


H.B. 28a



John Carter Brown
Library
Brown University

*The Gift of
The Associates of
The John Carter Brown Library*

HLN
50819







EPJCB

ELIZABETHÆ SERENISSIMÆ

Anglorum Regina.



Eteris nobilitatis tuę decora, lucisq; futura eximia indoles, Princeps clementissima, cum te à teneris Reginā potētissimā atq; felicissimā tacitis Providentię auspicijs primum designassent, deinde inauguraſſent: tum linguarū, diuinę & humanę Sapiētię splendor, ubi tandē in te totus effulsit, te virtutū omniū hāredē, vel potius heram admirabilē, extulit. Complures namq; fœminas *Natura*, *Fortuna*, formāve ad regiū decus olim euexerūt; sed earū plurimæ, quæ tantā nequiuissēt concoquere fœlicitatē, ut canit *Pindarus*, seipsas rerūq; summā pessumdarūt: beatiores verò nōnullæ in otio marcido & pace, nec ita diu, vulgatis Imperiis defunctæ sunt. Verūm, quis paterfamilias rei domesticæ, quis *Nauarchus* naui suę, etiā terra marive pacatis, æquius aut prudētius moderatur, quā tu deploratissimis tēporibus, multos iam annos, nō modò multarū Ciuitatū, sed etiam regnorū, & gentis sociæ animos cōposuisti? Ciuilem prudentiam, perhumanā affabilitatē, summā æquitatē, quotusquisq; etiam in viris ipsis, nedū in fœminis, non desiderat? at eæ dotes sunt tibi veluti domi vernæ, aut potius celestis in te bonitatis soboles. Quid enim aliud spiret aut agat mens angusta, pura manus, metus contemptor animus, malignæ sortis euersor, melioris autor, tolerantia victor, Deo hominibusq; charus, in cunctos etiam ignotos & hostes beneficus, serò seuerus? tu perpetuò pacis alumna tuis, aliis autor & pronuba fuisti, etsi terra mariq; copijs potens & formidabilis. Quin æmulatione priscae Patrū hospitalitatis, miserta trās marinas clades funestissimas, extorres ac omniū rerū, præterquā boni animi & pudoris, egenos, quoslibet pauperes, nobiles, ignobiles & ignotos, quos quidem non sua, sed temporum prauitas, aris, focis, & fortunis euertisset, tua ora, quasi sacra ara, exceptos, opibus refo-
uisti, spe erexisti. Nimirum humanæ sortis & ancipitis Martis


A.

gnara,

gnara, vicissitudines rerum periclitata fueras: imò sic facere iussa
fueras à Ioua Opt. Maximo, qui peregrinos humanè habendos; nec
secus atq; indigenas diligēdos & fouēdos, Abrahamidæ genti præ-
ceperat, quia ipsa in Ægypto peregrina fuisset. Ac quamuis hanc
Heroicā propensionē & bonitatē, quæ nos similiores & gratiores
Deo efficit, quàm vlla alia virtus, aut peritia, potius exoptare di-
scet, quàm æquare queat posteritas: tamen interfuit Mundanæ
Reipublicæ eam nosse: & alioqui tacita nostra tantorum meritōrū
veneratio, & virtutū admiratio, nunquam factura satis nostro sol-
licito officio & desiderio videbatur, nisi extitisset quodpiam mo-
numētum, quod nos ingrati animi suspicioni extimeret, & tam lu-
culentum beneficiū memori æuo repræsentaret. Sed cū tua fæli-
citas, nostra autē tenuitas, nos etiamq; vulgatas quaslibet opes &
laudes huic gratiæ recolendæ aut reponēdæ impares effecisset, præ
manibus tamē eiusmodi volumē Stirpiū nobis eſset, quale & quān-
opulentū nullusdū recētiorū edidit: id Maiestati tuæ offerri sane-
quàm æquum fuit, cōmune pignus nostræ omnium penitus, & per-
petuò obligatæ voluntatis, futurum. Quodq; aliàs ni tibi priuatim
nuncupassemus, spretæ gratiæ, fortè & plagii notā nobis inuſſiſſet.
Etenim harū plantarū, quædā indigenæ, plurimæ autē inquilinæ
tuæ Angliæ factæ, omnes demū tui mancipij iam dudū sunt. Quas
enim siccatas veluti cadauera, earumq; semina, rarissima &
ferè innumera, ceu animas, diuturnis peregrinationibus, & multo
sumptu è toto penè & ab vsq; extremo orbe cōquisitas, in hanc vr-
bem, quasi alterum orbem visuras, nondum Martis furia secundò
Gallias vastante, transuehi curassemus, easdem rediuiuas, fælici-
terq; enatas quā plurimas hīc habuimus: Earū itaq; virentium vel
euulsarū videndi copiam nos, amicorumq; horti, primū fecimus
Guillielmo Turnero claræ memoriæ Medico, & herbariæ Angli-
cè scriptori: postea D. Roberto Huick & Richardo Mastero, tuæ
Maiestatis Philosophis Medicis illustribus, ac D. Thomæ Fran-
cisco, raro rei Medicæ ornamento, alijsq; ampliſſimi collegij Do-
ctoribus celebrioribus, Caio Britanno, Richardo Caldwello, Io-
hanni

hanni Symingo, Eduardo Astlowe, Simoni Ludfordio, Richardo
Smithio, magnæque spei & peritiæ in hac parte D. Thomæ Pen-
nio: Demum exercitatissimis D. Hæctori Nonio, & Loppeo,
Lusitanis, ac D. Iulio Borganutio Italo, alijsq; non paucis literatis
nobilibus, ac præclaris viris Anglis & Fræcigenis. Mirum enim
quanta feracitate plantarũ sit, quam moderata soli & cæli tem-
perie faueat plantis peregrinis hæc insula: ubi cum possim alibi, tũ
industria & hortis fidiſſimorum peritiſſimorum & laudatiſſimo-
rũ Myropolarum Londinensium Hugonis Morgani initio, postea
Iohannis Rychei, etiamque Thomæ Graii & Thomæ Colf,
sata semina exotica, maxima ex parte in plantas latissimas eru-
perunt. Ergo Herbaria hæc familia quæ in tuo regno, regiaq; ciui-
tate adoleuit, eque uiuis naturæ typis solerti manu, partim iconib.
expressa, tota autem formis non inuenustis excusa fuit, sese iamdiu
tibi debuit: debemusque nos ipsos quantuli sumus tuæ Angliæ, ubi
dum peregrinando mederemur, & medendo peregrinaremur,
quamplurima simplicia, fide ferè & expectatione rariora nacti
fuimus: & gentis humanissimæ, lteratæ, generosæ, sed præsertim
aureæ, & eruditæ nobilitatis tuæ, non vulgarem amicitiam &
munificentiam experti sumus. Proinde nõ veremur quin regio tuo
cådori hæc medicæ Philosophiæ historiæ grata sint futuræ: ut quas
sibi nasci, penes se haberi, & foueri Imperatorũ & Regum sum-
mi sibi æquè honorificum ac utile semper duxerint. Egregijs quip-
pe eorum animis insita ~~et~~ immortalitatisve perpetuandæ fo-
menta, horum laude perennia fiunt, quorum item usu non magis
vita humana, vel potest vel carere vult, quàm igne aut aqua. Cæ-
saros quippe famelici aut sitibundi, imperia & mundos, tritico &
vino, si geant, commutabunt: Phloe autem arefacto ægroto, pul-
chrior & potior sit herbula Ros Solis vocata, in tua Anglia fre-
quentissima, ipso Sole. Et Chironio Thelephiõe vlcere sauciato,
sordebunt vel montes aurei, præ Sophia vel Nicotiana herbis.
Solani ope deceperunt & ceperunt Regem exercitumq; Nortue-
gorum Scoti. Dicat Palæstina & Africa ipseq; Magnus Sultanus
A.ij. quid

quid Oduardo Regi inclyto atauo tuo, Christiani velleris ad Oriē-
tem Argonautarum uni, iam iam ex venenato vulnere moribun-
do, animum retinuit, remque restituit. Quod si hac nostra tenuiū
homuntionū properata & penē abortiua opella, potius veritati
& utilitati, quā dignitati rerum consuluit, ac ne siquidem maie-
stati tuæ soluēdo fuit; nihil maius iam suppetit, quā altera huius
operis pars edenda, quæ Naturæ medicatricis vniuersam fermē
explicat opulentiam. Eam tuæ item clientelæ simul ac addixeri-
mus, pleno voto nos defunctos gaudebimus. Qui enim quā
potuit maxima dedit, abundē gratus fuit. Gratia au-
tem æterna Dei te tuumque solium intaminatis
augeat honoribus, & suæ sanctæ conse-
cret immortalitati.



ANTIQUISSIMÆ SIMVL ET NOBILISSIMÆ NITIOBRIGVM
ACADEMIÆ REGIIS PROFESSORIBVS, COETERISQVE
Benemeritis praeceptoribus MonsPELLIACIS,

OPERIS ARGVMENTVM & Emolumentum.



TSI quaedam fatalis Orci filia feritas, diris extrema deformitatis exemplis iam-
dudum isthic grassata, tantam stragem mortalium imo & virtutum vastitatem
fecerit, ut non tantum vrbes & Academias ferē vbique Galliarum, studiosis ho-
minibus, sed etiam studiosos ipsos officiosa, grataque humanitate exhausit:
tamen istius vrbis, gentis & soli amoenissimi, vestrique & commilitonum amo-
ris, & collata in nos beneficentia suauissima recordatio, tantum & tamdiu apud
nos viguit, dum non modō nō ingratos esse sinisset, sed etiam fecisset audaces. Qui-
pe variis & celebribus in Academiis & regionibus Europae multū & diu versatos
nos, tum praeceptoribus Medicis & Philosophis eruditissimis vsos, vestra tandem

Schola exceptos, ea nos accuratione & exercitatione de integro excoluit, ut minime opera posita postea vnquam
poenituerit. Cumque inter studiorum oblectamenta, herbariam cognitionem veluti condimenta quadam lau-
tiora ieiunioris aut asperioris Medicae Physica haberemus, eoque nihil ferē herbarum in Italia, Germaniis,
& reliquis Galliis, aut finitimis regionibus, vel inspectione vel sciscitatione inexploratum reliquissimus: ta-
men posteaquā pari vel maiore sedulitate Norbonam tum Mediterraneam & montanam, tum Mariti-
mā varijs item rusticationibus lustrassimus, multas deesse ceteris regionibus, quæ huic abundē familiares essent,
nec paucas superesse cognoscendus iis doctissimis vestigatoribus, qui multas nos docuissent, comperimus. E-
nimvero si delitias & diuitias plantarum, quæ Norbonensi agro cis transque Rhodanum Lyguribus & Pyre-
neis alpinis, utring, maritimis cōtermino, virent, cum plerisque Septentrionis, vel ipsis Italiae tractibus, quis con-
ferat hasce saltus & pascua, lumas aut desita loca putet: Norbonenses autem praefecturas, amoenitate & varie-
tate feraci Elysæa vireta dicat: illis quidem sparsim multa & rara, sed hic tum eadem, tum longē plurima &
letiora

latiora etiam in montis & conuallis ambitu pusillo, quasi uno Europæi Orbis compendio, occurrunt. Tanta inibi agri ætherisque consensio & aura blanditiæ eas fœnent, ut montes Meridianas ab æstu, conualles autem Septentrionales aliosas à frigore, vindicet: ut nec iam aliò cupiat Apollo suam sacro sanctam Musarum Asclepiadarum Aganippen, aut montem illum Pelion olim celeberrimum, quàm Montem Pelium, translatam. Quare qui iam tum multa lætione, rerum exercitatione & vestra indagine, hæc plan-
tas diligenter conuassæmus, præsertim quas nondum in literas missas rebamur, veriti communem bien-
nio post sequutam naufragam tempestatem, atque auidi noscendi, nū plures nostratibus & rariore alerent
Aquilonia plage, quæ minus videntur notæ fuisse antiquis Botanicis, huc in portum tranquillitatis, easdẽ
nosque unâ commodum subduximus: ubi rursum isto quadriennio tam multas consequuti sumus, partim
hic oriundas, partim satas, etiamque ex utrisque Indiis & Africis inueltas, ut earum numerus penè al-
tero tanto, vel Theophrasti, Dioscori & Plinii, vel Marboli & Dodonei, qui ut posiremi omnium hæc
familiam ditarent, ita primâ laudem meriti sunt, copias superarint. Ea igitur mundi senectû cū in Phi-
losophia sinu vestrum omnium interitum, imò & bonarum artium τὸ πολὺ εὖ penè eluxissemus,
quò iacturam tam excellentium mercium, & dispendia temporum lucrifaceremus, lubuit quantum vs-
piam habuissemus & meminisse potuissemus vulgatorum & rariorum herbarum de integro recensere,
easque institutorum more, quasi in paginis dati & accepti suis popularibus exaduerso aggregare: quod genus
commentarii Cicero **ADVERSARIA** A vocat, quia tumultuariè & è re nata cõ recens accepta
debiti portiones potius congerantur quàm digerantur, ex quibus postea codices absoluti consunt. Quo qui-
dem nomine, ne utiquam nouandi, aut cuiquam aduersandi, sed potius modestiæ causâ & calumnie eluden-
dæ, vobis hæc muneri mittere maluimus, aut potius vestratim remittere & remetiri beneficia καὶ χάρις,
ut ferunt Charitum leges, quàm absolutum opus profiteri: unde futurum speramus, siquidem vobis va-
cat (debet autem vacare & placere) ut ista aduersaria, siue opum non modò Norbonensium, sed utriusque
orbis congeries, in codices nitidos vestris perspicacioribus iudiciis redigantur, nec parum gratiæ à vestra
dignitate consequantur.

¶ Ceterum, ne huius naturæ partis, quàm πολὺ εὖ iure Theo-
phrastus vocat, immensitas, Tyronibus metum vel laborem nimium afferret, nève nescio quis Caprimul-
gus, insitutum, res, aut ordinem, potius quàm flores aut fructus in hoc opere carpat, monendus est benignus
læctor, nos summo studio habuisse, ut quàmplurima paucissimis commodissimè diceremus. Proinde ad-
uersariorum voce nouas veteribus additas plantas, & nouum ordinem quadantenus inuimus. Qui
ordo utique sibi similis & vnus progreditur, dicitque à sensui propinquiorib. & magis familiarib. ad ig-
notiora & compositiora, modumque siue progressum similitudinis sequitur & familiaritatis, quò & vni-
uersim & participatim, quantum licuit per rerum varietatē, & vastitatē, sibi responderet. Sic enim ordine, quo
nihil pulchrius in cælo, aut in Sapientis animo, quæ longè lateq. disparata sunt, vni quasi fiunt, magno ver-
borum, memoriæ, & cognitionis compendio, ut Aristoteli & Theophrasto placet. Verum, si idem quod, illis
nobis hic contingat, nempe ut quàm instituisent methodum, non potuerint vsquaque sequi, operis inscrip-
tio, & turbuleti huius cui quo hæc apparabamus, fluctuatio, nos excusatos habeat, apud eum sanè, qui no-
uit tantò plus habere perplexitatis tantum negotium, quantum venia minus. Quamuis dum reliquarum
stirpium, quæ hic non habentur, quasque plurimas per superiorem calamitatem, huc ex Galliis accersere
non licuit, Icones εἰς τὸ μέγαρον arguta manu & emodulata ad plantarum ipsarum magnitudines &
effigiaturas proportionē (quàm alii pictura solacis crebrò deformant, dum arbores & frutices æquẽ
magnas ac herbulas pingunt) delineantur & exsculpuntur, datur opera in nostra appendice & Synopsi,
ne quemquam huius læctionis peniteat: Quin eum pudeat potius penituisse, nec vidisse domi & vno in-
tuitu, sibi nusquam visâ aut lætâ, quæ multis mēsis aut annis pauci vix videre potuerunt. ¶ Et quia
plantarum duplex est cognitio, altera nempe de facie exterior, altera virium, quasque interior: illam
huic anteuertere oportere monet Philosophi opera, imò ipsa Natura. Neque enim potest quis vllam certâ
cognitionem sibi arrogare eorum simplicium quæ nunquam aspexit. Proinde nos primum cuiusque no-
menclaturam, ut quæ non raro ipsam rem aptè notat, è Græcis præsertim, enucleare conati sumus: obi-
ter Regionem, & in ea seorsim natales, illam Geographiam, hanc Corographiā vocant, præstius quàm quis
quam autor antè hæc designamus: ut quasvis plantas, quò loci, quando & à quo ipsi nascisci, vel amicos
rogare mittendas, ubicūq. tandè nostri orbis, vel Indiarū ille orirentur, scire possemus. Descriptiones au-
tem inter congeneres & similes, de similitudinis, collationis, & similitudinis ope, breuiores semper, emẽ-
datiores plerumque & faciliores aptauimus, non tam antiquorum historia, quàm iteratè inspectioni
& ex viuis ipsis plantis expensionem, quàm penes ius est & norma rectè & verè describendi. Sed vires par-
cius & consilio eatenus attigimus, quantum vel ad cognoscendum, vel ad probandum, quampiam vnam
plantam satis videbatur, Aristotelem nempe in alio, & Theophrastum in simili instituto, imitati. Nam re-
centiores quidam, qui Cõmentatoris nomine turgent, potius videntur suū fastum, quàm plantas viamve
eas noscendi describere. Nec ex locis natalitiisve seriem historiarum inire, ut doctissimus & can-
didissimus scriptor Dodoneus cepit, sinunt plantæ plurimæ, quæ tum aridis, tum humentibus & riguis e-
rumpunt, ut Cardamine in vinetis, vijs, & riguis: Lapatium utrunque, utrobique, aut ubique. Quæ

NOMI-
nis occasio.

Insitutum

Ordo vni-
uersalis.

Iconum e-
modulata
proportio-
nes.

Methodus
perticularis

Etyma.
Natales.

Secunda o-
peris pars.

dum in montibus pariter & conuallibus, ut Eryngia, Calamentum, Polium, & alia quamplurima. Et quod in primis obseruatum dignum, quae iugis montium regionum calidiorum proueniunt, eadem in planis, syluosis vel depressis regionum Septentrionalium exeunt. Gracorum uero auctorum extant potius Indices Alphabeticis, quam simplicium Methodi, praeterquam opus Dioscoridi & fragmenta Crataei, ex quibus illi uires & uerba mera exscripsisse videntur: utinam notas non neglexissent: aut eo pudore fuisset Plinius, quod diuinus Seneca, qui se parum in Stirpium cognitione profecisse, professus est: aut Dioscoridem diligentius legisset, cuius nusquam meminit. Dioscoridea tamen methodus, optima quidem illa, illis qui iamdiu nouerunt plantas: uerum ad cognitionem compendiosam, Alio uero. Placuit inspectione uel, quam tantopere laudat Dioscoridus, comparandam, minus est accommoda. Diuersis quippe libris eiusdem speciei & similitudinis plantas distrabit, quas aliqui uno intuitu ferè discas: ueluti Cucurberem syluestrem à satiuo, Colocynthides, siue Cucurbitulas, ab esculentis Cucurbitis, Thapsiam à ferulaceis, Crocum à Colchico, Scammonium & Soldanella, à uolubilibus, Sisymbrium à Menta, Hieracia à Chondrillis, & quamplurima passim: Tamen si alicubi uolens à sese descendit, sequutus, quam nos hic adumbramus, Methodum, ut in Portulacis, Semperviuus & aliis. Quamobrem accuratiorem expensionem, & aduersus uitae hostes morbos munitiorem τὰ ἀνὰ νόσιν seorsim aggressi sumus, ne palilogia Aristoteli inuisa, uiam docendi commodiorem, interciperemus: quam non secus atque hanc partem, praesius, & ex minutiarum, rerumque particularium obseruatione, ac perpenione abstrusarum uirum uirtutis & quartae qualitatis, ad Philosophicam normam exigemus: Sed paucioribus, aptioribus, nec iteratis uerbis, ut solent isti Scandici nuperi. Quin etiam aperiemus laternam, unde istae Noctuae aut Scarabei νοττοφάγοι, lucem mirificam patefacta Medicinae polliciti, tenebrosa fuliginis carbonaria & stercorearia laetricem, quasi Telephum pamosum apud Tragicos, in Reipublica literaria Scenam introduxerunt. Qui si quam se iactant Christianos, tam esse humani, ne uiquam uellent calidius sibi patefacta ista arcana, tamdiu nos celare, quae ipse Genius Raphael, qui cum familiaris illi loquitur, praecepit ultro referenda: Nam, inquit, Regum secreta tacere, sed Dei opera pandere, honoris est. Aut si istae docere nolunt, quid nos popularesque, suos tam diu vexat, forte morituros horum vel ignoratione, uel desiderio? Nam profecto adhuc conquerruntur Elephantiaci & Leprosi, quos isti Aureoli libelli coniecerant in latitiam stultissimam, de duodecim Leprosis à magistro curatis. Quid si iuxta uicem hic Asclepiadem opprobrium & terror, quamplurimos, ut faceret nostras Gordonius de Galeno dicebat, curauit, quorum nullus euasit? Ferendi tamen aruscatores isti, ubi nullius incommodo, & doctiorum risu, de religione, caelo, & Meteoris barbarè balbutientes, pie poti delirant: At ubi impudentius antiquitati, herbariaque particulari cognitioni conuiciantur, nec tamen rerum nos quicquam docent, uti nos hic eos, sed potius fumos & perneabilia Pharmaca agris pinsent & uendunt, ipsi scutica, belluli isti Aureoli spongia, egent. Sanè ita mihi habet Apollinem secundum, nisi malim unam Myhridis antidotum, quale etiam Lōdini superiore anno, simplicium exquisitioris delectu, summa fide & sedulitate egregii Pharmacopoei Hugonis Morgani paratū, certissime uis, penè dixerim Venetis & Florentinis efficacitate praesentioris, non semel aduersus luem pestiferā aliosque affectus grauissimos experti sumus, factūque periculum audimus ab excellentissimis huius regni Medicis, quam istorum Cuiusmodi quintas ineptias, caelos & Cherubos flammis. Ut Deus Optimus maximus optimū faciat inchoo Vidamio Carnutensi, Maligneo, totius integritatis & literate Gallica nobilitatis Phoenici, qui primū alterū nostrū ferè ab hac insania persuasum, e natura sine de proptis lectissimis rationibus auertit, comodioraque & incūdiōra de metallis, arcanisque Philosophia, sapere docuit. Quare si sapiunt, imò ut sapiunt nostris periculis tyrones, monemus & rogamus, ut rei herbariae totius Medicatricis certissima, utilissima, incūdisima, etiā minima quaeque explorent, persuasumque habeant, in istis Dei diuitiis nihil vspiam esse despicabile aut indignū homine Philosopho, cui uni hac ille cōdidit, uoluitque, ut est in sacra pagina, nos sanari herbis, non uerbis, ne Sapientiae suae opera irrita forent: ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς & uelut, ait Philosophus. ἐν ἐστὶ τὴ θανάτου. Nec putent tritico, uino, lacte & melle, olusculo, aut herbulis etiam contemptissimis, non posse corpora aequè sanari atque alii: Neve Aristippos quosdam sericatos, undulatos, auri & auræ popularis, quam penitioris eruditionis siticulosiores, audiant, quos pudet hac serò doceri, & discere serio, arduisque laboris, tadeat. Vosque praecipuos clarissimi, impendio oramus, ut multorum annorum, regionum & uirorum doctissimorum aduersaria hac, non secus ac peregrini aut hostes expendatis, foueatis autem, concinnatis, & augetis ut parietes: nosque, sicubi nolentes lapsi sumus (imò quia saepe sumus) benignè moneatis. Nec enim laudem ueniamur, duntaxat culpam uel inuidiam deprecamur: uelut cetero amor, beneque sibi animi nostri consciū, quos multi anni, multa peregrinatio, studia, omniumque rerum arctissima necessitudo, amicitia deuinxit, nobis abundè premium & precium sunt futuri. Londini pridie diuini Natalitii. 1570.



In Stirpium aduersaria Mathiæ de Lobel & Petri Penæ INDEX.

NE FRVSTRA VOLVMINIS MOLEM AVGERENT ELENICH
IDEM HVC INCVLCATI & ACERVATI, QVI REPERTV FACILLI-
mi, & multò locupletissimi cuilibet inter euoluendum patebunt, hic duntaxat
Indice summa genera Stirpium complecti, visum fuit.

- A** Bies, Pthoropis Theoph. 450 Enagallides. 194. 195. asclepias, siue Vicetoxicum. 278.
Abrotani diff. variet. 341. 342. Anagyris diff. varietates. 388. ascyrum, siue ascyurus. 173.
Abynthii diff. variet. 335. 337 Anchusa disse. var. 247. 248. 249. aspalath: differen. 427.
Abutylon Auicenna. 294. Androsachis. 165. aspalathus. 29. Mo. an Scorpio Theo.
Acanthi varietates, differen. 365. Androsenum. 173. asparagi & Corruas diff. variet. 353
Acarna Theoph. 373. Anemones spec. 112. 113. 114. 115 asperula, siue aspergula. 357.
Acati adiffer. varietates. 409. 410. Anethum. 347. asphodeli genera, varietates. 45. 46.
Acatie cognata planta. 451. angelica. 311. asphodelus Hesiodi. 85.
Aceris varietates. 443. anguina, siue Dracunculi disse. 261. asplenion, siue Ceterach Officin. 360.
Achyillea, vide stratiotes. Anisum. 322. assa dulcis & foetida. 311.
Acini herba varietates. 215. anonis varietates. 378. aslone Anguil. 374.
Aconiti differe. va. 289. 300. 310. anthemides, siue Chamemilla. 342. astratia nigra, Elleborus nig. Do. 304
Acori differentia. 29. 205. anthora. 301. asteris differe. varietates. 147. 148.
Aculeosa Gaza an Polyac. Th? 374 le. anthyllis Peplios effi. 195. 196. alt. lege aster Italorum. fruticosus luteus.
Adonis, videtur Phlōz Th. 115. 344 anthyllis Chamapithoides. 164 (ibide asragallus Monspell. 137
Adiantum Dios. & Plinii. 361. antirrhini differen. varietates. 175. astragali persimilis plantula. 404.
Aeglops. 10. Aeglops Tragi. aparine. 357. attrayilis. 372.
Æthyopis. 242. aphaerca, vicea agrestis, aracus Dod. triplicis differen. varietates. 96. 97.
Agallochum. 428. Aphaerca The. an bourgesime Monsp? auellana nūces. 441.
Agaricum Larignum. 449. 421. auena differentia. 9.
Agerati diff. varietates. 207. 208. aphyllanthos Monspell. 190. aulitis harundo seu tibicnaria. 28.
Agnos. 423. apiastrum. 220. aurea virga, an Leucographis P. 125
Ainga. 164. apios. 204. differentia. 205. auricle muris, vide Pilsella. 200
Aizoon maius & minus. 161. 162. apium hortense. 314. auris Iude. 434.
Alabastrites, siue Coralloid. Cor. 305 apocyni differentia, variet. 279. auricula Leporis, vide Bupleurum.
Alkanna Arabum, vide Ligustrum. aquifolium, siue agrifolium. 431. 430
Alcea differen. varietates. 295. aquilegia an Pothos Theoph? 339. Baccharis. B. 245
Alchymilla, siue stellaria. 298. arabis, siue Draba. 78. Ballote, vide Marrubium fetidum.
Aliser Gallorum. 441. arantia in Medico malo. 425. Balsa. cucumerina punicea. 289.
Alisma, an Plantago aquatica? 127 arbutus, siue Vnedo. 424. mina femina Persici folis. 134.
Alliaria. 228. Allia. 58. 59. araci, siue Cracca differentia. 401. Bamia Eben. 295
Alnus proximè Betulam. 440. arbor Iude Monspell. 441. Barba Capree, vel Vlmaria. 318.
Alni nigri siue Fragula inscriptio red. arction an Persolata Pli. 253. Barbarea, vide Pseudobunias. 70.
aenda sequenti capite, & dele Nux argemone. 112. Bardana. 253.
Auellana. 440. argentina, siue Potentilla. 308. Batecha nigra Auic. Citrullus Offi.
Alopecuros Th. 17. Pl. in Melapvro. Agia. 435. Battades, siue Ignames. 317.
Alfmes disse. varietates. 193. 195. arisari varie. diff. 260. 261. Pli. aris Batrachii differen. varietates. 298.
Althea diff. varietates. 293. 294. arisfolochia differe. varie. 264. 265. Baucia, an Elaphoglossum. 317.
Alhpi species, varietates. 158. 160. armeniaca mali differen. vari. 436. Bedeguard, vide Spina alba.
Alhsson. 255. armeria. 188. varietates. 189. Bdellium. 426.
Amelancher Gallopronincia. 441. arnabo. 35. 36. Becabunga, non est Capea. 195.
Amaraci varietates. 212. 213. arnoglosson. 127. Bechion, vide Tusilago.
Amaranthi variet. 95. 203. 294. arum Egyptiū & arū vulgare. 290 Bellidis diff. varietates. 199. 200.
Ambrosia. 341. arthemisia. 340. 341. (260. Ben, vide Glaus unguentaria.
Amelus Virg. in Asfere. arundines. 19. Benzoin no est succus Cyrenaticus 311
Ammi, diff. an Bubonii Hip. 323. arundinacea spinosa planta. 452. Berberis, spina S. quorundam. 439.
Ammoniacum, in Ferulis. asarū, siue Nardus rustica. 261. 262 Beta & Blitis diff. varietat. 93. 94.
Amomum Pli. 444. aliud ibidem. asaradrachi auicenna. 416. Betre, vide foliū. Botonica diff. 229.
Amurca. 422. asarina. 262. Betonica syluest. Diosanthos Theop?
Amygdala. 423. ascalonitidis antiquorum. 58. Anguil. *

<i>Betula</i> .	440.	<i>Carlina</i> syl. vide <i>Acarna</i> Theoph.	<i>Chamemespilum</i>	435.
<i>Bifolium</i> , <i>Ophris</i> Pl.	127.	<i>Carobia</i> .	414. <i>Chelidonium</i> Maius nū virga tincto-	
<i>Bipinella</i> , vide <i>Pimpinella</i> .		<i>Carotta</i> alba, nigra.	323. nū <i>Auicen?</i> Minus.	339
<i>Bipinel</i> , sive <i>fra. an Phelladriū</i> Th. 321		<i>Carotta</i> latifolia alba, siue <i>Pastinaca</i> ,	<i>Chermes</i> , vide <i>Requet.</i>	
<i>Bipinella</i> sanguiforda, vide <i>Sideritis</i>		an <i>Dioscorid.</i> <i>Elaphoboscum?</i>	<i>Chrysi</i> different. varietates.	418.
altera <i>Diosco.</i>		<i>Carpinus</i> .	440. <i>Cisti</i> folio arbor noui orbis.	452.
<i>Bistorta</i> varietates, differentia.	120.	<i>Carpobalsamū</i> eiusq. succedaneū.	415. <i>Chrysanthemi</i> different. varie.	237.
<i>Blattaria</i> , an <i>Chrysogonum</i> .	243.	<i>Carui</i> .	323. <i>Christophoriana</i> , vide <i>Elleborus</i> niger	
<i>Bolbanac</i> , <i>Lunaria</i> Graca. 136. 137		<i>Caryophylla</i> .	427. <i>Chrysanthemum</i> litoreum.	171.
<i>Botrys</i> .	80.	<i>Caryophylli</i> floris dif. vari. 188. 189	<i>Cith. tertium</i> <i>Matthi.</i> pag.	491.
Bouckwey Belg. <i>Erisymū</i> Th. 395		<i>Caryophyllus</i> differentia, va.	309. <i>Chrysocome</i> est <i>Amaranth. luteus</i> Fus.	
<i>Brassicarum</i> diffe. variet. 90. 91. 92.		<i>Gracorum</i> .	425. <i>stachas</i> citrina <i>Offici.</i> & <i>Lynaria</i>	
<i>Brassica</i> } <i>Monospermon</i> .	92.	<i>Cassia</i> } <i>Poetica</i> & <i>Theo.</i>	184. aurea. 303. <i>Chrysogonos</i> .	243.
<i>marina</i> . } <i>Soldonella</i> .	263.	<i>Purgatrix</i> Arabū.	414. <i>Chyna</i> , vide <i>Schyna</i> .	
<i>Bourgespi</i> , <i>Mos.</i> an <i>Apharca</i> Th. 421		<i>Cassitha</i> Pl.	182. <i>Cicercula</i> altera.	394.
<i>Britannica</i> varietates differ.	121.	<i>Castanea</i> differentia.	433. <i>Cicerbita</i> aspera, vide <i>Sonchus</i> .	
<i>Brunella</i> , vide <i>symphitum</i> petreum.		<i>Catanance</i> utraque.	399. <i>Cichoreorum</i> genera vari.	82. 83.
<i>Bryonia</i> .	275.	<i>Cataputia</i> minor. 153. maior.	306. <i>Ciciliana</i> Italor. <i>Climenon</i> Pl. Ang.	
<i>Briza</i> .	9.	<i>Cattaria</i> .	219. 220. <i>Cicuta</i> , <i>Cicutaria</i> differen.	326. 327
<i>Buglossi</i> & <i>Borrag.</i> dif. va. 246. 247		<i>Caucalides</i>	224. 225. <i>Cinnamomū</i> .	425. <i>Circea</i> .
<i>Bulbi</i> & <i>Bulbina</i> . 49. 52. 56. 58.		<i>Cauda</i> micris.	187. <i>Cynobaton</i> .	446. <i>Cirsii</i> diff.
<i>Bunis</i> & <i>Buniadis</i> discrimen. 57. 71		<i>Caulium</i> varietates, different.	90. 92. <i>Cirsion</i> luteum <i>Sequanorum</i> .	373
<i>Bupleuri</i> differentia.	191.	<i>Cedrus</i> Libani, phoenicea, <i>Lycia</i> .	448. <i>Cissampelos</i> <i>Helxine</i> dif.	274. 275.
lege <i>Bupthalmos</i> .	343.	<i>Cedrus</i> Theoph. <i>Dioscor.</i>	425. <i>Citria</i> , siue <i>Cidromella</i> .	425.
lege <i>Bupthalmum</i> alterum.	343. 345	<i>Centau-</i> } <i>Maius</i> . } varie.	318. <i>Citrullus</i> <i>Officinarum</i> .	226.
<i>Bursa</i> <i>Pastoris</i> .	76.	<i>rium</i> } <i>Minus</i> . }	173. <i>Clematis</i> peregrina different.	275.
<i>Butomos</i> , vide <i>Sparganion</i> .		<i>Centummorbia</i> .	198. <i>Clematis</i> daphnoides varieta.	282.
<i>Buxus</i> .	419.	<i>Centumnodia</i> , vide <i>Polygonum</i> .	<i>clinopodium</i> .	217.
		<i>Centūculi</i> , siue <i>Gnaphal.</i> dif. 201. 202	<i>chymeni</i> differentia.	230. 279.
		<i>Cepa</i> different. varietata. 56. 57. 58.	<i>cnicus</i> .	374.
			<i>cnicus</i> sylue. uterq., vide <i>carduum</i>	
C.			<i>benedictum</i> & <i>Attractilidem</i> .	
<i>Cacalia</i> .	255.	<i>Cepa</i> herba.	169. <i>cnicus</i> sylue. uterq., vide <i>carduum</i>	
<i>Cakile</i> <i>Scrapionis</i> .	77.	<i>Cerasi</i> varietates, differentia.	436. <i>benedictum</i> & <i>Attractilidem</i> .	
<i>Cacubalum</i> Pl.	104.	<i>Ceratia</i> .	414. <i>coccus</i> , siue <i>Ilex</i> <i>coccifera</i> .	430
<i>Calaminthe</i> diffe. varietates.	219.	<i>Cercis</i> Theoph.	441. 431. <i>cochlearia</i> differentia.	121.
<i>Calamus</i> odoratus.	29.	<i>Cerefolium</i> .	324. <i>colchicum</i> , vide <i>Ephemerum</i> .	53.
<i>Calamocorus</i> , siue <i>Arundo</i> florida.	28	<i>Cerinthe</i> Plin.	172. <i>colocasia</i> .	259.
<i>Calceolus</i> <i>Marie</i> .	127.	<i>Cerucaria</i> , siue <i>vulneraria</i> .	138. <i>colocynthides</i> .	287.
<i>Calcitrapa</i> Ruel. an <i>Coronopus</i> Pl?		<i>Chamaecyffos</i> .	268. <i>colus</i> <i>fovis</i> , siue <i>Galiopsis</i> lutea.	241.
<i>Calendula</i> .	237.	<i>Chamedaphne</i> .	155. <i>colutea</i> differentia.	406. 405.
<i>Caliba</i> differentia.	237. 256.	<i>Chamedryos</i> diffe. variet.	209. 210. <i>colycea</i> Theo. an <i>Frangula</i> .	440.
<i>Campanula</i> lasura, vide <i>conuolulus</i>		lege <i>Chamaeficus</i> .	442. <i>condrilla</i> .	82. 83. 85.
<i>Hederaceus</i> .	174.	<i>Chamalea</i> dif. varietates.	157. 158. <i>Conisa</i> different. varietates.	145. 146
<i>Capanule</i> differ. varietata. 139. 117.		<i>Chamaleon</i> albus, niger.	367. <i>consiligo</i> , vide <i>Ellebo. ferula</i> . Th. 351	
<i>Caphorata</i> an <i>Chamaepeuce</i> . Pl?	174	<i>Chamaleon</i> lene Theoph.	367. <i>consolida</i> Aurea nemorum.	125.
<i>Canchamon</i> , eiusque succedaneū.	428	<i>Chamaleontha</i> <i>Monsp.</i>	366. <i>conuoluli</i> .	271. 272. 272.
<i>Cannabis</i> species, varietates	226. 227	<i>Chamaleuce</i> .	208. lege <i>consolida</i> minores <i>Offi.</i>	199. 200
<i>Canabrica</i> Plin.	188.	<i>Chamemespilum</i> .	435. <i>consolida</i> maior <i>Officinar.</i>	251.
<i>Capnos</i> , vide <i>Fumarias</i> .	339.	<i>Chamemilla</i> .	342. <i>cor</i> <i>Indicum</i> , an <i>Isopyrum</i> .	228.
<i>Cappares</i> .	281.	<i>Chamaepeuce</i> Pl. an <i>Caphorata</i> .	174. <i>coris</i> <i>Monspell.</i> & <i>Mat.</i>	174.
<i>Capsicum</i> <i>Actuarii</i> .	134.	<i>Chamaepithis</i> mas lege <i>Auga</i> .	164. <i>coriandrum</i> .	314.
<i>Caput</i> <i>Galli</i> , an <i>Onobrychis</i> .	402.	<i>Chamaepitis</i> prima odorator <i>ibidem</i> .	<i>cornus</i> utraque femina Th. & <i>Dod.</i>	
<i>Cardamine</i> .	71.	<i>Chamaepitis</i> altera <i>Dios.</i> an <i>Vermicu-</i>	est virga <i>Sanguinea</i> <i>plinii?</i>	436.
<i>Cardamomi</i> differen. vari. 444. 445.		<i>lata</i> frutescens?	163. <i>coronopi</i> differen. varietata.	186. 187.
<i>Cardiaca</i> differentia varietates.	221.	<i>Chamaepitis</i> <i>mosc</i> hata, vide <i>Anthyllis</i>	<i>corylus</i> <i>persimilis</i> <i>Aino</i> .	441.
<i>Carduorū</i> dif. quāplurima. 364. 365		<i>Chamerbodoedēdos</i> dif. va. 154. 155	<i>coronopi</i> & <i>Sedi</i> media planta.	187.
366. 367. 368. 369. 370. 371.		<i>Chamariphes</i> .	451. <i>corruda</i> .	353.
372. 373. 374. 375. 376. 377.		<i>Chamefyce</i> .	154. <i>costus</i> <i>spurius</i> <i>Illyricus</i> .	318.
<i>Carlina</i> varietates, differentia.	367.	<i>Chamemelum</i> seu <i>Chamamaliū</i> .	342. <i>costus</i> albus & <i>buxeus</i> .	441.

Molucensis corticosus rugo- *tulis squarosis.* 236. *Dryopteris*, aut *Querna Filix.* 363.
Costus { *Molucensis lignosus ferni-* *Cymbalaria Italica hederae folio.* 269 *Ma.* *Meloton Theop.* cap. 10. *Lib.* 3
dior. 35 *Gynium regium, Ethiopicu, Gal-*
Hortensis Gallis Cocq. 135. *latium, Basilicum Hippoc.* 330.
lege Cotinos Plinii & Rhus Allobrogii Sylvestre Gynium
413. *Cotonaria vulgi, vide Gnaphaliu.* 200 *Alterum silicosum* } 330.
Cotula vide Anthemides. *Cynara vide Scolimus Satiuus.* *Ebennus vide Hebenus.*
Cotula, siue Parthenii marinum mi- *Cynocrambe.* 100. *Echion, siue Buglossum agreste.* 249.
nimum. 345. *Cynoglosson.* 250 *Echinomelocactos vide Melocar-*
Cotyledon. 164. *Cynobatos.* 446 *dus.* 374.
Cotyledon minus sedifolio motani 165 *Cyperus rotundus duplex.* 37. *Elaterium albu Dio. lucernis admo-*
Cotyledon aquatica acris Septetrona- *Cyperus longus duplex.* 37. *tum facile accenditur.* 288.
lum. 165 *Cyperus Graminea, siue miliacea.* 38. *Elaterii optima nota parā, mod°* 288
Cotyledon marinum vide Androsa- *Cytinus flos Punici.* *Elatine Dioscorid. Veronica femina*
ches. 165. *Cytisus Dioscorid. & Galeni.* 387. *Fusch.* 197.
Crategonos. 11. *Cytisus altera minor & vulgat.* 388. *ελαικρυου Theo siue Agnus castus.*
Crista Galli recentioru, num αλεντο- *423.*
ποδοφ & Pli. an num potius Al- *ελαικρυου Chrysanthemum.* 331.
liaria recentiorum. 227. *Ellebo, albu, siue Epipactis.* 132. 131
Crista Galli altera, siue Pedicularis *Dactylon gramen Plin.* 4. *Ellebor. Alpina Saniculae facie.* 298
ibidem. *Damasonum, siue alisma.* *Elleborum albu.* 131.
Cnysogonu vide Tormentilla & Blat *Daphnoides vide laureola.* 156. *Elleborus niger Theo. fol. Ferule* 351
taria. *Daucus Creticus verus Diosc.* ? *Elpho Hispanica, vide Spartium mi-*
Cnithmum, seu Crithamon, an Portu- *alter.* 323 *nus.* 408.
laca Marina? 165. *Daucus niger Theop. Carotta.* 323 *Empetron Rodellety, Batis Pli folio*
Cnithmum tertium Mat. Aster At- *Daucus vstator Officinariu, ibidem.* *crasso in modu Portulacae, flore albo,*
ticus Marinus. 168. *Delphinion.* 329. *semine Libanotidis, vide Crithmu.*
Cnithmum quartum Mat. 168 *Dens Leonis alter Monspel.* 83. *Endiua, siue seris satina.* 85.
Maiores Plinii. 271. *Dens Leonis, siue Vrinaria.* 84. *Enduiarum Varietas.* 86.
Cnol- { *Minor purpureus.* 272. *Dentillaria Rodelletis an Molibdena* *Endiua syl. non est lactuca syl.* 86.
ulus. { *Minimus foliis Lynariae* 274 *herba Pli: Lepidiu Pauli Mon-* *Ephemeru, siue strangulatorum Cro-*
Coeruleus hederaceus. 174 *spell.* 136. *cistoru & Bulbifolium hermodacty-*
Crocodilio { *Magnum Ety.* } *Diacridium vide Scammonium.* *li vulgares Syl. Croccum vulgi.* 53.
Marantha & Fuschii. } 368 *Dictamus.* 214 215. *Ephemerum Syri. cum & Alexan-*
Dracunculus { *Dictamus albus vide Tragium.* *drinum.* 54.
Dracunculus { *53. Digitalis purpurea.* 145. *Ephemeru Anglicu flore candido.* 54.
Crutiata vide Gentianellas. *Digitalis lutea.* 145. *Ephemeru non venenatum Dioscoridi*
Crutiata minor. 358 *Diosanthos Theoph. videtur Superba* *Liliiflorum, Iridifolium, an Her-*
Cyclamen folio hederae. 264. *Germanorum.* *modactyli Officinarum Tralliani*
Cucumer Elaterii sylvest. 288. *Dipsacum an spina Selenites Theoph?* *& Pauli idem.* 54.
Cubebe. 427. *Galeadragon Senocratis Ang.* *Epimedium an Epipetrum, vel Epi-*
Cucumis { *Satiuus.* *Dipsaci satini fulloniu & sponte nascent* *meron Plinii?* 138.
flexuosus siue Angui. 285 *tium labri venerei ascrimen.* 373. *Epipactis duplex recentiorum, siue*
Cucurbita siue Zucca. 287. *Dorea Norbonensium, an Theophr.* *Elleborine.* 132. 131
Varietates, Lagenaria maior & *Panax chiorium & Plinii Phar-* *Epipetrum Pli. vide Epimedium.* 138
minor. 287. *naceum.* 124. *Epipetrum Theop. vide Acinus.* 215.
Cucumis sylvestr. 288. *Doronici Varietates.* 290. *Epithymum.* 181. 182
Cucurbita Sylue. amara apud *Elizeu Dorycinon Monspeliense.* 388. *Epithymbra.* 181. 182
Prophetam 237. *Dotterblumen Germanorum vide Equisetum vide Hippuris.*
Cunila siue Origanu Heracleoticum. *Caltha palustris & farfrugu.* 256. *Eranthemum* 344.
Cupressus. 446. *Draba vide Arabis.* 78. *Vulgator.*
Curcuma. 33. *Draco aut potius Tarchon Symeonis* *leg. Purnilla.*
Cyanus vulgaris. 236 *Seti & Auicenna.* 190. *Erica* *Alisor lunigressilla.*
Cyanus { *Maiores hortensis.* 236. *Dracuncul' maior siue Dracutia.* 261 *Maiores Norbonensi.*
Minimus Spactens. 236. *Dracuncul' Aquatica.* 261. *Corysanthemum minima. Sc-*
Peramarus repens capi- *Minor.* } *lago Pli. qugrundum.* 447.

- Erigeron*. 79. *Fœniculi varietates, differentie*. 347 *Glaux altera*. 178.
Erinos. 216 *Marinū, vide Crith-* *Globularia*. 200. 199.
Eryca differentia, varietates. 68. 69. *Fœniculum* } *mum*. *Glycyrrhiza differentia, varietates*.
Erium sylvestre. 399 *Tortuosum, vide Sefeli* 405. 406.
Eruca. 397. *Masiliense*. *Gnaphalia*. 200. 201. 202
Eringii differentia, varietates. 375. *Fœnum Bugundiacum*, 382. *Gnaphalis Tragi, vide Iuncus Bom-*
Eringium Luteum MonsPELLIENSIS Fœnogracum. 387. *bicinum*.
vide Scolymos Theopoh. an Eringi- *Flammula vulgi, vide Clematis alte-*
um Atractilidi simile Archigenis, ra. *Gossypium, sine ſulph.* 291.
Ang. *Gramina*. 1. 2. 3. 4.
Erysimum verum Dioscori. 69. *Fœtilapathū* } *magnum*. } 117. *Granum Regium Mes. vide Ricci-*
Erysimum Theoph. 395. *Folium Indicum: Malabarrū*. 129. *Guatiola recentiorum, an Spumeum*
vide Belgarum Bouckwey. Tra- *Fraga fragaria* 308. *Varietates*. *Papaver Dioscori*. 185.
gotrophon Dodo. Frumentone Ita- *Fraxinella, in Tragio*. 410. *Guaicum*. 439.
lorum, *Fraxinus*. 416. *Graiicum Fallopij, Patavini ibidē*.
Eristalis, vide Acarna, Cirsium lu- *Fraxinus Bubula, Sorbus syl.*
teum Sequanorum. *Frumentum Turcicum*. 13.
Erythrodanum marinum vide Rubia *Frumentone Italorum, Bouckwey*
maior & Rubia minor. *Belgarum*. 395. *Halicacabum vide Solanum vesicari-*
Esclentine. 446. *Fumaria varietates, differentia*. 338 *um*.
Esula } *Maiores, an sit Diosc. pręgran-* 339. *Halymos*. 169.
Minor. 151. *dis frutescens Pityusa?* 151. *Funispation, vide Elpho*. 408. *Harmala Syriaca, an sit Sesamoides*
Esulara Venetorum. 160. *G.* *magnum Dioscori*. 390.
Euonimus Theophrast. 435. *Gallia*. 432. *Harundinū, sine Camari differentia*
Eupatorium Græco. Agrimonia. *Gagel Germanorum*. 417. *& varietates*. 19. 27. 28.
308. *Galanga maior & minor*. 30. *Hastula regia, vide Asphodelus*.
Eupatorii Mesue varietates. 207. *Galega*. 392. *Hedera differentia*. 269.
Costus minor hortensis Gesneri. *Galiopsis Lutea, vide Colus Iouis* 241. *Hedera, siue Chamacissus*. 268.
Euphrasia, Euphrosyne. 210. *Galla*. 432. *Hedera Saxatilis, vide Asarina*.
Esula dulcis. 216. *vide Erinos*. *Gallion, siue Galion luteum*. 358. *Hebenum*. 440. *lege Xyloalos Offici*.
Esula Sylvest. Tragi. 216. *Album* } *Hedisarum, vide Securidaca maior &*
minor. 358. *Hedypnois Plinii, dentis Leonis flore*.
Gariophyllata, siue Geum alpinum re- 267. 82.
centiorum.
Gelseminum flore } *Albo &* } 415. *Helenium*. } 246.
Luteo.
Faba Egyptia, siue Colocasia, an sit 259. 408. 409. *Aegyptium*.
Aron Egyptium? 259. *Genista, Genistella species, varietates* *Helicium secundum Dioscori*. 185.
Faba innerfa, vide Telephion. 167. *Genista, Genistella species, varietates* *Helianthos, siue flos Solis, an Panax*
Faba Antiquorum & recentiorum. 407. *Chyronium, & Helenium secundū*
varietates, differentia. 392. 393. *Genista spartium spinosum*. *Dioscori?* 185.
Fagus. 433. *Genista rapum, ibidem*. *Helianthes species rara figura legumi-*
Fagus Theophr. vide Galla. 432. *Gentiana, Gentianella varietates, dif-* *noia*. 405.
Farfara. 254. *vide Tusilago*. *ferentie*. 129. 130. *lege Heliochryson, Chrysanthemum, si-*
Farfrugum herbariorum, vide Caliba *Gerani varietates, differentia*. 296. *ne solis flos*. 331. 332.
palustris. 256. 297. *Heliotropium minus, minus, & repens*
Ferula: Ferulago. 348. *Getium, vide Iacea nigra*. 100.
Ficaria, vide Scrophularia. 230. *Gingidii species*. 324. *Heliotropium tricocon Pli.* 100.
Ficus & varietates. 442. *Gith, vide Melanthium*. *Helleborus ferulaceus, vide Buph-*
Ficus Indica varietates. 454. *Gladulus*. 47. *thalmum Dod.* 351.
Filago, vide Gnaphalium. 201. *Glan vnguentaria*. 414. *Helleborastri & Consilignes*. 303.
Filipendula, an Molon Plinii, vide Glastum, vide Isatis. *Helleborus niger*. 304.
Oenanthe. 325. *Glasti species, Vaccaria Dodo*. *Helxine parietaria, siue vitriola*. 98.
Filipendula altera montana ibidem. *Glaucium*. } 109. *Helxine Cissampelos*. 274.
Filices. 362. *Glaucium Venetorum*. } *est Scammonium tenue Plinii Ang.*
Filicula vide Polypodium. *Glaux maior vulgaris*. 402. *Cysampelos altera, Atriplicis effigis,*
Filix Tragi, vide Holostium. *Glaux vel Glaux quedam legumino-* *inter volubiles*.
Flos Cuculi, est Armoraria sylu. pra- *sa herbariorum*. 402. *Hemerocallis inter Lilia*.
terfiss. 189. *sa herbariorum*. 402. *Hemeonitis siue sterilis*. 359.

H.

Heranthemum Dodo. an. *φλωα*, *Cypselinum* Mat. *Leuisticum* Off. *Labnum* Pli. an *Cyrhifus* 2. Theob.
sive *viola flammæa* Theophr. *Adonis* Math. 312. *Lacea* *Arabum*. 428.
Herba Doria. 124. 312. *Hyssopus* *Dioscoridis* *Origanifolius*. *Lachryma* Job. 16.
Herba Iudaica, sive *Tetrahitis*, vide *Hyssopus* *Arabum* *Mesua* & *Offici-* 89.90.
Sideritis *Heraclea*. 224. *narum angustifolius*. 185. *Lagopi* *differentia*, *varietates*. 383.
Herba Parahis, vide *Phlomidis*. *Hyssopus candida* *Anglorum*. 185. 384.
Herba Paris, seu *tetraphyllon* *Solanum*. 105. *Lamium* *Plinii*, *Milfata* *Italorum*,
Herba sancta *Indorum* & *Herba* *Regia*. 251. *Iacea* *alba* *Monspelliensium*, vide *O-* vide *Galiopsis*. 222.
Herba tunica Gordo. 143. *cymoides*. *Lamium* *luteum*. 223.
Herba turca, *Herniaria*. 180. *Iacea nigra*, vide *Getium*. *Lampfana*. 70.
Herba stellaria, vide *sanicula*. *Iacea nigra*, *differentia* *varietates*. *Lampfana* *Dod. ibidem*.
Herba Venti Rondel. an. Othoma? 229. 234.235. *Iacobea* *Senecio*, vel *Senecio maius*. 79. *Lapathi* *genera*. 115. & *varietates*.
Hermodytyli *Officinarum*. 54. *Iacobea marina*, *Arthemisia marina*. 119.117. *Lappa maior*. 253.
Hermodytyli *albi* & *rubri* *Nicolai*, 79. *Minor*, vide *Xanthium*. 254.
Actuarii & *aliorum*, non *cathar-* *Iasminum*, vide *Gelseminum*. 415. *Lapsana*, vide *Lampfana*.
zici, sed *cordi*. *venerique amici*, *Iberis* *Cardamantice* *Damocratis* & *Larix*. 449.
an sint Beben album & *rubrum?* 55. *Gale*. 77. *Laseris*, sive *Laserpitii* *differentia*. 312.
Herniaria. 180. *Idea radix* an *vaccinia nigra* & *ru-* *Lathyrus*, sive *Carapatia minor*. 153.
Hieraciorum *varietates*. 88. *bra?* 417. *Lauendula* *spica*. 184.
Hippia, *Alfine*. 193. *Illecebra*, vide *Sedū mini*. 167.162. *Lauri* *differentia*. 424.
Hippia minor & *minima* 193. *Imperatoria*. 431. *Laurus* *Tinnus* & *Regia*. 424.
Hippoglosson. 283. *Inryba*, vide *Serides*. 310. *Lauri* *Alexandrea* *Dioscori* & *Hip-*
Hippolapathi, *varietates*, *differentia*. 80. *poglossi* *discrimen*. 283.
118. *Intubi* *varietates* & *differentia*. 85. *Laureola*, vide *Chamedaphne*.
Hippomarathrum, in *feniculo*. *Irio*. 69. *Lauzerde*, vide *Medica*.
Hippophaes. 375. *Iridis* *varietates*, *differentia*. 31. *Ledon*. 418.
Hippophastum. 376. *Iris* 32.30. *Lens* sive *φάκς*. 401.
Hippeslinum, sive *Olusatrum*. 315. *Iris* & *ypoxis*, sive *Xyris*. 22. *Lentiscus*. 411.
Hippopartium, vel *Rapum* *Geni-* *Ivaridis*, sive *Glasti*, *differentia*. 148. *Leontopetalon*. 305.
fre. 407. *Iscopyon* sive *paludosum trifolium*, *Me-* *Leontopodium*, sive *Pes Leoninus*.
Hippurium una videtur *Caucon* & *Iua* *Anthrytica*, vide *Ainga*. 164. 202.
Ephedra *Plinii*, minus tamen *tus-* *Iua* *moschata* *Monspell.* est *Anthyllis* *Lepidi* *Diosc.* *Aginete*, *Ety*, *Mō-*
entibus apta est. 355. *Chamaptyroides*. 164. *spellien*. *varietates*, *differentia*. 77.
Hirculus. 133. *Junibe* *differentia*. 437. 136.135.
Hirundinaria *utraque*. 256. *Inde arbor*. 441. *Leucas* *Pentaphylli* *facie*, an *Disco?*
Holostii *varietates*, *differentia*. 17. *Junci* *differentia*, *varietates*. 43. 307.
18. 44.45. *Leucacantha*. 371.
Hordei *varietates*. 7.10. *Juncus* *odoratus*. 42. *Leucacanthemi* *odorati* *varietates*.
Hormini *differentia*. 240. *Juniperi*. 448. 343.
Hyacinthi *varietates*. 46.47.48. *Juniperus prima* *Diosc.* videtur *Oxy-* *Leucanthemis*, vide *Anthemis*.
49. *drus* *Theop.* & *Juniperus* 2. *Diosc.* *Leucoii* *varietas*, & *differentia*. 141.
Theocriti & *Poëtarum* *Hyacinthus* *Cedria* *Theop.* *lege* *Leucoium* *duplex* *floribus*. 141.
flore *Iridis*. 47. *Jixia*, vide *viscum* *Carlina*. 367. 142.
Hydrolapathum magnum & *pusillum* 117. *K.*
Hydropiper. 134. *Kali* *differentia*. 169.170. *Leuisticum* *Offici.* vide *Laserpitium*.
Hyoehiami *differentia*, *varietates*. *Kegues* *καροφάτος*. 430. vide *flex* *Libanotis*, vide *Rosmarinii* *serulacæ*.
107. *Coccifera*. *Libanotis* *Theophr.* *Sesels* *Athyopi-*
Hypecoon falsam *Mathioli*. *Argemo-* *ne altera* *Fusch.* *Alcea* *Venetorum*. *Lilac* *Mat.* non est *Ben*. 414.
Hyperici *differentia*, *varietates*. 172. *Lilionarcissus* *luteus*. 52.
173. *Labri* *venerei* & *Dipsaci* *discrimen*. *Lilionarcissus* *sanguineus*. 52.
Hypochistis. 418. 373. *Lilii* *differentia*, *varietates*. 60. 61.

<i>Lilium luteum.</i>	45.	<i>Malum asyrium</i> , vulgo Poncirus.	pyrum Dod. vide trifolium.
<i>Lilium conuallium</i> , vel vernum.	425.		<i>Mentha quadruplex.</i> 218.
Theoph.	61.	<i>Mala Cotonea.</i>	430. <i>Mentha sisymbria aquatica.</i> 218.
<i>Limones.</i> 425. <i>Lime.</i> ibidem.		<i>Malua genera, & varietates.</i> 292.	<i>Mentha Catti.</i> 219. 220. non est
<i>Limonium.</i>	122	293. 295.	<i>Nepeta antiquorum.</i>
<i>Limoniū germaniciū</i> , seu pyrola.	122.	<i>Mamiras.</i>	36. <i>Mentastrium.</i> 218.
<i>Paruum Limonium</i> Norbonense olea		<i>Mandragoras Theophr.</i> an Me-	<i>Mentastrium niueum Anglicum.</i> 219
<i>folium.</i>	123.	longena.	<i>Meon</i> , siue meu, perperam Libano-
<i>Limonium secundum Mathi.</i> ibidem.		<i>Mandragoras.</i>	106. <i>tis prima</i> Dod. foli. 197. 347
<i>Linofostis</i> , vide <i>Mercurialis.</i>		<i>Mandragoras femina</i> ibidem.	<i>Mercurialis mas femina.</i> 100
<i>Linum satium.</i>	176.	<i>Manna, Manbu.</i> 23. 24.	<i>Mas syluest.</i> vide <i>Cynocrambe.</i>
<i>Linum marinum luteum</i> , an Osyris		<i>Manna Israelitarum</i> quanam? 26.	<i>Mesfilus.</i> 434.
<i>Dioscorid.</i>	178.	<i>Manna varietates.</i>	26. <i>Mesfilus aronia.</i> 443. lege <i>Itolorum</i>
<i>Linifolia Campanula lutea.</i>	177.	<i>Marathi differentie, varietates.</i>	<i>Azarolles non asafides.</i>
<i>Linaria purpurea & lutea.</i> 233. num		347.	<i>Metegla, siue Meteglin.</i> 22.
<i>antyrhinū P.</i> vide <i>Osyris</i> 175. 176		<i>Mariana viola</i> , vide <i>Medium.</i>	<i>Milium.</i>
<i>Linopartium.</i>	408.	137.	<i>Milium Indicum Plinianum.</i> 13.
<i>Lithospermum maius & minus.</i> 192.		<i>Marrubii, differentia, varie.</i> 222.	<i>Milium Solis utrumque.</i> 193. 192.
<i>Lithospermum Plinii</i> , siue <i>Lachryma</i>		<i>Marrubium aquaticum vulgi.</i> Side-	<i>Millefolii, siue Militaris, differen-</i>
<i>Iob.</i>	16.	<i>ritus Mat.</i>	224. <i>tis varietates.</i> 333.
<i>Loli variet. differ.</i>	10.	<i>Matagon, vide Lilia.</i>	<i>mil & Theophr.</i> vide <i>Taxus.</i> 450.
<i>Lonchitis utraque.</i> 383. 384.		<i>Marum, siue Maltic Gallor.</i> 213.	<i>Millemerbia, siue Scrophularia maior.</i>
<i>Lotus arbor D. & Theo.</i> 439.		<i>Marum Syriacum.</i> 213. 230.	
<i>Lotus Egyptia, vel Nilotica.</i> 385.		<i>Matricaria nostras, non</i> respondet	<i>Millegrana Cordi, vide Herniaria.</i>
<i>Lotus hortorum odora, urbana.</i> 384.		<i>Parthenio Pauli & Plinii.</i> 335.	180.
<i>Lotus trifolia pratensis Monsp.</i> 384.		<i>Matronalis Viola, aut Damascena.</i>	<i>Milæatella Anguilare, Lamium</i>
<i>Lotus syl. Diosc.</i> 384.		137.	<i>Dioscor.</i>
<i>Lunaria Græca Recentiorum non est</i>		<i>Maith Septentrionalium.</i> 7.	<i>Mezercon Arrabum verum.</i> 157.
<i>armoracia Dioscori. neque Thlaspi.</i>		<i>Meconium.</i> 111	<i>Mezercon Germanicum, vide Chama-</i>
<i>Cratæa.</i> 137.		<i>Mede Moscoitarum.</i> 22.	<i>daphne.</i> 213.
<i>Lunaria Racemosa Cetrachi foliis ra-</i>		<i>Medica herba, vide scenum Bur-</i>	<i>Moly Dioscorideum putatum.</i> 59.
<i>cemulis Ophioglossi.</i> 360.		<i>gndiacum.</i>	<i>Moly Liliflorum Homericū forte.</i> 60.
<i>Lunaria an Nicotegretou Plinii.</i>		<i>Medica tres in semine variet.</i> 383.	<i>Moly Hippocraticum est allium vrsi-</i>
<i>Lupinus sativus & syluest.</i> 396.		<i>Medica marina.</i> 383.	num. 59. 60.
<i>Lupulus salictarius.</i> 277.		<i>Medium, an Viola Mariana.</i>	<i>Moly Plū.</i> 18.
<i>Luteola.</i> 149.		137.	<i>molibdena Plin.</i> 135.
<i>Lychnidis differen. varie.</i> 142. 143.		<i>Μελανϋ γολας papauer.</i> 111.	<i>momordica, vide Balsami cucumerina</i>
<i>Lycium Norbo, seu Pyxactha.</i> 419		<i>Melissaccharum.</i> 25.	<i>μολόφυλλου recentiorum.</i> 127.
<i>Lycopsis.</i> 249.		<i>Melapum commune.</i> 22.	<i>morfus Galline folio Hederule.</i> 194.
<i>Lygusticum.</i> 316.		<i>Mel Cedreum Hipp. & Syriacum.</i>	<i>morfus Diaboli.</i> 235.
<i>Lyfimachie lutea, cerulea vari.</i> 144.		24.	<i>morfus Rana.</i> 258
145.		<i>Melampyron Dodo. an Alopecuros</i>	<i>mori varietates, differentia.</i> 442.
<i>Lyfimachia cerulea hortensis Veroni-</i>		<i>Plinii?</i> 11	<i>mulsa.</i> 22.
<i>ca recta quorundam.</i>		<i>Melampyrū alterū Neotericoy.</i> 11	<i>musca.</i> 451.
M.		<i>Melampyrum perpusillum luteū.</i> 11.	<i>muscipula, siue Viscaria.</i> 189.
<i>Macaleb, vide Phylerea arbor.</i>		<i>Melanthis, siue Nigella.</i> 329.	<i>Alicra muscose flore.</i> 190.
421.		<i>Meliloti differentie, varietat.</i> 306.	<i>myagros.</i> 78.
<i>Macer.</i> 426.		<i>Melegetta, vide Cardamomum.</i>	<i>myosotides.</i> 193.
<i>Mais Occidentaliū.</i> 13.		<i>Meliosphylli varietates, differentie.</i>	<i>mirica, vide Thamariscus.</i>
<i>Malabarrifolium.</i> 129.		220. 221.	<i>myrobalani Arabum omnes.</i> 439.
<i>Malorum genera.</i> 434.		<i>Melorigena, vel mala insana.</i> 106	<i>myriophillon, vel maratryphyllon pal-</i>
<i>Malus Medica.</i> 425.		<i>Melo vugi.</i> 285.	<i>lustre.</i> 354.
<i>Malapunica, siue Granata.</i> 419.		<i>Melonis varietates ibidem.</i>	<i>Myrioph. equisetifolium flumiatile.</i>
<i>Mala Persica.</i> 423.		<i>Melocarduus, seu Echinomelocac-</i>	354.
<i>Mala aurea Lycopersicum quibusdam</i>		<i>tos.</i> 376.	<i>myrrhida P. Rostri Ciconie.</i> 296.
<i>vide Glaucium.</i>		<i>Melopepo, siue Batecha</i>	<i>Anicenna myrrha.</i> 428.
		<i>semine nigro.</i> 230.	<i>myrrhis diff. varietates.</i> 327.
		<i>Menianthes Palastre Theophr.</i> 150.	<i>Myrtachantha siue Ruscus.</i> 283.

<i>Myrtillus</i>	419	<i>Oleocorneli.</i>	25.	<i>Panicum hylueft.</i>	15.
<i>Myrtus minor</i> , 'maior', candida.		<i>Oenanthes herba varietates & gene-</i>		<i>Panicum ceruleum Indicum.</i>	unde
419.		ra.	325. 326.	forte Indum Dioscori.	
<i>Myrtacantha</i> , vide <i>Ruscus</i> .		<i>Oenanthe labrusca</i> , vide <i>vitis</i>	umise-	<i>Papaveris differen. variet.</i>	110. 109
<i>Myxa Egineta.</i>	437.	ra.	277.	III.	
N.		<i>Olea agrestis</i> , siue <i>Oleaster</i> .	422.	<i>Papaver Spumeum</i> , an <i>Gratiola</i> rece-	
<i>Napelli varietates differen.</i>	301.	<i>Olea & varietates.</i>	422.	tiorum.	185.
<i>Nicotiana gallozum</i> , siue <i>Indorum</i> .		<i>Oloftium</i> , vide <i>Holaustium</i> .		<i>Spumeum aruorum.</i>	143.
<i>Sanaſaneta.</i>	251.	<i>Olusatrum</i> , vide <i>Hippofelinum</i> .		<i>Papyrus Nilotica.</i>	38.
<i>Napelli muſca.</i>	302.	<i>Ohya.</i>	8.	<i>Papyrus latifolia Braſilia.</i>	39.
<i>Napus</i> , siue <i>Bunias</i> , à <i>Bunio</i> diuerſus		<i>Onagra</i> , siue <i>Mulcibruta.</i>	423.	<i>Papyracea arundo.</i>	40.
67.		<i>Onobrichis</i> , vide <i>polygala.</i>	172.	<i>Parietaria</i> , vide <i>Helxine muraria.</i>	
<i>Napus</i> , siue <i>Bunias</i> hylueft.	67.	<i>Ononis</i> , aut <i>Anonis</i> varietates.	378	<i>Paronychia</i> , <i>Alſineſolia.</i>	196.
<i>Narcaphthon.</i>	36.	<i>Onofma.</i>	249.	<i>Paronychia altera folio rutaceo.</i>	196
<i>Narciſſi genera</i> , varietates.	50.	lege <i>Ophiogloſſū</i> , siue <i>Henophyll.</i>	360	<i>Parthenium</i> , non eſt <i>matricaria.</i>	344
51. 52.		<i>Ophioſcorodon.</i>	59.	<i>Parthenii varietas.</i>	344.
<i>Nardi differentia</i> , varietates.	42. 43	<i>Opium.</i>	111	<i>parthen. marinū</i> minimū, vide <i>Colula</i>	
<i>Nardi celtica differentia.</i>	132. 133	<i>Opobalſamum.</i>	415.	<i>Paſſerina unicaulis herbariorum La-</i>	
<i>Nardus</i> { <i>Montana.</i>	320.	<i>Orchis</i> , vide <i>Teſticuloſ.</i>		<i>naria</i> , aut <i>luteola</i> figura.	328.
<i>Italica.</i>	184.	<i>Origanii varietates</i> , differentia.	211	<i>Paraliſtica alpina ſanicula</i> , vñſi <i>auri-</i>	
<i>Nardus Ruſtica</i> , vide <i>Aſara.</i>	262.	<i>Orminum ſatiuum</i> , vide <i>Hormi-</i>		<i>ckla recentiorum</i> , figura <i>primula</i> ſed	
<i>Nafurtium.</i>	72.	num.	56.	<i>floribus purpureis.</i>	244.
<i>Nafurtium Babyloniciū</i> , vide		<i>Orinthogali varietates.</i>	56.	<i>Paſtinaca varietates</i> , differentia.	316
<i>ba.</i>	78.	<i>Ornithopodium</i> , siue <i>pes auis.</i>	403.	317.	
<i>Natrix Pli?</i>	378.	<i>Orob.</i> <i>herbariorum.</i>	400.	<i>Pecten veneris</i> , vide <i>Scandix.</i>	
<i>Nepa Theoph.</i>	353.	<i>Oryza.</i>	12.	<i>Pedicularis Aleſtorolophos.</i>	334.
<i>Nepeta</i> , vide <i>Calamintha.</i>		<i>Oryza Plinii</i> <i>ibidem.</i>		<i>Pentaphylla</i> , vide <i>Quinquefolia.</i>	
<i>Nerion purpureum & album.</i>	154.	2. <i>Oſmunda Recentiorum</i> <i>Filix florida</i> , <i>peplis.</i>			153.
<i>Nerii facie arbor.</i>	452.	363.		<i>peplus.</i>	153.
<i>Nigelle</i> , vide <i>Melanthia.</i>		<i>Oſyris Pli. Antirrhinum.</i>	175.	<i>peponum genera</i> , varietates.	280.
<i>Noli tangere</i> , siue <i>Pericaria ſiliquoſa.</i>		<i>Oſyris purpurea.</i>	176.	<i>perchepier Anglorū</i> , an ſit <i>ſcandix?</i>	
135.		<i>Oſyris purpureo cerula repens.</i>	176.	324.	
<i>Norbonenſium dorea.</i>	124.	<i>Othonna Italarum</i> , aut <i>flos Aphrica-</i>		<i>perfoliatum vulgatiuſ</i> , flore <i>luteo</i> , <i>folio</i>	
<i>Nux Anellana.</i>	441.	nus.	318.	<i>umbilicato.</i>	171.
<i>Nux Indica.</i>	451.	<i>Othonna</i> , an <i>herba Venti Moſſ.</i>	229	<i>perfoliata ſiliquoſa.</i>	172.
<i>Nucula Indica.</i>	451.	<i>Oxalida.</i>	119. 120.	<i>peryclimenum.</i>	
<i>Nux iuglans & earum conditura.</i>	416.	<i>Oxyacantha.</i>	443.	<i>peryclimeni duplex varietas.</i>	280.
<i>Nucula terreſtris Septentrionalium.</i>		<i>Oxycedrus Theo. an Iuniperus prima</i>		<i>ibidem.</i>	
an ſit <i>Bunio</i> <i>Dioſcoridis & bulbo-</i>		<i>Dioſcorid.</i>		<i>peryclimenū alterū incertum</i>	
<i>caſtanum Tralliani?</i>	331.	<i>Oxis Pliniana</i> , vide <i>trifolium.</i>		<i>periploca repens.</i>	100.
<i>Nux peregrina Indica non biforis.</i>		<i>Oxytriphylli Scribonii varietates</i> , vi-		<i>perſica malus.</i>	423
416.		<i>de Trifolium.</i>		<i>perſicaria ſiliquoſa</i> , siue <i>noli tangere.</i>	
<i>Nux Metel Auicenna</i> , <i>Hyppoma-</i>		P.		135.	
<i>nes Cratena.</i>		<i>Paeonia differentia.</i>	305.	<i>perſicaria Hidropiper.</i>	134.
<i>Nux Moſcata</i> , siue <i>Myrſtica.</i>	424.	<i>Paliuri differentia.</i>	437.	<i>perſolata plinii</i> , vide <i>arction.</i>	253.
<i>Nummul- ria centimorbia</i> , num <i>Ere-</i>		<i>Palma.</i>	451.	<i>perſonata</i> , vide <i>lappa maior.</i>	253.
<i>ſtedanum Theoph.</i>	198.	<i>Palmule reptatrices. Theo.</i>	451.	<i>pes Anſerinus</i> , siue <i>Atriplex.</i>	97.
<i>Nymphaea lutea Nenuphar Offi.</i>	257	<i>Cefaglionii Ital.</i>		<i>pes Locuſta Auicenna</i> , vide <i>Rapun-</i>	
<i>Alba.</i>		<i>Palma pinus</i> , siue <i>Conifera Guinea.</i>		<i>culus.</i>	
<i>Alba minor.</i>	ibidem.	450.		<i>per Columbinus</i> , ſeu <i>Dioſcoridis alte-</i>	
<i>Lutea minor Septentrionalium.</i>	258.	<i>Palma Chriſti</i> , vide <i>Ricinus.</i>		<i>rum Geranium.</i>	296.
O.		<i>Palma Sancta.</i>	440.	<i>petafites.</i>	254
<i>Ocimaſtri</i> , siue <i>Ocimoidis differen-</i>		<i>Palma ſancta ſimilis arbor.</i>	440.	<i>petafites noni orbis.</i>	453.
<i>tia</i> , varietates.	143 144.	<i>Palum ſanctum ibidem.</i>		<i>petroſelinum</i> , siue <i>Oreoſelinum.</i>	315
<i>Ocimi varietates</i> , differentia.	215.	<i>Panaces.</i>	312. 112. 124.	<i>petroſelinum Macedonicum ibidem.</i>	
		<i>Pancratii varietates.</i>	57. 49.	<i>peucedani facie puſilla planta</i> , an <i>pleu-</i>	
		<i>Panicū. 14.</i>		<i>dobunion Dioſcor?</i>	331.
		<i>Mel frugū Dioclis. Ang</i>		<i>peucedanū ſeniculum porcinū.</i>	350.
				*. ij.	

[illegible]

<i>Rapum maius orbiculatum.</i>	66.	rid. sue Arabum Conditi, de quo in plin?	240.
<i>Rapi gemina varietas.</i>	66	Hippophaes & Hippopbesto.	133. Scariola, seu intybum sativum, seu
<i>Rapum fyl. non bulbosum.</i>	66.	Sancta sana Indorum, siue Nicotia- Endivia	85.
<i>Rapistrum arvense.</i>	66. 69.	na Gallorum.	251. scyna, vide Acorus Aquitanicus. 29
<i>Rapuntium parvum, siue Pes locusta Satyrion</i>			schœnoprasson.
<i>Auicena.</i>	139.	Satyrion Genevise Erithroneu	136. scylla, siue Cape marina.
<i>Rapuntium maius Alopecori flore.</i>		Satyrion Erithro. Syriacum.	scolopendrium, vide Asplenium.
140.		Sebesten.	437. scolymos, seu Cynara, Cactos Theoph.
<i>Raphanus magnus & parvus purpu-</i>		Securidaca, vide Hedysarum.	365.
<i>reus.</i>	77.	Sal Indum.	21 scolymos Theoph, seu Eringium luteu
<i>Raphani varietas.</i>	67.	Salix.	422. Mor spelliensium.
<i>Raphanus fyl. siue Rusticanus, vide-</i>		platiphyllus.	423 scolymos fyl.
<i>tur Molibdena Plinii.</i>	135	Salix humilis repens.	423. scoparia Italarum.
<i>Raphanus fyl. Officinarum, Francis lege Salsaparilla & smilacis aspera</i>			Scordion. Trixago palustris.
<i>& Belgis, Lepidium Aegineta, fo-</i>		figure, & natura discrimin.	270. scordion plinianum Mentastro simile.
<i>lius Lauri maioribus.</i>	135.	Salvia	239. 211.
<i>Rhamni varietates, differentia.</i>	438.	Maiores.	240. scorodoprasson. 58. vide Alliporrum.
437.		Minor.	239. scorpioides leguminosa.
<i>Rha capitatum Cetaurii maioris facie</i>		Salvia coccifera.	403.
<i>Enule folio.</i>	118.	Salvia agrostis Sylvarum, vulgo Salvia scorpioides.	168.
<i>Rhaponticum.</i>	118.	Scorodiana cordi.	211. scorpio herba Theoph. vide kali spino-
<i>Rheseda Plinii.</i>	76.	Salvia vita herbariorum, siue Ruta	sum in Tragano.
<i>Rhodia radix, Rosea.</i>	177.	mararia, an Theophr. adiantum scrophularia maior; Millemorbia.	356
<i>Rhus obsoniorum, coriariorum, & Pl</i>		album? Mathiolo falso paronechia	230.
<i>nii duplex.</i>	412. 413.	362.	scrophularia minor, vide Chelidonium
<i>Ricinus.</i>	306.	Sambuci vulgaris, Montana, racemo-	minus.
<i>Ritrum Theoph.</i>	368.	se.	434. secacul Arabum.
<i>Robus.</i>	5.	Aquatica, differentia & varietates.	secale, varietates.
<i>Robur.</i>	432.	444.	securidaca maior.
<i>Rorida, siue ros Solis.</i>	454.	Samplicum, Dioscori, siue Amaracus	Minor.
<i>Ros caelestis.</i>	26.	serpens.	213. sedi genera 161. 162. 163. & va-
<i>Rose, eiusdem differentia, Nersin</i>		Sanguisorba altera maior, siue pimpi-	rietates.
<i>Theoph.</i>	446.	nella.	320. semen Zedoaria, vide Absyn-
<i>Rosmarinum ferulaceum.</i>	351.	Sanicula, siue Diapensia.	297. thium.
<i>Rubia differentia, varietates.</i>	357.	Sanicula, siue paralitica Alpina vrsi sena Arabum.	406.
<i>Rubi varietates, differentia.</i>	446	auricula, eiusdem varietates.	senecio.
<i>Rubus canis, Cinamorus Galeni.</i>	244. 245.		senecio Iacobei
446.		Santal albi, Citrini rubri.	456. Marina.
<i>Rubifacie, senticosa planta.</i>	452.	Satureia, siue Tymbra vera spicata S. sempernini varietas, differentia.	161.
<i>Rumex, vide Lapathum.</i>		Iuliani.	181. 182. serides, siue intyba.
<i>Ruscus, vide Myrracantha.</i>	283.	Satureia, siue Tymbra altera.	182. serides picrides.
<i>Ruta, Rutula varietates, differentia</i>		Satureia hortenstis.	182. seris, siue intybum sativum.
390. 391.		Satyrion Erythronium.	64. seris domestica, altera lactucina.
		Satyrion alterum.	64. serpentaria.
S.		Saxifraga siue Saxifragia antiquorum serpentina Mat.	187.
		183.	serpillum utrumque.
<i>Sabina differentia, varietates.</i>	447.	Saxifragia Dioscorid. & Italarum.	seriphium. Dioscoridis; Abrotani fex
<i>Saccharum, vide Harundo saccha-</i>		eadem.	352. mina facie.
<i>rata.</i>	19.	Saxifragia Anglica persimilis.	352. serratula.
<i>Sacchari candi parandi ratio.</i>	20.	Saxifragia varietates, differentia.	seratula Campana, vide Melilotus.
<i>Sacchari canis Violatii paratio.</i>	21	267.	sesamoides maius, an Syria-
<i>Sacia procerior recta.</i>	231.	scabiose varietates, differentia.	232. ca Alepiana Hermala?
<i>Sagapenum</i>	348.	233.	Minus.
<i>Sagittaria aquatica. Plinii.</i>	126.	Scammonium, Syriacum, siue Antio-	sesamum Officinarum.
<i>Sagittaria minor.</i>	127.	chenum & Norbonese.	272. 273 Alteru Mathio. videtur Myagrum.
<i>Salicaria, vide Lysimachia lutea</i>	144.	scandix.	324. Diosco.
<i>Salicornia.</i>	170.	scorlea, seu herba S. Iohannis, siue cen-	sefeli Ethiopium 230. Massiliense.
<i>Saponaria, non est struthium Dia-</i>		trum Galli.	an Aletherolophos
			352. Creticum, pratenfe.

Sefeli Peloponense. 327. *Spina Arabica*, *Succaba* *Maini*. *Tarchon*. *Simeo*. *seti* & *Auicene*.
Setanum. 6. *tanis.* 370. 190.
Sida Theo. 294. *Spina infectoria.* 838. *Taxus arbor pullos* *Theophr.* 450.
Sferro Caualla ferrum. *Equinum.* *Spina infectoria*, vide *Rhamnus.* *Telephion* (*Cratena* *ibidem*, an *scorpioides*? 168.
403. *Spina solstitialis*, *aurioles* *provincialis*.
Sideritis secunda *Mathioli*, *Tanacetum* 372. *Tembul*, vide *folium*.
parum *Dodonei.* *Splith*, vide *fumaria lutea* & *alba*. *Terebinthus* } *Maiores*.
Sigillum solomonis, vide *Polygonatum* *num Chelidonium capites* *Aetii.* *Terebinthus* } *Minores*. } 411.
Sigillum Mariae, vide *Vitis*, vel *Bryonia nigra.* *Spondylium*, *Germanis* *falso Acanthum* *Terebinthus* *Indica* *Theop.* 413.
Siler montanum *Officinarum.* 328- *Spumeum* *Papauer*, an *Gratiola* *rece-* *Tereniabin.* 23, 24
Siligo. 5. 6. *tiorum.* 185. *Terribilis herba*, vide *Allypum.* 33
Siligo Tragi. 8. *stachys.* 228. *Testiculi canis*, *vulpis*, *hirci*, *differentie*, *varietates.* 62, 63.
Siliqua Carobe. 414. *stachys altera spuria.* 306. *Tetrahit*, vide *Sideritis heraclea.*
Siliqua Calfia. 414. *staphis agria.* *staphylodendrum* *Plinii*, *arbor vitis.* 224.
Silphion in *Lasere.* *staphylodendrum* *Plinii*, *arbor vitis.* 224.
Silybon, *Carduus Mariae* & *Lacteus.* 414. *Teucrium.* 208.
366. *stoebe* *Dioscori.* *Cerinthe* *Plin.* *Φλέος* *Teucrium pratense* 1. *Chamaedrys* *spu-*
Sinapi Persicum, vide *Raphanus Ru-* *Theoph.* 41. *ria* *Officinarum.* 209.
sticanus. 135. *stachas Arabica.* 184. *Talictum*, vide *sophia.*
Sinapi differentia, *varietates.* 68. *stachadis* *Cicirina*, *sive* *Chrysocoma* *Thamarindi.* 439.
Sinapi & *Thlipsis* *media* *Provincia-* *differentia*, *varietates.* 203. 204. *Thapsia*, *Turbith gallicum*, & *Thur-*
lus planta. 72. *stelephurus* *Pli.* 17. *bith cineritium* *Officinarum.* 349.
Sisarum. 317. *stramonium peregrinum*, an *solanum.* *Thapsia herbariorum* *vulgaris.* 350.
Sisymbrium alterum *Dioscoridis*, vide *manicum* *Licopersicum* *Gal.* 103 *Thlipsis* *sive* *Nasturtium* *tectorum.*
Cardamine. 71. *styrax* *eiusque* *lacrlyma.* 429. 72. 73.
Sisymbria Mentha. 218. *stratiotes aquatica aizoides* *Diosco-* *Thlaspi* *Draba* & *Chamalina* *folio.*
Sium, *sive* *Lauer* *Dioscorid.* *Olusauri-* *ridis* vide *militaris*, *sive* *Milicfolia.* 73.
folio, *sive* *aquatica* *Pastinaca.* 71. 334. *Thlaspi differentia*, *varietates.* 72. 73
Sion *Cratena* *Eruca* *folium.* 71. *strumaria*, vide *Xantium.* 74. 75. 76.
Smilacis aspera & *Salsaparilla* *discri-* *struthion* *Dioscorid.* *non est* *saponaria* *Thora*, vide *ptihora.* 263.
men. 270. *vulgaris.* 133. an *Cunder* *Anicen-* *Thuris* *differentia.* 430.
Smilax levis vel *lenis*, vide *Conuol-* *nas* *Tymbra.* 182.
nulus maior *Plinii.* *Malacocisfo* *strychnodendron.* 103. *Thymelaea genuina* *grani gnidii.*
Cassiani *Bast* *Anguil.* *suber duplex.* 432. 157. 156.
Smilax hortensis, vide *Phaseolus.* *suberiquerquus* *ibidem.* *Thymum duplex.* 181.
Smyrnum. 316. *succissa*, vide *Morsus Diaboli.* *Tilia* } *Femina.* } *Theoph.* 440.
folani *genera*, *varietates.* 102. 103. *superba* *Recentiorum.* 189. } *M. s.* }
Solanorella 263. *sycomorus.* 442. *Tithymali* *genera* 150. *varietates.*
Soldonella montana. 262. *syda* *Theoph.* vide *Maluus.* 394. 151. 152. 153.
Solidago sarracenic. 125. *sylibum*, vide *Carduus Mariae.* *lege* *Alyrthi* *specie*, *non a foliis*, *sed*
Sonchus aspera, an *Dioscoridis* *arbo-* *silphion*, vide *Lascepitum.* *frutice.* 152.
refcens. 87. *symphitum* *Alum.* 251 *Tordilion*, vide *siseli* *Creticum.*
Sonchus levis. 87. *symphitum* *petreum.* 198. 199. *Tormentilla*, vel *heptaphyllon*, an *Cry-*
Sophia *Chirurgorum*, *sine* *Thalictum* *symphitum* *Pecton*, vide *symphitum.* *sogonum* *Diosc?* 308.
Dioscori? 328. 251. *Tota bona.* 97.
Sorbus domestica & *syl.* *Alpina* 416. *Trachelion minus* & *eiusdem* *varie-*
Sorbus torminalis. 443 *tates.* 139.
Sorgi. 14. *Tragacantha.* 377.
Sparganion *Theophr.* *Butomos.* 40. *Tamarix* *Norbonica*, vel *italica*, *Tragetes* *Indica*, *num* *Othonna* *Diosc.*
Sparti *differe.* *varietates.* 407. 408. *Germanica* *minor.* 447. *Tragion*, vide *fraxinella.* 410.
409. *Tanacetum minus* *Dod.* vide *Achil-* *Tragion alterum* *scelopendrisolium.*
Spergula, *sive* *sparry* *Belgarum* & *lea* *M. effigie.* 1007. 360.
Angulorum. 357 *Tanacetum* *floribus* *Abrotani* *femina* *Tragoriganum* *vulgare.* } 211.
Epica *Lanendula.* 184. *na.* 334. *Venictorum* *alterum.*
Spina *alba*, *sive* *Bedeguard* *Arabibus* *Tanaceti* *varietas.* 335. *Tragus* *Matthio* *perperam*, *falso est*
369. *Tartonyre* *Masilienfium.* 160. *Theoph* *scorpio.*
Spina *Acatia* *Diosco.* 409. *Tupus*, vide *verbascum.* *Tragos*, *Tragum*, vel *Tragos* *Diosc.*

An Racemosa Equiseti facie plan- tenuisolia? 231. vide *Convolvulus maior* Plin.
ta sit. 355. *Verbena communis* sue recta sacra, *Volvulus asirens* ibidem.
leg. Tragon improbat Mat. 356. 231. *Urinaria*, sine dens Leonis. 84
Trasi Recentiorum, sine esculenti Cy- *Vermicularis* differentia vari. 162. *Ursa*, vide arction.
peri. 37. *Veronica vera maior.* 197. *Ursi auricula recentiorum*, vide Sa-
Tribulus { *Terrestis.* 403. & *Minor Serpilli folia.* 197. *micula alpina*, eiusdem varietates.
Aquaticus. 258. *Viburnum Virgili.* 436. 244. 245.
Trichomanes, sine *Polytricum.* 361. *Vicetoxicum*, vide *Asclepias.* *Urtica* varietates, diff. 223. 222.
Tridaces, sine lactuca. 81. 82. 89. *Vicia*, sine *Silvica* 401 *Vicia sylvestris* *Ustilago.* 11.
Trifolii differentia, varietates. 380. vide *Aracus*, sine *Aracca* & *Cra* *Vna crisp.* *Vitis pretia* Pl. cap. 2.
381. 382. 387. *cia maior.* *Lib.* 14. 445. 446.
Tripolum littorum. 123. *Vicia Dod.* an *aphaca* Math. *Vna lupina*, vide herba Paris.
Tritici genera. 5. *Vicia Sylue*, prima *Dod.* *Aracus* Dios. *Vulvaria atriplex.* 97.
Triticospeltum. 8. *Vicia syl.* secunda. *Polygala vera.*
Triticum Vaccinum Dodo. 11 *Vinca perunica*, vide *Clematis.*
Trixago { 209. 210. *Viola Damascena* & *matronalis.* 137
Trixago maior. { *Viola nigra*, sine } 266.
Trixago palustris. 210. *Purpurea.* }
Tulypa Turchicu purpureu { 1. 25. *Viola* varietates ibidem.
Luteum. } *Viola flammea*, colora calida. 266. *Xanthium*, sine *Strumaria*, vide
Turrons Norbonensium, *Italica* A- *Viorna Vulgi* forte *Vitis sylue.* Dios. *Lappa minor.* 254.
midalato. 23. 275. *Virga aurea*, an *Leucographis* P. 125 *lege Xyloaloes Officinarum.* 440.
Turbith omne. 159. *Virga pastoris.* 374. *Xylobalsamum.* } vide Bal
Tusilago, sine *Farfara.* 254. *Virginea*, vel *Parthenium* est *Corula* *Xylobalsami succedaneum.* } *samum*
Typha 40. *Virginea*, vel *Parthenium* est *Corula* *Xylocina momum.* } 426.
Typha minor. 41. *ferida* non *Matricaria*, vide *Par-* *Xylocasia.* }
Typha carealis. 8. *thenium.* *Xylos*, vide *Gossypium.*
Typha, an *Speltha?* 9. *Viscum Carlina.* 367. *Xyris.* 32.
V. *Viscum.* 282. Z.
Vaccaria Dod. *Glasti species sylvest.* *Viscum Indicum geminum.* 452. *Zea.* 8.
148. *Viscaria*, *Muscipula.* 189. *Zedoaria*, sine *Zadura* herba. 35.
Vaccinium rubrum, { an *Idea Radix* *Utex*, vide *Agnus castus.*
nigrum { 417. *Vitis alba*, *Bryonia.* 423. *Zedoaria semen Belgis*, *Gallis Bar-*
Vaccinia pallustris. 417 *Vitis*, vel *Bryonia nigra.* 275. *totine.* 337.
Valeriana nostrates, an sint *Dioscori-* *Vitis Umifera* spontanea vel *Oenathe* *Zingiberis differentia.* 33.
ridis? 318. *Labrusca.* 275. *Zingiber Caninum Auicenne.* 134.
Valeriana differ. varietates. 319. *Vitis Corinthia.* 277. *Zizipha utraque*, vide *fuube.*
Veneris umbilicus, vide *Cotyledon.* *Vitis domestica.* 278. *Zyzipha candida* *Monspell.* *perperant*
Veratru album, *nigrum*, vide *Elleborus.* *Utraria*, vide *parietaria.* 278. *Venetorum*, *Sycomor*, an *Asara*
Verbasculi genera & va. 242. 241. *Viurna vulgo Gallorum.* 278. *Drachi Auicenne?* 416.
Pagi. 242. *Linea.* 1. *lege Purpureu* *Ulmus.* 436. *Zucca* varietates, vide *Cucurbitas.*
Erucafolium, & *deme Syl.* *Salviso-* *Vulmaria*, vide *Barba capra.* 440. *Zurumbet.* 35.
lin fruticosum lignosum. *Umbilici*, vide *Cotyledones.* 437. *Zyzipha Galeni.* *Iuube Arabum.*
Verbenaca Columbaria, sine *Peri-* *Unedo.* 424.
risteron, an nostra *Scabiosa minima* *Volvulus*, sine *vulubilis maior* vulg.;

Finis.

Coppie du Priuilege.



Charles par la grace de Dieu Roy de France

Anoz ames & feaulx les gens tenans noz courtz de Parlemens, Gouverneurs, Baillyz, Senescaulx, Preuostz, ou leurs Lieutenans & aultres noz Officiers & Iusticiers Salut. Noz chers & bien ames Pierre Pena & Mathias de Lobel Medecins nous ont faict entendre quilz ont delibere pour le bien publicq de faire Imprimer vng liure Intitule *Stirpium aduerfaria noua*, perfacilis vegetatio, & luculenta accessio ad *Dioscoridem*, *Coniectanea de Plantis*. &c. Et pour ce quilz craignent, q'auaucun Imprimeur ou Libraire ne les feist a leur grand prejudice Imprimer ou contrefaire en nostre Royaulme, & pays de nostre obeissance, si sans obtenir de nous permission, ilz les mettoient en lumiere, Ilz nous ont treshumblement faict supplier & requerir vouloir sur ce pouruoir de noz lettres necessaires. A ces causes Et aultres a ce nous mouuans auons permis & octroye, permettons & octroyons ausdictz Pena & Lobel qu'ilz puissent & leur loise faire Imprimer par tel Imprimeur que bon leur samblera le dessusdict liure: & affin que celluy ou ceulx desdictz Imprimeurs qui auront charge deulx de ce faire ayent moyen d'eulx Recompenser des fraiz qui leur conuiendra faire pour cedit effect, Auons Inhibe & deffendu, Inhibons & deffendons a tous aultres libraires & Imprimeurs que durant le temps & terme de dix ans ensuyuant & consecutifz a compter du jour & date, que ledict liure aura este Imprime, ilz n'ayent a Imprimer ou faire Imprimer ou vendre ledict liure, Contenant tant en figures que descriptions de plantes nouuelles par dessus & oultre celles qui ont este par aultres Imprimees enuiron mille, Fors q'ua ceulx a qui ilz auront permis & accorde & sur peine de Mil escuz d'amende applicable partie a nous, & l'autre aux dessusdictz Pena & Lobel, Ensemble de perte & confiscation desdictz liures, a la charge que deuant les Imprimer ilz seront veux & visez, a sauoir si les liures sont a Paris par Ordonnance de la court, & s'ilz sont a Lyon par ordonnance du Senescal de Lyon. Sy voullons & vous mandons a chacun de vous endroict soy & si come a luy appertendra que ou contenu en nostre presente permission ilz facent, souffrent & laissent lesdictz Pena & Lobel joyr & user plainement & paisiblement, Cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au cōtraire Car tel est nostre plaisir. Nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, Donné a Villiers-cotrez le xij. jour de Decembre L'an de grace Mil cinq cens Soixante dix & de nostre regne le dixiesme,

Par le Roy.

Et Selée de cire Iaulne.

Soubzsigne

Pinart.

PETRI PENE ET MATHIÆ DE LOBEL
STIRPIVM ADVERSA.

RIA NOVA.

Graminis omne Genus.



ΤΡΩΣΤΙΕ QVASI AGRESTIS DICERETVR planta
nec fatiua aut ferenda Græcis scitè nuncupata fuit : utpote
quæ ruri vbique sponte quouis anni cardine , cælo, solo & si-
dere luxuriet : eius namque perennis proventus feracitatis re-
stibilis , nec minus immensæ utilitatis quantum toto orbe ex-
tat terrarum, note ornat amœno, & veluti gradatim sese præ-
pagando apicet decore, vnde Latinis Gramen deflexum pu-
tatur. Triticæo generi, vt cognata, & similis, sic perinde va-
ria & nobilitate proxima. Quin differentia magis conspicuæ
è radice, spicata coma, folio & flore sunt ducendæ: quas etiam cunctas partes & diffe-
rentias (quia varias tritici species æmulantur, deque mutua inter se collatione facilius di-
scernuntur & discuntur) aptius fore duximus nominibus & notis quamque suis, vel mi-
nimas quasque prosequi, quas natura pecori quidem vescendas, sed homini vni non mo-
do vtendas, adeoque prius cognoscendas, peperisset. Nullum enim vel despicatissi-
mum illius operum, nostra, id est, mortalium Philosophantium indignum cognitione &
admiratione ducendum, summus Philosophus in libro, De partibus animalium, luculen-
ter docuit, eiusque alumnus Theophrastus in Plantarum historijs.

Uulgatius pratense { Maius,
Minus,
Minimum,
Rabinum vel Rauisum Montanum,
• folijs vetonice Garyophyllate.

Caninum, { Longius radicatum,
Bulbosum, nodosum, } Officinarium.

GRAMEN.

Harundinaceum scabrum, equi nex Babylonium aut Cilicium.
Harundinaceum læue, & pilosum nemorum, Ischamum, forte Plinij.
Harundinaceum striatum album.
Harundinaceum Marinum.
Ischamon vulgare.
Parnasi hederaceo, aut Chelidonijs folio, &
Plinij Aizoi effigie gramina suis locis.
Manna esculentum.

GRAMEN PRATENSE MAIUS VVLGATIVS.

EST igitur quàm quod notissimum gramen pratense dictum, vulgo notum, & Fœnum
quâdo aruit vocatum, exilioribus radicum cirris seu pullis capillamentis, & creberrimis
cespitem summum fugens, humumque perreptans & tegens, densissimo & numerofo
foliorum triticeorum stipatu: culmos pedem & cubitum altos furrigens, tenues genicu-
lato, læues: lanosa, sparsa & magis harundinem Vallatoriam imitante spica fastigiatum.
Eius semine in horreis è spicis excusso & collecto vtimur complures Medici ad obstru-
tiones viscerum, calculum, potu, admotuque ad disculsionem pertinacium tumorum, &
flatuum, tamen officinis vlu ignoto.

FOENVM.

Gramen vulgo
notum Trag.
Epitomes
Folio. 207.

A.

MI.

STIRPIVM aduersaria noua.

MINVS.

Istud idem quod fundit Montanus, vel declius incultus, exctus & aridior ager, vt pabulo gratus & vtilius velleri, sic multò delicatius, minus, & femine efficacius est.

MINIMUM.

VARIETAS.



Aliud etiam in sabuletis squallidis, & vinetis glareosis Norbonæ sæpius visitur, omnium minimum: perpusilla radice, capillacea, alba, calamulis etiã capillamentis similibus, eleganti purpura lucētibz, graminis Ischæmo vocato non diuersis, sed spica mollicella, latiore, sericea, speciosa.

RABINVM vel RAVISVM montanum, folijs vetonica garyophyllata.

Saginæ & lactis vbertati omnium laudatissimum: Montium accolæ opillones Sabaudi & Heluetij Rabis vel Rabinū vocāt, quasi præstantius & præcipuum gramen dicas, (vt quasi Robus in Triticeo genere) Folijs est crassioribus, carnosioribus, breuioribus ad Tunicē vetonicam propius accedētibz, Motosis vdis Angliæ & Heluetiæ familiare.

GRAMEN CANARIVM, Medicatum Officinarum.

Germanis, gras.

Italīs Gramigna.

Anglis, quych gras.

Gallis, dent de chien.

Extat figura.
folio 345. apud
Dodoneum
apud Mathio-
lium 999.

ET istud perquam cognitum, sed in aruis & satis, non pratis, vt plurimum, frugibusq; haud parum incommodū: eoque sementem facturi rastris Septembri, etiamq; primo Vere, manibus runcandum præcipiunt coloni. Prolixioribus, crassioribusque radicibus implexis, candidis, gustanti dulcioribus, geniculatis, longè latèque subtus tellurem serpit: minus numerosam sobolem promit foliorum triticeorum & harundinaceis minorum, egeniculatis calamulis, rigidioribus, crassioribus & longioribus, vti & folia, quàm pratenis: flore item spicato, minus tamen lanuginoso, asperiore femine, totaq; planta magis vesca dulcis & frumentacea, vsibusq; Medicis receptissima, præsertim radix, quæ reseat viscerum fæctus & renum, citra calefactionem, lumbricosq; huius stillatitia interimit, nempe pabulo humorum putridorum fraudatos.

GRAMEN BVLBOSVM, NODOSVM.



Rarius aliquantò istud, minúsque; plerisque; Europæ regionibus vsu cognitum: Lemmano autem Lausanæ finitimis aruis & segetibus plurimum. Frequētissimum etiam Sabaudia & Angliæ, vbi idem efficacissimum experiuntur Medici eruditissimi quidam, Londinenses præsertim. Cuncta prorsum ei canino graminis similia sunt, si huic glandulas teretes, rotundas, gustu dulces, radicis anfractibus hærentes, demas, aut illi addas.

CALAMA

STIRPVM aduersaria noua.

3

CALAMAGROSTIS vel HARUNDINACEVM

forte BABYLONIVM.

PRATIS vdis, sed strigosis, macilentis & sabulosis neglectis familiare graminis genus illud, quod apprimè Babylonio respondet, ac quā Caninū gramen altero tanto maius est, calamis & folijs rigidioribus, scabris, quibus ad harundinē valatoriam non parū accedit, nec pabulo cedit, nisi multum esuriant & penuria melioris admodum laborēt veterina, nec eo greges vescūtur, quippe, quibus non modo ingratissimum (*aigre & Saut*, seu acidum, Rura vernaculè dicunt) verum etiam maciem, sitim & tabem conciliare creditur, linguam & œsophagum vulnerat & arctat, sanguinem in ventriculum elicit, vnde tumefactio, inflammatio & mors plerumq;. Quod si Babylone fuit enatum, vbi id maleficij pernicio adferre proditur, siccius & rigidius, grex verò imbecilior & aluo duriore, minus mirum illius esu iumenta illic enectum iri. Sic enim videas interdum iumentorum labra & fauces cruore manantia & sauciata, quæ cum reliquo stramine per fenecia, huius aut cōsimilia harundinacea folia esitarint: mediæ itaque inter harundinem & gramen est naturæ, figuræ, Radice geniculata, alba, promissiore & longo reptatu vagata, compressiore tamē & crassiore, Canario gramine simili, sed valatorium equante. Spicata, Panici aut Sorgi comosa lanugine.

GRAMEN HIRSVTVM NEMOROSVM,

Ischemum videtur Plinianum.


MONTOSIS & opacis syluis Pedemontium & Lugdunensis Galliæ lubens prouenit, duplo quàm Caninum maioribus folijs, mollioribus, & deorsum reflexis milij, pilis & setacea lanugine multum hirtis, pallentibus. In sesquicubitali calamo geniculato, floribus canini graminis, similibus, maioribus, albidioribus, sed radice exilibus fibris & capillamentis barbata, pratenfis graminis. Iunio & Augusto, nec nisi nemorosis floret.

HOLOSTIVM quidam docti amici, sed imbecilla coniectura, augurabantur. Longè verius coniecturi si *ἰσχίμων* Plinianum dixissent: è terra quippe aut in terram serpit milio similis, folijs asperis & lanuginosis, in nares farcitur. At recentiores aliud gramen subdendum docuere *ἰσχίμων*, de quo mox.

HOLOSTIVM.

*Ischemum, Pl.
libr. 25. cap. 8.*

GRAMEN SVLCATVM vel STRIATVM album.



COLITYR istud in Belgio & Anglia, syluosis autem, montosisq; Sabaudia & Galliæ Allobrogæ spontè nascitur, milij potius folijs, sed vt cannæ Valatoriæ rigidis, mucronatis: lōgitudinem mediā glaucam, complures candidæ venæ vel lineæ argenteæ insigniunt: culmos & Panici sylvestris vel canini erigit. Radix pusilla, fibrosa, albida, pratenfis graminis,

A.ij.

GR.

NORBONÆ littoreis vadis quā vndæ æstusq; æquoris illiduntur, præsertim ad Aquas Marianas & Peraus, proximè piscatorum attegias; gramen istud etiam harundinis æmulum, & vtriusque particeps naturæ, plurimum reperitur: verum luculentioris magnitudinis, & radicibus quidem ternas quaternasue vinas prolixis, digitum crassis multis flexilibus subter sabuleta, vbi Eringiū, reptantibus: geniculatis, cædidis, gustu & figura prorsum Canini graminis, sed paucioribus anexis fibrillis. Calami verò & stipulæ geniculis & folijs superiori similibus donantur; Sed procerioribus & commosis lanosisq; inter harundinem & caninum gramen; floribus in auras, ineunte hyeme, euolantibus.

ISCHÆMON vulgare.
 { CRVS Galli, DACTYLON PLINIO,
 & Aculeatum, an Scirpus Tragi?
 Sanguinella & Capriola Italis. }

Inter Icones.
 Trag fol. 209.

Leoniceo pes
 Corni siue corono-
 nopus

VINETA Galloprovinciæ & Norbonæ isto scatent nonnullis æstatibus; exiguum est gramen, florum tamen elegantia, & viticulatorum cognitu dignum. Sunt namq; purpureo nitido hianthino lucidi calamuli, geniculati, surrecti, singuli, in quinas senasve exiles florum spicatas caudicellas, vel pannosas propagines, cyperidis modo, digitatim sparsi; aut potius graminis Mannæ vocati; Radice & folijs graminis pratensis minimi, sapore subdulci, sed astringente, & exsiccante; vnde potuit coniectura arripi Ischæmi Pliniani, à quibusdam non parum eruditis Medicis, vt Rondelletio & Assatio præceptoribus exercitatissimis.

PARNASIV M hederaceum.

PARNASIV M verò Dioscoridi memoratum gramen, & sic dictum magis vti videtur, propter passionem salubrem & opimam; quam propter similitudinis comparisonem, quia facie longè alia (folio nempè hederaceo & flore albo est) proximè chelidonium minorem & Cochleaream, cognitionis facilioris, & nostri instituti causa, relegamus. Alioqui possit quis ex vulgi vsu Burgundiacum fœnum dictum; Cytisum, aliaq; loti & trifolij genera pabulo laudatissima, gramina vocare; & huc aduocare; eadem prorsus ratione, & consuetudine plebeia: quæ ansam dedisse etiam Plinio videtur enumerandi quædam AIZOI VRENTIS effigie gramina, quorum alterum medeatur Paronychiis vnguium, & carniū excreffentiis in digitis, eoq; DACTYLON vocetur.

Gramina Plin.
 Aizoi effigie.
 Dactylon.

Alterum verò in parietinis & tegulis nascens, cui etiam caustica vis, & sistendo vlceribus quæ serpunt apta. Quæ vtramque Illecebram, siue Aizoi quartam speciem, ita repræsentant, vt nulli paulum versato, non liquidò constet, eandem plantam propter margines viarum aridiores, atque in parietinis spontè nascentem, designatam à Plinio.

Qui an Dioscorideū Cilicium gramen non descriptū, nisi quod boues inflamat intellexerit, coniectari licet; asserere non item nostri est instituti: Id autem interfuit illius magni Senæsis apud Dioscoridem, in quem tamen, operâ sui similis, & adeo ieiuna ad plantas noscitas & discernendas est; vt nisi, quia veluti quispiam putidus pedotriba, Pliniana loca inconditè & inscitè acervat; satius duxissemus de Graminis & Triticis vaga & varia historia quempiam Auernum aratorem, quam istum commentatorem consuluisse. Ne nihil tamen egisse videatur hoc capite, ad Leonicensem & Ruellium à se repræhenfos nos amandat; & gramine Parnasio nouo (vt sunt pleraque omnia Cortusiana) nos donat; nec tantillum descriptionis dat: Et cum Ischæmum, seu vulgatam sanguinariam, cum gramine Mannæ eadem asseuerat, non parum dubios animi relinquit istos anxios herbarum exploratores amicos nostros, qui putarant potius esse congenerem quam eandem; nulli enim cibo cedit illa.

Apud Mathi.
 fol. 1001.

GRAMEN MANNÆ esculentum,

Germanis Himmels deau & Hymncls dau.

Pictura elegans
 in Mathi. 1000.

NON aliundè quam hinc auspicari frugum historiam quisquam potuit, commodiore notione & naturæ imitatione; cuius mirificus ordo & scita varietas, à gramine ad Triticum & harundinacea per cognationes & gentilitates gradum fecit, intermedia & pro-

STIRPIVM aduersaria noua.

5

promiscuæ naturæ; cuiusmodi est graminis Cerealis huius, *Himmels deau*, à Septentrionalibus dicta planta, id est, *CÆLESTE MANNA*, seu Ros. Est hæc sanè adeo similis *Ischæmo* vulgari, vt cultu duntaxat distare videantur: habitior quippè tantum tota, radice fibrosoiore, latioribus folijs, & calamis minus rubellis, plures spicatos stilos gerentibus, semine in glumis magis conspicuo, exiguo tamen albido & compresso orizæ gustu. In pultibus, iusculisque pinguibus incoctum, non dispari gratia esitant Germani Alpini, qui semen istud *Manna cælicum* vocant, ferunt & colunt.

TRITICI GENERA.

TRITICVM, siue
Robus, Robur, vel Rabeus. } *SECALÆ & varietas.* } *Vernum,*
Siligo. } *Autumnale.*
Trimestre siue Setarium, seu Pentarium, id est, quinque mensium.

FRUMEN-
 TVM, aut est
 Triticum aut
 Zea.

HORDEVM, & va-
 rietas. } *Autumnale,*
 } *Vernum,*
 } *Nudum,*
 } *Spontanæum spurium.*

ZE A.

Zea Spelta, siue
Typha.
Zea Theophr. præstantior & mutica.
Zeopyrum.
Zea Olyra, seu Arinca media bonitatis,
Zea Briza, valde degener, & ultima nota, pecori potius quam homini pabulo.

AVENA, } *Sativa,*
 } *Sterilis, Bromos,*
 } *Nuda.*

TRITICVM.



TIRPIVM nobilissima & mortalium forti vtilissima, vt qua animantium princeps homo, vitâ trahit, **TRITICVM** est: sic vti videtur latine dictum, quia molis teratur, Græcæ autem *τρίτος* ab acutie, aut similitudine cum fructuum nonnullorum gygartis; nucleis & granis, quæ *τρίπυς* dicerentur. *Σίλος* autem quasi cibus dictus, quæ tamen vox vniuerso cerealium generi congruit. Sic etiam Frumentum à fruendo dixerè prius, qui Triticum in quamplurimas differentias distaxerunt; cognomines regionibus suis & exoticis, vnde illud aduectum fuisset, solo, celo, satû, cultu & industria varium, cæteroquin specie, & natura re apse vnum.

Est namque annua plantâ canini graminis folijs, sed pratensis radice, multo notissima; spicis seminum feracissimis; cuius etiamnum coloni binas vel ternas agnoscunt differentias, à coloris, alijsque bonitatis notis quasitas: quæ Varroni & Columellæ *Robo* aut saltem *SILIGINI*, & Setanio respondeant. Primæ dotis & præstantissimum Europæis, hodiè pistorum suffragio notum, & in panificia receptum; videtur illud quod è quibusdam Ciliciæ atque Corsicæ mercatis, Lucam & Genuam venum asportatum meminimus: Non ita tumidum, sed solidum, flauum, graue & siccius mansuque minimum muscidum, sed friabile & nitidum, è solo letiore & pingui minime yliginoso, sed flatibus & solibus siccioribus obuerso, cuiusmodi etiam quibusdam Hispaniæ Beticæ, & Norbonæ aruis enatum vidimus. Istud mirum, ni Varronis & Columellæ sit primæ commendationis *Robus*. Nec enim priscorum sedulitatem in colenda annoña neglectui habuisse, tam excellentis frumenti sementem, & propagationem fas est credere: tantò minus nostræ ætatis auidam, ad gulæ cupedias comminiscendas satagentiam huius adeò parabili cibi vsum, fructum non repetituram putandum, etiam si in vltimos orbis recessus (vnde multò minoris momenti, quamplurima accersit grana & aromata) antiquis abrepta fuisset: Sed hæc mutatio cum est frugibus & fructibus quæ vscendo sunt, valde

ROBUS.

A. ij.

6 STIRPIVM aduersaria noua.

SILIGO.
Triticum.

Effigies apud
Math. 391.

ROBVS &
Siligo differunt.

consueti (vt pomis, pyris, peponibus & melonibus) tum maximè triticeo generi : cuius semen & idem fructus triticum istud cum sit, speciem quidem seruat, sed qualitates saporis, odoris, coloris, aliisque affectiones asciscit, aut exiit: prout fuerit ager, imber, succus, flatus, cultus, sol. Itaque ROBVR, ROBVS, vel RVBEVS non suo solo satus abit in SILIGINEM, id est, TRITICVM, deterius pondere, colore, etiamque pollinis robore. Eiusmodi est in vniuersa fermè Gallia, Germania, Belgia, Anglia & Septentrione: quod tamen optimum quidem illud, sed quasi proles nonnihil degener illius præstantissimi habendum. Istud tamen nostras feracius & vberius, illud pauciores culmos, minusque grauidas semine spicas segete fert: ac facile videre est, quam non omnia tellus ferat similia: Etenim Scotiæ agri nonnulli glareosi triticum annuum spatium, vel menses tredecim, propter hyemis sæuitiam, fctum & educatum edunt, ex quo panis longè excellentissimus pinsitur. At illud cuius Ostlandi, seu eorum vicini Septentrionales Orientales, Antuerpiam, maximam quotannis vim & comeatum, venum nauibus important, minus lautum atque cædidum constat panem: tamen penè sub iisdem cæli segmentis vtrunque enatum sit: sed istud vliginoso & depresso aruo. Illud autem subactiore, glareoso, decliuore, & magis perflato: cuiusmodi quod ex solo Hispanico squallido vidimus aduectum in Belgio pellucidum, Rubellum, rutilum, sed adeo durum, vt quia vix molis frangi posset à Flandris mercatoribus sperneretur. Quapropter id duntaxat fuerit discriminis inter ROBVM & SILIGINEM, quod hæc minus excocta succoque blennofo & crasso, ROBVS verò elaboratiore tenuiore & magis grato adoleuit.

ESTANIVM Gr. TRIMESTRVM.

Flandris, Sommer teruen. Gallis, Bled de Mars.

ITIDEM ab vtroque horum non specie, sed imbecilliore quadamtenus constitutione, TRIMESTRVM triticum, quod SETANIVM Græci vocant, differt: Eius quippè solutior crassis & corporatura, celerius germine & culmo proficit, subque æquinoctium Vernum satum, ante Autumnale cum diutissimè cunctatur, spicam maturat: Nec quia neutiquam perferre hyemis rigores potis sit, satio in vernum teporem differtur, vt autumant: Sed quod amissa tempestiua Autumni sementis occasione, propter vel imbres aliaue incommoda, huius serotina satio subsidium venit agricolis. Huius in Gallia Norbonensis montosis satio multa, vbi TREMES quasi TREMESTRE vocatur. Franci verò MARTIVM dicunt, à mense cognomine, quo feritur. Septentrionales Sommer teruen, hoc est, æstiuum triticum, nuncupant. maturat enim æstate ineunte. Meridionalibus, ideo Trimestre vocatū. Septentrionalibus verò exeunte, idcirco PENTAMINVM seu quinque mensium potest dici: non perinde tamen aut delectat, aut reficit huius usus, minusque vberè prouenit. Fœlicius longè exiturum, & vberius si eodem quo reliqua duo genera tempore aruo mandaretur: Nam quodlibet triticum vbiuis gētium, & quolibet anni vertentis momento satum, germinabit & proueniet, & adolescet modo superuentu frigoris, aut ardoris non enecetur.

SECALE.

{ Gal. Seigle.
{ Germ. Rogge.
{ Anglis. Rye. }

Figura apud
Math. fol. 402.

NOTIVS & vsitatus quam gratus plebeculæ frumentum istud, quo inuitæ fruuntur, famenque arcent multæ Europæ regiones, atque quantum à Siligine vincitur bonitate, tantum accedit grani similitudine, magnitudine, nuditate: nigrius tamen & longius & angustius istud. Inter glumas è spicis, per maturitatem pendulis aristæ horrent, cuiusmodi siliginis: non perinde vt hordei rigidæ, scabræ, pungentes in culmis senis septenisque siligineis multo procerioribus, sed gracilioribus tenerioribus, & internodia terna aut quina habentibus. Radice item triticeæ non dissimili: E satione faciunt differre coloni.

Scrunt

7

varietas. { Verni
Autun
nale.

Effig. Math.
395.

Effig. Math.
395.

AVTVMNA-
le, Vernal.

MAY 1940

A.iiij. spica

spica aristisque fastigiata hordei prorsum; sed molliusculæ, minores & grano cassæ, uti auena notha aut Ægylops; ad cuius cognominem morbum Ægyloperem dictum valere scimus: Sed longè magis straminis cineres ad ædemata podagrica.

ZEARVM HISTORIA.

SPELTHA. **V**ALDE quam vagum *Zeas* vel *Zea* nomen, & perplexæ notionis fuit, latiusque multò olim patuit quam hodiè, **SPELTHA** vel **SPEAVTRA** huius ætatis; quæ id nominis duntaxat vni frumenti generi largitur, aceroso multum glutinoso, leuiore, & aristis horrido. pauci alimenti, non tamen prauis succi nec insueti: apud Italos Insuabres, Genuenses, Longobardos, Sabaudos, Galloprovinciales, & vascones, qui serunt propter varietatem grani & agri: nec nisi potioris grani penuria vescuntur. Hæc planè videtur **TYPHA CEREALIS** vocata, quam Germani *welsche weysen*, & *Römische Tuerne* dicunt, Peregrinum & Romanum Triticum vel far; quia indidem allatum. Est siquidem tenui calamo, & ut plurimum singulari spica, multis & prælongis hordei non dissimilibus armata aristis scabris & rigidis, quibus Ægyneta scitè præcipit narium interna vasa punctim læscenda ad sanguinem in quartanariis eliciendū. Granum autè languidius, & exilius multò, multiplicique scabriore & membraneo pertinacius hærente folliculo arctè inuolutum. Longius à tritici natura recedens, quam *Zea mutica* aut *Olyra*. At **THEOPHRASTI & ANTIQVORVM ZEÆ** fermè eadem laus & commendatio, atque Siliginis. Quippè tritico simillima, firmissima, copiosissima, è multiplici & alta radice, culmo numeroso & alto fruticat; nec vllis valatur aristis spica, grano multis folliculis in cluso, læuissimo & cunctis animantibus iucundo, læti pinguisque soli alumna, & olim Græciæ solius vernacula; postea regionibus multis expetita & sata. Vndè facile discas nostratè **SPEAVTRAM** multum ab hac Theoph. abesse, & tamen congenèrem, aut potius degenerem *Zeam* esse, Quantūque *Zea* à præstantiore siligine, tantūdem hanc à *Zea* melioris notæ defecisse: Sunt enim, & possunt esse mutationes cōplures & familiares inter **SILIGINEM**, **ZEAM** & **HORDEVM**, propter cōmunia seminis & essentiæ principia interiora; atq; foris multiplicem euentum: ut consulti Rusticæ rei norunt. Quapropter cum ex Dioscoride tres sint *Zeæ* differentiæ, (illi enim est **OLYRA** è **ZEIS**) satis liquet, ætatem Theophrastum sequutam, latiore huius nominis significatu usam; & complexam non solum **ZEOPYRVM**, sed etiam **OLYRAM** **TYPHAM**, & **BRISAM**, præter illam primi meriti *Zeam*. Idcirco si rem adeò dissipatam & perplexam, quis pressa & facili designatione digerere & perstringere queat, adhuc modum tentandum.

ZEOPYRVM *sive TRITICOSPELTHVM.*

HORDEVM **H**VNC proximè locum vendicat Zeopyrū triticum; cui nomen conflatum ex tritico & *Zea*, quia effigie sit inter *Zeam* & siliginem vel robum, mediæ. Stipula siquidem culmo, spica & aristis *Zeæ* est: granum autè simplici gluma & solutu facili amictum: sed longius minusque quam triticum ventriosum & plenum etiam in hortis satum, quale habuimus his duobus annis; Speltæ vulgari colore & cuticula nonnihil ad secale accedente, gustu minus quam cōmunis hordei suauis, non tamen ingrato. Utilitas, ut copia, rarior.

ZEATHEOPH.

ZEATheophrasti omnium secundum siliginem præstantissima; est admodum affinis Siligini, nec nisi perpusilla varietate distans, non tamen eadem prorsus; nam veterina esu siliginis crepant, aut torminibus intereunt, quibus tamen Theophrasti *Zea* iucunda & commoda. Huic *mutica* nec vallata aristis spica donata est; glumis tamen tuniceis occlusa.

OLYRA.

Siligo Tragi, seu far candidum.

{ *Ger. Ammelkorn.*

DEINCEPS **OLYRA** subdenda, quæ *Zea* Herodoto vocatur; panificijque apta habetur. Hanc Germani, quia pollinis perquam boni & candidi sit, in **AMYLVM** soluunt, &

STIRP IV M aduersaria noua.

9

& AMMELKORN, id est, Amyleum triticum vocant; putantque nonnulli, propter huius in panificio candorem & suauitatem Siliginem esse priscorum, vel SETANIVM, verum secus est.

TYPHA, an SPELTHA?

SEQVITVR Typha; cognata & hæc Tritico; sed Theophrasto monente, cæteris multo læuior quam Zea, nec pinguis facundique soli, sed soluti & macilentioris seges. Hanc nostrates, vti fermè auenam alternis ferunt annis, non veruaculo, sed etiam defesso agro; SPELTAMQVE vocitant: Admodum aceroso, scabro, squallido & arrido grano, minimi ponderis, & eiusdem fermè cum auena indicaturæ apud colonos, quare Olyra deterior, Briza autem melior & læuior videtur.

BRIZA. {Ger. S. Pitters Korn.

ZEARVM vt sic loquamur, deterrima videtur Briza, *Βρίση* enim est onerare, ag- Dodo. 313.
grauare, & quasi veterno sopire: Quod huius panis esu euenire testatur Galenus post Muesiteum Medicum. Typhæ culmo & spica simillima, grano folliculis incluso ex fusco rufescente; panem acerosum, atrum, improbum, olidum, perquam ingratum dant. Germani istud St. Pitters Korn, & Lynkorn, dicunt: nec dubium quin Zeæ species sit, id est, Spelthæ; tametsi nonnulli inficiantur, qui aristas carere dicunt. Quod superius contingere vniuerso triticeo generi, monuimus; sic etiam quando degenerant foetere; saltem Zeæ vitium esse, eoq; hisce accensendum, per criticos herbarios nobis liceat.

AVENA VESCA & STERILIS.

Βρομος {Germ. & *Bauer.* {Ital. *Biana.*
{Flandr. {Anglis. *Detes.*

NI SI in hordeum, quod rarius, aut Zeam, quod frequentius fit, descuerit Siligo, *Mathi. 401.*
in vitium illud segetum primum ac minus cæteris malū abit, quæ auena latinis, Græcis autem *Βρομος* vocatur: non à foetore, sed potius quia veterina eā multa vescantur, vel à fragore, sonituū quem seges matura minimo tacta flatu, edit. Frugum generi si- BROMOS.
quidem colatur accensenda; sin neglecta inculta, aut semine fuerit vidua, tunc *Βρομος* erit, edendo inepta, & qua de Virgilius STERILES DOMINANTVR AVENÆ, Dodo. 346.
canit. Proindeque hæc secrevit Dioscorides, vtque vsu essent diuerso, tametsi genere & figura non diuersa; vtriq; enim vt nomen sic facies & natales eadem. Sed minore, gracilioreq; pedali stipula, apiculisque stamineis delicatioribus, minimè mordacibus, comosa effigie BROMO STERILI; semen fermè euanidum, in tuniculis fermè vacuis. Sed BROMO AVENÆVÈ frugi proceriora crassioraq; calamus & setacei apices tunicis prognati; semen plenum fecali simile, sed arctius, longius & acutius; colore interdum pullo, alias nigro, sæpissimè albicante, & admodum per menses caduco. Vniuersæ Galliæ, Germaniæ, Italiæ, equis est laudatissimum pabulum granum. At in Angliæ huius loco panes fabaceos plerique omnes dant: Iumenta quoque auenæ esu minus bellè habere, aut labores ferre persuasi sunt: Tametsi bonā habeant auenam, qua in Wallia, quæ Cambria est occidua Angliæ pars, panes & placentas ex hac exuta glebis nō prosum respuenda sæpius esitauimus. Pultes illic etiam ex farinæ polline aut flore, cuiusmodi meminimus in Heluetia atque Germaniæ Alsatia: potionibus etiam accommodant integram; vel farinam, decoctis aluum siccantibus & astringentibus.

AVENA NUDA.

NON procul ab amæno Tamesi quā Londinum præterlapsus est, atque in Cantia Angliæ patent alicubi planities nudata auena cōstitæ; cuius omnia similia, si granū quod colore ad Speltham, & nudatum hordeum siuè Zeopyrum accedit, exceperis. Mirum quantum, cuniculis hæc seges placeat. Parant ista fruge tabefacta aqua macerando, optimam ceruisiam; nam suauior aliquantò & vescendo gratior hæc est, nequedum valdè frequens.

ÆGL

STIRPIVM aduersaria noua.

ÆGYLOPS.

PHOENIX, siue Hordeum murinum, & Lolium rubrum.

LOLIUM.

USTILAGO.

MELAMPYRVM an Alopecuros Pl:

PSEUDOMELANTHIVM.

ÆGYLOPS.

Min⁹ verè Ma
tholo Ægylops
altera figu: 1206
& prima autem
falso Bromos.

NO MEN obtinuit à morbo perquam difficili curatu, cui medicationem pollicetur Ægylops, affectio notans proximè oculi vtriusuis magnum canthum, cauernulam, vel sinuosum vlcusculum, aut abscessum. Permulta ferunt Ægylopem segetes triticeæ & hordeaceæ agri Norbonensis & Galloprovinciæ, ætuis & glareosis marginibus, qualem Dioscorides docet: herbulam sesquipalmū, binosque palmos altam, foliis triticeis, exilibus, spica exigua, breui, duo plurimum, interdum tria grana gerente, glumis amicta striatis, & aristis singuli grani ex apice, nō spica emergentibus: hordeacea grana, radice triticea pusilla. Hac nulla propior genuine Ægylopi, cui morbo potius fieri cepto, quam iam longius progresso, non semel periclitati sumus profuisse. Exiccatur enim astringendo citra calefactionem multam. Potui cereali etiam addita semina, cerebrum temulentum faciunt.

PHOENIX, Latini hordeum murinum.

Fol. 346. Histo-
ria Dodo.

LOLIUM
Rubrum.

DICTA Phoenix fuisse videtur, quemadmodum Phœnicopteris auis à colore Phœniceo, puniceo, quasi flammæ, eoque vocant Flammæ istam auem Norbonenses maritimi, nam cum radices, exiguaque folia & viticulos Tritici vel Ægylopi habeat, spicam obtinuit rubello colore, purpurascens ex fusco nitentem, alterno situ glumas hærentes habentem, & prorsum lolij similes: vnde nonnulli RVBRUM LOLIUM vocitarunt. Et nisi multum fallimur, est hæc Plinianum HORDEUM MVRINUM, folio hordeaceo breuiore, angustiore: spica lolio similis. Rami digitorum seu num radicem circundant: In aruis & tegulis, recens illitis, trita & vino pota præclare menses ciet: quod nobis hætenus incompertum, non enim fuimus ausi experiri, veritatem capiti dolorem moueret, aliaque incommoda temulentie faceret, cuiusmodi nouimus Lolium facere solitum: Præsertim apud Prouinciales, Delphinates. Repertum & cognitu hæc facilis, Germaniæ, Angliæ, & Galliæ.

Σίγα καὶ ὀξὺς.
Gal. Turay.

LOLIUM, & temulentum triticum.

Fig. apud Dod
320.

Aτρυ vocarunt Græci ut coiectura fert καὶ τοῦ ἀτρεσθαι, quod est efferri & attolli, vel sursum rapi: rapitur quippe in cerebrum lolij vapidam nocua aura, atque dementie affinem tenebrosam vertiginem, temulentiamque efficit. Quo quidem maleficio vel infimæ plebeculæ notum, & inuisum plus satis est, præsertim Galloprovinciæ, Norbonæ, & passim in reliqua Gallia, vbi *yuraye*, quasi ebriosa vel inebrians vocatur. Quippe etiam in Nortmania, Belgio, & Anglia, non solum pani mixta farina, sed multo magis Cerealibus potionibus, *Ale* & *Byere* addita, & feruēfacta, torpore & temulento veterno cerebrum opprimit, & opacat, reliquaque membra torpida reddit. At foris admotum, eiusdem ex axungia depositum cataplasma, eadem pellit incommoda, doloresque diuturnos artuum & pericranei soluit. Spica similior nulli quam phœnici, ut sitè Dioscorides monet: eoque qui alterutram norit, ambas nouerit. Granum in duratunica: stipula, radix, & reliqua tritici, vel secalis sunt: eoque ea in opinione, qui ex Theophrasto est Senensis, ut hæc tritici pestis, rursus in triticum redire solita sit: ut verum dicit, ita ineptum & Physices imperitum se prodit; quum de Hippocrate historiam, è Plinio exemplum sextis humani mutati adducit. Quippe neque ad rem facit hic sexus mutatio, & in plantis sexuum distinctio non vera, sed metaphorica & figurata doctis merito censetur: igitur res vera, ratio improba. Nullus enim non nouit hic defecisse Lolium à tritico, nec in sceminam abiisse, sed in vitium quodpiam, aut aliam segetis speciem: calidius enim & siccus est lolium, reliquo quolibet frumento, improbum

STIRP IV *Maduersaria noua.*

11

bum alendo, præsertim homini, tritico autem planè contrarium natura. Hoc enim homini salubre, veterinariæ autem nex plerûque. At lolium hisce, vti neque alitibus gal-
linis nocet nihil, illi tamen plurimum: quare specificæ differentiæ sunt, non maris aut
fœminæ, vt blaterabat Commentator. Quinetiam Adamus Leonicerus, Germanus Bo-
tanicus minimè malus.

USTILAGO.

{ Germ. *Bzant.* { Gal. *Brusure.*
Fland.

NON è deprauatis humi granis, sed ambustis culmorum fastigiis, quæ iam spicari
cœperant, istud vitium oritur, quòd ideo Brandi Germani, & vstilaginem recetio-
res dicunt: *Brusure* Galli, apud quos, inter siliginem, secale & auenas, frequens oritur. *Historia. Dodo.*
Dum enim in floribus atque granorum spe adhuc est spica tenera, si compluta madidâque
321.
imbre fuerit, ac repente sole feruidiore arefacta, iam vitium istud sterile fit, nullius in
Medicina commodi comperti: cognitu tamen facile, quia culmis, foliis & radice est
filigineis, vel auenaceis: Spica autem puluerulento situ fusco, aut atro obducta, quæ il-
lico, quasi defloresceret in puluerem ambustamue teredinem cariosam, fatiscit.

CRATÆGONON.

CRATÆGOS, vel Cratægón arbor est, quæ de inter Mespila dictum. Crategonum
verò herba Cerealis videtur, & affinis melampyro, cuius vsus & esus, semen viu-
dum & genitale redderet, id enim τὸν γόνον κατεστῆ, est semen robore acuere, &
quasi viribus imbuere. Nullius venit in mentem plantæ, cui aptius quadrarent notæ,
quàm ei, quæ propter similitudinem recentioribus, alterum MELAMPYRI genus pu-
tatur. In Syluosis collibus, & deuexis, vmbrosis, Norbonæ, Angliæ, Sabaudia, & Pe-
demontis passim multa æstate fruticat, cubitum, sesquicubitumque plusculis, & ge-
niculatis germinibus, in alas multas diuisis, eufrafiæ ritu: sed multo crassioribus &
maioribus, quas ab imo totas folia melampyri, seu tritici vaccini vocati, vel luteæ cristæ
gallinacæ dictæ, psyllii aut liniariæ ambiunt: Flores in summis herbacei ex luteo, cala-
ticulis minoribus, quam Albæ digitalis, sed similiter digestis, & vt melampyri aut lini-
ariæ effigiatis. Semē in folliculo exiguo milia non dissimili, cuius odor & sapor acre non-
nihil testantur. s lacunosus & hians, ta-
centium, & seminis ge-

MELAMPY-
rum alterum
Neotericorum.

PLI.

RPJCB

ms.

cie triticum vel pabulū
on similibus cristæ Gal- *Histori. Dodo.*
lopecorum fecit: folia 320.
amen stellatim oriuntur:
ntibus ex cœruleo, deinde

luteo, cœruleoque permixtis in virorem marcescentibus, inter quos glu-
mosæ siliculæ duo grana cohibent loliacea, triticis minora, & nigriora.

Vitium est tritici, & comes importuna, vaccis pabulo grata & innocua, & in quam
triticum minus laudatum abiisse videtur.

PSEV.

STIRPIUM aduersarianoua.

PSEUDOMELANTHIUM.

Germa. Kaden & Kornroß.
 Fland. Korenroosen & negelbloemen.
 Italis. Gittone.
 Gallis. Nielle des bledz.

Mathiol. effigies
 Fel. 798.

PORRO sui generis est Pseudomelanthium vocatum, nam tritico permixtum atque farina in panificio vesca est: folia pilosa, psyllii latiora, breuiora, caules rectos, proceros, pilosos, in summo caliculis oblongis donatos, qui quaternis, quinifue mucronatis, exilibus vnguiculis, flores maluae colore & modo ambientes. Semen copiosum fusco pulloue colore foris, intus albedo.

RELIQVA CEREALIA.

Oriza	{	Vulgare
		Indicum Plinianum, seu Mais Occidentale.
Milium	{	Sorgo.
		Panicum.
		Panicum sylvestre.
		Panicum Coeruleum Indicum unde forte Indum Dioscoridis.
Phalaris.		
Phalaris pratensis minor.		
Lithospermum Plinianum.		

ORIZA.

{	Italis. Riso.
	Germ. Reisz.
	Flan. Reys.
	Gall. & Anglis, { Ris.

Mathiol. 403.

VT semen ex India primum fuit allatum, sic & indidem nomen adscitum videtur. ORIZON Theophrastus, Dioscorides verò ORIZAM, Nostrates trunca voce Ris vel Riso Italis vocarunt, Notissimum illud Asia & Europæ, sed vnus duntaxat generis nobis visum in Prouincia Norbonensi & Hispania, sed maximo prouentu in agri Mediolanensis depressis, & patenti planicie vdi agri, quem tamen euripis & illicibus à flumine è lacu Maior vocato ductis, crebrius, quoties opus vident, rigant: alioqui nullam aut cassam segetem laturum, vt mirum sit tam siccum & exustum granum, tam palustrem & humentem optare fundum, bonum alimentum & lautum suggere, etiâque valetudini prodesse posse. Huius messis serotina est circa æquinoctium Autumnale, quippe maturescit æstiuis solibus multis: eoque Septentrionales, tamen si humentes magis respuit tractus, vtpote alsiosos. In arista flexuosa, sed rigidula spicatum alterno situ insunt grana, subflauo folliculo, acutis seu angulosis striis in longitudine donata: quo cum sibi supernè harentibus aristis mordacibus, exuta grana, candida, pellucida, dura & multo pultibus gratiora, atque candidiora quouis præstantissimo tritico siligineo. Culmi hordeacei sesquicubitales & cubitales, radix tritici: at folia potius milli aut hordei quam porri nobis (ni multum labat memoria) visa in Longobardicis & Hetruscis campis latissimis & vliginosis, atque in Prouincia Galla. Eapropter Mathiolus Senensis, sequutus videtur eos, qui ex Plinio ORIZAM hodie ignotam, radice Gemmeæ rotunditatis, flore purpureo, foliis carnosius porri similibus, & latioribus, altitudine cubitali, cum nostrati vulgata Oriza inscitè confuderunt. Illud porrò radicis rotunda RISVM, fortè sit illud, quod Romanis inuidebat iam tunc Asia, & Syria Barbara, iureiurando adigere solita messores & institores, ne prius quam excoxisent, vlli venderent, veriti ne semen in alias regiones communicaretur, quæ semina sic coctione exanimata, munere accepta

ORIZA
 Plin.

STIRPVM aduersaria noua.

13

accepta, nos metipſos non raro ſefellerunt. Plurimum & optimum alimentum ſufficit probè lacti incoctus ſaccharo & amygdalo noſtratis Oryzæ pollen, eòq; ſanguinem & ſemen auget, quod non dubius animi ille Senenſis efferet ſi in Mauritaniâ vel Hiſpania egiſſet, vbi etiam ex Oryzæ macerato lacte frumento deſtillant liquorem, limpidum primo, deindè oleoſum habent, nec parū ſuauè, nec minus exhilaratè ſpiritus & inebriantè, quàm ipſum (quo illi abſtinent, vel carent) vinum. Etiam eius pabulo mirè delectantur & dociles fiunt Aphri Elephantes.

Κέϋκος, MILIVM VVLGARE.

Flandris, Biers ſeu Milie.
Italica, Miglio.
Germanica, Riſen.
Gallia, Millet.

GRÆCÆ à minutis ſicuū granis ſeu gygartis numeroſiſſimis, quæ κρυχαμίδες vocantur, dictum videtur. Latine verò quaſi milleſimum ferat granum: eſt enim tantæ feracitatis, vt granum ſingulum ternos reddere ſextarios feratur. Niſi potiùs dictum putet quis quia communi nomenclatura Græci μελίκην vocarunt, tum Panicum, tum Milium auctore Varrone. In Hetruria & Norbonenſi Gallia, primo Vere ſerunt, metuntque tertio ſerè menſe poſt. Solum pingue, limoſum & glebam glutinoſam, & aërem tepidiorem amat: ab radice fibroſa Panici ternos quaternoſque culmos birtum, triūmū cubitorū altos, hirtutos harundinaceos porrigit: foliis & comoſa ſœtura, facièq; ſumma quadantenus oryzæ, ſed longè maiore & magis ſparſa ſœtura iubatâ, comam harundinaceam imitante, & grauida puſillis granis, leuibre tunica teſtis Phalaridis aut Lini, ſed rotundioribus, minoribus, magisque lubricis, quæ tamen facilè friata, inque pollinem redacta panes, lagana, placentæque cōſtant, graua concoctūque difficilia, & mandendo glutinoſa, atque ingrata, niſi mox quum cocta fuerint edantur. Eoque Venetijs, calentia adhuc eſtant & vœnūdat plebecula in compitis, addito elogio recentis à clibanō vel furno caliditatis. Sed ſeu recens, ſeu vetus eſt, vtique compactæ compendio & ponderoſæ molis, prauūque ſuccum & multò ſilagine ac oryza deterius alimentum ſuggerit, vel quibuſuis Carbonarijs, opilionibūſque Tiriolenſibus ludicibus, nedum Galeno: quos illic cum percontaremur, num vera ſcripſiſſet Mathiolus, nimirum eos poſſe victitare, niſi pane miliaceo, vel polenta lacte incocta, nos ridebant, & Commentatori ſimilem victum perpetuum & lautitias optabant, & ioco addebant, ſe non poſſe quidem perdurare, vt quorum res, pecuniæ neutiquam potis eſſet meliores emere panes. Auiculæ iſto non ſecus ac Phalaridis, Lini & Canabini ſeminibus victitant, vt Canariæ Philomelæ, Linottæ vndè aui nomen, & κρυχίδας fortè à milio illi auiculæ, quam Galli *Queracereau* vocant. Siccat tenuitate multa, pauco aut nullo eſt calore, eoque cerebri fluxionibus valdè accommodum. Itidem ad fluxiones artuum, flatūſque inteſtinorum magno leuamento. Torrefactis ſalis manipulis duobus ferro cochleari vel imbrice, addunt milij tantundem, ſed ſubducto ab igni cochleari, nè vratur milium, quod calore & contactu ſalis vel ſurfuris, dum remiſcentur vnà crepat, medullamque candidam tumidam, Aniſi aut Carui conditi parem, ſimilem, & concolorem adeo excludit, vt pueris ſpecie tragematis ſacchariti illudat. Ex ſaccis lineis excepta, calida admouentur, etiam partibus delicatioribus, torſionibus vexato abdomini, lateri, denique cuiſlibet ad humiorem craſſiorem impactum digerendum.

Mathiol. 405.

MILIVM INDICVM PLINIANVM ſeu MAIS

Occidentalium, Frumentum Turcicum, vulgò.

Flandris, Turckskozen.

FRVGVM maxima & perquam ſpecioſa hæc noſtro, orbi inquilina, indè à Neronis principatu in Italiam inueſta, iamque noſtra ætate magis oblectationi quàm Panificiō ſata & culta, Turcicumque frumentum, tum vulgo tum doctiſſimo Fuſchio nuncupata eſt. Quem tamen perbonum doctorem, cum alias non ſemel, tum

B.i.

hic

hic potissimum immerentem lapsus inculcat commentator Senensis: quod istud Milium perperam triticum appellarit, ut pote non ex Turcica allatum, sed ex Occidentibus Indis primum asportatum. Atqui cum huius deliniationem, proceritatem & fecunditatem scite Plinius adumbret, cuius æuo nulli Europæorum nota fuit aut peruia Occidua India, perperam illius primum allatum fuisse commentatoris Chronographia statuit: quare rectius naucleri qui ex Asia Turcica maiore, Indiis finitima aduexissent, Turcicum vocarunt. Radice, folijs, & floribus est planè Milij, sed multo maioribus atque culmis procerioribus, septenarium, octonumue pedum, harundinaceis, rigidis, digitum & pollicem crassis, geniculatis & medulla farctis densa, candida, cuiusmodi saccharinæ harundinis, è cuius medio, inter geniculorum & foliorum sinum se prodit Cylandrea effigie Typhæ claua crassiore, sed breuiore, tunicea & tenui vagina operta, in qua conduntur grana Pisi magnitudine, compressa & denis pluribusue versibus rectis scite & arte stipata, colore purpurea, interdum fulua, nonnunquam alba & fusca: quorum varietate flores utique concolores miliaceis similes respondent, in summoque culmo nutant nullo indidem prodeunte grano, raro naturæ luxu, quæ non ut pararet umbram sæturæ, sed ut ostento spectatorem oblectaret, eodem callos semine fecisse videtur, quod raro alijs in frugibus animaduertas. Aprili & Maio triduo maceratum semen (uti cætera duriora grana) compluto mandant aruo, scrobibusque deprexis infodiunt & operiunt, non secus ac Pisi, & Fabas rurales. Maturat Augusto & Septembri in Anglia. Perunianum M A I S verò ferunt, qui illic fuerunt, ferme toto vertente anno posse & feri, & meti. Est quod, trimestri, bimestrique aut sex hebdomadarum spatio maturat, prout terræ & ætheris fert temperies, nec dispar fementis facilitas in Asiaticis Orientalibus Indiis. Est huius M A I S panis, ut miliaceus, grauis & gratus minimè ventriculo: præcoccus enim & terreus, alimentosi succi expers longè nostrati filigineo bonitate inferior, quem Phronea illi genti apparauit, ut similes haberent labra lactucas. Mouendo puri, faucibus, salina & manu subigunt quidam: dulcedinem quandam infulsam percipias & gluten, quo, occlusis calori nativo spiraculis, facilius & citius pus fit.

SORGHI ITALIS & GALLIS.

ES t etiam Sorgha re & nomine Indicum Milium huic affine, & indidem aduectum, sed ut minus speciosum, ita frequentius multò in Italia, præsertim ubi secus viam, & tuguriola rustica: inter Patauium & Ferrariam, videas hanc segetem Septembri mensibus aptam, quam Vergiliarum ortu seuerint. Similiter superiori harundineis quaternis, quinifue, medulla farctis assurgit culmis hominis proceritate, gracilioribus aliquantò, fuscis, geniculis tuberosis, superioris folijs mucronatis, sed summitatibus spicata fastigia Panico maiora insunt, quæ post delapsos flores luteos, grana oblongæ rotunditatis, subrubra, canabis, milij maiora duplò, & duplici tunica inuoluta promūt. Miselli illic coloni pertæsi operæ & longioris moræ, quæ egerit cætera fruges, sorgam ferunt ad panem faciendum, aut columbis & pullis alendis. Concinant etiam scopas huius arefactis rectioribus & rigidioribus, exilibus summis viticulis, aut virgis, ad vestes pannosque quolibet verrendos in Italiæ & Galliæ varijs locis.

PANICVM.

{ ΕΛΥΜΟΣ & ΜΕΛΙΝΟΣ: *Italica, Panico.*
 { *Germanis, Phenich & Heydelphenich.*
 { *Flandris, Panichkozen.*
 { *Gallis, Paniz ou Panic.*

Mathiol. 406.

ΕΛΥΜΟΣ & ΜΕΛΙΝΟΣ vocarunt Græci, vnde & Milium Latini auctore Varrone: fuit enim promiscua nomenclatio, Milij & Panici propter communes tum naturas tum usus. Est quippe species milij, sed Panicum dictum à glomerosis tuberosisue quasi racemis, in paniculam, siue conicam spicam hirsutam, nutantem, palmum & sesquipalmum longam aggestis: Miliaceis, sed exilioribus, numerosioribusque multo granis, multaque

multaque tunica obfistis concoloribus, interdum albis, fuscis, interdum ex pallido luteis: folia item Miliacea, mucronata in culmis firmis harundinaceis densè geniculatis quinum, senumue pedum. In Gallia & Vasconia vltima, etiàmque Belgicæ Gallia hortis, sed felicius in soluto & sabuloso aruo, sicciorèque & tepidiore Climate. Nullius ferè commodi hodie, nec Officinis, nec Panificio: est enim præficci, macilentis, & leuioris, vt sic dicam, alimenti, eoque auiculis ad cibum erogatur, non secus atque Phalaridis & syluestris iam describendi, spicæ.

PANICVM SILVESTRE.

DISTAT nostrate Syluestre vocatum, inter Italiae & Norbonæ rudera, & vrbium areas plurimum oriri spontè solitum, non solum cultu, sed etiam spica peculiari, nec in turbonem collecta, sed minore multò & alterno situ summo cauli hærente, Persicariæ, aut Potamogetonis similitudine. Cætera verò facies multum præ se fert Panicum, stipula, folio, culmo, radice, & internodiis: omnia non dissimilia, tametsi longè minora, eoque Panici recepto nomine herbariorum donata, vsu hodiè neglecta.

PANICVM COERVLEVM INDICVM

unde fortè INDVM DIOSCORIDIS;

QUID possit in plantarum ortum & educationem æther, aër, & tellus, vel hæc luculenta, si quæ alia planta, luculento exemplo erit: cuius semen recens ex Indijs acceptum, & summæ humanitatis, & summi admiratoris stirpium, generosi Ioannis Brancionis Mechliniensis munere acceptum, à nobis Monspellij hortis factum Martio mense, antè Augustum harundinaceos culmos, quales cannæ saccharatæ, hominis proceritate erexit: crassiores digito, medulla fungosa pallente farctos, rectos, geniculatos, qui proximè radicem (quam pro sui magnitudine minorem, & ferme Panici prioris magnitudine habet) cœruleo, eleganti, nitido purpurascunt, vt etiam in summo cylindrico spicæ vel conis superne retulso fastigio, ad effigiem Indici **M A I S**, seu Milii Turcici, nitent stamineis apiculis florum ex cœruleis dilutis & gemmulis, grano densè elegantèrque stipatis, oblongis, teretibus, cœruleis, auenæ nudatæ similibus quadantenus, minoribus, copiosissimis. Folia harundinacea, medius secundum longitudinem neruus percurrit, lata medio tenuis internodia inuoluentia: gustus miliaceus, vsus nullus, quia inter rarissimas fruges rara hæc.



φάλαρις { Flandris & } Spaensch saet & Saet van Canarien.
 { Germanis }

Dodo. foli. 317. NON modò è Canarijs Saccharinis & Hispanijs, sed etiam Norbonensi agro, via ad Magalonem propè segetes ad pontem, Phalaridem veram, eiùsque enatum semen foeliciter in Belgio & Anglia habuimus: quò institores Canarijs Philomelis plusquam saccharatas & mellifluas cãtilenas modulantibus alendis vœnum asportant seminis magnam vim: Sclamo paulò maius & concolor, aliquantò depressius, & minus quàm lini semen: in spicatis culmis, & glumis acerosis, æqualibus: cubitales sunt culmi, geniculati, folijs & radice hordei, aut potius, vti tota facies, Zeæ. Alimento est, & nonnulli panes pin-sendos curant, esitântque ad calculum farctûsque vesicæ.

PHALARIS PRATENSIS MINOR.

Trago *Aegylops* Pl.

Inter Icones
Hiero. Tra. 204. QVO modo & quantum distat gramè pratense minimû à canino gramine, tantû hæc à Phalaride: quippe non in segetibus, sed herbidis pratensibûsque Germaniæ, Galliæ, Angliæ oritur, gracilioribus ac fuscis ex sanguineo lucidis stipulis, sesquipalmaribus, interdum & pedalibus, per summa in sericeis capillamentis sparsum copiosas glumas gestantibus, nitidas, ex atro fuscas, & semina superioris phalaridis duplo minora: folia item & radix minimi graminis vel Ischæmi.

LITHOSPERMVM PLINIANVM, siue Maius.

LACHRYMA IOB seu Christi.




GAlloprovinciæ & Norbonësia vireta, præsertim Cœnobiorû, nondû intestinis bellis efferuentibus euersa, hanc plantam sedulò colere solita erant, seminis lapidei causa: quo traiecto filo preculas funditabant & supputabant. Et etiamnum ad calculum Renum & Vesicę faburam, polline & decocto præsidium vulgatum. Rotundum, leuiter altera parte turbinatum, altera nonnihil depressum, Staphylodendri bac-cæ haud dissimile, magnitudine Ciceris: nitore, leuore, candore, colore Lithospermi maioris Dioscoridis: sed duritie silicea, & lithospermo multò pertinacius: præsertim quod è Creta, Syria, atque Rhodo allatum, & spontè natum erat: medulla intus pauca, gustu emplastico: nostratis autem folia Orizæ, miliij, vel pusillæ harundinis, palmum & sesquipalmû longa, digitû lata, surrecta: statim ab radice Tritici cul-

meos cauliculos, geniculatos, rotundòs, cubitum altos complexa: quorum è singulo sinu singulæ barbulae (vt hîc Plinius ait) seu panniculæ miliacæ prodeunt, semênque continent magnitudine ciceris, duritie lapidis, vt idem describere pergit Plinius. Cuius si quis exactius verba perpendat, & cum vtroque comparet Lithospermo, facillè animaduertat vtrumque ab eodem designatum, sed (qui illi penè fatalis lapsus, vt de Chrysanthemo monuimus) in vnâ descriptionem conflatum. Primû Δίοςκουρον, id est Iouis triticum indicat triticeis aut harundineis similem, aut congenerem: herba quinquëcialis, folijs rutæ duplò maioribus, ramulis surculosis, crassitudine Iunci, quæ ex vtriusque deliniatione mixta sunt. Sed post addit lapillos magnitudine Ciceris, duritie lapidis, cãdore & rotunditate margaritarum, cauernulas habent qua pediculis hærent: quæ postrema prorsum Lachrymæ Iobæ quadrant, neutiquam Dioscoridis Lithospermo. Quod licuit illi quâplurimis in agro Romano locis videre: haud sanè tam stupèda mirabilitate, si vulgò cognitû Miliû folis intellexisset: eoque dicit, sibi non hærentè, sed vulsam visam plantam in Italia crescere, puta hortis. In Creta optima, nimirû natiuo solo: quin tantus decor veluti cãdicantibus margaritis: cæterâq; inibi verba, neutiquâ deformi & tristî Lithospermo congruant, sed Lachrymæ Iobæ longè hilariore & iucundiore, aspectu: quibus

quibus intus inest semen (vt idem dicit) & subtus cauernulæ , neutiquam cõmuni. Mut-
tit hic Rapfodus Senensis, & superius in Fuschium ineptit, & superiore volumine nobis
Phalaridem vorarat.

Αλωπέκκος THEOPH.

Cauda vulpis Monspellensium.



HERBAM quam caudis Vulpinis similem & cognomi- Lib. 7. cap. 10.
nem factam dicit Theophrastus, cum de superiorum
collatione, tum verò de ista Philosophi deliniatione, no-
tissima est, frequensque maritimis ad Magalonam Aquas
Marianas, & Monspellio propinquieribus. Pedè alta tota
planta, albicans tenui canicie & triticeis culmis, folijs, ge-
niculis & radicibus exilibus. Speciosiore tamen ex fla-
uo pallentem, paleo colore molliorem, & densa lanu-
gine obducta, pilis delicatioribus & longioribus in Vul-
pinam caudam, etiam vulgi illic suffragio & nomencla-
tura, eleganter eformatam habet, qualè & vndè Theo-
phrastus nomen mutuo habuisse dixit : sapore frumen-
taceo insipido. Huius autem non vsquequaq; accuratus BELGARVM.

interpres Plinius, videtur σελεφσρον (quam Melampy- Melampyrum,
rum Belgij hariolamur) loco Alopecurū accepisse : vti descriptio liquidò docet. Nam Pli. σελεφσρος.
quòd nonnulli Plantaginem, etiam alij ortigen acceperint, non propterea plantago sit
statim censenda, vt monuimus, varijs adducti exemplis in Stœbe : sunt enim nomen-
clationes vulgi incertæ, nisi certioribus stabiliantur coniecturis.

HOLOSTEVM DIOS. floribus albis
vel ολόσσεον Aginetæ.

HERBULA sit oportet tota tenella & graminea holostium, sic contraria notione di- Perperam Fusc.
cta tota ossæ, quasi nihil duri ossæiue haberet : sic etiam Græculi τὰ γλυκέα id est Gramen.
dulcia fella contrario significatu, vt quæ sint amarissima, vocant: sic etiamnum vulgus ?co: 74.
Iuam moschatam, & Vnguem odoratam dictitat. Duæ verò sunt plantæ gramineæ, qua-
rum altera perperam à Doctis: altera non malè forsan à nobis, proponuntur. Quāplu-
rimis Galliæ, Belgiæ, & Angliæ locis incultis, & viarum marginibus, exiles, tenellos vi-
deas & humi caducos, per intervalla geniculorum, bina folia gramineis breuiora, acu-
tiora, habentes cauliculis: floribus lacteolis Ornithogali, & Morsu gallinæ minoribus:
vtriculos, Lini seminis, aut Anagallidis similes relinquentibus: Radicibus flamineis,
albidis geniculatis prolixè per terram vagantibus, gramineis multò exilioribus, quibus
tamè etiam hodie abutuntur quamplurimi Angli Pharmacopœi, graminis loco & igno-
ratione. Hanc Lutetiani Parisienses præceptores iamdiu holostium opinati sunt.

HOLOSTIVM ALTERVM.



Sed enim nostra hæc multò breuioribus & crebrioribus
Sgramineis vix palmeis viticulis, & folijs exit Coronopi
diuisura, in superiore ambitu ex fusco virentibus, delica-
tioribus fermè, vt Capillarium, sparsis. Radix tenuissi-
mis cirris, & capillis pluribus Adianthi veri, ternos &
quaternos digitos prolixa, pulla & albicans fuscèdine.
In Norbonæ ad Veganium, & propè Lugdunum, e-
tiàmque in Alsatia Germaniæ vidimus, saxosis & in-
cultis sterilibusque collibus. Gustu exiccat & adstringit,
grata satis & cuiusdam lentoris non immunis. Quare SERPENTI-
multò certius quis hanc verum holostium profiteatur, na.
quàm SERPENTINAM vernaculè vocatam & Est apud Ma-
Mathiolo Holostium putatam, cuius radix adeò non thiol. Fol. 494.
est capilli tenuitatem assequuta, quod vult Diosco-
rides,

B. iij.

rides, vt crassicie lignosa & fusca minimum digitum fermè crassa manifestò conspicitur. Reliquaque planta capitulis & semine plantaginis: non mollicella aut tenera, sed durior, rigidiórque, quàm vt holostio datum sit. Folia illi iuncea, angusta, crebra, in terram procumbentia.

HOLOSTIVM MONSPELLIENSE



Nec quam Monspellenses Holostium suspicabantur probàda, propter eandè planè radicis còtrariam notà. Est enim (tametsi alba) lignosa, crassa, Iux aut Cotulæ, aut Cichorii æqualis, furculosa, statim folia Psyllii aut Coronopi non incisa tamen, albicàtia, complura, & nònihil lanugine pilosa emittens. Viticulis etiam & floribus Coronopi vel Plantaginis, sed albidis. In Monspellensibus aridis oliuetis, & non procul ab aruis viàque Boutoneti proxima frequens oritur. Exiccat & hæc nonnihil, adstringit, terreo sapore, subfalso, saluam ciente.

PHALANGIVM an MOLT PLI.

Φάλαγγιον.

Non rectè Dod.
Moly. Fol. 348

NON sine dispendio nostræ cognitionis, & tædio conquisitionis omissa sunt folia Phalangii, in Dioscoridis Pliniique deliniatione. Cui tamen multum diùque, vt nonnihil quod bellè quadraret, nancisceremur, a nobis elaboratum est. Lugduni in collum accliuibus ad Rhodanum, non procul ab arce noua Lucernæ portæ, & Pedemontis Taurino, Eridanòque flumini collibus vicinis planta est gramineis folijs latioribus, pallidioribus, caulem inum cubitalem & sesquicubitalem amplexis, ab vno ortu exuntibus & reflexis, radice exili, fibrosa: plures pusillos ramos in summo promens, quibus ex pediculis flores aptantur candore & diuisura Lilij, sed crebriore Asphodeli pares, nec absimiles. Semen angulosum pericarpio Lini, aut Asphodeli oclusum, sed multò minus. Varijs Londini & in Belgio hortis colitur, nominèque Phalangij donatur. Multò sanè aptius quàm MOLY, seu Dioscoridis, seu Plinij, vt nonnulli voluerunt non indocti: nullo enim bulbo, ne quidem atra radice præditum est, vt cætera taceamus.

PHALANGIVM CRÆTÆ Salonensis.

DVM Monspellio Galloprovinciæ Malsileam lulum iremus, cum plures commilitones per Crætam, glareosâ sue, & fusas planicies Salonæ, quæ vocantur Craux de Salon, alteram non dissimilè huic copiosam collegimus, nisi magnitudine differentem, quæ pedem vix æquabat: & folio minore quidem, sed crassiore, rigidiore multò, ad Garyophyllatâ accedente. Iunio flos, & semen Augusto fundebat similia, sed minora.

PHALANGIVM. H. TRAGI.

PHALANGIVM verò singularis iudicij Tragi, non Lilij flore, sed potiùs papposo flore quopiam visitur Lunci, cui item folio, caule pedem alto, totòque habitu accedit, quò etiam referemus.

PHALANGIVM MATHIOLI.

COMMENTATORIS Senensis verò Phalangium pictum, vti pleraque alia, nec descriptum nobis, nec multis doctioribus nusquam visum, (fortè nec Mathiolo) qui quasi mutus foret, sculptori munus commentandi relinquit. Multus alioqui hic & alibi, in ex Ruellio & Plinio iamdiu pertritis locis vel interpretationibus conferrummandis.

ARVN-

ARVNDINES

- Saccharum.
 Sacchari purgandi ratio.
 Saccharum { Candum candidum.
 Candum violaceū venetorum }
 Saccharina Indica { Arundinis Indica siue Saccharæa mel, & Sal Indum Eginetæ.
 Mel apum.
 Oleomel.
 Manna, Ros seu Drosomeli vel Aereomeli, & Melisaccharum.
 Manna { Israelitarum.
 Brianfornensis.
 Calabrienfis.
 Vallatoria aquatica seu Phragmites harundo.
 Δόξα & Satua nostras.
 Fistula, vel Syringa & scriptoria.
 Nastos seu farcta, Toxica Theoph.
 Aulitis seu tibicinaria femina.
 Calamus odoratus Libani.
 Camacorus, Canna Indica Neoteritorum.
- Arundinea

H ARVNDO SACCHARINA INDICA.



ON
modò
effigie,
quæ illi
cò Mi-
liū vel
Panicū
intuen-
ti of-

fert, sed etiam natura & vsu hunc proximè locū sibi vendicant Harundines: vt quarum radicibus tuis arefactis & in farinam molitis, etiamnum hodie nonnullæ gentes panem nō insuauem conficiunt. Quinetiā gramineo est sapore, etiam nostratis arundinis radix. Et ea quæ Saccharum fundit delicias lautitiâsque, tum culinæ, tum Pharmaciae vtiliornē an similior Miliaceis sit incertum est, idcirco hanc illis proximè subdere consilium est, Medius siquidem inter Miliaceas atque Arundinaceas videtur hic Saccharatus Calamus, nobilissimus hodie & orbi Europæo iā multis ad Mediterraneū Oce-



anumque tractibus inquilina: vt Hispaniis, Lusitaniæ, atq; amœnissimis Olibi in Galloprovincia viretis, non procul, & ex aduerso Stœchadibus insulis, quem virentem ini bi & alibi habuimus, & in Belgio meminimus. Septenum octonūque pedum calamos pollice crassiores, densis geniculis, fungosa, perquam dulci, succulentâque medulla obfarcta albida promit. Folia binos cubitos equant, angustiora tamen Donacis, scabra &

B. iij.

secundum

secundum longitudinē striata, numerosa: Stolones harundinibus ceteris concolores, complures amplexetia, angustiora quàm ea sunt, quibus Saccharata Metæ inuolutę passim apud insitiores cernuntur. Comofo flore, & quadatenus Sorgi. Radix ad Cannæ radicem accedit, sed dulciore, succulentiore, minusque lignosa: vnde germinula erumpunt sationi oportuna, resecta. Panguntur etiam taleæ inæ radici abscissę, atque bellè primò proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyemis seuericia enecantur, humentis foli, sed tepidioris aëris & auræ aluminae atque amasiæ. Laticem hæc dat prorsum incomparabilis utilitatis esui potuique, secundæ atque aduersę valetudinis cuius ætati, forti, & regionī plusquam mel merum, & meras cupedias. Nec tamen Indico hodie prima laus, tametsi ex India primū in citeriorem Asiam, Rhodum, Cyprum, aliāque non pauca loca trāsmisissent. Nam hodie Canarium & Maderense longè omnibus suauitate & candore excellit: quippe tametsi quod Genuam, Mafsilæam ex India, Alexandria, & alijs Aphricæ emporijs, Liburnicis Venetias asportant, sæpius excoctum, candore marmoreo Canariū prouocat: multò tamen suauitate & dulcedine gratissima superatur. Dum enim lixiuio illo acriore, quasi sapone ex calce parato, feculentioris, nigriorisque pinguedinis fordes eluuntur & absterguntur, vber dulcedinis gtatoris perit, atque nescio quid rancidæ acrimoniæ inurit: vnde bilis gignitur, & sanguis vritur, caput grauatur. Quod quilibet nosse potest ex esu vsūque Thomæi rubri vocati Sacchari, ex cognomine insulæ, sub ipso fermè Equatore sitæ. Antuerpiam enim & Londinum Angliæ, vbi defecare solent quidam industrij artifices, si gustes adhuc impurum & rubrum, multò suauius & dulcius reperias, quàm excoctum, lixiuiāque & cortinas expertum. Et quia, qua purius reddant industria, coelant Pharmacopœorum plebem: lubitum est hīc monere. In Cortinā seu ahenum, sacchari Thomæi, vel alterius quantum volunt, immittunt. Lixiuij fortis sola ex calce viua parati, iustum modū, & quod ebullitioni, despumationique suffecturum sit, affundunt: tum agitatione, scopulisque spumas tumidas multorum albuminum ouorum sensim affundunt, vicissim despumando, & rursus instillando, donec fitulam plenam mellea & sordidiore pinguedine, despumādo exemerint. Tunc probè lympidum & fuluum factum syrupum, lixiuio nondum absumpto, transmittunt per cilicium, colum, vel stamen, quo inibi festucas, quisquiliāsque relinquunt. Tum feruet denuo, donec expirarit in vaporem lixiuium. Quod si (vt ferè fit) feruens saccharum impetu, artifice inuito, labrum effusione, & ebullitione superet, non aquam: nam sic (vt illi loquuntur) decoqueretur, recrudesceret: sed butyri momentum illicò addunt, atque actutū resident vndantes spumæ. Iam è syrupo ad duritiem excoctum, saccharum in nolas, infundibulæ figlina vasa, (Veneti enea) quibus subtus in angustiore loco inest foraminulū, prius fontana imbutas, Saccharo adhuc calente, opplent, eodem obturato foraminulo: recunduntq; promo, cella, aut Hypocausto sicciore, tepidiore cumque induruerit. Metæ ordine dispositæ latiore basim inducunt, luto ex figlina fusca aut pulla terra & aqua calida subacto dilutiore, lorica latam duorum triumue digitorum. Quæ crusta vti partim loci, partim sacchari tepore sicco & bibaci aruerit, demitur, noua apponitur: bis terte repetit: sed singula in mutatione fusi mucronem in foraminulum immittūt, vt facilius effluat crassamentum pinguius, & sordidius, quod Syrupum vulgo vocant, Gallis *Melasse*: qua quidam improbiore pharmaceutij, suos stercoreos syropos cōdunt. Postremò bis aut tertio ex Metis erutum fontana liquefaciunt: rursūque in Metas infuso, referant subtus foramen, supernèque lutum addunt, cuiusmodi diximus.

SACCHARVM CANDVM.

NO STRI etiam est candoris impertiri discendi cupidis modum, quo Veneti Candum saccharum efficiunt. Primæ notæ, seu finissimī vocati Sacchari accipiunt vicens tricenāsque libras, pauca aquula fontana, vt liquefcat, faciunt: & nè multum in multa aqua bulliat (nam flauesceret) & quia parum aquæ inest illicò in crassum syrupum abit. Tunc arundinaceos bacillos, aut ridicas pusillas, quas prius cancellatim, decussatimque ad ollæ imum, & latera aptarint, mersa saccharo syrupone calente, & vas paulò superius, quàm medio tenus oplente, multum inuolutum bombace densa, vas cella, aut officina calefacta reponunt super asserē, seminenſe aut viginti post diebus aperiant os, & nōdum concretum syrupum prius effundunt, repente affusa calida, ad syrupi eluendam pinguedinem.

guedinem. Qua denuo & illicò affusa, reponunt quouis calidiore, aut quouis alio loco: effractòq; eodem die aut biduo vase, pellucidi candoris crySTALLINAS bacillis aggestas habent glebas, multò durissimas, quas citius vres, quàm liquefacies igni, nisi liquore addito.

CANDVM VIOLACEVM.

PVRPVREVM Violaceum æquè pellucidum, sed pulcherrimum, nec minus vtile, solis Venetis, dum illic ageremus, notum, sic paratur. Sumito, exempli gratia, sacchari finissimi *℥.vi.* liquecant & bulliant quàm fieri potest paucissima aqua, donec ad tabelatum electuarium crassitiem deducatur. Tunc affusis vncijs 24. expressiois coactæ, cõpendiosæ, & recens eductæ ex frigida & violis contusis: aut potius violacea stillaticia (ne vires colòrne deleatur) recrudescat, seu (vt illi loquuntur) decoquatur, vt recedat ad syrûpi superioris simplicis Candi crassitiẽ. Festucis olla, & eodẽ loco & modo paretur elegantissimum Violaceum. Dum saccharo percocto miscetur Violarum dilutum, vel expressio purpurea, qualem diximus, addendo aliquot guttas succi Limonum, viuidiore colore & limpidiore diaphano placebit.

Denique vtilissimum simul atque fragrantius, curauimus parandum, additis drachmis duabus Iridis candidissimæ lacinia inuoluta, quæ amica societate, solita est Violæ fragrantiam & gratiam, tum addere, tum excitare, nec parum sic Arteriacis commodi adferre. Sic decet nitidum Pharmacopœum parare, nec perpetuò, quasi misellus foret seruitor, Seraphico Vercellẽsi radiato Apollini auscultare, qui imperat vas cõdendum & obruendũ sterquilinio, vt fermentando & putrefaciendo (fortè & ipse persuasus à Theophrastinis stercoreis Philosophis) suaues imbibat penitus fragrantias & vapores, stercoreòsque adsciscat spiritus.

Multa scitæ elegantia etiam è saccharo cõstantur, loricantur, condiuntur, & cõcinantur dulciaria & tragemata & gulæ blandimenta: quibus quia prolixiora, superfedemus, consultò prolixitatis hostes perennes: nedum vt Truiales, prolixasq; lites huc adducamus ex Ruellio, Manardo, Fuschio & alijs, Senensis exemplo. Vt quid enim quarunt tamdiu & blatiunt tam multa, notum ne fuerit Antiquis saccharum? Sanè fuit, etiã Dioscoride & Galeno antiquiori Theophrasto, huiusque præceptori Philosopho. Ait enim Theophrastus mel arundinibus Indicis excipi: eadem ferme etiam Aristoteles. Quod porrò vltiùs tumultuantur & sciscitantur num illi vñ fuerint saccharo hodierno? ex historia in promptu responsum: Galenus φασί, id est, inquiunt dicit, oriri scilicet in Indicis harundinetis Mel saccharum vocatum: igitur auditione magis, quàm ex- *Sal Indum* exploratione norat. Et Paulus facetè censet inter sales SACCHAR, SALEM INDVM sapore dulci, saccharum innuens, dentibus vt sal fragile. Quinetiam Plinius, quasi valdè rarum, nec ad eò alimentosum vel familiare foret nostro corpori, inquit sumi quantitate nucis castaneæ aut auellaneæ. Eòque primò è Græcis Actuarijs, Medicatos succos saccharo excepsisse, nomènque Iosacchari, Rhodosacchari commentus fuisse putatur.

At Dioscorides paucis litem dirimet: Salis in modum concretum, & dentibus fragile saccharum, in India, & felicis Arabiæ arundinibus, quod aqua solutum, potui, stomacho vtile. Sed addit καλῆται, id est, vocatur: vtpote cuius nõ valdè certus erat: quia vsum tantum nondum ars locupletarat. Vocarant quippe rem minus notam propter dulcedinem Mel: quemadmodum sal Ægineta, propter concretionem duram, lucidam, fragilem, & candorem. Rimas namque anulæ harundines, præ senio, aut turgidæ, agût, excluduntque succum saccharatum pauciorẽ, sed solidum, & salis aspectu, quale vulgatum arte excoctum saccharum, etiãque vt Candum. Quia verò admodum paucum & exoticum, minus erat notum, vsùque receptum: quod neutiquam mirandum, cum Manna roridum, Lariceũque, Europæ multis locis familiare, illis penè fuerit prætermissum: quia nondum commodum experimento auditioneue compererant.

Norbonensis Varro & Strabo, etiamtum ex radicibus succum premi suauissimum, ex arundine arborea non nimis magna.

Strabo arundines Indicas gignere mel sine apibus: Igitur si μελιτῆς seu apis non est pensum, non erit mel, seu melissæ excrementum, sed plantæ: quam eiũsue laticem, Sacchar Indi vocarunt.

Et Seneca à nobis facit: Inueniri in India Cannas, quarum humor pinguis, dulcisue, *in*

in mel abeat. Et sapor cannarum fermè omnis dulcis, radicis præsertim. Fluxiones sistit suffitu Saccharum. Et nostrate Candum, etiámque vulgatum abstergit, oculisque prodest, vti tempore Dioscoridis faciebat Spontaneum: quare idem esse nulli controuersum. Nec hodie foret ignotum illud Antiquorum: cum vniuersa pateat per Mediterraneum & Oceanum Æthiopicum Arabia & India.

MEL APVM COMMUNE.

SACCHARO nobilitate, vtilitate & origine proximum mellis nectareus liquor: quem largita videtur Phronæa populis fermè omnibus, præsertim apud quos sacchari arundo nullo nequidem mangonio, cultu viuere quit. Eadem vtriusque natura, ortus & ferme modus videtur. Verù mel calidius, acrius, aëreum, magisque igneum & spirituosum: vnde tantopere prodesse senio confectis & calori languido, Democratis exemplo fertur. Nec abs re sanè, quippe vini saccharique vigorem, vitam & efficacitatem mel merito complexum esse quis dicat: M V L S A enim, vbi aquæ plurimum, mellis non multum, diuturna intestinæque mellis ebullitione, in vinum vicinūque saporem multò vtilissimū abt. Et Pannonica seu Polonica Mosconitarumque potionum M E D A vocata, atque Cambricorum Anglorum M E T E G L I N, suauiora sunt, & salubriora non paucis optimis vinis. Quarum quidem vsum, quàm scimus certò profuturum Meridionalibus, tam lubenti animo illis hic impertimur: quæ sic habet.

Rec. Mellis boni Lib. 20.

Aque pluuia, fluminalis vel fontana Lib. 120.

Bulliant despumando ad Libr. 80.

Quibus semigrisfactis, inditis in vas vinariū, addantur fermèti panis, vel Alæ, vel Byeræ acidioris vnciæ. vi. vel quod satis sit excitandæ ebullitioni & defæcationi. Et vnà de licinia vel nodulo hæc suspendantur merganturque, nec fundum tamen tangant arro-

Rec.	{	Cinamomi,	}	an drach. ij.
		Granorum paradyfi,		
		Piperis,		
		Zingiberis,		
		Garyophyllorum crassius contusorum		
		Florum sambuci Man. 1. in dolium merforum.		

Sinantur in cella vinaria tepente per hyemem: estate verò in sole manèant 40. dies, vñquedum adfiscat vineum saporem & exuat dulcorem ingratiorem mellis. Qui vinum colore ementiri cupiunt, panni Tornesolis (nomen sonat heliotropium purpureum verrucarium) Lib. S. addunt. Nonnulli efficacius & gratius, addita vini tertia parte, reddunt. Hæc si quis, non vt quotidiano potu, sed quasi medicatò vtatur, multum commodi percipiet, tum ad febres quartanas, tum ad cæchexias, & ad morbos cerebri, quibus potus vini perniciosus, vt Epilepsia & Analepsia: adq; noxas aquarum corrigendas, vbi hæ multas putridas febres excitare solitæ sunt: eòq; Troglodytæ, propter multos fructus aqueos, & putres aquas plurimo, tametsi feruida in regione sint, vescuntur pipere.

M E T E G L I N.

CAMBRICVS etiam ille potus Metegla, non patrio (vti putant illi) sed Græco nomine dictus, vt multò salubrior parari potest, ita multò dignior qui Transmarinis innoscatur: est namque altera liquida & limpida Septentrionis THERIACA. Eadem proportionem fermè miscetur mel & aqua, addunturque despumatis herbæ siccatae quamplurimæ, fermè numero sexagenæ, bulliuntque diutissimè ad dimidias, interdum ad tertiam partem. Quò fit (vt còtra quàm ferunt vulgata Pharmaciæ documenta) diurna coctione herbacei viroris & saporis exuat fastidium, adipiscaturque vegetiorem, & quasi tertiam quandam peculiarem alendi vim, & gratiam saporis Maluatici vini æmulam, nec minus duratione perennem. Triennij enim & quadriennij colore, crasi, & sapore maluatici vel Muscati Meteglam non rarò illic bibimus. Quotidiano hæc senibus potui

potui placet, & plurimum prodest: nec adeo temulentiam vertiginosam, sed amcenior facit. Multo aptior foret & vtilior, si Medici Docti Instituto, quilibet sibi accommodam parandam curaret.

Quibusdam naturis, etiam hepate calidioribus, mel ieiuno sumptum ventriculo, multum conferre scimus, & compertum (secus quam vulgo videatur) maiore copia & satietate ingestum crudum purum Anglicum plus prodesse, quam moderatè sumptum Hispanicum, optimum putatum. Quippe acrius Atticum, Norbonense, vel Hispanicum crudum, facilius in bilem abit, magis sanguinem adurit, & minus ventrem subducit, nec perinde recens hic habetur. Minus speciosum ac delicatum Anglum: sed quibusdā, præsertim saltibus & pascuis, vbi lana commendatior, lectum, vernum aut æstiuum, biliosa excrementa inferius extergendo pellit, & aciei oculorum prodesse putatur. Venetias & Veronam ad Theriacæ confectionem delata sapius Græca famigeratissima, Attica & Hyblæa mella gustauimus, fuluora & puriora, sed minus candida Norbonensi aut Hispanico: quæ duo tamen celebriora apud Francos, Germanos, Belgas & Anglos, adeoque multo cariora.

TURONES NORBONENSIBVS.

Italica, Amigdalato.

ISTO Norbonenses Pharmacopœi parant placentulas niuei candoris Turones illuc vocatas, ad alendum tabidos, & expectorandum crassos pulmonū farctus, simul suaves & viles: vtiliores tamen futuras Anglis & alijs ad Septentrionem populis, etiāq; PIGNOLATO dicto medicatiores. Nam Italica valde quā elegans & marmoreum niueum PIGNOLATVM (hodie ex puluerato finissimo saccharo, & postea albuminibus & modica rosacea, & succo Limonum subactō, & donec summum contrahat candorem, atque pelluciditatem, agitato: pineis lotis, & siccatis furfuribus & absterfis, additis, & remixtis omnibus, viuio sed pusillo, puroque in igne exiccatis, & in duritiem coctis, in morcellos digitum longos, conflat) tametsi prodest & alit, tamen minus intrō subit aut incidit & abstergit arteriæ vel viscerum mucosos farctus, quā ex melle & amygdalis parati Turones, qui sic fiunt.

PIGNOLATVM

*{ Mellis primæ notæ & purissimæ Libra sex.
{ Albumina ouorum sex.*

In pelui tamdiu frigida pistillo ligneo agitantur, donec lacteum candorem assequantur. Tunc prunis cinere obrutis, ne vrantur aut nigrescant, sedulo versando pistillo ad suppositoriorum crassitiem iam fragilem coquuntur. Tum adduntur dulcium amygdalarum integrarū deglubitarum furfuribus torridis tostatarum vnciæ, quantas excipere moles iam Pignolati specie potest. Calentes super Nebulis (quæ crustula sunt) extensæ ducuntur in placentulam, vnciam crassam, latiore superficie, quā acie adhuc calentes in rhombos dispeſcunt, Medico volente, interdum adduntur puluisculi gemmei, coralli, cryſtalli aut aliorum.

MANNA ARABVM TEREINABIN

Drosomeli. Aereomeli & Melisaccharum: Manhu.

Δροσόμελι.

POSTRIDIE quam Ioua largitus esset victum Plebi Israeliticæ, complutâque fuisset humus, & conspersa rotundo semine Coriandri simili, minuto, albo, gustu mellitæ placentæ, aut specie Bdellij: ex quo districto mola, panes factitabant sapore libi ex oleo: Gens Israelitica mirabunda, cum primum hæc cœlestia, & nusquam antea visâ munera fuisset conspicata, cœpit dicere: MAN-HV, id est quidnam istud? Cuius nominis vestigia remansisse apud posteros Indicat Mannæ Thuris Libani Palestinæ montis nomen: cuius similitudo cum illo Bdellio simili Mannæ nonnulla esset; yndè etiam verisimile La-

tinis

tinis deductum nomē Manum, quod bonum interpretatur perbonus Latinitatis autor Marcus Varro. Et indidem putandū Medicatum istud Manna, quo de hic iam agemus, dictū fuisse recentioribus Græcis & Latinis. Eximium sanē Naturæ opus, ac mirabilitatis plenum: nec valde antiquis notum: indicio est quod paucis & vacillantibus verbis illius meminerint, nec quantæ esset ad purgandum salubritatis monuerint. Theophrastus siquidē ex Hesiodo & Aristotele succum mellitum ex æthere quercub⁹ siue Robori illapsū putat, quale Galenus prouentu portentoso ē Libani arboribus excusis memorat: & Celsus

Lib. 5. Histori.
animal:

MEL CEDRE-
drum. Hippo.
Succus Mellius
Theoph. Syria-
cum Mel Celsi.

SYRIACVM MEL
vocat: qui omnes
persuasi fuisse videntur (præterquam experientissimus senex Hippocrates, qui non aëreum sed CEDRE-
NV M MEL vocat) nihil aliud esse Manna istud, quàm roridū ex humo in æthera subue-

ctum interdiu, vi & calore Siderum, vapidū spiritum, qui reduce nocte occurrans frigori liquor refluus & quasi stillatitius factus, arbores, tellurēque rursus, horis antelucanis præsertim irroret. Quam opinionem, vt improbare nolumus: ita etiam sequi, nescio quo modo, renuit animus. Quæ nam tenuitatis tantæ, partim aqueæ, partim aëreæ, cuiusmodi ros esse videtur, destillatitia, illico vel imbecillis Auroræ radijs diffusi in auras solita, possit in grumos masticheos, gummosos, farinaceos, emplasticos, solidos & densos abire? Quin Manna etiam calidiuscula est, gravis ac pinguis, & solutu non adeo facilis. Imò soluta, liquori calido non vt mel, aut saccharum, mixta, perstat, sed plurima quasi aqueū respuens liquorē resine gummi, & Caphuræ factitiæ modo rursus coit, & collecta vasis lateribus hæret. At imbrium cœlestium proles nix, grādo, pruina, gelu, ros, omnia frigida, neutiquam pinguis, sed facillimè vel calore, vel humore soluuntur, nec quicquam pinguis vestigiū relinquunt. Quare suspicio magna est Manna non aëreum rorem, qui refrigerando, temperandōque diurnum æstus natura comparatus fuit: sed succum vaporēque viuificum cuilibet tum arbori, tum herbæ insitum iam per soles tepstiuos & genitabiles maturitatem assequutum, qui extillans expiransque interdiu trans latentes corticis superficieiq; meatus, in auras à sole feruido dissipatur: noctu verò ros consuetus illabens sese cum isto permiscet, atque ne dissipetur, partim obstat, partim seipsū vna fermentat, inque amicam naturam vnā coeunt, ac demum quippiam constant

MANNA CRAMIS LARICIS.



stant mediæ inter mel & Saccharum naturæ. Quod quispiam MELISACCHARVM vocare possit. Istud nostrum paradoxum confirmat eorum diligentia Pharmacopœorum, qui ramos magnos præscissos Laricis & Fraxini, inque vinariam cellam, quo ætatis tempore Manna colligi solitum est, asportatos, Manna postero die, tametsi non perinde nitidum, conspectum sibi affirmabant. Quod etiam minùs mirum videatur illis, qui sciunt RORI COMMUNI deciduo purgatoriam vim inesse, non a se, sed foliis herbarum, quæ abluuntur & absterguntur ab illo. Sic Brassicæ foliis & Rosarum rorem exceptum detergente, nitroso & laxante succo magis lubricare certû. Ea propter consulto huic infundunt Rosas nonnulli ad syrupum Rosarum ex infusionibus. Quare cum quilibet obseruare possit post ramos & truncos auulsosue firculos, vel etiam radices Laricis, Pineæ, Iuniperi, & aliarum gummosarum aut tediferarum arborum gummi, Lacrymas & micas etiamnum in superficie congeri atque con crescere, quas ideò propter similitudinem Manna Thuris Græci, Rustici autem Norbonensēs Metaphorice in Iunipero & Teda glaciem, Galli Vernicem vocant, poterit secum perpendere idem Larici, Ornoglosso, Amygdalæ, Prunis ac aliis quamplurimis vñu venire posse. Quin quod de celeomelite Norbonensi diximus in Olea Æthyopica magis fulciatur hæc persuasio, alioqui & rara obseruatio est, neque à quoquam recentiorum literis prodita, quin potiùs à nonnullis quasi fabula foret excepta, nec ipsimet assentiri recensionis ausi essemus, nisi oculis manibùsque id comperis simus in Prouincia Norbonensi maritima, non procul Monspello vrbe tam lauta quàm nobili.

MELISACCHARUM.

Ros celestis.

E LÆOMELI.

EX olea arbore vulgari perquàm amara tota & ingrata, cortice, caudice, fructu nondum sale condito, emanare MANNA verè melleum, non solum colore, sapore, sed etiam duratione incorruptû experti sumus. Habemus namq; partim iam duodecim ab hinc annis collectum à Rondelletio præceptore aliquot vncias, partim à nobis quinque ab hinc annis, cum eo nos duxisset Stephanus Barrallius Monspelliensis Dioscorides vocatus, atque in tenellis ramis & stipitibus Olearum arborum tam insolitas diuicias affatim nos latere monuisset. Tunc enim rimosis è corticibus, partim scalpello fauciatis, satis excepimus non modò ad explorandum, sed etiam amicis impartendum. Verùm non nisi propemodum pene matura oliua ac nigricante vel purpurascente, quam Nouembri & ingruente Hyemis scœuitia decerpunt, quisquam reperiet mel istud: vt nos plebecula monebat, quæ interdum tantam copiam ramis aggestam se vidisse vna aut altera die ante vel post D. Catherinæ festum aiebat, vt auiditati explèdè pueri & mendici eò certatim confluerent. In proximis vinetis pone fanum fune-cinctorum Franciscanorum, via ad Latrensẽ portam, etiam nonnihil emanabat, & plurimum ferebatur Lunellæ extillare, præsertim sectis maioribus truncis, è quibus initio melle liquidior latex glutinosus effluebat, postea inibi residens aliquamdiu frigore densior euadebat, atque non tam mel quàm Manna verum præ se ferebat specie, gustu, sapore, concretionem omnium comilitonum iudicio qui degustarant, inter quos Iacobus Vtenhouius Gandauensis generosus, & multarum literarum Medicus doctissimus. Quin iam dum hæc proderemus, cum multi alij degustarunt & mirati sunt, tum Medici singularis eruditionis, vniuersæque materiæ medicæ consultissimi D. Parisiensis Drouetus, & D. Penius Anglus.

An cum Arabes exscribunt fortè de Galenico Manna rorido, quo còpluerat arbores Libani atq; lapides Iuppiter, hallucinantur nominis & naturæ affinitate, interpretati nempe quæ Græci antiqui de latice illo mellito suauique rore antelucano, qui instar sudoris expirantis, partim è puro sudòque aëris ambientis madore, patimque ex potiore genitabiliq; cuiusq; arboris & herbæ salina gutticellas lynipidas & prædulces in arborû folijs & herbarum constituit: vnde mellis apum ortum & naturam facile quis assequetur? Sane sic videtur, nec enim manna illud sordidû, gûmosum, granatum, quisquilijs

C. i.

ar-

arborum mixtū, in ramis lapidibūsq; diu delitescens, non Sole Caniculæ feruido, aut imbribus ita facili liquefcere solitū cuiusmodi māna intelligunt Arabes, idē cū rore æthereo. Eapropter Grecorum Stillatitiā aëreūmue rorem mellitum illum tenuem, neutiquam Manna Iudæum Arabicūmue putamus, sed granā ista Mastichina pellucida, solita ē ramis folijsque arborum elabi præ copia, rotunditate & lubricitate granorum, succussatione & ventorum impetu, qui montes crebrius perflant, sicque colligi in montosis syluosis humi, & ideo putasse quosdam instar grandinis ē Cælo manasse. Istud nostrate porro nos quasi vtrūq; naturæ cinnū & particeps plurima arborum genitabili salua suauī & madore, qui cuilibet inest pro sua natura plantæ varius, conflatum putamus. Cui dū occurrit noctis periodus anteculana frigidiuscula, quemadmodum tunc coactio in Æthere vel aëre vapore aqueum facit R o r e m vocatum, sic in arboris superficie cogendo & ad densando expirantem per latentes poros mellitam exhalationem, sistit inibi manna. Quæ eadem causa efficit, vt ficus suos fructus noctu maturare verè dicatur, non propter quem apud Plutarchum Graculi Lunæ afferebant calorem *περὶ τὴν*, quippe illi noctu silente æquē benè maturitatem assequuntur. Sed quia ficunleus cortex, laxæ cum sit texturæ, vtī tota arbor, facili Solis radios admittit, qui spiritum caloremque insitum lacteo liquori dissipant interdū, vnde concoctioni officitur: at noctu hīc non diffatur, eoque maturitati impenditur totus, quam celerius & perfectius absoluit, nisi propter laxitatem arboris & lactei succi vbertatem nimia obruatur, vt in ficu Ægyptia euenit, quæ ideo non nisi vulneribus faucia maturat quia plus iusto obruebat lac alimentūmue quod per vulnus effluxit.

Ros.
M A N N A
quomodo fiat.

Ficuum maturatio.

M A N N A
Israelitarum
qualis.

Nec dispar modus opūsque mellificij: vt enim efficit ex rore aut cum rore & succo benigno arboris, natia insitæque vis Manna, sic ex vtroque ē floribus decerpto, suo calore & spiritu conficit apicula sedula, etiamque aliæ volucellæ insectæ, carpto in truncis arborum humore, quem percoquant in mel album saccharo simile, siue Stercus suauissimum, quod etiam Hispanus à Vega magni nominis Medicus sibi visum narrat. Non enim rore solo caduco, sed suauī, odoratoque vapore, & plantæ tenuissimo succo, quem suis sibi intestinis fouet apis, confit mel. Nam quī possit ros Stillatitiū sue imber aut vapor in Ceram, Propolidem, fæcēsque quot continent faui abire? Quin mel grauius multo oleo, vino, aqua, lacte, sanguine, quorum æmulatur aut superat dulcedinem. Quin amarum mel, improbum, venenatum, ex Absinthio, Erica, Oleandro & aliis. Cur non potius ē foliis Iuglandis aut quercus hauriat apicula, vbi plus nectarei & dulcis roris, quàm ē florum aridis calyculis? Nisi quia vbi optimus est aër, inibi optimum mel, modò Stirpes sint natura aptæ mellificio, sugantque ē solo probum alimentum. Sed hæc latius in Larice & Fraxino.

Hebræum Germanicū notū, & Rabbinam admodum callentem Philosophiæ habuimus, qui Manna istud purum & Mastichinū vocatū affirmabat esse idem cum suo Israelitico, Bdellii specie, Coriandri granis simile, melleo sapore, quale etiamnum est in Palestina, Syria & Arabia. Porro, nobis obiectantibus illius supercælestes vires, portenta, & putredinem: Respondebat Iouam cunctipotentem pro eo ac ferebat sua voluntas, vsum & fruitionem Mannæ illis largitum fuisse, qualem, quantum & quamdiu illi visum fuit: reque ab se condita vtī solitum ad suam ostendendam siue gloriam, siue munificentiam, præter & super naturæ leges ratas. Sic quoque M A R A C H perquam amarum & falsum edulcuit iniecto ligno: & Arabicus sinus quasi medius seclus, vadum fecit proli Iouæ, hostes vero obruit: Solis orbita cursum inhibuit & æquor montibus innatauit.

M A R A C H
Brianformensis
Mastichina igitur vel Granata vocata, quæ hodie ex orientis Emporijs Venetijs & Genuæ prostat, optima. Nec tamen spernenda Brianonensis ad Galloprovinciæ & Allobrogum alpes prouenire solita, qua vniuersa fermè vtitur Gallia, modò delectus nitidioris, purioris, candidioris, & recentioris grani habeatur, qualem illic nos effraçtis ē lalice furculis copiosam habuimus, quæ nec dosi, gustu & effectu purgandi nihil planè cedere illi exoticæ videtur, & multo minoris emittit, minoræque mangonij suspicione: blan-

blandè namque educit biliosa è primis venis & Iecore, èque pulmonibus pituitosa, veluti Lariceus liquor, Terebinthina Veneta vocata. Hac igitur, si illius Syriacè purè copia desit, aut CALABRIENSIS, vtendū ab vncia 1. S. ad vncias 3. Calabriensem tamè hodie perpaucam, aut nullam inueniri, quidam institores qui illinc veniebant, planèque desisse conquerebantur.

ARVND O VALLATORIA.

OMNIVM Vallatoria notissima, vbiuis Regionum vdis humentibus marginum vallis lacunis & scrobibus aruorum, aggerum & mœniorū tesquis, & attegiis, rusticisque tectis multum accommoda: sic & sepiendis tutandisque fatis. Multi è radice graminea, geniculata, prolixiùs reptante, marini graminis graciliores exeunt culmi recti, ex pallore pulli, concaui: alterno pullulata folia emittète graminea, milia- ceis longiora, scabriora, firmiora: spicas fert Milii modo sparsas, lanosa, mollique cesarie nutantes & purpurascetes, maiores & elegantiores, caesidum plumas imitantes, quæ ventis hybernis abripiuntur, nullo comparente feminum vestigio, radice namque etiam combusta & eruta, seipsam denuò instaurat. Equidem quam noua depacta, albidia, dulcis prolixa, & vt diximus graminea: quare scita consequutione gramineis & triticeis subduntur hic arundinacea.

Δὶναξ DONAX SATIVA NOSTRAS.

NON parum frequens hæc hortis & Satis Galloprovinciæ & Norbonæ, vbi colos adnendum & clatras fenestris Rustici mulierculis fascitant, flectuntque ad fornices topiarias, aliaque viretorum ornamenta, adque fulciendas vites humi depangunt. Similes istius sunt tubi illius Vallatoriæ, sed proceritas & crassities magnam æquat hastam: densissimis geniculis, è quorū acetabulis vel cauernulis basis latioris prodit nervus medio tenus ambiens calami ferme spatium, intergenicula. Acori vel Schenæ radix prolixa, tuberosa geniculis multis, latè huc & illuc subtus humum porrecta, albida foris intusque dulcis gustanti. Ex qua vsta Arabum Spodium paratur Pharmacopœis quamplurimis, tametsi vt non necessariò, ita non magno commodo: quando melius nec difficiùs ex Myrtho aut Cithonio arbore, oleaue (vti monuerat in Antispodio Dioscorides) conficerent. Longè tamen grauius delinquent qui loco Palmæ foliorum teneriorum harundinis huiusce subdunt radices: namque harum facultas ex alto cum vel spicula euellere prodatur, calida etiam auctore Dioscoride sit, planè Palma contraria sit huic oportet, cuius ad frenandā cohibendāque Chalcytidis vehementiam addita folia videntur. Verum isti audaculi, quid intersit foliane harundinis, quæ fortè quadrarent, an radices addas, quæ prorsum aduersantur scopo, supino fastu malunt nescire quàm discere.

Spodium Antispodium.

FISTVLA vel STRINGA, & SCRIPTORIA.

EADEM cum Donacè harundine hæc est, vt cernere est in Galloprovinciæ & Corsicæ vdis & pinguibus prope vrbes locis, compactiore est carne, minore & pollicem vel indicem digitum æquante crassitie, octonum denūmque pedum, radices & folia non disparia, Pueris etiam quæsi calami ad maiuscula characterum crura delinianda: & hæc vt superiores duæ, caua.

NASTOS seu FARCTA, TOXICA Theophr.

RARIOR hæc Europæis, nota tamen iam diu harundo mediterranei & Tyrrheni maris mercatibus: vbi interdum à naucleris emunt senes, robustiores & adultiores Stolones, quibus scipionibus siue labantis vestigiū fulcris vtuntur: leues namq; sunt elegantes & robustæ. Exiliores Stolones verò Scythæ Asiatici & Syrii aptant ad iacula: quos emptos à quodā Pictano circulatore Alexandro vocato habemus exiles, leues, politos enodes prorsum, rectos, solidos, nec graues, colore cæsius pullo & purpurascète nitentes. Iouibertus Monspelliensis habuit, ni fallit memoria, perquam solidam & elegantem, puto ex Aphricæ Argyra, non Alepo.

TAMETSI fœminam hanc nuncuparit Dioscorides, tamen putamus nos à nostratibus vulgatis, non nisi textura delicatiore carnœue solidiore distare, proindeque tubulam magis esse sonorum læuiorem & nitidiorem, cuius delectus pœnes aulêdos & tibicines esto.

INDICA FLORIDA.

EXOTICÆ elegantia pulcherrima planta hæc, ambigua inter Cannas & Acorum natura & figura. Ea ex semine Indiæ Occidua amicis in Belgio, deinde nobis Monspellij in horto lætos flores, Augusto ineunte, dedit: colos purpure miniatę nitidus & vegerus: figura & magnitudo, numerus & habitus florum Gladioli, in ferulaceo vel harundinaceo bicubitali & tricubitali caule, læuore herbaceo, crassitie digiti minimi, quem circa geniculos ambiunt folia alternò & Acori vel Cannæ, situ & ritu, magnitudine & effigie hellebori albi adultioris. Radices Cannæ nostratis siue Donacis vel acori palustris æquant, è quibus prima foliorum eruptio pereleganti volumine Hellebori albi erupentis simulacrum ostentat. Rarissima in Italia & Gallia & Anglia etiãque Belgio vbi tametsi quotannis nouo ex India aut Lusitania femine ab elegantia amassis fata, tamen nec semper floret, nec frigus ferre potis est. Idcirco commodi medici adhuc ignoti: sed cui locus hic merito relictus, quo ad Acorum, plantasque consimilis vultus viam institutam pergeremus.

ACORVS.

Acorus Dioscor.

Acorus palustris.

Acorus Aquitanicus.

Galanga { Maior.
Minor.

Iris Domestica Florentina.

Iris Illyrica.

Iris sylvestris.

Iris maritima Norbonensis an. Medium Diosco.

Perpusilla saxatilis Iris Norbonensis acaulis ferme.

Xyris.

Zingiber.

Terra Merita, Curcuma Officinarum.

Costus	Arabicus candidus leuis	} Zingiberis effigie.
	Syriacus buxens grauis	
	Indicus leuis niger.	
	E Moluca cortice rugoso,	} Dulcis Amarus
E Moluca lignosus.		
Officinarum duplex		
	Math: spurium suo loco.	

Zedoaria { herba.

Zurumbet

Zedoaria Thora in. Napellis.

Zurumbet arbor in coniectancis.

Arnabo Pauli.

Mamiras Paul, In Doronicis.



VNCVPARVNT itaque sic plantam hanc quia τὰς ὕλεαῖς Effig. scitè Ma-
sue pupillis aciei oculorum caliginosa mederetur, vti cognata thiol. 21.

Zingiberis radices faciunt. Nam Ακορος illa Theoph: Veneris mi-
rifice incentiua longè alia est. Acorum verò verum esse istam ra-
dicem odorem & geniculatam, & longè ab vtraque Galanga dissi-
dere, etiam caculæ officinarum sciunt, nedum viri eruditi, quo-
rum factum opera, vt non solum innotuerit, sed etiā adeo vsur-
cepta sit, vt pudor sit denuò illos rationum acervos euoluere.

Nec hodiè Itali, Galli, Germani consultissimi rei herbariæ, alio
vtuntur quàm isto è Transyluania Moscouiticisq; tractibus Venetias, Antuerpiam, aliaq;
celebriora Emporia asportato: vbi nò rarò etiamnum folijs integris visitur Iridis emulis,
cuiusmodi à Dioscoride descriptus fuit. Eapropter minimè multis opus fuit verbis ad dis-
cernendū à Calamo aromatico has easdem radices, quas etiam perperā Calamum officina-
ræ statuere: non enim modò odore ceterisque facultatibus, sed etiam natura & effigie
tota dissident. Nec enim Acoro Arundinis, sed Iridis caulis inest, gracilior & longior ta-
men: at Calamus non modò caui tubi harundinaceo caule donatur, sed assulatim fran-
gitur. Porro cum hanc radicem ignotam tum Calamo suffecissent (vt sit meliorum penu-
ria & ignoratione) demum proregem quasi Regem agnouerunt & tutati sunt. Quam
pertinaciam etiamnum fouent plerique Salgamarij, potius quàm Pharmacopœi cæcitate
impudenti, sed non tanta infelicitate. Quippe æquè bene explet ista radix interdum de-
scriptionis pollicitationes atque genuinus Calamus: intenso namque est odore, & præ-
sentissimis ad muliebres morbos viribus.

ACORVS NOSRAS PALVSRIS

Germa. Selb wasser Lelien, id est Lilium aquaticum
luteum.

VLCARIS nostratis haud aspernendæ aut vires vel vsus vt quidam minus verè tra-
dunt, qui primò lingua, non intimo gutture hanc explorarūt, cui aliquid acrimoniæ
gustando semper inurit, non quidem illico prima impressione, sed aliquanta cunctatione.
Idem experiaris in Phyllo Mospelliensi alijsq; plantis, quarum vis calefaciens multa ter-
rea mole est sopita. Nam tamen illi odor fermè nullus, calor remissus, tamen alijs doti-
bus multos ad morbos peregrino præferenda: plus namque roboris & caloris addit ven-
triculo, partibusq; finitimis, quàm illa quæ suo seruire dissipat potius innatum calorem
atque vires insitas populatur. Qui igitur illi nonnihil gratiæ conciliat, Garyophyllis non
secus ac Iuglandes, traiciunt, at neitiquam cõtèmnendum experiuntur.

Mathiol. 22.

Propior Aco.
aut Galanga
quàm Iridi,
propter radi-
cis vim astri-
toriam.

ACORVS AQTIVANICVS.

PLVSCVLIS abhinc annis eruta fuit quædam Acori species in agro Tholosano, quam
Pharmacopœi pro Schina & venditare & venūdare ausi fuere: quia facie esset haud ita
dissimili, sapore ferme nullo, eoque Apio affini. Radice crassiore, densiore quàm Schinæ
aut Galangæ, concolore, prædura, fragèri contumace, lignosiore quam Schine, prælonga,
tuberosis geniculis cincta: Harundinacea effigie Antuerpiam, Londinūque delata
Chynani emetita, propter quandā similitudinē, quæ multos Medicos in stultam lætitiā
coniecit, ratos se in Gallia Schinam inuenisse, ad luis Veneræ apparatus. Sed Acorū non
Schinam gustus & euentus patefecit: astrictionis namque plurimum habet, tota est crassè,
inertisque facultatis, nihil leuitatis emplasticæ, vt Schina. Morbo Neapolitano curando
ineptissimam norunt, qui frustra sæpius experti sunt: tamen ad vlcera mala & frummas,
non desint illi suæ dotes.

Illas autem radices prægrandes, turbinatas, Americi orbis Schinam superioribus annis
ementitas, in caput de apio seruamus.

C. iij.

GAL-

Nisi Gallatium Acorum, qui ceteris auctore Dioscoride anteit, deprauarit in Galangæ siue Galangæ flexum Arabica scola, vt quæ speciem Acori Galangam fortè putarit, ignotam hanc fuisse antiquis Græcis necessum fateamur. Cum autem è proximo sermone authorumque descriptione Acorum nostrum esse Antiquorum genuinū liquet, tum diuersum esse ab vtrauis Galanga maiori & minuta Officinis dicta, vtriusque radices perpendēti perspicuū illicō fit. Acorus namque albida, odora & amaricans etiam monente Galeno, effractuque facilis, eoque vt colore, sic concretione similior Iridis, quam vtrauis Galanga: quia ex fusco intus forisque rufescit, nec tundendo facile cedit, acriore quidem sapore & aromatico sed minimè amaro, magis astringente, minusque proinde vires vicarias Iridis ad muliebres affectus exerente, qualem optant Dioscorides, Galenus & ceteri classici. Quibus an notæ fuerint vtriusuis Galangæ radices, vt incertum, ita nobis persuasum est iamdiu Acoro aut Iridi congenerem esse, nempe Acori palustris vulgaris radices habere, folia autem Iridis aut Xyridis nigricantia angustiora tamen. Alebant hanc, non multis ab hinc annis, horti Patauini & Veneti, vbi plurimum nobis visum virentem meminimus. Nec multo post à fidelissimis & peritissimis herbarijs accepimus hanc eandem è Syriæ montibus euulsam, vbi vulgo Iris putatur & nominatur, propter arctam foliorum potius similitudinem, quàm radices colorem, odorem, aut efficaciam: astringendo namque roborat, vt Acorus palustris, nec tenuitate partium quanta est in Iride & Zingibere est, sine astrictione pollet, præsertim maior Galanga, quam hinc intelligimus.

GALANGA MINOR.

Alioqvi minutam siue minorem, quam vocant Officinæ, an sit Cyperi species potius quàm Galangæ aut Acori difficile sit statuere. Nam tamen radices aspectu, duritie, odore, sapore & nonnihil figura Cyperum longum præferant (quo quidem institutorum fraude adulteratur, & permutatur) tamen folia si sunt Myrthi (vt quidam Indicorum simplicium exploratores affirmant) non parum ab vtroque illorum etiàmque maiore Galanga dissidebit, quam alioqui viribus, odore, sapore, colore & nomine proximè æquabat, ac fortè superabat. Hanc tamen, vt & Zedoariam, Chinarum Emporia in reliquam Asiæ Indiam, Europamque occidentalem mittunt: maiorem verò Iaua trans Equatorem ditissima Insula Liburnicis in Septentrionem reddituris venundat: vnde verisimile fit, aut diuersas putatas fuisse Arabibus, aut nō admodū notas Auicennæ & Serapioni, vtpote Græcos sequutis, ac propterea eos (vt solent de rebus peregrinis, parūque notis) caput duplex de ea instituisse: interdum duo admodum diuersa simplicia in vnum caput miscuisse, veluti vbi Cancamum historiæ de Manna intexuit, geminato errore, & quia Cancamum è cælo desuere, & quod in Sorbum excipi dixit, quæ de Manna, non Cancamo, ramis fraxini vel Ornoglossi, non sorbi excepta intelligenda videntur.

IRIS DOMESTICA, FLORENTINA.

ventina, Illyrica.

Priusca gens horum florum conspicua, amœnam varietatem colorum & variegatam cœlestis Iridis amulam, quæ opacæ luridæ nubis obice, Soli obuerso luminis repercussu occursans æthera pingit, plantam Iridem vocauit: sic & Latini, Græca nimirum origine quibus Iris etiàmque Iris, ουγάρια & θαρπαςδς dicitur, id est, sacra cœlestis atque admirabilis, qualem arcum fœderis post diluuium à I E H O V A sancti narrat diuina pagina. Hodie hanc tamen admodum frequentem, tamen cunctæ ferme gentes deprauatè vocitant, Germani enim Gilgen, Schwetzel Flandri, Ita-

li, Hispani Liliū, Galli etiam *Glaioul*, propter arctam florum ipsorum inter se cum Lilio & Gladiolo similitudinē. Quod idem vsu venisse Poëtis & imposuisse Historicis in Hyacinthis & Liliis dicitur, de quorum tamen collatione facile noscitur Iris, & ab iisdem discernitur, folijs acutioribus, rigidioribus & latioribus quā Acori, aut Gladioli. Florum autem oræ diductiores hiantesque magis, magisque reflexa foliola, sēna ut plurimum, quæ alternatim in ansulæ speciem curuantur, intrōque flexa staminum fibrillas condunt aliquot, quibus marcidis, æstate media ferè, siliqua Xyridis aut Acori palustris non dispari, anguloso itē semine erui, sed minore, se prodit. Radice viuacā, plantæ quippe semper virentis, plena, solida, albida, multas in propagines per summum cespitem fusa: amaro, vehementi, acriori & feruidiore, dum recens est, gustu; ut & purgandi vi, quam arida facta prorsum amittit, multumque feruoris ingratique saporis remittit, & odorator, eoque commendatior euadit, præsertim T V S C A, siue F L O R E N T I N A, hodie primam laudem merita. Quæ plurima in Mediterraneis, non procul Florentinis montibus eruitur, multum temperic agri & ætheris ad Illyricos tractus accedentibus, adeoque præstantior I L L Y R I C A H A B E T V R: nam hæc non nihil rufescit, minusque nitida, cuiusmodi vtuntur Veneti. Florentina verò candidior & elegantiore aspectu, suauiorēque odore visitur. Neutra tamen illic flaccida, rugosa, rancida, fuscane aut muscida insolatu fit, ut nostras, præsertim Septentrionalis, cuius succum Hydropicis propinquant Medicelli lectione practicozum freti quidam: incertum maiore ne cruciatu an incommodo ægros vexent. Ac tametsi Galenus Illyricæ palmam statuerit, tamen cum idem sanxerit: vnde quodlibet simplex, in suo genere quo est fragrantius, eo præstantius esse, de eius sententiā Florentinæ postponet quis Illyricam, à cuius bonitate tantum abesse Aphricanum, quantum animal vegetum à suo cadauere idem dixit: eapropter videtur hæc Natalitius gaudere neque admodum feruidis ut Aphricæ, neque ita frigidis ut Septentrionum: sed montosis temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valde odoratam laudatissimam ferunt, & ad fluminum crepidines canit Nicander Naronianam Illyricæ non maritimæ, sed Septentrionalioris & riguæ à flumine Macedoniæ, sic vocato.

IRIS FLO-
rentina.

I L L Y R I C A

Multiplicem igitur sortitur varietatem, non modò viribus, ut diximus, sed etiam magnitudine, odore & potissimum florum colore. Cuius multiplicis venusta mixtura, non modò in diuersis plantis, sed etiam in vnius dumtaxat floribus spectanda venit. Elegantiæ siquidem hortensis amantes non modo purpuream (quæ vbiuis ferè Europæ ruri oritur, omniumque frequentissima visitur) sed etiam quasdam floribus candidis, liliaceis alunt, non item luteam, ut quidam doctus putat, ratus vulgarem aureis floribus vbiue in pratis Acorum esse Iridem, cuius radices, ut idem Doctus Belga ait, tātò opere astringunt, & planè Iridis facultatibus aduersantur, ut neutiquam futilis author literis mandarit, hæc vel dumtaxat appensas appressasque corporei quemlibet sanguinis fluxum sistere: quare maluimus nos Acoro aut potius Galangis, quibus figura & viribus cognator, reddere.

V A R I E T A S

IRIS SYLVESRIS.

I N O D O R A duæ irides, quas Sylvestres vocant recentiores, minus obuiæ sunt, minusque multò aromatica dote commendabiles. Hortensi ferè eadem, nisi quia tota gracilior, harum quæ plurimum squallidis saxorum marginibus sponte oritur, cultaque retinet speciem qua distat à satiuæ, etiam sapore ingrato, odore nullo in subalpinis Lygum & Taurinensium passim occurrit, nec vlla potest esse earum, quas commendat Plinius seu Illyrica, seu alia.

IRIS MARITIMA NORBONENSIS

an Medium Dioscori.

N E V T I Q V A M triualis venustatis est hæc altera quam verbis & typis hæc apictam damus, primum in Nltiobrigum maritimis & sabuletis herbis nobis lecta, diuque D. Affatio MonsPELLIENSIS medium putata, riguis herbis cis lacu non procul

C. iij.

ab

ab oppido Frôtignana ex aduerso montis Ceti multa, nec
vsquam alibi vniuersa Gallia aut Italia facilis repertu, nisi
maritimis illic: quare num in Germania etiam reperia-
tur aut Heluetia, fides penes recetiores esto, quibus ma-
lo assentiri, quam tantilla de re rixari, tametsi radices e-
rutæ recensque effractæ nullum vnquam olfecerimus
Armeniæ mali odorem, qualem illi inesse ait Commen-
tator. Radix, caulis, folium, siliqua & semen, Iridis
illi, sed minora, minusque aromatica, saltem quibus
locis natalitiis nobis obseruata est, nempe vt plurimum
humidis & incultis. Flores tamen Calendis Iunijs aptius
Xyridem colore & figura foliolisque minus repandis ex-
primunt. Sapor illi feruidus, amarus, tenuitas multa,
quam etiam medicis experimentis compertam habemus.



PERPVILLA SAXATILIS IRIS

acaulis ferme.

MINIMA & rarissima omniū etiam Norbonensis
hæc: radices plexu, substantia densa & colore Illyricæ
non absimilis, caule vero nullo, præsertim natalitiis, fo-
lio latiusculo, rigido, mucronato, palmum alto, cuius-
modi Gladioli: flore, semine siliqua, Xyridis fetidæ. Hæc
mox quam è terra assurgit Chameleontis albi modo pu-
silla humilisque remanet, proindeque nonnullis Cha-
meiris nuncupanda videtur. Plurima oritur in agro
Norbonensi, locis aridis & saxosis, secus specum illam
sesquimiliare Monspellio dissitam, via qua Frontigna-
nam itur, in cuius cautibus & rupium commissuris fre-
quens adolescit prope Ferulam.



XYRIS, sive IRIS ὀφειά THEOPH.

Math. fig. 991

SPATVLA
Fetida.

ETIAM QVE Xyridem ob folij similitudinem quasi rasorium cultrum aut nouaculam
dixere appositè præci: est quippe folium ancipiti nouaculæ similis, acutiore acie, &
tenuiore rigidioræque quam Gladiolus & Iris mucrone. SPATVLA FETIDA VUL-
go dicta, quam seueriores isti notarum exactores, cum improbant, indicant se nec mul-
tas plantas vernaculis natalibus eruisse, neque virium periculum multum fecisse. Dum e-
nim nescio quid coloris & magnitudinis desiderant in radice & flore, non meminerunt
vtrius harum, vt plerasque alias, facile non nihil non ita magna de causa mutari. Etenim
si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeo vari-
ant, vt cum Florentina si nostram componas, longè aliam colore & odore putes, quid ni
possit tantilla mutatio Xyridi contingere, quæ etiamnum omnibus vulgò vocitatur Iris:
quemadmodum olim Theophrasto ὀφειά Iris dicta fuit? Quin Illyricæ & Sclauonicæ ra-
dix subruffa, nostrati pulla & cineritia: Hetruscæ autem candida, eximia fragrantia, no-
stras vero ingrata ferme fatet: & vbi πλατύτεα folia & cacumine acutiora dicit Diof-
corides, innuit medium folij latius, aut ventriosius, summum verò multo angustiore
mucrone, cuiusmodi prorsum Spatulæ nascentis spontè quibusdam præsertim Gallopro-
uinciæ & Angliæ, vbi quàm vberima, prope vda prata & littoreos maris aggeres inspi-
cere licet. Eamque si conferas ruri enatæ Iridi in parietinis & siccis glareosis, angustiore
obseruabis folio: & caules etiam cubito maiores, plures, glabri, teretes, crassitie me-
diocri per media folia recti assurgunt: florésque in summo promunt Iridis Syluestris, ter-
nis foliolis surrectis, nec reflexis, purpura saturiore Violæ Martiæ, & in medio venis non-
nullis luteis, & phœniceis apparentibus Iunio & Augusto in Anglia. Siliquis, item Iridis
trique-

triquetris, trināque carina dehiscētibz: quando maturuit semen, quod rubrum, nitidum, rotundum, gemina secundum longitudinem serie, conditur in filiquarum membranis loculis, aut p̄scēpiolis, vti in Pæonia, Orobi, vt quidam ex Oribasio legunt, aut fabæ, non vulgaris nostratis, sed antiquæ & Dioscorideæ, quæ multò minor, & nostrate rotundior fuisse probatur à doctis. Radix (facilis enim & frequens mutatiuncula *μακρόν* in *μικρόν*) parua, geniculata, fibris multis donata & Iridi concolor, similis aut fusca. Ea vi & acrimonia prædita, tametsi Corulam aut cimices oleat, vt multorum nostræ ætatis Medicorum monumētis & experimentis constet ea præstare, quæ Dioscorides Xyridi reddidit. Quin non modò Iridi similis facie, sed & viribus anteit, tum ad vlcera, ossaque desquamanda, tum intro sumpta decocto aut succo, vehementius lotium ciet, & sudores, sed pharingem adurit fermè. Si multa decocto bibatur, vomitum excitat, & tormina ventris, vti Iris facit. Gustauimus acre, & quod in Angliæ maritimis ad Brumam ferme vsque in filiquis pendulis hiantibus visitur.

zingiberi ZINGIBER.

{	Gall.	Zingembre.	}
{	Ital.	Gengeno.	}
{	Ger.	Ingber.	}
{	Flan.	Bengeber.	}
{	Ang.	Genger.	}
{	Hispa.	Gengiure.	}

EST etiam Zingiber, aut Gingiber vt in Plinii codice legitur, herba & nomenclatura Barbara, antiquitati viribus quā



RPJCB

nte,
tem
æ in
nol-
iēses

fiariis
pro-

quempiam legerit, eoque forte minus aptè dixerit Zingiberis radices paruas, cādicantes odora-

odoratas Cyperi modo libro secundo: alioqui enim nisi perquam exigua illi cum Cyperis intercedit similitudo. At vires perquam similes quasdam habet (præter Crocei succum, quem mansu remittit) cum Zingibere, tamet si gustu ignauiore, ingratiore, docte autem referandi viscera potiore: ideoque hodie cursores & mulierculæ cum Zingibere miscent ad Isterum. Vis autem psilothi illa feruida videtur elangescere, longa temporis & locorum intercapedine atq; teredine, cui eadem obnoxia est, sed minus quam Zingiber. Pictoribus & Chymistis, quam medicamentis hodie frequentior.

ZINGIBERIS EFFIGIE COSTVS

Arabicus & Syriacus.

INTRICATIO multò Costi dignotio, utpote etiam plantæ peregrinæ Indicæ, nec vllis liniamentis signatæ, nobis tamen vsibus & præsidio futuræ. Sprenndæ tamē recentiorū contentiones & apponendæ recensiones, quæ doctis possunt esse argumento & emolumento ad vberiore cognitionem. Sexto abhinc ferme anno, cœpit vehi radix è Syria & Egypto Venetias Zedoariæ aut Zingiberis effigie, quam primus omnium singularis modestiæ amicus noster Valerandus Domez Flander Insulanus, & Historiæ huius peritissimus verum Costū censuit esse, cui Gesnerus primū frustum inter magnam copiam Zingiberis fortè repertum specimen futurum donorat Venetias ituro, indeq; in Syriam Simpliciu perquirendorum causa nauigaturo. Radix intus candida, leuis, minimè grauis, pollicem crassa, vñciam & sesquiunciam longa, hinc inde tuberibus oblongis altrinsecus donata, odora, gustu acri; odore inteso & iucundo Cypresi aut Cedri Libani quadatenus, interdū & BVXEA visitur, uti vulgata odore & sapore similis, subaristata vtraque, cætera similes. Qui Turcæ insitiores persæpe venditabant amico nostro, rati esse Zingiberem Syluestrem, haud ita magno pretio distrahebāt. Ea Venetorum Medicorū collegio oblata, adeo placuit, ut dignam censuerint, quæ inter lectissima Theriacæ parandæ simplicia, anno 1563 infereretur, quod paulò post factum fuit, iamque inde maiore copia aduecta fuit Venetias. Et nostra opera factum fuit, ut amicis nostris Antuerpiæ innotuerit, quibus misimus. Quæ quidem, ut non esset Costus genuina, tamē quia & radix est, eximiâque odoris saporisque acris gratia aromatica pollet, merita videtur parem Costo laudem & gradum, præferendâque non modò FVSCÆ GRAVI & INODORÆ RADICI, Helenii compacta concretionē ignotæ, qua Officinæ hodie abutuntur, sed etiam Zedoariæ, quæ minus odora, aromatica & gustu grata est. Quin ne Angelica quidē præferenda est, quam NIGRVM COSTVM, siue Indicum, propter insignes vires & odorem suauissimum hodie faciunt: non enim est adeo peregrina planta, sed Europæ familiarissima, nec admota vrere solita, nihilque adstrictionis habet, qualem Galenum in costo optare auctor est Senensis Commētator. Cuius plantam suis postremis commentariis insertam Costi nomine, nobis sæpius ab Herbariis Illyricis ostensam, quia nihil Costo dignum habet, sed potiùs facie Elaphobosci est, illuc reiicienda.



BVXEA
Costum.

COSTVS
Officinæ.

Costus niger.

Costus Spurius
Mathi: foli. 53.

COSTVS DVLCIS & AMARVS.

COSTVM dulcem nouimus nullum, nisi collatione quadam cum acriore & amariore Costo sic vocetur: quo intellectu quis Actuarium accepisse putet, vel eandem plantæ radicem, quæ dum recentior mitior multo, vetustior verò amarore & feruore ingratiore facta, amara aut inamœna vocetur. At Galeno nulla Costus non amara. Sedenim Arabes sequentis recentioribus indulgendum illud ut quædam species Costi suauiore quasique, ut vernaculè loquuntur, dulciore odore, feruore mitiore, dulcis illis dicta sit, & vsu recepta: quo modo quis dicat Zingiber, Tridem, Helenium, Centaureum & plerâque alias radices mitiores & dulciores, dum tenellæ sunt: vetustiores vero & vietas acriores & calidiores. Id euidentius exemplo succorum excoctorū natura vel arte, in Aloe explicuimus.

COS-

STIRPVM aduersaria noua.

35

COSTVS MOLVCENSIS

Corticofus, rugofus.

DVAS insuper radices peregrinas Costum admodum simulates, hinc impertiemur candidis arbitris, ea beneuolentia qua Rupellenfis Medicus doctiffimus Launaius easde nobis, quadriennium iam est, impertiuir. Ambas acceperat a Naucleris e Molucis Insulis reducibus, quarum altera maior arboris maiusculæ cortex videtur, & figura Sambuci adultioris & cineracej, rugis & plicis frequens, sapore & odore æque vehementi.

MOLVCENSIS LIGNO.

fus feruidior.

MINOR quidem altera radices Solani Syluestris valde quam similis, colore diluto pullo, gustu vrent vt vix ardorem lingua ferre aut sustinere queat. Illis iam persuasum erat Costi esse speciem, tametsi parum odorum esset: quod vt non inficiamur, ita priorem vt potiorẽ retinemus, & hasce ambas Molucenses nempe, minus odoras iudicio studioforum pitas subdidimus.



ZEDVARIA sine ZADVRA herba & ZERVMBET

PROSTANT itidem peregrinae duæ radices in Officinis non perinde notæ e totius plantæ partibus, vt sunt celebres facultatibus. Neutra quidem Græcis memorata, sed dütaxat figura Zingiberis a recetioribus prodita. Earum quæ notiffima, Zedoaria vocatur: altera quæ rarior ZERVMBET: & vtraque vt nominis, sic generis eiusdem meritò putatur, nec secus inuicem differre, quam Cyperus rotundus & lôgus, videntur. Eoque Serapio Zedoarium eandem Zarumbeto dixit, rotundasque radices Aristolochiæ describit & Zingiberis colore & sapore, in Chinis vltimis nempe Indiis oriundas. Auicenna autẽ, nisi sint eius tenebriones interpretes, permutatis nominibus contrarias planè Zedoariæ & Zerumbet affinxit comparationes: apud quem idcirco malim legere, Zedoariam Cypero similem, minus tamen odoratam, Zerumbet autem Aristolochiæ rotundas radices inesse. Quod tamen parum interest rerum cognoscendarum cupidi vestigatoris. Satis enim discernitur apud Serapionem, modo sic accipat, vtramvis harum radicum tuberosam esse, ac quemadmodum Doronicis siue Aristolochiis & ænanthis contingit variare oblonga tereti, vel orbiculata & nodosa mole radiciis: sic euenisse Zeduariæ herbæ, cuius naturæ, quemadmodum nominis est particeps Zurumbet, quippe amaror, feruor, odor, color, ingratus vehementior gustus, modus, durities, duratio eadem & vsus ad Colicos cruciatus, præsertim aduersum venenata, certissimus, vnde nomen forte fluxit. Indèque videntur Auicennas, Serapio ac Mauri nonnulli designasse antidota pluria, aut præsidia ad venena comparata, laxiore vt plurimum solent nominis ambitu, quemadmodum BEZARDICA generatim vocantur Arabicæ, quæ vitam tuentur: eoque quæ BEZARDICA. piã celebrẽ arborem eodem nomine implicuisse Zedoariæ aut Zerumbet foliis faligneis *Arbor Zedoar.* Citri odore, quæ item ad Ze particula multũ alludit. Potiorẽ etiam eam Zedoariã, quasi dicas antidotum, quæ radicibus Napelli adnata foret, eiusdem venenati Napelli præstantissimam Theriacam merito dicit, qualẽ nos experti sumus, & eruimus copiosam variis in montibus, vt capite de Thora dictum. Ne dehinc porrò Principem Auicennam veri feuerum vindicem & ferium Philosophũ fabulatorem vocet ille Sabbatarius Indicarum *THORA.* mercium ex commentarijs triuialibus Navigationum interpolator, qui valde vereor ne metipse fabulas non parum multas effutuerit, certè non vno loco multa præcipitan- *ARNABO.* tius effutita satius fuerat siluisse, vt de Calamo aromatico, Costo & aliis plerisque. Quem etiam non puduit, ARNABONEM arborem esse proceram apud Ægyptetam Libr. 7 Cap. 3

Cap 3. prodere, cum nullius prorsum arboris ac ne stirpis quidem mentio fit inibi de ARNABONE 231 pagina Græci codicis. Bonum Medicum nimirum decepit Commē-
tator Senensis, qui affirmat Arnabonem Pauli & Zurumbet Serapionis eadē esse, quod
easdem is Zurumbeto, quas ille Arnaboni reddiderit facultates. At id fecus est, nec Paulus
vllam vllius plantæ partē exprimit, sed tantum dicit τὰν Ἀρναβόντων esse Arnabonē.
Et vt eadem scripsisset Serapio de Zurumbet quæ ille de Arnabone, non tamen illico id
esse dictum oportuit, cum Zurumbet eidem Serapioni sit ipsa Zeduaria, radice nempe
rotunda, adeoque Auicenna plantam Cypero similem sed minus odoriferam dicat. Quin
Isacco vtroque illorum antiquiori Zurumbet radices sunt Aristolochiæ rotundæ colore
& sapore Zingiberis similes ē Chinis petendæ. Sed enim illis ut doctissimis viris (vnde hanc
haussit labem Commentator) nominum anceps allusio, vt dudum monuimus. Ergo Ze-
duariam triplicem innuere voluisse Arabes putamus: Oblongam nimirum vulgatiorem,
Cypero propius accedentem, & huius speciem Zurumbet officinis infrequentiore,
nobis rotundam dictam, tertiam autem luculentam arborem minus hodie cognitam. Il-
las itaque, quia recentiores foliis & natura Zingiberis æmulas deliniant, nec nisi radicum
figura distare affirmant, huc non incommode attexuimus. Si cui autem propius Zeduariā
videtur exprimere noster Costus Syriacus Zingiberis radice simili & maiore, sua sane o-
pinione fruatur: nam & hanc dicunt ab vsque vltimis Oceani Orientalis Chinæ plagis
in Persiam & Syriam, vbi etiam, sed pauca, oriatur, transmitti. Probabilius tamen
vulgatiore veriores esse, cum sint sibi per omnia similiores, vt Castani-bulbi cum ceteris
œnanthis, exemplisque aliis superius ostensum fuit. Arnabonē verò Pauli & MAMIRAS.
RAM, nobis ignotam adhuc esse, fortē & fore magis dolendam, quā mirandum: cum
priscorum pudor non ausus sit res peregrinās, neutiquam compertas temerē posteritati
NARCAPH. figurare: vnde NARCAPH. non corticē aromaticū, ac pleraq; alia thymiamata fami-
geratissima nullo signo memoriæ mandata fuerunt. Mamiram tamen qui Doronicum v-
num quodpiā arbitratur, neutiquam infirma coniectura nititur: at qui Arnabonem eius-
dem Zurumbet Arabum hariolabitur, verum si dicat, illum putato vatem optimum.

IVNCI & IVNCEA

	<i>Rotundus</i>	<i>Maior</i>	<i>Syriacus</i> ,
		<i>Minor</i>	
<i>Cyperus sine Iun- cus angulosus</i> .	<i>Longus odoratus</i> .		
	<i>Longus inodorus</i> .		
	<i>Gramineus</i> .		
<i>Trasi</i> .			
<i>Papyrus Nilotica</i> .			
<i>Papyrus latifolia Brasilia</i> .			
<i>Arundo Papyracea</i> .			
<i>Sparganium</i> .			
<i>Typha</i> .			
<i>Typha minor</i> .			
<i>Stæbe</i> .			
<i>Phleas Theoph</i> .			
<i>Schoenanthos, siue Iuncus odoratus Libani</i> .			
<i>Nardi spica</i> .			
<i>Nardus Gangitis</i> .			
<i>Iuncus</i>	<i>Lauis vulgaris</i> .		
	<i>Acutus duplex</i> .		
	<i>Aquaticus</i> .		
	<i>Maritimus</i> .		
	<i>Bombycinus, Gnaphalium Tragi</i> .		
	<i>Cyperoides, seu floridus paludosus</i> .		

IVNCI VA-
rietates.

CYPERVS; sine funeus angulosus.

Gal. Soucher.
 Ital. Cypero.
 Ger. Wilder Galgan.



ATVRÆ natalitiorum; cognatione succedent Iunceæ Cyperorum
 serici, ut etiã Theophrastus innuere visus fuit, cum Cyperum, Pa-
 pyrum, Calamum, aliisque palustres recensuit. Dicta autem *κνπερις*
 aut *κνπερις* videtur à radice effigie, quæ pyxidulam, aut pocu-
 lum pusillum vasculum ue imitatur: sic etiã apud Theophrastum
 folliculum Vlmj *κνπερις* legitur. Huius certior multò Historia
 quàm cognatæ Curcuzæ, siue Cyperi Babylonici putati, de quo
 superiore capite, propterea quia nò multi sunt anni, cum quidã
 horti Itali rariorem, rotundum vocatũ alebant, nòsque copiam

Effigies Math.
 26.

duorum generum Rotundi vocati ex Syriæ Emporijs Venetias aduehi vidimus apud Al-
 bertum Martinellum Pharmacopœum peritum à quo etiamnum habemus. Quare plu-
 res sunt species, quàm quot Dioscoridi recensitæ fuerint. Nempe Dioscoridis maior &
 minor rotundus: vterque peregrinus, Syriacus vocatus Noftratum autem Longus odo-
 ratus, & Longus inodorus: postremò etiam Veronensium Trasi, quæ sanè Cyperi sunt cõ-
 generes. Omnium effigies similis & eadem fermè, folijs porraceis Asphodeli striatis, an-
 gulosis, rigidis Sparganiij vel Iunci floridi aquatici, caule gracili, nitido, triquetro, iunceo,
 floribus item seminibus & cacuminibus pannicularum Iunceis spicatis. Vda, etiam scro-
 bes & ripas fluminum, vbi Iunci, amant: quare meritò Iuncum angulosum sine triangu-
 larem vocarunt antiqui & nos hic collocauimus. Omnium tamen in radicibus discrimẽ:
 Syriaci maioris etenim radices multis filametis implexæ numerosæ, glandularum instar
 aut filipendulæ annexæ rotundiores, oliuis pares, intus albidæ, foris subruffæ, sapore mi-
 nutè Galangæ, odorèque aromatico, antidotis maiori gratia & vi misceri solito.

Minor verò radix duplò minor est, cortice fusco villosiore, duriore intus candore,
 alioqui & sapore & odore simili, non modo è Syriæ montosis humentibus, sed etiam
 Illyriæ & Apuliæ consimilibus natalibus, vbi sponte prouenit, in Italiam ferunt, emunt-
 que magno vtramque harum, & ad Theriacæ compositionem, ceraque oblinunt ne teredi-
 ne exedantur. Aptissimam enim Xylobalsami succedaneam iamdiu Patauina & Veneta
 collegia sanxerunt & vsurparunt, tametsi commodiora hodie succedanea suffici possent
 vt sumus dicturi in Antibalomenis.

LONGVS HABITIOR.

NOSTRATIS duplicis Europæi frequentior multò prouentus & vsus Septentriona-
 libus regionibus, vt Germaniæ, Belgiæ, Angliæ & Galliæ, quàm Meridionalibus trans-
 marinis. Harum pariter altera maior habitior, carnosior odoratiórque est. Radices illi
 longæ sibi cohæsi mutuò implexæ Polypodij modo, etiam odore suauissimo mulieribus
 notæ, quæ ex illa destillationes & pulueres instituunt.

LONGVS INODORVS.

ALTERA verò minor inodora fermè neglecta, quam Theophrastini in Heluetia mis-
 cebant suis quintis ineptijs.

RECENTIORVM TRASI, sine esculenti Cyperi.

EST & hæc prorsum è Cyperi genere, seu radices seu plantam reliquam totam species,
 eiusq; natalia, nec differre videtur, nisi radicum sapore, qui gratus vscendo nec utilis
 minus est, vnde nomen in vulgus Italarum manauit, quod forsàn Tragum esse illam spe-
 ciem frugis, quæ Halicæ speciem gerere quadamtenus describitur, secundo Dioscoridis
 Volumine, tametsi vtraque illarum factitia est: at Trasi planta est equidem rara, nec vspi-
 am Christianæ ditionis oriri spontè solita, preterquam in amœnissimo Veronensium agro
 non procul ab vrbe, vbi etiam colitur pingui rignòque aruo, quò nos, dum floreret Iulio
 mense, duxit optimus ciuis, Pharmacopœus diligentissimus, Andreas Bellicoquus, cuius
 radices in Gallia, Belgio, Anglia satè non paucis amicis opinionem fecerant Cyperi
 rotundi minoris. Cui equidem par est & similis: agnitu tamen facilis, quia can-

Tragos & Con-
 drus Diosco, fa-
 Etitia.


D.i.

didior

didior, pellucidior, nec odora, nec medicata, sed alimentoso dulcioreq; quàm Castaneæ sapore, vnde vulgo, *Dolce Trasi* Veronæ & Venetiis per vrbes puerulos audias, qui radicem harum circumferunt vœnum plenos quasillos. Crudas coctasque esitant in bellariis, ad acres fluxiones commendantur, nec dubium quin ptisana ex iisdem parata multum profutura sit, addito Coriandri semine, & pauca Iride quemadmodum quidam parant. Afri, quibus etiam spontè oritur, Hab-alfelim vocant.

CYPERVS GRAMINEA sine MILIACEA.

ACCERSENDAM etiam Cyperis hanc caulis natiuusque locus suadent: est enim inodori Cyperi quadatenus affinis, breuior tamen foliis, quæ ab imo orta medio sui tenus fermè caulem ambiunt pedalem, gracilem, ternis angulis asperum, coma donatum sparsa eleganti, & maiore quàm pro sui magnitudine, copioso Milii aut Iunci referta semine, circum quàm imam aliquot foliola enascuntur, vt in Cypero aut Papyro, lectam industria summæ sedulitatis Medici Thomæ Penii habuimus, ad Neccarum flumen agro Heidelbergensi.



PAPYRVS NILOTICA.

NON corticis siue libri cui inscriberetur, vt quidam putarunt, est Ægyptia Papyrus, sed plantæ magnitudinis speciosæ admodum, Cypero similis effigie, natalibus, etiâq; nomenclaturâ Ægyptia, qua in regione secus fluueta in Nili palustribus adolescit, nec è profundo emergit, sed tantum è vadosis frutescit, non procul à ripis, vt etiam diuina pagina narrat Mosen diuinæ spei & elegantiae delictum puellum à matre inuita eiectum prope Nili ripam inter Papyrus, vnde diuinitus iussu filiarum Pharonis eductus, indeq; Moses vocatus, quasi aquis ereptus, fuit. Niloticam Papyrus, vnde & qualem describunt Theophrastus & Plinius aduectam hortique Pisani totius oræ Thyrrhenæ longè amoenissimi & raris stirpibus ditissimi inquilinam factâ vidimus, & florentè legimus beneuolentia eruditissimi Professo-



ris in Academia Pisana Andræa Acroaria Cifalpini, quo etiam hortante nonnullos Stolonos Papyri, & aliarum rariorum plantarum Gesnero misimus: quarum oblectatus peregrina elegantia, vt erat incomparabilis modestiæ & eruditionis, non ita multo post literis gratulabundis hæc significauit. Rarum spectaculū sui mihi præbuerunt stirpes duæ munera tua rarissima, quarum illam Papyrum Niloticam vocas, altera, mihi tecum ignota est: sed nec illam nouissem, nisi tu monuisses esse Papyrum Niloticam è Pisano horto lectam. Plinio videtur gemina Ægyptia & Babylonia ex qua præparantur acu chartæ diuise in prætenues, sed quàm tenuissimas philyras. Tua verò an sic possit parari nescio: Plinianæ premuntur prelis plagulæ & fecernuntur scapo nunquam plures quàm vicenæ. Plurima quæ ibi habet Plinius non assequor, nec nunc cum Theophrasti, conferre vacat, sed peruelim scire cuiusmodi tuæ sint folia, & an nō Cyperus sit, vt cū nostrum opus in lucem exhibet curem depingendas, ac tibi acceptas feram.

Neutiquam mirum doctissimo Gesnero visam esse Cyperum, cū illi sit congeneris & simillima: verum elegantior multo est, Iuncea harundinaceæ triquetra caule, medulla farcto tomentacea, quæ tusa glutinisque in speciem subacta ducebatur in bractæas Papyraceas, quæ mutuo sibi appressa folia crassiora constabant scribendo apta, quemadmodum etiamnum sit ex laciniis linei panni contusi & in candidum gluten redacti. Medulla vero utebantur ex præcepto antiquorum, quemadmodum hodie Chirurghi Itali linamentis, & turundis ex medulla Sambucina aut Spongiæ paratis, quò suis poris melius saniem imbibant, suæque qualitate desiccando fistulās latiores faciant, quod facitari solitum meminit Dioscorides. Stipitum numerosorum proceritas, læuis, nitida, surrecta senum, septenūmue interdum cubitorum, quibus nuspiam, nisi ad inum folia insunt Cyperi aut Sparganii repanda: radices autem arundinaceæ fibrosæ, quas in Ægypto erutas asserebant non illic ortas, propterea quia semine caret, tamen floribus est perquam speciosis & luculentam in ambitu cæsiem effigiantibus: numerosis gracilibus thyrsulis, denso & æquabili comarum stipatu, & apicibus prominentibus, Ferulæ in modum collectis, non vt Cyperi sparsis, quos circa ortum ambiunt radiatim scita folia multo minora illis, quæ sunt ad inum, vt in Cypero. Idcirco verisimile sit hanc veram Theophrasti esse, & Papyri descriptionem apud Plinium geminam esse, sed mutilam, æque duabus diuersi generis Papyris confusam, nempe ex Ægyptia hac & ex Babylonia, cuius etiam alii scriptores meminerunt. Nam, vt nomen & res indicat, Theophrasti papyrus non alia est, quàm Dioscoridis quæ notissima omnibus, fuit ex qua præparabantur chartæ, & vtilissima Medicis ad ora fistularum diducenda, nempe medulla, vt superius ostendimus, etiamque è Iuncea medulla hodie fieri scimus, nam ipsam chartā non esse, sed medullā, indicio est quòd Dioscorides dicat cinerem crematæ Papyri præstantiorem esse quàm è Charta, & ipsos stipites neutiquam inferi sinibus aut fistulis solitos, sed medullam, propter commoda quæ recenset Dioscorides. Ideoque aut vsum tum funium, tum chartæ obscurius Plinius tradit, cum dicit: textuntur omnes tabula madente Nili aqua, quod de funibus quis fortè interpretetur. Et mox: turbidus liquor vim glutinis præbet, cum primo supina tabula schœdæ illinitur longitudine Papyri, quæ potuit esse segmentis vtrinque amputatis: transuersa postea cratis peragitur, premuntur deinde prelis & siccantur Sole plagulæ, atque inter se iunguntur, quæ medullæ gluten in Chartas duci solitum innuere videntur. At vbi in Euphrate circa Babylonium nasci scribit, non eandem videtur describere, sed eundem vsum habere chartas, quæ diuise acu in prætenues, sed quæ latissimas philyras præparantur. Quare & si ista folia admodum lata, quibus metæ saccharatæ adferuntur passim inuolutæ ex Austrinis trans Equatorem Insulis vocari possunt Papyraceæ, quemadmodum olim etiam folia Palmæ & aliarum arborum, quibus poterat quippiam commodè scribi, tamen non esse genuinam certum est. Quapropter consultius est, vbi defuerit hæc nostra Papyrus, cinerem parare ex Cyperi vulgaris, aut Iunci magni aquatici medulla, vtendum ad depascentium vlcerum rabiem feram compescendam.

*Folium sacchar.
inuolutum.*

PAPTRVS LATIFOLIA BRASILIA.

D.ij.

Nic

Nec etiam Papyrus esse illud folium quod doctissimus Generus describit, vel inde perspicuum, quod Dioscoridi non folia, sed quidpiam certo modo paratum & plāta Papyrus vocatur. Tamen, ut monuimus, nihil obstat, quin folia hæc, ut quibus concinnè admodum characteres ac quiduis aliud exarantur, possit papyrus dici: præsertim etiam cum iisdem vigeat locis, quibus Arundo Saccharata & cæteræ aquaticæ.

ARVENDO PAPTRACEA.

AD MODVM similis Papyri descriptioni, & nulli non Galliarum regioni familiaris, lacustris planta altera speciosa proceritatis, quam non semel in Lani torpentibus aquis non procul Monspellio conspicati papyrus Dioscoridis ut pote notissimam suspicari fuisset, nisi illi scapi minus angulosi essent, senum octonumue cubitorum, crassitie & similitudine Typhæ, sed harundinis in morem flore fastigiato thyrsi cacumine, folia item arundinaceis aut sparganii longiora, carinata, carnosæ, triquetra, radice ampla, crassa, multas lateratim hinc & illinc propagines fundente, vrendo apta cum sicca. Ex folijs verò texuntur tergestia, quas Mattas vocant, non secus atque in Iunco maiore, Sparto, Alga & alijs non paucis.

SPARGANIVM BVTOMOS.

Theophr. Lib. 1. Cap. 8.

AFRINIS valde Typhæ Iunco florido Papyris & Cyperis Sparganium, qui idem *βέτομος* id est admodum scindens Theophrasti videtur, nominis argumento id docente. Iisdem namque paludosis & riuus inter & prope illa prouenit folijs cõsimilibus, triquetris, dorso prominulo & carinosis, acieque utrinque manū arripientis cæsim sauciente, partim ab radice graminea, fibrosa, surrectis: partim è bicubitali caule alterno ortu sparsa & reflexa: inque alarum cauo globulos echinatos saturè virentes, duos, firmos, Platani pares habente, gustu subastringente & sicciore, insipido. Sunt qui respuunt ut Senensis, nec tamen describunt, non magis quam Iuncum floridum vocatum, per eius commentaria hætenus minus sane notum, iniquius paulò tamen interpretantur duas voculas *σπάρτακα καὶ ἐπικλινόμενα*, id est angustiora, & inclinatiores. Atqui illa vaga nota latioris, angustioris folij, non sæpe certa, sapientissime contrario sensu accepta in Dioscoridis lectione, ostenditur alibi: & ubi dicit magis quam Gladioli inclinata, aperte indicat esse magis disparata & sparsa (ut sanè sunt) quam sint Gladioli, quæ ut plurimum recta, & proximè caulem parallela assurgunt. Sed Commentatori illius triuialis intellectus literæ quæ sic habet; folia ad terram inclinata magis, vel procumbentia.

TYPHA.

Ital. Mazza Sorda.
Gallis. Masse de Ionc. *Angl.* Carris tayle & reede mase.
Germanis. Moseloben seu Narrem kolben.

CYLINDREA turbinatæque florum effigies quasi Typhonis sese gyantis turbinem, aut gigantis staturâ minacem signaret nomen huic dedisse videtur. Earum est & hæc quæ non nisi certis natalibus nempe annibus leniter fluentibus, & vada, stagnantésque aquas & palustres efficientibus emergit, è radice iuncea caulis procerior interdum homine procero teres, rectus læuore colorèque & parilitate illius Iunci fluuiatilis maioris, quæ propè haud raro nascitur folijs ab imo exeuntibus alterno situ carinatis triquetris mucronatis Cyperidis: fastigium tereti, papposæque claua clausum, sesquipalmum, pedemue longum, quadam Tritici Turcici similitudine. Ventis abrepta lanugo pulla intus foris nigricans, cogitur à Tomacarijs mulieribus, & renibus æstuantibusque lumbis haud parum commodi adferunt puluilli thoriuè eadem farcti: etiam intusa pinguedini præsertim axungia, aut larido illiquato, arcet ambustis partibus tumorem & inflammationem ferique vrentis collectiones. Quod prodiderunt ad Enterocelas tantopere facere, non huius reor, sed ad motorum & aliorum mixtorum merito acceptum ferendum, nempe Hippoglossi, Gladioli, Bethonica: unde malim hanc abesse lanuginè, quæ et suffocationis periculum minatur, mures enim sic enectos vel plebs nouit, & ineptiora cætera medicamenta efficit.

An verò sit huic congener Theophrasto Cercalis Typha, tum sitne Zea Speautra Gal-
lis, inter fruges diximus.

TYPHA MINOR.

IN agro Genuensi, qua confluunt Rhodanus &
Arua Typha pusilla, siue Typhula exit planè iun-
ceis culmis, enodibus, rigidulis, cubitum & ses-
quicubitum vix excedentibus, binòque fastigiolo
floris Tométacei donatis: nempe in extremo vno
exiguo & semine eroso, cui adnascitur foliolum
triticeum, & intorquetur: altero autem inferius
relictò spatio, crassiore & corpulentiore iuncum
ambiente Typhæ non dissimile, sed multò minore
vti & folia quæ ad imum sunt aliquantum rigida:
radix prolixiùs reptat, monente peritissimo & ad-
modum accurato plantarum expensore Thoma
Penio Anglo, qui hanc vult superioribus an-
nis & nobis impertuit.



STOEBE.

PLVS quindecim annos spes ferebat nostra Stœben verã alicubi sese nobis obuam da-
turam, at iam ferme despondimus animum: cum nuspiam lacu, paludè, stagnorum, la-
cunarũ, aliorũque vdorum sedulis stirpiũ venatoribus cõparuerit. Qui saltem si Phleon φλέων. Theo.
Theophrasti inuenissent, STOEBE Ñ Dioscoridis se nactos putassèt, propterea quia ean-
dem esse vtramque Persuasi essent, Cõmentatoris ex docto Ruellio furtiuis versuris ac-
ceptis. Verũm haud necessaria nominis solius communis protrita argumẽta, quæ Stœben
eamdem PHLEO plantam esse illicò asserunt, imbecilla vna dumtaxat coniectura, quia
à quibusdam PHLEON vocari Stœben lib. 6. Cap. primo scripserit. Nam eadẽ nomen-
clatura in quamlibet tomentitiam vel fungosam alius generis stirpem quadrare potest,
vt Typhæ, Centunculis, Gnaphaliisq; veris, Cynaris & Spinis albis. Quin Galenus cum
Stœben acris valdè & calidæ facultatis dicit libro de antidotis, satis indicio est idem no-
men etiam contrariæ naturæ plantis indi potuisse: quippe oñtuo Simpliciũ aliam Stœ-
ben mordacitatis expertem, qualè planè Dioscorides & Egyneta, recenset. Dioscorideã
cũ descriptione careat quòd notitiæ plebeia extitisse videatur, quasi vsu frequenti vul-
gatiõ, alia à φλέω Theophrasti Indica lacus Oromeni frutice fuisse videtur, quæ de spino-
sarum classe est. Nec ex Plinio probatio vllius momẽti est, vt qui dumtaxat vertit & per-
uertit eo loco Theoph. historiã. Sic enim ille τὰ δὲ πρὸς τὴν ἀκρότητα ἑτέρου ἔχει φύλλον,
ὡς περὶ ὁ ὄνους, καὶ ὁ τριβόλος, καὶ ὁ φλέως, ὃ τινες καλοῦσι σάβην. Plinius verò libro vi-
gesimo primo Capite vigesimo quinto, aliqua secundum spinam habent folium, vt
Tribulus & Anonis: quædam in folio habent & in caule, vt Phleos: quod aliqui
Stœben appellauẽre: cum tamen Theophrastus neget Folium Phlei Spinosum esse Cap.
quinto & sexto. Quæ labeculæ illi frequentiores. Sed & istud Theophrasti PHLEON à
seminis vbertate, vt rentur, vocatum, non magis ex descriptione, quæ satis plena & per-
spicua colligitur, notum est, quàm Folium Indicum Cinamomium, & alia quæ iisdem na-
talibus quæplurima à nostro cœlo disitis oriunda sunt. Frutex enim est aculeatus in cau-
le (falsò acuti-folium aut aculeato folio verterunt) semine molli, rubido, pecori radix
gratissima, non alibi quàm in aquaticis nascens, sceminam in eo accipi quæ sterilis sit, &
ad nexus utilis. Item Phleon tradunt folio nasci carnosò multipliciter laciniato, stir-
pe numerosa germinare Virgiliarum exortu, primòque aratro, vnà nec id folia di-
mittere, vitam annuam longiorem esse, ad bimatum aut trimatum prorogari, cau-
lem non solum sed folium aculeis armari: Item secundum spinam folium habere
D. iij. Phleon

Phleon, quam nonnulli Stœben appellant, lanugine mulieres ad lixiuū vti, pabulo esse folia ouibus, germina suibus, partem imam radici proximam pueris teneram esitari, non in profundum actam radicem inque Orchomeno copiosam haberi, atque in Arabia exaduerso Æthiopico tractui, flumine præsertim quod Cinamoferam determinat Strabone narrante. Quæ tot notæ fatis docendo erant, ipsam Plantam sicubi ea in Europa cerneretur. Dioscoridea tamen vix vnquam certa erit, cum nullis sit descripta notis, nisi vulgato vagoque nomine, & facultatibus quas nec diuersas nec ignauiores quis in Bursa Pastoria, Gnaphaliis marinis, Iaceis, Scabiosis, Bellidibus & Globularia experietur: quarum maxima pars tametsi antiquis indicta meritò putetur, fieri tamen potest, vt vna quæpiam Dioscoridis sit Stœbe, aut saltem non magno vel desiderio vel dispendio illius vsus expleat: easdem namque vires fermè Gnaphalio, Typhæ & Iuncis reddiderunt antiqui.

IVNCVS ODORATVS seu SCHOENANTHOS.

IVNCORVM præstantissimus odoratus Schoenanthos olim vocatus à multis tempore Galeni, florum prærogatiua roseæque fragantia, tametsi Galenus dixerat suo tempore minùs aptè sic dici, atque præcepisse quosdam Schoenanthum miscendum esse compositionibus, cuius florum non admodum suppetet copia, sæpe depascentibus nimirum summitates Camelis Aphricanis, qui Schoenantho vescuntur & maximè oblectantur. Quam Galeni rationem, vt prauam & veluti mendacii ream ridet aniliter Commentator, quasi nusquam vllum eius florum vestigium Europæis compareret, sed omnes ligurisse Camelos diceret. At ille dumtaxat sæpe truncam adferri reliquam herbam dicit, nempe radicem, folium, caulem, eoque floris minorem suppetere copiam, quemadmodum hodie videas in Emporiis, Venetiis, Genuæ & alibi longè copiam plantæ maximam, florum verò non admodum mercem frequentem. Quippe cum sint quadatenus flores papposi, tenues, facillè que delabantur, etiàmque cum cæteris gramineis vescendo rescentur, calore odor eorum exoluatur, factum fuit partim eorum paucitate, partim etiam infistorum negligentia vt perpauci adferrentur. Iam lucris spes luculentior adeo sedulos colligendo adferendoque fecit mercatores, vt nulli dubium, quin veri calami floribus integris quamplurimum habeatur Nabathej, Arabici & Aphrici: quorum etiamnum ex odore dotes noscitare quiuis facillè possit (prostant enim interdū in Officinis) veri quidem sed adeo soluti viribus, vt nonnulli putarint non aliam esse plantam, quam quæ passim in Adriaticis frequens & nonnunquam in Mediterraneis littoreis & sabuletis occurrat, planè specie, magnitudine, culmòque concolori Schoenanthi odorati: meminimùsque hanc nobis obtrusam à Pharmacopœis Venetiis & Monspellii, qui affirmarent esse verè congenerem. Verùm ab illius præstantia longius abest, quàm Canna vulgaris à Calamo aromatico: deinde foliis gramineis est, & longè disparem florem profert: qualem aromaticum in Campania oriundum ex Plinii memoratone, sed minùs viribus pollentem quispiam coiecit. Siccatus hodie vœnundari solitus in fasciculos vinctus, radice est exigua, duriuscula, arida, fibris exilibus multis summo cespite sparsis, foliisque prominentibus vnà conuoluta & squamatis interfecta, crassiora, rigida, sesquipalmū alta, mucronata pallida propius amplexa calamulum geniculatum rotundum, plenum, non cauum, nitidum, pedè altum, Cyperi Iunceaue concretione & læuore, & in summo graciliorem, quem ornat gemina series flosculorum ex pallido rubentium, acerosi glumis aut calyculis rubellis foris intusque papposis, leuibus, quæ Cyperum tota olent, sed trita in mortario aut digiti tantopere fragrant, præsertim interiora folia & calamuli, vt legitimum hunc esse qui inficietur, planè mucosæ naris dici mereatur. Ne nunc blaterent de Cyperi caule, quem non odorati Iunci, sed vulgaris, nulla expressa adiectione innuere videtur Dioscorides. Cætera porrò descriptio adeo cum sit lucida, pudeat istos maleferiatos exactores putidulæ seueritatis in notis exquirendis.

NARDVS DIOSCORI. seu
Nardoſtaxis Agineta.

NVM dicta fuerit à Naardo vrbe Syriaca Euphrati contermina, vbi etiam Nardum aliam


MARINVS
gramineus Iuncus
foliis Schoenanthi.

aliam meminit Plinius incertum, certū tamen legitimā plerisque locis Ægypti & Syriæ in Europam adferri, nō modo radicem qualem Galenus vult, sed etiam quatuor distinctas partes, nimirum radicem, spicas comasue, festucas & folia ipsa. Ima radix Schoenanthi, exili & arido stamine à radícula siue torulo exit, cui inascuntur spicatae comæ confertæque glomerationes quasi per cirros torulos nucleosue distinctæ & cōflata capillamentis, vt in Mēo: è quarū spatiis mediis emergunt nonnulla iuncea folia marinæ Algæ modo, tametsi minora multo. Hasce ficas inter ingentes fasciculorum strues conspicati fuimus in ædibus amici nostri & periti Pharmacopœi Alberti Martinelli Veneti ad Angeli symbolum, & scimus nonnullis aliis studiosis Lugduni fuisset animaduertas.



NARDVS GANGITIS SPVRIA NORBONA.

QVINTVS iam agitur annus, cum aliā huic simillimā & copiosam nacti fuimus. Est in Gallia Norbonensi à Gange vrbecula septem plus minus miliaria dissitus mons perquam amœnus & celsus, herbarum lectiorum feracissimus, cui idcirco vulgò nomen *L'hort de Dion*, id est Dei Paradisus, inditum: in huius cliuo qua ad meridiem maræue Mediterraneum vergit, hæc vberi prouentu erumpit, muscidis & vdis tractibus, infima radix pusilla, exilibus fibris duris & raris, quæ subsunt spicatis comosisque torulis minimum digitum crassis, colore pallefcentibus ex fusco, ferè palmum altis, non valdè mucronatis, sed quadatenus per extrema recisis, folio est viridi, rigido, iunceo, vix pedè alto, numerofo quod ab ima radice ortū trans spiceam comam inum caulē ambientem sese exerit: multæque plantæ quasi vno cespitis ambitu implexæ, vnius effigiem præ se ferunt. Tota inodora est, præterquam capillamēta spicea, quæ multo crassiora quam Indicæ sunt, odore Muschi Querni, vel terrestris, cui semimerfa humo inferuntur comosa capillamenta: è quibus gracilis ac nitidus iunceus culmus Elphæ vocatæ non dissimilis, cubitū altus exit, à medio cuius ad summū alternatim sunt admodum exiles herbaceæ filiquæ apiculis è calyculis aliquantum Schoenanthi flori aut deflorescenti Geranio & Cotyledoni similibus. Hæc tum visā fuit Rondelletio præceptori & Iacobo Vtenhouio generoso Gandauensi cōmilitoni eruditissimo, & in hac parte nō secus ac in cæteris rei medicæ apprime exercitato, qui eam suis ipsius manibus collegit, & etiamnum nobis videtur G A N G I T I D I Dioscoridi prorsum quadrare. Nec cuiquā mirum sit Gangis vrbeculæ à nobis factam mentionem, nam nullum occurrebat oppidulum nullusue insignior & propior locus isto, quem alluunt duo amnes suauissimi, quorum alter est fabulo, micis balucibusque aureis mixtus, vnde etiam Aurū colligunt. Quo verò fato factum sit vt id nomen adsciuerit, equidem nescitur, non esse Indicam scitur.



IUNCVS LÆVIS VVLGATVS.

NVN C ad reliquam Iuncorum Historiam pergamus sicuti à loris & funibus Schænum, sic à iungendo Iuncum dixerunt. Pratis vdis deterioribus nihil viuidius familiarisue iunco læui vulgato, qui duplex est, aut mucrone tenuis distans. Vtrique tamen rectæ, læues, herbaceo colore virentes, nitentésque virgæ aut culmi mucronatis cuspidibus & semine nigro conspicuis, medulla alba elychnum referente & vsu sup-
plente rigidis, cubitū & sesquicubitum altis, minúsque duris mucronibus armatis culmis:

D.iiij.

semine

femine nigricante muscofo in pufillis acerosis glumis. Nullius neque pecori, neque homini vſus, niſi in ſternendis aulis & deambulacris, in Anglia potiſſimum.

Complures aſperitate & ſquallore tantum & copia medullæ varietates iſtius vbique, quas recentiores minùs ſcitè in quaternas aut quinas ſpecies diffundunt.

MARITIMVS DVPLEX.

AThuius acuti duæ apud rura Norbonenſia maritima differentia, multò proceriores, nec ternis cubitis inferiores. Vtraque ſtagnoſis maritimis que lacuſtribus inter Latera & Peraus eodem ceſpite viſcunt, multò acutie maiores & infeſtiores punctim occurrendo. Vni feminis nigricantis fecunditas in glumofis aſperis & nigricantibus glomis: alteri niuea, tomentofaque inſtar barbulæ lanugo mollior propendet. Etiam horum medulla elychnis atque circulatorum neuroq; Plaſtorum iocoſis ingenijs & ludibrijs apta materia: è qua columbulas commentitias volitâtes, atque aëre ſeſe librantes memini-mus conſlatas.

AQUATICVS MAXIMVS.

MAXIMVS omnium procerrimæ æqualis Typha, & conuiſtor, aquarum potor & alū-nus. Vbique etiam Septentrionalium præfertim fungoſa medulla, floreis texendis ad triclinia inſternenda, perquam notus.

IUNCVS CYPEROIDES FLORIDVS
paludoſus.

ILII omnibus vt diuerſus, ita excellit Floridus vocatus Iuncus, quippe nonnihil ad Cyperū accedere folio & umbella cernitur, alioqui nō diſſimili illis radice. Iuncus rotundus & virore herbaceo, caulis Typhæ non abſimilis, ſed gracilior, tres cubitos æquans muſcario decorus Cyperi, ſed floribus ex purpura candore diluta Ampelopræſſum referentibus. Folia item Cyperi aut Aſphodeli longiora à radice Iunci, ſed craſſiore, nō nihil carinata. In lacunijs & torpidis aut lentè fluentibus riuiſis Belgia, Angliæ & Londini ad arcem Regiam caſteriūque nauium Liburnicarum naſcitur.

MARITIMVS.

HVIC non ita diſſimilis, ſed tantum littoribus & arenofis Norbonæ & Galloprovinciæ frequens, vix pedem & ſeſquipal-mum æquans. Folia con-plura, tenuia, albida, anguſta, & caule ſeſquipalmeo duplò longiora, lenta, ſparſa, inflexa, craſſa & porreacea è radice nigra ſimpliciore Cyperi modo lōgi geniculofa & prolixius ſerpente, & multis villoſis piloſiſque cirris & crinibus fuſcis depacta, ſapore grato. In ſūmo caule foliola plurimū terna, tres pollices longa, florem glo-boſum Iuncis ſeminibus glumofis ſtipatum, aſperiuſ-culum, ex fuſco & purpureo pallidulum Ampelopræſſi magnitudine & effigie emittit.



IUNCCELLVS.

VERV aridis glareis & ſterilibus Erycetis Septentrionalibus omnium minimus paſſim viſitur, qui vix ſeſquipal-mum æquat, puſilla breuīq; radice, ſpicis tenellis, diſperſis ſtoſculis mucrone carentibus.

IUNCVS BOMBYCINVS.

EST etiam Maio & Iunio in vdis pratis & riguis, exilibus & quasi gramineis foliolis donatum Iuncum videre, pannicula aut cesarie niueo candore lucente insignem, quæ etiam perquam procul oculos nitore pulchro allicit: radice fibrillis tenuibus, & mucrone minus rigido donatur. Germani ob tomētum lincūmue florē & vsum. *Matten Glachs*, quasi culcitæ stupam, aut tomentum dicunt.

GNAPALIUM
Tragi inter Ico.

ASPHODELI.

Albus.
Luteus.
Alphodelus. { Luteus Liliflorus, sine Liriosphodelus.
Palustris radice non bulbosa.
Asphodelus Galeni.
Asphodelus Hesiodi suo loco.
Hyacinthus Poëtarum.

ASPHODELVS ALBVS, sine HASTVLA REGIA.

Germ. Gold Wurtz.
Gallis. Afrodiles.
Ital. Asphodelo.



RID A Narbonæ littora Asphodeli cōmunis feracissima sunt, nec min⁹ mōtes à mari disiti, vbi bulbis illius, adultioribus rostro effosis, quātumuis acribus sues lubenter vescuntur: homini iam in cibum non cedit, vt Galeni Asphodelus, cuius vis etiā non elixi ignauior multo, & feruor mitior. Folia illi Cyperi, cœnanthes, aut Porri similia, triquetra, carinata: Caulis rotundus, læuis, cubitalis & sesquicubitalis: flores stellati candidi Ornithogali maiores: semen fuscum triquetrum Sefami Theophrasti, in orbiculatis capitulis obscurè virentibus occlusū. Radices teretes numerosæ ab vno capite, Pæonia minores, concolores ferme, acres, glandibus similes subsunt, acriorēque multò & ingratiore quam vt vescendo sint nostræ gulositati vt fuerunt holus priscæ frugalitati, cuius testis Hesiodi versus etiamnum extant: nisi huius cum Galeni eadem Asphodelus fuit, aut mitioris soli alumnus, vel coctus, vt de Aro Egyptio, de Cœpis & bulbaceis acribus legimus & scimus.

ASPHODELVS LVTEVS MINOR.

VSQV AM littoreis iisdem vifitur, tametsi hortis Batauinis & Galliæ familiaris luteus hic antiquis indictus, generēque diuersus, est enim radicibus prolixioribus, nec ita bulbosis, sed Corrudæ modo minus tuberosis, leniūque turbinatis, è quibus Cyperi folia complura exeunt exilia, saturo virore. Caulis rectus, floribus crebribus, luteis alterius similibus fastigio tenuis stipatus: semen triangulum pericardiis continetur primi modo.

LVTEVS LILIFLORVS.

LIRIOSPHODELVS inter naturæ luxuriantis lusus, quia non minus elegans quam noua, hic subdenda & describenda, qualem Venetijs superioribus annis vidimus, ac dein Antuerpię cum Asphodelo luteo in officinis Guilielmi Driesch & Petri Coldenbergi amicis peritisimis, denique Monspelli seuiimus. Radices illi cœnanthes aut Asphodeli albi exiliores, caulis sesquicubitalis, folia statim à radice surrecta, exilia porracea. Extremus caulis in turiones fissus qui flores ternos quaternosue Liliaceos referunt, colore flauo, vel aureo, quibus succedunt siliquæ angulosæ semine lucido, atro, oblongo, Pæoniæ feminæ minore. Hunc Liliū luteum vel Asphodelum nuncupabant iam tum quidam Pharmacopœi Veneti.

Lilium luteum

ASPHO.

ASPHODELVS ACORIFOLIVS, palustris, luteus.

ANGLIÆ Flandriæq; humentibus paludosissq; prouenit è radice fibrosa sparsa non admodum protuberantibus per interualla graminea appendiculis, folia exeunt Gladioli aut Acori angustiora, atro virentia & striata, caulisque sesquipalmaris, ortu magnitudine & modo semineque in lagæ nûculis Hyacinthi.

ASPHODELVS HYACINTHINVS fortè Galeni.

Asphodelus
femina Dodo.
452.

Spicatum Or-
nithogalum.

HVC radix Ornithogali aut Hyacinthi, bulbus est vnicus albus, folia porracea, exiliora, breuiora, caulis vnicus, rectus, pedalis, cauliculi triquetri altrinsecus hærent spicæ in morem, è quibus flores stellati lactei se explicant, è medio staminibus quibusdam productis Ornithogalum referentes, quare Ornithogalum spicatum quidam vocant, Monspelliensium nonnulli Pancratium, alii Asphodelum Galeni, propterea quia ancipitis videtur figuræ & promiscui generis ex Asphodelo cuius flores habet, exque hyacintho, propter non dissimilem radicem.

Nos itaq; cœpimus à serie gladioli & similibus, hinc è cognatis principiis Hyacinthorum Historiâ bulbosis annectemus à Poëtico primum orsi Hyacintho vt qui Irides inter Lilia & Hyacinthos gladiolos & Asphodelos quadamtenus ambigat: quem voluissimus Iridum classi proximè subdere, & poterat sanè, nisi potior collatio Acori & aliorum sese obtulisset, quibus hæc tantopere similis floribus, vt Iridem multi putarint. Verum bulbis & foliis cognator natura hyacinthis similiorem facit, eoque nos huc digressimus: variis enim de partibus & collationibus, varias ad stirpium gentilitates allussisse videtur Dædala & munifica parens Natura.

HYACINTHI.

Hyacinthus Poëtarum.
Hyacinthus Dioscoridis.
Hyacinthus { Germanicus.
Autumnalis.
Anglicus.
Hyacinthi Orientales Græci.
Orientalis alter.

HYACINTHVVS POETARVM.

AD E o affinia sunt, & v elemēta, vt facile sit augurari τὰ ἴα, id est violas cognomēto dictos fuisse antiquis flores speciosissimos quosque, præsertim vernos & coronamentis innecti solitos, vnde tot florum generibus diuersis violæ vox quasi hyolæ communis facta sit, & proinde accommodata hyacinthis, quorum purpureum Plinius ab antiquis nigras Violas vocatas meminit, propter concolorem hyanthinum siue violaceum florem, vt liquet de Theocrito, pariq; ratione putandum Dioscorideum dictum fuisse propter hyanthinam incuruamq; & pronam deorsum comam, floribus plenam purpureis, cuiusmodi deliniatur & hodiè conspicitur.

THEOCRITI & POETARVM Hyacinthus flore Iridis.

NVLVS dum scriptor neotericus videtur scitè distinxisse aut agnouisse hæc species hyacinthi: ea propter nonnulli Iridem, alii Gladiolum sequuti Palladium conieciarunt, quidam rati lugubrem illum cruorem, qui fusus humo signauerat herbas, ac desiderat esse cruor Tyrioque nitentior ostro, floris Lili formam exceperat, eadem prorsum: si non purpureus color his nempe hyacinthis, argenteus esset in illis, nimirum liliis candidis, vt Ouidius canit, rati inquam cruentos debere esse à cruore flores, Lili-um rubrum Dioscoridis, Martagon Chymistarum, Hyacinthum Ouidianum fecerunt. Atqui istum Hyacinthi Poëtici colorem esse purpureum violaceum, non phoeniceum siue puniceum, cuiusmodi in Minio, Anagallide & Martagone spectatur, ostrei Tyrii color violaceus siue hyanthinus abundè explicant, & ostentant buccina purpura, cuius fa-

cuius fanies ex violaceo tantillum rubet, vnde apud suauissimum Maronem suauè rubens hyacinthus dicitur, at Martagoni non suauiter rubent folia, sed flâmco flauente exuberâti rutilât. Et porro, *Ibera ferrugine tinctum*, cum canit Poëta, innuit colorè, quem politæ cassides igni calfactæ aut candefactæ simul ac frigescent, violaceum rubidum, nitidum contrahunt, vocant *Brunifure* Galli, de quo etiam ferrugineas Violas dixit Claudianus, neutiquam vt putarunt, funestas, aut lugubres intelligens, nam Vergilij versus contrarium indicat: *Pictus acu Chlamydè, & ferrugine clausus Ibera*. Quare vndeque aptissimè nostras Poeticus Hyacinthus studiosæ huius ætatis expectationi satisfaciet, cui nullus hætenus poterat placere, cum istum nondum norat: quique non inodo è Hyacinthorum genere est, sed etiam tantum habet cum Lilio, Iride & Gladiolo similitudinis, vt hinc faciliè sit coniectari Poëtis, Historicis, Rusticæ rei scriptoribus & alijs collatum fuisse penitus cum illis iisdem de plantis, & interdum iisdem acceptum, quod à plebecula etiamnum fieri in Iride diximus. Si enim huius florem, semen, vniuersumque caulem, & siliquam oculis Poeticis intuaris, Hyacinthum neges, Iridem dicas: sin bulbū, foliāque perpendas porracea, colorēque hyanthinum, Hyacinthum asseueres. Sed harum rerum peritus arbiter (tametsi videat Pausaniam, Palladium aliōsque scriptores ambiguis sententijs fluctuare) rei ipsius exploratione nifus, neque hyacinthum prorsum dicet, quia nonnulla reclamant, & Iridem negabit, quòd neque radix foliāue congruūt: neque tamè illi despondendum erit, quin ea potius, quam nos sæpius hinc inculcamus, moderatione & methodo expedienda Poetarum Historicorumque controuersia. Ne miseram nuperorum quorundam sattagentiam imiteris, qui adeo se torquent in delectu ex antiquis plantarum habendo, vt frustra putent ortam plantam, & ferme in Naturæ censu perditam, nisi cuipiam generi ab illis descripto, quasi sub vexillo suo possit aggregari. Atqui nos, quod Aristoteles & Theophrastus in Lapidum, Piscium, Quadrupedumque historia prodidère, hinc possumus multò verisimilius dicere, nō parum multas esse plantas ancipitis mixtæque naturæ, non secus atque hinnuli ex contrarijs aut diuersis speciebus conflati *ῥωσφύτα*, hybridæ & amphibia non pauca. Proinde cum isthec planta Iris non sit, & tamen illi atque Lilij florum elegantia ab similes non sit, quorum æmula venustate Poëtæ assimilarunt, & Palladius dixerat Iridem vel Gladiolum à foliorum similitudine vocari: sanè nobis Poëticus Hyacinthus esto, qualem in Angliæ, Flandriæque amœnioribus viretis videre passim est corollis expetitam. Disparis igitur generis duplex hyacinthus erit, Poëticus noster scilicet purpureus, cœruleus hyanthinus violaceusue ferrugineus vocatus Iridis Historicis, & Palladio, Gladioli Poëtis, & vulgò Lilij similis, qualem exactè noster exprimit: effigie nimirum Iridis aut Gladioli propior, quàm Dioscoridei hyacinthi: quare prius hinc de Gladiolo hyacinthisque spurij germanico, Anglico, Græco bino, & Autumnali, quia sint floribus stellatis & Liliaceis, mōx, que de altera Diosc. comosa specie hyacinthi dicetur.



ῥωσφύτα, GLADIO LV S.

{ Germa. Schuuertel. }
{ Gal. Glais, }

XIRIDIO seu Gladiolo aut ensiculo nomen factum à folij figura, quæ tametsi eadem propemodum sit multis plantis, vt Iridi, Xiridi, Acoro & bulbosis quibusdam, atque nonnullis etiam piscibus, tamen huic præ cæteris remansit, propterea quia propius mucronatum effigiat, striatumque liris & neruis scabris, rigidisque firmissimum, In satis frequentissimum, ea propter dictum segetalè Romanis. Caulis singularis, rectus, rotundus,

Effig. Dodo:
Histo. Fir. 144

dus, striatus, nitidus, è folijs quasi sese exerens & flores conditos deinceps habens per interualla, interdum vnico tantum & ad vnā partem versus (sic nostras Norbonensis) interdum binis ordinibus vtrinque vno, vt in Italo. Flores rutilant hilari saturaque purpura, senis & septenis foliolis constantes Liliaceis similibus vel Ornithogali, sed minus repādis aut diuulsis. Semen in folliculo rubrum Erucæ magnitudine : gemini bulbi radici sunt, quorum habitior & corpulentior interdum superior inferiori incumbit, interdumque hæc inferior maior & languidior Vere exacto iam effæta, plusculis pusillis bulbis propagatur Ornithogali modo coma fibrosa, subtus radicatur glutinosi bulbi & villosi inuolucro teguntur fusco, sapore non ingrato, acri, ad tumores strumosos & scrophulas tantę opis, vt nulla huic comparanda videatur, Recentiorum certissimis periculis factis. Arua & fata Norbonensia vero Gladiolo scatent, eoque cum Draba vulsam furculatores in proximam viam aut tramitem proijciunt.

HYACINTHVS GERMANICVS, Liliiflorus.

{ Germa. Blo Wertzzenblumen. }
{ Angli. our ladies flower. }

Hyacinth.

stellatus. Inter
fcones Fusch.

484. 483.

EGGLADIOLO & Poëtarum Hyacintho noscenda est speciosa illa planta bulbacea Germaniæ notissima, quam propter florum pusillorum colorem purpureum, & diuini diuinabant: elegantia, magnitudine plausibilior spectanti, Iridis floribus gratia is nostrum longè superat. Et reliqua illius effigiatura congruentior multò Dioscoridis Hyacintho quàm Poëtico foret, magnitudine etiam par, sed bulbi candidi, flores cærulei purpurei Asphodeli vel Ornithogali stellulis visuntur. Norbonę mōtosis arduis, Geneuę, aut Heluetiæ & Germaniæ in campestribus & iuxta sepes nascitur.

HYACINTHVS ANGLICVS.

Belgis Hyac.
Bruxellensis
Hyacinth. non
scriptus.
Dod. 167.

HVNC Anglicum nuncupare lubitum fuit, propterea quia nusquam terrarum germanosi saltus & prata vberiori scatent copia, quàm in Anglia. Magna huic cum Germanico siue Fuschiano affinitas bulbi & foliorum, sed conspicua florum discrepantia: sunt enim his oblongi calyces Iesamini vel Filij ante patrem, cærulei, cæsiue, & interdum albidum extrema ora fimbriis stellatim reflexis dehiscētes plures è cauliculo nudo pedali nitentes, & inæquali situ penduli. Semen in folliculo herbaceo atrum Nigellæ vel Cape, vt cæterorum Hyacinthorum.

HYACINTHVS AUTVMNALIS.

Dod. effig. de
florib. lib. pag.
174.

HVIS effigiaturæ minimus, sed pulchellus, quem primi omnium Autumnalis donatum nomine Antuerpiam è Veronensi agro misimus Guilielmo Driesch. Plurimum postea etiam Lutetiæ Parisiorum, Norbonæ ad Aquas Marianas, & ad Cellam nouam Monspellijs visus nobis glareosis asperis, Autumno ineunte, non Vere, vt superiores, non flosculos lagenosos edit, sed radiatos quinque senisue foliolis cæruleis Ornithogali minoribus, cætera prorsum eadem, sed minora.

HYACINTHI ORIENTALES GRÆCI.

Effigies.
Math.

ANNO 1562. Patauii primū vidimus, donoque accepimus hæc duas bulbosas, vnā cū bulbo Homerici Moly ab insignito celebri eruditionis laude Doctore Treuisano, quę tum inter se multum similes erant, tum illi Anglico non ita diuerse: è floribus tamen discernuntur, alter enim est crassiore, breuiore bulbo & flore, qui sunt veluti vtriculi violacei cærulei vel albi Anglici Hyacinthi, vel Iacæ mediæ vel albæ similes, rariores & à medio caule ad summum vsque hærent. Bulbus aliquanto crassior quàm Anglici, & Moly Homérico par.

ORIENTALIS ALTER

ALTER

ALTER verò bulbus non dissimilis septū caulem pedalem attollit, à medio totum floribus siue caliculis in speciem comæ elegantis digestis, purpureis alias albis Asphodeli Galenici, siue Ornithogalli spicati similitudine & situ. Ambæ quadriennium, quinquenniumue durarunt Antuerpiæ, quas in Belgio infosis bulbis seuissemus: in delitiis Adonidisque pensilibus horti alunt veneti.

HYACINTHVS COMOSVS Diosco.

QVAMVIS sit difficilis notiois verus Hyacinthus, tamen propterea quia coma *Neoterico. 39.* incurua floribusque plena purpureis descripsit hunc Dioscorides, Hyacinthorum classem à superiore secreuimus, vt quem putamus magis ad Diosc. Hyacinthum accedere, huicque proximè subdidimus, quia simillimus etiam est, nisi quòd illi sponte frequentius Septentrionalibus regionibus, hi Meridionalibus lubentius florent. Siquidem Italia, Norbonæ, relique etiam Gallie tepidiori abundè in fatis & viarum marginibus prouenit maior Hyacinthus, folijs porraceis, bulbi Vomitorij latioribus, in terram reflexis, caule læui albicante ex herbaceo tenero, quem à medio summo tenuis amiciunt numerosi flosculi spicatum confertimque digesti, purpurei oblongi in tantillis pedicellis vuæ gygarta aut Lauendulæ flosculos imitantibus, supernæque comosam umbellam latiusculā, circinnatam deorsum vergentem, nutantem & incuruam efficientibus, ex purpura violacea suauis rubore permixtā. Radix Cæpacea ferme quanta Narcissi, sed extimus color nitidus illi roseus dilutiore purpura, propter quē *Bulbus* *esculentus.* *Bulbina Pl.* *Pancratium* *alterū Monspel.* *Neoter 19. Dod* *170.* siue *BVLBVM ESCYLENTVM* exercitatisimi quidam Monspellienses autumabāt, alij verò *PANCRATII* speciem: quia minorem iam describendam veriolem putabant,

HYACINTHVS COMOSVS MINOR.

EST siquidem hic toti Meridiano tractui multò frequentissimus, & Septentrionalibus in hortis tantum. Vere (quum superior floret) ornat hæc planta editiora, agrorumque margines herbidos, flosculis item venustis inque comam perspicuam per versus spicatum digestis lagenulas numerosas & admodū exiles confertim aggestas, & patulas ostentantibus, vnde vulgus Prouincialium *Barreletz* vocat, quasi lagenulas: cauliculis est sesquipalmum altis, folijs Iuncea tenerioribus, sparsis, striatis.

NARCISSE.

- Medioluteus medocroceus Pœticus.*
Luteus totus Theophrasti.
Luteus Africanus, an Bulbus vomitorius?
Purpureus ceruleus.
Narbonensis Lilionarcissus luteus.
Non descripti duo Math.
Leucon arcissus siue viola alba Theoph.
Narcissus Herbaceus Plinii.
Tulipam Turcicum, siue Lilionarcissus flore rubro.
Tulipan Turcicum siue Lilionarcissus luteus.
Crocus.
Crocus syluestris Montanus flore albo.
Hermodactylus flore Purpureo, siue Ephemerū & Crocum syluest. vulgi.
Hermodactylus siue Colchicum flore albo Anglicum.
Colchicum Syriacum & Alexandrinum.
Ephemerum non venenatum Dioscoridi Liliiflorum & fridi folium.
an Tralliani, Pauli & officinarum Hermodactylo idem?
Hermodactyli albi & Rubri Nicolai, Actuarij & aliorum, non cathartici, sed cordi Venerique amici.

E.i.

Orni.

STIRPIVM aduersaria noua.

Ornithogalon candidum vulgare.
 Ornithogalon Luteum, Bulbus Vomitorius Belgarum.
 Bulbi esculenti.
 Cæpe.
 Cæpa oblonga.
 Squilla, siue Cæpa maritima.
 Pancratium maritimum Norbonense.
 Escalottes Galis.
 Cæpa Ascalonica.
 Ascalonitis.
 Porrum capitatum.
 Porrum sectile.
 Schoenoprasum.
 Ampeloprasum, seu Porrum agreste.
 Alliporrum, siue Scorodoprasum.
 Allium Sylvestre gracile.
 Allium latifolium maculosum Serpentinum.
 Allium latifolium Ursinum, siue Moly Hippocraticum.
 Moly Homericum.
 Moly.
 Lilium.
 Lilium purpureum utrumque, siue Martagon Chymistarum.
 Lilium Sylvestre siue, Hemerocallis.
 Lilium Montanum.
 Lilium Conuallium.
 Satyrion Geneuense Erythonium.
 Satyrion.
 Satyrion Erythonium Syriacum.
 Testiculi siue Orchides { Canis, cuius varietates quinque.
 { Hircinus siue Tragorchis.
 { Serapiadis, cuius varietates quatuor.
 { Odoratus minimus.
 { Palma Christi due.

Νάρκισσος NARCISSI.

{ Germa. Narzissen Kozlin.
 { Fland. Spaensche Jencetten.



EC HYACINTHO à luctu, vt diximus iam, nec Narcisso illi congeneri etiam nomen inuentum ab amente amante adolescente, vt fabulati sunt, sed à vi sopièdi, quam *νάρκωσις* vocarūt, & *νάρκη* torpedinem, quæ eminùs stupidam tangentis manum efficit, qualem inesse inimicam neruis, caputque grauante Plinius ac Plutarchus Narcisso huic affirmant. Notissimæ hodie non modò quot differentiæ apud antiquos extant, sed multò plures, quas illi non memorant, inter quas nonnullæ, quæ ab Narcissis ad Lilia degenerant.

POETICUS MEDIOCROCEUS purpureus.

VVLGATISSIMVS omnium Poëticus, cuius croceum florem videre est, foliis *medi-*
um cingentibus albis, vt scitè canit Metamorphosis, estque idem Dioscoridis Nar-
 cissus, Narbonèia Gallòque Prouinciæ prata Liliaceo Stellarū candore ornans, Februa-
 rio & Martio. Flores enim habet cādore micantes lacteo, senis foliolis radiatos, corolla
 mediū occupāte fimbriata, ex croceo purpurascēte, odore suauissimo & verè soporife-
 ro, quasi quiddā Nymphææ florū redolēte, folliculo mēbraneo ex nodulo exorto primū
 occlu-

Mediopurpu-
 reus Dod. 181.

STIRPIVM aduersaria noua.

51

occlusi in caule glabro rotundo, sed vtrinq; compresso vel friato. Semē nigrum in vtriculo mēbraneis Nigellæ, multiplici tunica bulbus cōuolutus, & cute densa obstitus Pan-cratiij marini vel Squillæ admodū simili, sed minore. Folia sunt Porracea, mucore albido plena, vti Hyacinthi, Cæpe, & Squilla. Hortis Belgicis, Germanicis & Anglicis inquilinus.

NARCISSVS MEDIO LVTEVS.

ETIAM pratis lisdem sed frequentius vberiorēque ornamento floret hic Narcissus, qui floribus est vno ex pediculo senis, denis, duodenisue sparsis minùs candidis, & circin- Dod. 183.
nato verticis calyculo in luteum languescēte, nigro foris & habitiore bulbo, crassiori-
bùsque folijs. Galloprovincia, vbi etiam sunt Gramini detrimento, *Donas* flores quos
corollis innectunt, vocitat.

TOTVS LVTEVS NARCISSVS *Montanus Theoph.*

Germanis. Vebiblumen, Hornungsblumen, & zeilosen.
Belgis. Geel Tydeloofen.
Gallis. Coquelourde.

Nec dissidet hic à Dioscorideis facie vel viribus, sed tantum floribus, quos admodum Dod. de flo 190
speciosos, luteos promit, atq; quasi duplicati forent non corona exili, sed nolæ effigie
Primulæ Veris duplo maiore, luteo atq; insigniore cristatur vtriculus, non tamē dispar,
vti nec folia aut bulbus, nisi quod graciliora, minora. Februario & Martio scætet isto fo-
rum Londini holitoriu, & nemorosa reliquæ Angliæ Belgiq; prata. Ad Meridiē regiones
propiores, vt Norbona, Vasconia, & Hispania, nō nisi editis montibus, & Maio, Iunióq;
florēt, vt in Veganiis, Mindenis Pyrenæis iugis non procul Tholosa, inodorus, inefficacior,
nec perinde narcosim inuehit.

NARCISSVS LVTEVS APHRICANVS, an Bulbus Vomitorius?

HVNC quidam chyrurgus barbitonfor triremium Genuensium ostendebat allatum
ex Bona, & Argiera, Chartaginique finitimis locis Aphricæ, planè floribus luteis lan-
guidis odoris, sed effigie Mediocrocei Narcissi Norbonensis, minoribus tamen, exilio-
ribùsque folijs & durioribus, minùs mucagineis, sed magis viticeis & sequacibus, &
fructu contumacibus, nihil alioqui vlla sui parte à Luteo dissidentibus, Non procul Aga-
thenfi sinu affirmant inueniri, etiámque ex Hispanicis nuper in Belgiam & Franciam
delatos audimus.

NARCISSVS PURPUROCOERULEVS.

QVINETIAM afferebant non postremæ fidei amici, se nactos totis floribus purpu-
reis Narcissos prope Lanum fluuium, non procul Monspellio, quos tamen nos diu
sæpèq; inibi & aliis adiectis pratensibus frustra venati sumus, aut studiosos Simplicium,
& præceptores nostros, vt indicarent, rogauius.

NORBONENSIS LILION *Narcissus Luteus Montanus Tulipa species.*

ERVVM hunc è Dei Paradisij iugis vocatis Seuena Norbonensis, iam plures sunt Dod. Tulipa
minor de floribus.
189.
anni, in Belgium deferendum curauimus amicis Antuerpianis, qui primum Tulipam
illum vocarunt, nos verò Narcissolilium luteum audaciùs fortè (vti solemus quò rerum
cognitioni distinctiori consulamus) indigitauius. Flos itidem singulo bulbo & caule
Narcissi minore, teneriore, delicatiore, vnicus luteus, senis folijs constans ad Lilium aut
potius ad Lilij lutei Asphodeli florem, filamentis luteis è medio enatis. Bulbus exilior
multò, nucleum oblongum Allij æquat, sibique sæpius adnatum allium exili filo adnex-
um habet: folia crassiora pauca è caule medio porracea.

LEUCONARCISSOLIRION *Pratense Vernum, num- VIOLA ALBA THEOPH. vel Moly Rondellerio?*

Ger. Weiss hornungsblum.

E.ij.

Hvits

H V I V S coronariæ bulbosæ triplex è floribus & magnitudine varietas, nam Norbonensis multiflora, vt cæteris maior, ita multò speciosior amceniorque floribus est: sunt *Narcif. Math:* namque lacteo Ornithogali candore, sed Lili parui effigie, è singuli caulis superioris multiplicitis nodulo vno feni vel septeni procumbentes, seménque rotundum Pœoniæ nigrum in folliculo membraneo cohibètes: folia & radices Narcissi mediolutei in pratis, vel germinosis depressis atque lacunosis scrobibus, non procul Monspellio & Magalona ad Läteranum dirutum castrum plurimus floret, seménque fœnifeciis maturat.

In Germania, Gallia & Belgia visitur idem nisi paucioribus floribus distans, quos non dissimiles, sed singulos in singulis cauliculis minoribus habet, luteaq; filamenta è medio exerentibus, semine fusco.

varietas } Omnium minimus palmari cauliculo, etiam Septentrionalibus plagis, vt Antuerpiæ & in Nortmânia frequentissimus, paucitate foliorum, quæ terna vt plurimum, vel quaterna, habet, & flore exiliore, qui vnicus illi inest herbaceus lacteolus, eoque nonnullis Plinii NARCISVS HERBACEVS putatur, quod si verum foret, verisimile esset superiorem LILIONARCISVM eiusdem album nuncupatum, Narcissum futurum: quibus cunctis nonnullæ subtus lineolæ exaratæ herbidi viridantisue coloris conspiciuntur, vnde fortè Plinio causa nominandi.

*An Narcif.
Herbaceus Pl?*

TVLIPAN TVRCICVM, siue LILIONARCISVS Sanguineus.

M V L T I sunt exacti anni cum primùm Macedonium siue Græcum Lilium istud Tulipan à Turcico vernaculo dictum propter amiculum capitis ab illis gestari solitum, cui flores similes sunt effigie, sanè quàm luculenta purpura Venetiis primùm & Pataui vidimus, deinde LVTEVM & Phœniceū flore Florentiæ, & Genuæ Lyguriæ. Bulbus est Narcissi, folia promens Liliaceo læuore virore, crassitie, aliquatùm concaua carinata & vndulatis oris, caulem verò singularem pedalem & flore Liliacea venustate spectadū, purpura sanguinea nitente Pœoniæ floribus concolori, Lilio rubro fere pari, quinis & senis foliolis crassis, obtuso calathi fundo in latius sese pādēte, veluti violæ Mariang, porrectis è medio Liliaceis staminibus. Semen Aristolochiæ clematidis foliosum angulosum, compressum mēbraneo folliculo oblōgo clauditur. Medio Vere iā floret nō modò Italis, sed etiā Belgicis & Gallicis hortis.

NARCISSI DVO A MATH: non descripti.

C V L T V R A lenociniis hanc amatoriam plantā variatis foliis, floribus & bulbis posse admodum à pristina effigie desciscere, & rumor est iamdiu apud Venetos quosdā stirpium mangones, qui inditis bulbo seminibus quibusdam, vel insertis pullulationibus, nouas & visendas excitari figuras affirmant, cuiusmodi Taraconi è Cœpa enata, aliisque, colorem, & florem, & figuram mutantibus. Eapropter consultò alias Narcissi varietates reticuius, tū quod ne visas quidem planè in memoria habemus, tum etiam quia nullū operæ pretium ducimus artis ostenta & lusus prosequi: sed dūtaxat naturæ opes in istud album sedulò digerere & perspicuè, neutiquā Senensem imitaturi, cui satis picturas, quasi puer pueris pingeret & illuderet, in numerosos sed mutos elenchos stabulare. Non solum enim nullum describit è tam multis Narcissū, sed neq; discernit eos inter se, quos bis inculcat, & an illi duo quorū alterum radice squammosa & nucleis stipata, floribus multiplicibus & foliosis: alterum veri Narcissi Bulbo, sed florū foliis prolixioribus, angustioribus,

LILIONARCISVS

Purpureus.

LVTEVS.



gustioribus, porrectioribus staminibus, nō explicat. Vbi & quando & quomodo nascatur artēne an sponte: vt nēq; Narbonenses hīc alios flores, quos etiam vt non paucos alibi, fecit Cōstantinopolitanos, iactare potuisset; etenim eius Cōstantinopolitanus Narcissus, nihil aliud esse videtur, quā Maritimū Pancratium à nobis memoratum suo loco.

CROCVS SATIVS.

ῥέονος { Ital. Zaffrano. } Gallis. & Mauris, Saffran,
 { Ger. Saffran. } Angl. Saffron.

GERMANITATIS eiusdem cum Narcissis esse Crocum docent, non modò figura & natales, sed etiam facultates peculiares, quæ vtrique epispasticæ, deinde quadamtenus odoris soporiferi insunt. Nec in Crocum versū adolescentis Croci fabella aliud Ouidius innuit, quā istam abditā dotem Veneris mysteriis celebrem, cuiusmodi Poëtica Philo-
 sophiæ sunt inuolucra, Hyacinthi, Narcissi, Daphnes & quā plurimorum transformatio-
 nes. Nam alioqui ῥέον filium, villūmue, & tramam signat, cuiusmodi sunt Croci flaua flammæque stamina, & villi & flocci quæ ῥεονίδες vocantur. Porro notissimum & optimū crocū nō solum regiones ad Meridiē Africæ, Syrena, Sycilia, & Gallia, sed etiā ad Sep-
 tētriones sitæ Anglia & Hibernia laudatissimum abūdē dant carnosiss, latis, quasq; oleo delibutis cruorēque aureo nitētibus filamentis intensi odoris cum quadam acutie, sed soporiferi, quo Belgia, Germania, aliique vicini cibos condiunt, ac medicamētis miscent. Rustici radices pangunt admodum viuaces cultūque humanum spretas, vnico hyacin-
 thi Narcissi aut Gladioli bulbo carnosio, siquidem negligantur aut pedibus proterantur florem stamināque elegantiora prodere consuetas purpureas calycis in modum, pror-
 sum Hermodactyli pratensis. Bruma, Ianuario, & Vere virent folia interdū perennia, Au-
 tumno leguntur dū nitent nutantq; purpurei phœnici staminā, quæ trita carpis aut sub māmīs admota, illitæ vires suas cordi cerebrōq; illico transmittunt, quasq; vertiginem tenebricosam inuehunt, aciem oculorū prestringunt, aut hebetant. Germinosa herbidāq; loca vult, nec apud Italos aut Gallos spōte prouenit, nisi Siluestris, qui diuersus natura est.

Inter Icones
 Fusch. 249.

CROCVS SYLVESTRIS Montanus flore albo.

SIQ; IDEM Syluestri Autumno nisi rariū, sed plurimū primo vere venit flos mi-
 nor, candidus, interdum purpureus, locis præsertim aliosiss, vbi perpetua perennat nix, vt in Ostensis vallis arduis sunt planities albicantes niue Hyberna & istius floribus pur-
 purascentes & albicantes, non procul à Bernardi monte: radix & caulis satiuo similis, fo-
 lio angustiore & breuiore. Isto foris dumtaxat vtendum, intus non perinde: illitum pubi vrinas elicit crebras atq; crassas, tumores Hydropicorū discutit, spicula euellit. Isto agre-
 sti facilius abigeret ē suis interulis pediculos gens Hibernica, nam virosior est, & pen-
 tratiōr. Verū vulgatiōr præterquam quod Hibernis miseris tam importunos hospites, quietis & famis hostes abigit, etiam colorem floridum, vegetūque calorem vigorem &
 animorū ferocitatem artubus & alit & auget, illuuiēq; sordidas vestes colore commendat, militiæ idcirco non parum conducibilis.

COLCHICVM sive STRANGVLATORIVM Ephemerum
 Crociflorum & Bulbifolium, Hermodactyli vulgares.

QVAM minimū videtur plebis iudicio Pratensis vulgaris Hermodactylus Ephemerū dictus, à Croco syluestri abesse: vocant enim & putant vbiq; vulgò Syluestrem Cro-
 cum propter flores, natales, tempūsque florendi non dissimilia. Ac tametī tum ipsæ res, tum Dioscorides diuersas esse abūdē monēt, tamen iuxta hīc ponendæ fuerunt Crocus
 & Hermodactylus, deindēq; huius vel species vel varietas Colchicum Ephemerum, quo
 ytrauis ambas ostendat quærenti. Etenim duas non ita dissimiles est complexus Dios-
 corides, vt Paulus & Galenus, ex Priscorum descriptione, & sua obseruatione: quarum primam pōst & proximē fungos collocandam duxit ille, cum quod esculenta gratāque cibo videretur, tum quia non secus ac fungi, vt idem author exprimit, disertē suffocatu
 enecaret, strangulat namque illa itidem vna diecula: vnde Theoph. huius nominis oc-
 casio profecta visa, longē ante Dioscoridis ætatē, fuit. Hæc autē non alia est quā vulgatis-
 simū plebi PRATENSE CROCVM & SYLVESRE vbiq; vocitatum. Floret namq;

Gal. Tue chien.
 Angl. wilde
 Saffron.

Effig. fusch. 201

vti Crocus Autumno flore perquam simili, cōcolore, nec dispari ritu, iamdiu antea primo Vere orta, & Æstate amittit folia quæ Porreis latiora Pancratii sunt æqualia, vel bulbi pinguiora, terna aut quaterna, virentia, nitentia ab radice, caule sesquipalmari, bulbosa, femirotunda radice, altera parte compressa Castaneæ figura, aut Anacardi: foris tunica rufescente ex fusco, ab ima latiorēque basi ad apicem canaliculum imprimit prima caulis germinatio, intus tota alba, fungosa, muccida, virosa, gustu non ingrata, quam quouis anni cardine erutam à quibusdā Pharmacopœis pro Hermodactylo habitam vidimus, & siccata, flacidam, vieta, rugosamque, tangenti partim euanidam, partim fungosam meminimus, vti & Syriacum & Alexandrinum mox describendum venetijs nobis sæpius visum, denique nigram & longè discretu facillimam ab Officinarum Hermodactylis. Sunt enim peregrini hi, neūquam exitiosi, vt multis sæculis plurimus vsus doctos docuit: inque farinam vel pollinem candidum facillimè abeunt. Nec verisimile fit, quod Colchide vberimè scatebat (vt ait Dioscorides) aliud à nostrate fuisse, sed pernecabili interimendi facultate ceteris omnibus excelluisse, tum quia succo magis excocto illic, tum etiam quia soli, aërisque prerogatiuam quandam nactus fuit. Sic fungi non paucis locis exitiosi proueniunt, & nisi lacte iisdem quibus Colchicum remedijs, euincantur, interimunt: alibi innocui passim esitantur. Sic Taxus Norbonica & Hispanica deleteria sola vmbra prodit antiquitas: in Anglia & alibi neūquam malefica. Cicutæ & alijs idem vsu venit, vt nouimus alibi. Quapropter quot qualēque varietates in radicibus, floribus, ortu & colore, alia atque alia peperit regio, tales, differētis facultatum inter Syriacum rufescentem, & Anglicum flore candidum intercedere certum nobis periculo facto fiat.

COLCHICVM SYRIACVM ALEXANDRINVM.

RADICES & bulbos aliquot huius adhuc habemus munere Dominici Chirurghi Veneti, qui quamplurimas classe triremium rediens illinc, vbi fungebatur vulnerarij officio, à se auulsas Venetias aduexit, quibus vtebatur idem, easdēque, sæpe miscebat decoctis Guaiaci, ad Luem Veneream, alijsque sudorificis magno remediōrum cōpendio & ægrorum commodo, edoctus illic à plebecula. Huic bulbosa radix non parum à nostrati differt, tamen si Dioscorides deliniationem non minùs benè refert: non enim canaliculus lateratim depressus mittit ad caulem, sed caulis erumpens mediū findit bulbum, quasique geminum Colchici bulbum ab imo coagmentatum, caulēque vtrinque amplexatum ostendit, nigriōrque nostrati euadit intus forisque, alioqui è Capacea nec dissimili fungosa concretionē, vti nec totius figura.

COLCHICVM ANGLICVM candido flore.

ISTVD nuspiam herbarijs memoratum, quia Anglia copiosissimum spontè fundit, nec alibi facilè reperias, Anglicum nuncupauimus. Perpulchra planta, lacteis floribus Ornithogali vel Asphodeli maioribus, Croci montani Syluestris paribus, caulem ornant sesquipalmarē radix & folia, alioqui pratensis vulgaris sunt, foris fusca, intus candida. Londini hortis mersæ radices Hyemē ferunt, Vere emergunt, non secus ac in collibus & montosis prope Bristoliam & agro Somersfeti, Syluosis ornatissimi armis & literis Generosi nec parū stirpium periti, D. Eduardi Samthoo, cuius humanitati, vt pleraque alia, hanc ferimus acceptam.

EPHEMERVM non venenatum. Diosc. Liliflorum. & Iridifolium an.
HERMODACTYLO Officinarum, Tralliani & Pauli idem.

VELVTI Syriacum innocuum medicamētis, alijsque non paucas plantas varijs locis diuersas aut contrarias adipisci facultates dudum in Colchico monuimus: sic ex nomenclatione deliniationēque vtriusque Ephemeris apud Dioscoridem, & perpenfione harum radicum, quas vsus diurnus diuturnusque probauit, Hermodactylum siue Ephemerum salubre, dote dumtaxat & leuiore aliqua nota, non item specie ab Officinarum hermodylo dissidere certū. Tria tamen quæ obijci possunt, partim diluenda, partim distinguenda sunt, vt saltem doceamur, si non illa quidem eadē sunt, certè admodū affinia esse

esse: Ac primum obijciat quis factam seorsim Hermodactyli & Ephemeris vtriusque mentionem apud Trallianum & Paulū: fatemur, & arbitramur eos vel quòd vires purgatrices primum in Ephemeris aliqua specie còpererint, aliam arbitratos præsertim Trallianū quē Paulus citat, non Galenū, qui Hermodactyli non meminit. Vel quia Trallianus Ephemerum non venenatum sub nomenclatura Hermodactyli in remedia arthritica adduxerit, quia in describenda radice Dioscorides digiti siue Dactyli voce vsus sit, quæ admota vel fotu dentium mulceret dolores, deprimeret tumores, quod Officinarum Hermodactyli arthriticis adeo plenè præstant, vt nullum præstantius suppetat, ex lacte præsertim subactū remedium. Quippe digerit moderatè nullo aut pusillo calore, aliquanta adstrictione, sed miti emplastica & natium calorem parti reddente. Nec si non meminit Dioscorides vis Cathartica, non ideo necessum iustificandum Ephemerum esse: non pauca siquidem reperias apud antiquos classici Simplicia, quorum vires purgatrices illi siluerunt, ne dicā fortè nec notas habuerunt, vt & alia compluria: quare si non est Ephemerum Dioscoridis noster Hermodactylus, certè non alio putarim differre modo, quàm quo Colchicum Anglicum & Syriacum. Quare ridiculè æstuant cum Comentatore Senensi plerique, atque doctis Barbaris insultant, qui Officinarum Hermodactylos purgationibus misceant, enimuero arroderi interiora, veneno petere, ac nihil aliud quàm Colchicum nimirum deleterium esse. Verum bis falluntur: & quod Colchicum hermodactylon nostrate esse dicunt, quum tamè folia non norint, quæ longè minora sunt & humi fusa, quàm vulgaris Colchici: & quia statuunt necatorium, quum Dioscorides id maleficij non cuiilibet Ephemero, sed Colchico dumtaxat, id est, in Colchide enato, adscripserit. Tum Solidæ huius candidæque radices & plenæ concretio, quantum à rugosa, vieta, languida, nostrati & nigra absit satis indicio est. Nullam videas etiam Venetijs, vel Genuæ millibus è multis quantumuis recens allatam, quæ non leuiscula tusione illicò in puluerè farinaceum fluat, colore & sapore planè Turbith, Iridis, vel Agarici, quo etiam modo nec incommodo maiore purgare norunt, qui sapius vsi sunt nostri practici, quibus vsquedum experimento certo certa ratione nixo, aliud vsurpandum, aut frustra Constantinopolitanum viribus ignotū obtruserit & persuaferit Commentator: & falsò accusarit Serapionem, qui non Pauli, sed Dioscoridis, vt liquidò constat merus versor, quæ in codice antiquo reperit, fida barbarie retulit, vt alibi semper fermè Hermodactylon explorādo gustu neutiquam feruidum, sed ignaui acrimonia pusilla, & vi obruta emplastica potius facultatis purgatricis moderatrice, quàm viceratrice, qua non parum commodum esse arthriticis purgationibus faciliè percipiant, qui medicamentorum miscendorum methodū callent. Nec enim lacte eget vt Turbith, quo minùs adhuc noxium, quare & Catharticum non respuendum, vt vociferantur de clamarores sed commendandum.

HEMODACTYLI albi, Rubri Nicolai, Actuarii & aliorum non Cathartici, sed Cordi, Veneriq, amici: an sint Behen album & Rubrum eadem?

VOCES Hermodactyli æquiocam fuisse, & Ephemero Dioscoridis còparari potuisse, nò modo Caput Pentaphylli indicat (vt cuius radix Hermodactylus sit vocata, nò tam similitudine, quàm superstitione & incantatoria expiatione) sed etiam quæ extant apud Actuarium & Nicolaum celebres admodum compositiones arguunt. Quippe Auream Alexandrinam reginam illam & Diamoscu Hermodactylo rubro & albo non carent, misceturque alijs apud Arabes compositionibus cordialibus, quibus sunt visi designasse Behen albi & Rubri nomine, quod etiam defluxisse à Dactylite palmæ fructibus, quibus confert Dioscorides Balanū nucem myristicam apud Arabes Ben vocatā. Igitur Arabistarū Hermodactylus siue sit Behen, vt verisimile sit, siue sit Auicennæ Digni Citrini Palma Christi (cuius mentio inter Orchides facta, nullum enim Hermodactylon rubrum habemus, vt cum Rubro & albo Ben confundi possit) eorum compositionibus cardiacis præsertim miscendus: Officinarum vero Catharticis & Topicis vt dictum, capite de ben & nuce Myrepfica.

ORNITHOGALON candidum vulgare.

EBULBORVM classe cum sit Ornithogalon nec ita absimilis Hyacinthis, Narcissis, & Hermodactylo superiori floribus albis, non abs re hic dicendus, vt hinc mox ad E. iiii. bulbos

Bulbos veniamus, cuius speciem faciunt quidam Ornithogalon luteum vocatum, propter inter hunc & illum ambiguam effigiem. Et tamen Ornithogalo nomē dedit lacteus florū candor, cuiusmodi in Gallinari alis renidet aut ovis, non earum lacte (quo carent volucrum genus) tamen propter totius figuræ affinitatem nobis erit etiam vocandus alius, qui flore luteo elegatissimus, nec ita frequēs Italia, Norbonę calidioribusq; visitur.

ORNITHOGALON LVTEVM.

an Bulbus Vomitorius?

Belgis Bulbus
Vomitorius.

IN Auernis & ad Lugduni pomæria pone & prope suburbium trans Rhodanum vulgo *Aiguilletiere* in campis latis & glareosis, etiāque in Borbonio agro, quā ducit regia via Lutetiam, plurimisque Belgicæ, Angliæ nemorosis Sommerfeti Ornithogalon luteum collegimus. Tota planta minor multo, sed simillima candido Ornithogalo. Martio floret, bulbus vnicus, vt plurimum Allij Scorodoprasi oblongior, inodorus, pauciora sed latiora quā Ornithogali folia: flores prorsum Ornithogali sparsi, & quidem foris herbidi, vt Ornithogali, sed luteoli non candidi, intus verò eleganti luteo nitent.

BVLBVS ESCULENTVS.

NON secus atque Asphodeli bulbi plerique omnes edi mortalium luxu & mollitie desistere, præsertim Europæis regionibus, seu fuerint gustu minis comendabiles aut viles, quā bulbacea multa, Porri, cepæ, Allia, & similia. Viscidi namq; sunt mucō Pancratij omnes ferme quos nouimus, & plerisque insulsi & magis excipiendo condimēta, vt hyacinthi multi, Galenicus Asphodelus, quā ad condiendum apti. Quando igitur ex Dioscoride coniectari magis, quā asseuerare quicquam licet, videntur bulbi esculentis fuisse capis aut Pancratiis simillimi, & præstantiores rufsi, acres, locis calidis oriundi, vt sunt Lybica littora vel Norbonica. Afcalonium tamen vix est Cape, nam nec rufsum vt plurimum, nec acre, saltem vbi nos sæpius esitauimus Lutetiæ & in Flandria, fieri tæpote, vt Afcalonę fuerit acrius, rufsius & maius.

Bulbus ille rubida foris tunica, quem Hyacinthum fecimus, alias putauimus persuasi à doctissimis Monspelliensibus esse esculentum bulbum: quemadmodum hodie nonnulli luteum Ornithogalon nostrum Vomitorium Bulbum credunt.

(AEP E.

{ Ita. Cipole. } { Angl. onion. Belg. ayeuyn.
{ Ger. zwibel. } { Gal. oignon.

Fusch. Ico: 242. BVLBORVM, quantum vsipiam est in naturæ ditione, speciosissima & notissima Capa, vel de Græca appellatione *νεόμυρος* dicentē, quia oculorum tunicam pupillamque & folliculos mordaci vapore lancinando, conuiuere, contrahiq; cogat, lachrymas eliciēdo, vnde Latinis lachrymosa Capa. Etiamnum hodie varietas è locis, colore, magnitudine, acrimonia, teneritudine, variōque mangonio petenda, ferme cuiusmodi Theophrasti & Dioscoridis æuo. Verū non necesse habemus persequi plures, quā quot hodie nouimus insigniores & digniores vel esu vel fama, quibus cuius olitori quasilibet alias addere integrum per nos erit.

Suauitate & mole omnibus Italicis vel Gallicis, quas nouimus, excellunt Aphricæ ac Hispanicæ, & Hispanicis maiores atque speciosiores Diui Altomari in Gallobelgia fatiuræ, quibus prima commendatio, & magnitudo capitis exuberantis, compressæ vtrinque rotunditatis rapam non mediocrem æquantis. Squāmōsa cuticula, extimisque tunicis sanguineo saturo colore rubentibus nitentibus, & nihilo secius esui Flandriæ, & Angliæ cunctę, aliisque Sepentrionalibus expetitur: ad quas tamen gentes asportatur quotannis Hispanicę nō minore copia, aut comédatione quæ partim albæ, partim purpurascētes, gustuq; aliquātō acriores, pares teneritudine & mole, cibis & cōdimentis quā medicamētis aptiores. Cæterarum omniumq; nuspiam non gentium in Italiæ Hetruria, Germania, Anglia, Gallia vasconia prouentus plurimus hortis olitoribus venit, & vt quæque ad harum bonitatem proximē accedit, ita optima habenda. Omnibus eadem facultas incidendi, & lachrymas ciendi, non odor insuauis, sed vapor & sapor intentior, aut

aut mitior nonnullis, quemadmodū MAIOR & MINOR BVLBVS OBLONGVS teres, orbiculatus, & turbinatus quibusdā plurimus verò & cōmunioribus capis à caulis ceruice sensim in cōpressam latiore, sed à lateribus reductam vtrinq; circumferentiam bulbaceam abeuntibus, quorū Bulbi vmboni fibrarum numerosa comia aptata subest, Hellebori albi modo, quod Capis omnibus cō mune, vti folia Porreacea cōcaua glabra, nitēsq; caulis vacuus, & flos in cumulo villosa purpurascēte, semine copioso nigro Nigellæ.

Σκίλλα

SCILLA, siue
CAEPA Marina.
PANCRATIVM.

Ang. Sea onions.
Germa. Meerzwibel.
Hisp. Cebolla albatrana.
Gall. Oignon marin.

CÆPACEO generi tantopere est cōpar Scilla, vt multi eam MARINAM CÆPAM vocēt. Quia autem inter hanc & marinū testaceū piscem à tunicea squammarum cō-
pactili serie Squillam vocatum, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic dicta. Po-
tuit etiam à fabuletis maritimis Sole torridis, cuiusmodi sunt in Hispania & prope aridæ
Lusitaniæ tesqua maritima. Huius duas differentias colore dumtaxat inter Hispanicas tā
multas animaduertere est, quarum extimæ tunicæ vni rubent, vt Capis oblongis, alteri
albēt, magnitudine pares. Vtrius maxima Pomū Assyrium nō superat: è tam multis autē
millibus, quæ quotannis tum Venetias, tum Antuerpiam deuehuntur, nullam memini-
mus maiorem, ea quæ sata & perbellè adulta fuit Monspellū in horto Iacob Farges
Pharmacopœi. Vniuersa namque folii carina vel dorsum palmum fermè lata, pedem alta,
crassitudo minor quam Aloes, crebra è bulbo pullulant squammatim compacta, caulis
sesquicubitalis, gracilis, flosculos Fragariæ gerit similes sed minores, in spicam postre-
mo deficiens.

Englb. Ico: 453

Neutiquam mirum Mathiolum, post alios neotericos nuperos, sententiam de Scilla mutasse, cum nunquam sibi genuinam visam, sed tantum verbis depictā fateatur. Quin-
etiam si verum Pancratium vidisset, nunquam pro illo speciem Scillæ, aut potius vietam
plantulam aut adulescentem, cuiusmodi Venetiis veneunt, subdidisset. Et foliorū gra-
cilitas, à qua se deceptum conqueritur, sanè non aliam speciem constituit Scillæ: sed tantū
cōtingit habitiora & maiora adulescere folia, mutatione cœli, soli & cultu. Sic Capis e-
uenit angusto interiecto tractu, sic in foliis Aloes & aliis multis obseruatur. His verò bul-
bis flores, folia, omnia prorsum similia, aliquanto dumtaxat graciliora, vt bulbaceis mul-
tis præproperè enatis & aliō transplantatis euenit. In cōtignatione suspensæ, dum sabulo
merguntur, aut feruantur languidiora promunt folia, & succo seu pabulo cōsueti de-
fraudentur, exiliorāq; fiunt. Ratio par in Scillis tuis pusillis, quas Pancratium astruebas.

PANCRATIVM MARINVM.

V T Panaces doloribus placandis, sic ad cun-
ctos morbos affectus profligandos pro-
mittit auxiliū benè ominata nomēclatura Pan-
cratii, quæ tamen Scillæ species maritimūsq; bul-
bus est. Siquidem plurimū toto littore illo, ab
Aquis Marianis ad vsque Norbonæ vrbs mari-
tima, sapius vidimus & eruimus. Radix Scillæ
cū maxima, quanta maximi Lilii aut Arancii vel
Limonij, cortice Capæ obiecta pullo, intus can-
dida Scillæ modo. Sabulo arido vndis alluto
mersa sesquipalmum altè, folia septena vel octo-
na indidè erumpunt, rigidula surrecta, latitu-
dine & crassitie Iridis ferè, nigriora, summis
retusa non acuta. Caulis cubitalis crassitie Af-
phodeli, sed tenerior, qui extremo flores ter-
nos quaternosue cādidos Liliaceos narcissi lutei
modo promit, qui defluentes relinquūt filiquam



oblon-

oblongā, Aristolochiæ Clematidis similitudine, & semine compresso, sed nigro. Radices his omnibus albæ, non rubræ, quod accidit regionis situ & Superum aspectu, ut in floribus Rhododendri, foliis Cyclaminis, vitis, Caulibus, Atriplicibus, Betis, bulbis, Cæpis, & Scillis istis Hispanicis, ut Pharmacopœi Antuerpienses satis norunt. Littoris incolæ piscatores & prædones raptu interdum victitantes, rati hanc esse Cæpe, voratam ex sale & pane, quamuis famelici, hanc nauseabant.

ASCALONITIDES, antiquorum Escalottes Gallici.

ESCALOTTAS Gallicas, quas antiquorum Ascalonitides siue Palestinas cæpas arbitramur, peculiarem quandam naturam vel figuram habent, ut etiam Theophrastus monet, siquidem ancipitis & dubiæ naturæ inter cæpam, Allium & Porrum, similiores tamen cæpis, sed multo minores sunt, & crudi in lentaculis lautiores frequentioresque: capropter francigenæ *Appetis*, vocitant, quia edendi cupiditatem reuocent. **SETANIVS** Bulbus. fortè **SETANIVS**, quem Theoph. & Plin. Cæpe genus quoddam testantur.

SCHOENOPRASON.

{ Belgis. *bieslooch*.
{ Ger. *Sintzenlauch*, non *Brisslauch*, quod est sectile.

IUNCÆ ailla, quam perperam Commentator Theophrasti Ascalonitidem siue Palestinam dicit, minima sesquipalmū alta est, pusillis Porraceis bulbis oblongis sectilibus simul coherentibus & implexis pullulat, & sata fasciatim magno semper stipatu capitulorum Allij vrsini modo prouenit in hortis vbiq̃ue, adeoque porrum effigiat, ut quibusdam veri Porri non solum vicem expleat, sed opinionem faciat, flore perpusillo Iunci vel cæpe. Crudæ huius folia acetariis gustum gratissimum addūt. Bulbuli, qui exutis tunicis, vnioues imitantur, videntur apud Gallos nomen fecisse cæteris cæpis, quas illi *Oignons* vocant Germani *Bieslauch*, quasi Iuncum Allium vel Porrum.

PORRVM CAPITATVM & SECTILE.

{ Angl. *Leke*.
{ Ger. *Lauch*.
{ Gal. *Porreau*.
{ Belg. *Paraye*.

PRASIVM à colore dictum Græcè, & Latine porrum à callosa Porri capitis simillima in ossibus ferruminatis concretionem coniectamur. Non modò est hic bulbus Cæpacea affinitate, sed etiam cæpe, tunicarū inuolucris demptis, interius capitulum cor vocatum refert: nec foliis, floribus, caule, aut semine, quod tamen est pullum, differunt. Sapor idem & facultas, sed mitior calor, esus in olere frequens vbiuis.

Holitorum industria in CAPITATVM & SECTILE diuisit: istud Capitatum porrum vocans: illud quod sæpius ad culinaria iuscula detundi solitum esset, Sectium vel tunfile dixit.

SCORODOPRASON, siue ALLIPORRVM.

VT vocabulo sic effigie Porri atque Allij mixtam plātam signat Scorodoprason, quod sanè non admodum abludit ab Ampeloprafo vel natalibus, vel facultatibus & lineamentis, magis tamen spirat allium: sed exprimit propius Porrum, ni memoria labat, quod in cliuosis vinetis & incultis ericetis Lygurum, Nicæque Sabaudia spontè natum meminimus.

ALLIUM

STIRPVM aduersaria noua.

59

ALLIUM Satium vel domesticum.

{ *Anglicè, Garlicke.*
Germa. Garten Knoblauch.

KORODON adèd nobilitarunt odor, sapor, esus, virèsq̃ue medicatæ, vt nulli non *Fusch effig. 428.*
Sfuerit semper notissimum. Vibrat namque halitum quendâ ætuoſum, atq; tædiosam
 acrimoniâ faucibus inurit, edendo: vaporèſque excrementitios ad cutem pellendo *Pan-*
diculationes vescentibus mouet, quas Græci ideo *Σχοδανισμός* indèque Scordiô voca-
 runt. E Cæpæo genere, cui accensetur, facilis dignotio: etenim gramineû cæpæeû fo-
 lium, flos & semen in caule inani, tereti, bulbus exilior emittitur, foris dilutè purpurâti-
 bus membraneis cuticulis, nucleos multos vnâ coactos spicatinque coagmêtatos inuo-
 luentibus, è quorum medio vertice fibræ tortiles & graciles porriguntur terræq; infe-
 runtur.

ALLIUM SYLVESTRE tenuifolium.

{ *Germa. Wilder Knoblauch.*
Angl. wilde Garlicke.

FRIGIDIS calidissue pratis, macilentis & aruis Syluestre passim oritur inuisum alicu-
 bi, vt in Brabantia & Francia colonis, quia segeti innatum tritico prauum odorem
 & saporem cômunicat, quo deinceps tum farina, tum panes imbuuntur. Pufillus, oblon- *Fusch. 129.*
 gus bulbus, non ex nucleis constans, sed vnico læuique capitulo, nonnullis interdum
 adnatis minoribus sese propagante: Iuncea pauca foliola in gracili, tenui, pedali cau-
 le: flore & semine cæteris non dispari.

ALLIUM VRSINUM Latifolium, siue
Moly Hippocraticum.

{ *German. Wald Knoblauch.*
Angli. Ramslins.

NORBONÆ in editis syluosis, Franciæ verò & Angliæ vmbrosis vel vdis pratenſibus *Inter Icones Fusch. 431.*
 frequentissimum, magis tamen odore quàm habitu præferens Vrsinum Allium
 vocatum, quare Moly Hippocratico suffecimus, Liliî cõualliû vocati est fermè foliis, mi-
 noribus, viridantibus, flaccidis, politis in tenellis caulibus, Hyacinthi minoribus. Flores
 lactei, stellati complures Ornithogali vel Asphodeli, bulbus aliquot nucleolis oblon-
 gis sparsis candicans odorem Allii tædiosum spirat, gustantique saporem acrem, non in-
 gratum præbet. Vires Theriacales & imminentium morborum hostes inibi diximus.

ALLIUM LATIFOLIUM MACULOSUM
siue Serpentinum. OPHIOSCORODON.

ORTV & habitu non ita huic absimile, Ophioscorodon dictum à caule, foliisq; Ser-
 pentariæ modo maculosis, quæ tamen proximè Vrsinum deliniant & redolent: ra-
 dicis ceruice longiore, rimosa cute obsita, montosis oriunda.

MOLY DIOSCORIDEVM PVTATVM.

MOLLIRE, amoliri aut propellere morbos origine Græca τὸ μάλειν τὰς νόσους di-
 cebant antiqui, vnde μάλυ vocabulû Superûm nutu & ritu Deorum inditum plan-
 tæ Poëtæ canunt: *Moly vocant superi, radice nigra tenetur.* Verùm illud non vni, sed pluri-
 bus postea accommodarunt plantis, vt insigni quopiam odore, vigore, & figura, non ita
 dissimili, donatis, vt Rutæ Harmalan, siue syluestri, cui radix nigra, flos candidus autore
 Dioscoride. Peculiare tamen fuisse certum est plantæ bulbosæ, Alliiq; similitiori, indicio
 est μάλυζα, quæ Hippocra. Galeno explicante, aliisque Græcis Allii caput, est & antiqui-
 tûs celebris ad venenata, adeoque fascinationes, non secus ac Moly, cui fortè nomê mu-
 tuatû est: nam Dioscorides inquit habere quippiam in cacumine Allii figura, præter re-
 liquam

liquam similitudinem, qualis videtur ea quā Itali patauini & Bononienses iamdiu, nunc etiam Belgæ geminā Moly speciem alunt, cui bulbus exiguus, oblongus ferme Porri albicans, Triticeis aut Gramineis foliis, flos in cauliculis cubitum altis lacteus Ornithogali aut allij vrsini æmulus, semen in filiqua, istud Dioscoridis faciunt.

M O L Y Liliflorum Homericum fortè.

H O M E R I C V M verò putant alterū quod bulbo donatur, Narcissū, Capēne Ascaloniticum æquans. Folia illi Porri vel Pancratij minora septena octonāue : caulis sesquicubitalis aut bicubitalis : flos candidus & Lilij figura, sed minor : hisce nos donarat Treuisanus Patauinus Doctor.

H I P P O C R A T I S Moly in Allio Vrsino.

Angl.
Hammons.

A N Sit allium Vrsinum Hippocratis Moly, cuiusmodi Galenus interpretatus videtur, haud certum est, certum est tamē mulierculis Anglis, ineunte præsertim Vere frequēs esitari & quasi amuletum non modò corporis aduersæ valetudinis, sed etiam fascinationis auerruncandæ auertendæque causâ præsumi, tametsi intinctibus non vulgarem inuit cum plebecula gratiam.

L I L I V M C A N D I D V M.

ῥέγιον

{ Ital. Giglio.
Gallis. lis blanc.
Ger. Silgen seu lilgep.
Hispa. Lario blanco.

E X I M I V M florum par & ἄνθος ἁνθῶς vt Græci dicunt, Rosa & Lilium, quod etiam cecinere Veneris gaudiū voluptuæ & Iunonis Rosam : vt è cuius lacte effuso Galaxia via siue lactea in æthere, Lilij aut flos sidereo candore uifendus in tellure diuinam duxerint originem, cuius indicium esse perennem illam ῥοιπῆ effluuiūmue, diuini, quem halant, odoris, vnde Rosæ vox & ῥέγιον suaue, blandum aut concupitum sonat, compluresque flores & bulbaceas herbas notat, vt Narcissos, hoc tamen nomine signatur perquam nobilis flos Francigenis sceptris auspicatissimum Symbolum, intaminati candoris fulgens honoribus, sapientis Solomonis folio insidentis gloria magis conspicuus. Recto namque caule & erecto Hastulæ Regiæ, bulbo nucleolis squamatin compacto, floribus concolore. Folia pallido virore nitentia, carnosa, secundum longitudinem striolas habentia, rotundus caulis cubitalis in cuius summitate Asphodeli flores aut Croci, sed maiores, candidi, odorati, senis vt plurimum foliolis dispositi repandis, effigiem quasi filii vel nolæ exprimētibus, fibræ è medio Croceæue stamina educūt, vt in Colchico : vniuersa planta mucagineo turgēt succo, immensi tota commodi medici, estque vna è bulbaceis notissima.

L I L I V M Purpureum utrumque, siue Chymistarum Martagon.

{ Ital. Giglio Rosso.
Gal. Lis orangè.

C O L O R E S Lilio candido quæsitos mangonio fuisse & si ex Rei Rusticæ scriptoribus Plinius asseueret, tamen purpurei lilij duo genera spontè non arte oriri cum Dioscoride quàm plurimi montes hodie testantur. Verum nihil ab illo prorsum disidere videntur nisi angustioribus, longis, obscuriùsque ruentibus, & numerosioribus, quibus donantur foliis. Nec flores dispare a candidis, sed hilari in flauum coruscant purpura, nonnullis rubiginosis maculis aspersi & lineolis intus nonnullis inscripti, vt in iride : bulbi etiam similes, sed luteoli aut pallentes.

L I L I V M Purpureum minus.

MINOR

E ADEM fermè, sed minor, minorique elegantiâ hæc purpurea planta, paucioribus floribus, Lilij diuisura, & bulbis iisdem, infra, supraque quos appenduntur fibræ plusculæ.

LILIVM MONTANVM.

R ADICE ac bulbo haud absimili Lilium frequens montibus oriundum, sed caulis procerior, quàm Purpurei lilij minoris: è geniculis folia exerens stellatim Gentianellæ magnitudine & figura Lilij, purpurei item flores vel asphodeli, sed ad extrema pediculi apiculis reflexi, vt in Cyclamine. Color ferrugineus, pusillis variis notulis, purpureis staminibus concoloribus foras prodeuntibus, & reflexis deorsum.

HEMEROCALLIS, sine Sylvestre Lilium.

{ Ital. Giglio saluatico.

{ Gal. Lis sauuage.

S I cui libet accuratius expendere Lilium & Hemerocallidem, certò constabit nihil aliud quàm illius speciem esse hanc, quâ idcirco Sylvestre Liliū, seu Coronariū vocarunt, liliique vires easdem fermè omnes illi reddidit Dioscorides: quini valdè verisimile fit, quod Lilium Purpureum in Syria oriri auditione acceperat, vnum saltem ex hisce tribus hinc descriptis fuisse. Nulla igitur magis accedit Lilio aut Hemerocallidi Sylvestri, quàm primum illud Puniceum, seu Phœniceum, purpureūmque, cuius etiam bulbos eadē posse, quæ Dioscorides vult, scimus: idque vocitarūt meritò *BVLBVM CRVENTVM*, flore Liliaceo & Purpureo Hippocratis, eoque vtendum non pallidum valdè, sed ochreū, cuiusmodi videmus in Ochra saturati lutei, quæ purpureæ aut phœniceæ Anagallidis colore visitur. Hinc sedulitas & candor Commentatoris Senensis, quantus fuerit, meminisse iuuabit, qui vocis huius ignarus, plausui magis, quàm cognitioni verè studēs, phœniceum Lilium valdè alioquin notū, dicit esse colore perquam pallidō, Dioscoride falsò teste adducto. Equis color est perquā pallidus, nisi sit albus, cui proximus palles aut pallidus? Leuiusculi momenti est argutatio illa de appendiculis & florū numero, quæ nonnulli desiderare videntur. Sed si quis animaduertat Lilium candidum interdum exortus istos facere, in quibus cōplures flores congesti interdum singuli sunt, non magno opere refragabitur. Caterum folia quod longè plura purpureo isti inesse dicunt, id accedere cultu verisimile fit: quippe purpureo vtriuis & montano multò pauciora sunt. Eoque si cui horū vtrumuis magis pro Hemerocallide allubescit, per nos liceat sane. Istud tamē postremū montanū nolim Liliū coronariū, aut Hemerocallidē sancire, quia nescio quid tetri aut virosi halat. Quod huius vero florē Atheni cōiuiæ tabescere Sole cadēte & rursus oriente pullulare dixerint, sic accipiendū: non quidē prorsum marcescere aut defluere, sed occurru humentis noctis & frigidiusculæ contrahi collabique in sese flores, qui proxima luce & radiis Solis collustrati, explicantur, & quasi reuiuiscunt, veluti Tragopogo, Solisquisi & Heliotropiis cæteris accidit.

LILIVM CONVALLIVM, vel vernum Theoph.

{ Germanis. Weibluemlin.

{ Gallis. Grand mugnet.

I TIDEM hanc peramœnam aspectu & odore pusillam herbā antiquis Græcis indictā, Lilium Conuallium vocauit recentior ætas, putaruntque quidam Lilium inter spinas memoratum in Salomone, propter folia, suauissimum odorē, etiamque florem Lilij, qui niueus, pulchellus, Lilij similis quadatenus, & odore suauissimus, Maio præsertim inter fenticosā nemorum, vmbrosāque conualliū emicat, eoque Germana plebs vocat *Weienris*; Prodeūt è caule palmū alto exiles medio summo tenus in pedicellis nolæ Cytinī ue pusilli, penduli, niuei, in summa ora crenati, relinquētes bacculas rubellas minores nō dissimiles Asparagi, duriusculas, amaras. Folia lilij, Allij vrsini, aut Satyrii læuore viridātia, bina aut terna: radices reptant exiles, geniculatæ. Hortisque nota & expetita planta

F.i.

pari

pari nomine & commendatione, eoque nos inter Lilia inseruimus, quando alicubi conuenientiùs non potuimus.

TESTICVLI, siue ORCHIDES.

CYNOSORCHIS.

Ital. Testicolo di cane.

Hisp. Coyon de perro.

Ger. Knaben Frant.

Gall. Couillon de chien.

EAD E M in generis tribu cum bulbis, Capaceis, Hyacinthis & aliis plerisque reponenda Testiculi differentia atque Satyrii, quae longè plures sunt, quam quot priscis memorata: omnesque ab effigie radices Orchis, ab effectu nonnullae Satyriae vocatae, quod Veneris incentiui essent praeter ceteris bulbis, uti postea apud Latinos Plinium & Apuleium Veneri dicerentur: e radice tamen bulbo inita est distinctio. Vnicus namque bulbus Satyrii est, geminus vel didymi specie orchidi, quorum Caninus, vulpinus, & Hircinus sunt & insigniores indidè petita varietates. Opacis, filuosis, & sabulosis, vdisque pratis passim peruiæ. Cynosorchis varietas multiplex: omnium notissimus magnitudine, in pratis frequentissimus riguis primo pullulatu speciem Ellebori erumpentis, vel Colchici, deinde Lili couallii, aut vulgaris folia exerit terna & quaterna, lenta, crassa, & mucosè turgentia. Caulem vero sesquipedem longum, glabrum, nitidum cauum in summo, spicato flore conspicuum, odoratum, purpureum, maculis albicantibus, atque pullis variegatum. Radix geminis constat bulbis effigie testiculorum, quos quasi pubes supernè multae ambiunt fibrae, quibus, non secus atque ipsa planta superior, bulbi alimoniam adipiscuntur, & alternis perennem: alteri nempe iam flaccido & vacuo, altero succedente turgido & succi viscosi limpidi pleno albuminis oui, quasi foret semen genitale, magnitudo quanta maior dactylus, interdum nucis inglandis adulto: vieta verò, & rugoso multò minor & situs inferior. Dulcis sapor, mucagineus, emplasticus, infusus, color candidus, pellucidus.

Discrimen huius & varietas obseruatur in magnitudine & foliorum numero, quod non magni est momenti ad obseruandum & cognoscendum: aliquanto maioris istud, & euidetioris: aliud est foliis maculatis & paucioribus longioribus neruulis: vnde maculatu vocis licet ceterae distinctiones obscurae nisi exercitatis, nec ita utique constantes sunt, ut certum quid genericae differentiae statui queat. Colore nepe remissiore, dilutiore, vegetiore, mixto variegato, nitente, languido, paulum quid distantibus item testiculis & foliis, primum Cynosorchin intuenti offerentibus, iisdem natalibus Sole Geminos ingressuro florèt omnes.

TESTICVLVS Hircinus, seu Tragorchis & leporis testiculus.

AD commodiorem notionem vnam e summis differentiis constituit testiculus Hircum olens & spirillis aruncis barbâ caprillâ ementiens. Iisdem locis exit foliis pluribus, & itidem liliaceis amplexatis imò pedalem caulem, leuè à medio summo tenus, perpulchra serie florum spicatum vtriculis vel galeatis floribus, qui dehiscences caudicellam singuli singulâ purpureis distinctam punctis, cuncti Hircinae barbae aruncos cirròsue effigiantes, obtinent: odore graui & viroso: semine pusillo in capsulis, haec huius vnica differentia.

VULPINI TESTICVLI.

AT quadruplicem vulpinum testiculum meminimus e floribus questum: Papilionis nempe, fuci, muscae, postremi e colore qui luteus totus & ceteris rarior multo nec descriptus. Eruimus hunc Norbonae aestuosis & aridis sterilibus, decliuibus inter Cistum mare & Illicem Cocciferâ, prope specum vastam, quae redeunt Frontignana MonsPELLIUM laeta est: etiamque in herbidis aridis Gramuntiae syluae vicinis. Istis verò minor, qui foliis paucioribus binis nepe aut ternis caule spithameum imò ambientibus, summum floribus luteo fuluis paucis Afilonem aut potius Fucum colore & effigie praeseferentibus: exigui subsunt bini testiculi.

HVC persimiles duo sunt, quorum vnus est magnitudine ferè par floribus muscam, sed colore rubiginoso, obsoletoque; & inamœna fuscedine purpurascète, exprimentibus.

STIRPVM aduersaria noua. 63

ALTER maioribus, latioribus foliis Phalangineis, venosis, repandis, reflexis: caule interdum palmari, interdum sesquipalmm alto, nonnihil purpureo: floribus colore ita aspectu fædo non dissimilibus.

Discernitur facillimè postremis foliis latiusculis, & toto caule appressis, floribus Papilionibus volantes, aliusue pafsis se libantes æmulantibus.

TESTICVLVS ODORATVS.

MINIMVS omnium sabulosus, arentibus, atq; squallidis locis Norbonæ maritimis & Angliæ mediterraneis nascitur: folia exerit breuia, pusilla & subpallida, venosa vnâ collecta minoris Plantaginis: cauliculum palmarem, gracilem & flosculis odore Lilij conualliũ & involutæ modũ claniculatim caulẽ ambrientes: Bulbi pusilli, vt superioris.

PALMÆ duæ Christiades.

SERAPIADES.

HIS cæccacenset Triorchim Serapiada Egineta (addere enim tertiam quandam videtur) terno donatum didymo, quem alias Palmam Christi opinabamur: tum quia succulenta minùs, siccioreq; est, & vehementer deterget intro, forisq; vlceribus admota: tum etiam quòd Melancholicis, Quartanariis, Epilepticis, neruorum offarctu & pituitosa saburra oppressis miram præstet opem, fluxum dysentericum sistat, quot qualisq; Palmæ Christi recentiores vindicant (ne cuiquã imponat Palmæ Christi vehemēt purgātis homonymia) dignandas sanè Ægyptiis Veneradæ Serapiadis deæ Augusto cognomine: alio quin nihil attinuit à cæteris secreteuissæ, & Serapiadas nuncupasse. Rationibus hisce fauebat ex lectione coniectura, nam vbi πολύκερον multi vsus, legendum πολύριζον multifidam radicem: & fortè vtrumque, multifidum multique vsus radicem innuebat, & mox inferius vbi Diosco. ῥίζα δὲ ὑπὲρ τὸν ὀφθαλμὸν ὀμολα id est, Radix subest testicellis similis aut pusillis testiculis, legebam multifida, leuiore methathesi multò, quã in superiore capite, vbi pro olea suffecerunt meritò quidã Squillam teneram pancratiũ. Verum tamen si cui hæc minus allubescant Serapiades, exploret superiorum Orchium facultates, quæ multò tamen ignauiores & mucore elumbes magis videntur, aut alias aptiores adducat, & lubenter vtrò indictas istas palmatas antiquis profitebimur.


Herbidos pratenſesq; colles frigidiores amant tum minor tũ maior, legimus etiam in alpinis Rauisburgi & Nozoreti Germaniæ. Maio flore & foliis exit: maior foliis similibus, sed latioribus porri mucronatis, ad terrã reflexis, crassis, interdũ maculatis, fuscis, & nigricantibus notulis: flores purpurascens cynosorchis adeò similes sunt, vt nisi propriis spectes easdem putes. Radici itẽ geminus est bulbus, altero euanido, altero pregnãte & succulento, vtroque tamen oblongiore, nonnihil compresso, & ima sui parte in fibras inæquales ternas aut quaternas veluti digitatas abeunte. Hunc marem apellant.

FÆMINA verò floribus candidis, vel è purpura rubentibus, dilutè caruleis cuculatis crebriores maculas purpureas, & rictum ostentantes habentibus: foliis minoribus & inspersis punctulis: radice consimili.

MINOR ORCHIS ODORATVS.

HVS suauem efflant odorẽ flores mucrone spicati, purpurei amaranthi, qui foliis angustioribus, porraceis, vel croceis, caule palmari & leui, radicibus minoribus dumtaxat differt, vtraque radix orchin odorem & saporem dat gustanti, & Dioscoridi ad eadem facit, minùs tamen modeste facit Senensis, qui hærentibus aut inficiantibus citrinos Digtos Auicennæ esse hæc Monachis conuiciatur, nullamq; allatam rationem cõqueritur: cum ipse nè vmbram quidem adferat vllius. Et vires Digni citrini huic asserit, magno incommodo eorũ, qui fidem forent sequuturi: Citrini verò fuẽre Hermodactyli, vt nomen & color docent.

ERYTHRONIUM.

NON multis ab hinc annis innotuit bulbus perelegans, cui amici nostri Satyrion nomen fecerunt, is consultis Medicæ materiæ Lugdunensibus, qui condendum curassent, & exploratum habuissent, visus est Dioscor. genuinus: multo quidē periculo factō cōdita multam copiā Lutetiam, aliāsque Galliæ vrbes asportatā scimus, nulla interim desiderata nota præterquā coloris, qui valdē variat loci varietate, vt in Squilla, Cæpis & aliis bulbaceis videre est. Alij vrsini, aut Lilij similia folia bina, plurimum terna in humum deuexa, minora: caulem tenellum palmum altum, nudum humi foliis tenus mersum & Cyclaminis modo pediculum porrigentē exilem, flexilem: florē Croci vel Lilij, radium ex albo purpurascētē: radix dactylū æquat & as-

similat, Orchidis concolor, cui nonnullæ fibrillæ appensæ sunt, & pusillus semirotondus compressus bulbus exiguus lateri imo hæret, aut subest, vt in gladioli radice videre est. Lugduni florebat Aprili in horto Valerandi Donreæ è Iura monte cuius sedulitate primum nobis innotuit, eruta Alpibus Lemano finitimis: & postea in collibus Taurinensibus Padosequileucam disitis, eandem eruiimus.

SATYRION ERYTHRONIUM.

DVm essemus venetiis, superioribus annis, vidimus nō semel in Angeli Symbolo Alberti Martinelli officina, radices subrotundas, magnas rugoso tuberosas; cortice ex fusco rubello, effigiē & magnitudinē Cyclaminis vel potiùs Aristolochiæ rotundæ & prægrandis assequutas, carne intus albida eduli, dulci & Bulbocastano bunio dicto adeo accedente, vt eadem, nimirum solo latiorē & peregrino enutritam, suspicaremur. Sed illicò Martinellus aliquot missas Alepo Syriæ à fratre Cequino, qui vt erat explorator nō minùs audus, quàm peritus exoticarū stirpiū, Erythronium Satyrion iudicabat. Harum vnā celebris ille Leo Scamnidicus magnus. Marci fori Veneti tympanum, popularis philosophiæ, cuius nec imperitus, nec parū studiosus fuit, amans aluit aliquādiu, cuius foliola minùs prodere audemus, quia parū meminimus. Earundē Iacobo Cortusio alteram dedit idē Phamacopoeus, quā multò pōst, quasi nunquā vidissemus, munificus ille Patavinus ostentabat nobis, & penē inuitis risum excutiebat, qui diceret se manibus dumtaxat atrectando totum turgere Venereis libidinibus. Hanc ipsam Mathiolo postea misit, non Cequinus, vt audiuius. Is solitus namque fuit etiam minùs peritis quantum poterat, plenē descriptiones addere rebus peregrinis, quæ in Mathiolo nullę nisi radicis sunt.





ACTENVS comparando quot potuimus plantarum genera, quarum effigies & naturæ ordinis consequutione ita sibi mutuo hæreret, vt & facillimè noscerentur, & memoriæ mandarètur, à Gramineis, Segetibus, Harundinibus ad Acoros, Irides, Cyperos, hincq; Asphodelos bulborum tuniceorū Capaceorū-

ne naturam præteruecti sumus. Ac eorū quidem maximæ partifolia consimilia, vniusmodi mucronata, angusta, rigida, nec vsquam intercisæ erant, iam verò supersunt alia τῶν κεφαλίδωνται sue latinis capitatorum illisque consimilium genera, vt plurimum sinuata & laciniosa, quæ ipsa & quia holera maxima ex parte sunt, & cuilibet ad cognoscendū in oculis, ad vescendum in cibis quotidie sunt, non incommodè illa expediemus, nusquam alioqui aptiorem locum nacturi in vniuersa plantarum familia.

- [Rapum turbinatum maius.
- Rapum oblongum minus.
- Rapum Sylvestre non bulbosum.
- Rapistrum aruorum Erysimum Math: & recentiorum.
- Rapi gemina Varietas.
- Bunij & Buniadis discrimen.
- Bunias siue Napus.
- Bunias sylvestris siue Napus sylvestris.
- βένιου siue Rapula folia non Bunij vt Dioscori, sed napi fortè ex Plinio falso attribuit suo loco.
- Raphanus magnus &
- Raphanus parvus purpureus.
- Raphani varietas.
- Synapi satium, Eruca, aut Rapifolium.
- Synapi satium, alterum.
- Synapi agreste Apii, aut potius Laueris folio.
- Synapi sylvestre minus Irionis Dioscoridei aut Bursa Pastoris folio.
- Lampſana.
- Barbarea Pseudobunias potius quàm Pseudobunium.
- Alterum Pseudobunium quia ferulaceum inter ferulacea.

Rapunculus siue Rapuntium parum vulgo Pes Locustæ Auicenna } cum Trachelis.
 Rapuntium maius Alopecori comoso flore

Eruca satina.

Eruca maior Hispanica.

Eruca sylvestris.

Frio seu Erysimum.

Erysimum Theoph. folio Similacis aut Atriplicis suo loco.

Sium siue Laner Dioscoridis Olusatrisfolium.

Sium siue Laner Crateus, Nasturcifolium, aut Erucæfolium.

Cardamine Sifymbrium siue Nasturtia aquatica.

Sinapi & Thlaspi media Prœuincialis planta.

Nasturtium hortense.

Thlaspi genus omne.

Iberis.

Lepidium Pauli duplex.

Draba.

Dentillaria Rondel. siue Mo-

lybena herba neotericonum.

Bursa Pastoris.

Senecio.

Senecio Jacoea.

Senecio Jacoea marina.

Vulgatissimum.

Dioscorideum Drabæ folium.

Gracum fortè Dioscori.

Syriacum anguloso bifori pericarpio.

Osyridis folio hortense.

Hieracisfolium Lunaria Lutea Monsp.

Alterum clypeatum Serpillis folium Norb.

Centunculis folium Alisson Italicorum.

Candia umbellatum.

Umbellatum alterum.

Crateus suo loco.

MAIUS ORBICVLATVM, seu turbinatum Rapum.

Γογγυλίδες Γογγυλίδα

Gallis. Naueau Rond.

Germ. Kueben.

Ital. Repo.

Belgi. Rapen. Ang. Turnepe.

CVILIBET regioni abundè crescit Raporum omne genus, quod Græci vna voce designarunt Γογγυλίδα, quæ rotunditatem orbiculatæ globosæ radicis figuram docet, vnde notitiæ est plebeia, inque cibos egestati amicos per Hyemem multum accommodum, crudum, & coctum. Fronde perampla, laciniosa Erucæ, aut potius Rhaphani, etiâ siliquis aded simile, vt radice globosa, floribusque luteis, & minore semine, vt Sinapi nigricante exceptis, eadem putes.

varietas { Radice dumtaxat à superiori distare videtur, quæ teres atq; rotunda oblongior est, & Napo similior effigie, sed maior triplò, etiam vbiuis notissima.
 Hec eadem, aut certè simillima Venetis olitoribus vœnum fertur in forum, Hyeme purpura nitida & pellucida radice, gustu teneriore, suauiore, in acetariis cruda cum Eruca, Lactuca, & aliis illic escitari solita.

RAPVM SYLVESTRE non bulbosum.

EST etiam frequentissimū Sylvestre Rapum, præsertim apud Flandros, Germanos, qui ferunt hoc, quò folia bobus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorum numero, vt radix iam non tuberosa aut Raposa, sed exilis, nec ventriosa vsquam sit, alioqui fatiæ rotunda turbinata non absimilis, sed discretu facilis, crispior, rugosiorq; & vberiore folio.

RAPISTRVM ARVORVM.

ERAPORVM sylvestrium censu etiam est Rapistrum vulgo vocatum, passim viarum margines & segetes ornans, vbiq; præsertim Septentrionaliū: floribus luteis numerosis Brassicæ aut Rapæ, in caulibus sesquibitalibus folia insunt Lapsanæ, aut Rapi Sylvestris, Bra.

Brassicæ virore & lænore, non Erucæ, vt debentur Irioni Dioscoridis. Radice, tenui neuti-
quam fibrosa, gustu item Rapi Syluestris, cuius facultates propè sortita est, sed vehemen-
tiores, tametsi vsus neglecti aut ignoti. Neutiquam est Erysimum Dioscoridis: certè ad-
modum affinis est Napis & Sinapi: tulum namque semen Sinapi ementitur, & vsus ex-
plet rusticis.

Euviās siue N A P V S.

{ *Germa. Steckruben.*
Belgis. Steckrapen, & Parische Rapen.
Ital. Napo.
Gallis. Naut. Ang. Nape.

QVEMADMODVM Antuerpianum solum, vtpote sabulosum, tuberosæ & turbinatæ
Rapæ feracissimū, sic Lutetianum lutosum Napi fertilissimum. Vtrique plantæ con-
gener, imò & similis adeò Rapæ oblongæ est Bunias, vt eadem prorsum dicas, nisi Napo
folia minus scabra forent, radixq; media sui parte minus ventriosa, imoq; exiliore multò
esset, sapore suauiore, cibisque delicaliore, præsertim Francigena, quæ plenis doliis vœnū
in Belgium est ferri solita.

BUNIAS SYLVESTRIS NAPVS.

SECVS agrorum amniūq; ripas hæc lubens oritur, præsertim regionū frigidiorum cu-
iusmodi Angliæ, Nortmāniæ Germaniæq; Alpinæ & similibus: siliqua, semine, flore &
folio ex satiæ Buniadis inspectione admodum cognitu facilis, quia persimilis, sed minor
tota, foliorumq; profundiore lacinia & radice rotundiore, breuiore, ficum aut Sorbū æ-
quante. Huius napi, aut Satiui semen antidotis & eximiis antiquorū compositionibus ad-
dendum, vt Theriacæ Andromachi & aliis, non B V N I I semē, quod nominis propter ra-
dicem raposam siue turbinatā Buni; & Buniadis affinitate multis imposuit, vt Plinio qui
vtrāque Rapum appellat, & Senensi comētatori admodum ieiuno & sæpius decepto, nec
melius in Dioscoridea quàm Pliniana lectione versato. At Buniū neq; bunias est, neque
eadem figura, viribus, aut classe cum Buniade descripta est, vt paulò inferiùs dicemus,

RHAPHANVS MAGNVS & parvus Purpureus.

Præparis { *Gall. Raifort. Se Angl. Raddyshe*
Ger. Rettich. } Rabon.
Belg. Radtts.

VEL nomēclatura Rhaphani vnde Rapum latinis deductum fuit, indicat Rapi speciem
esse Rhaphanū, quippe omnia Rapi habet, si longiorem, graciliorem excipias radicē,
flores similes, sed purpura obsoleta, siliquam crassiore pyxidatim effigiatā seminis ruf-
fimaiores Rapi: efficacior medicamentis, quàm vtilior alimentis, expetita tamen fermè
vbique & notissima radix.

PLVRIBVS hortis Italiæ præsertim rubello colore colunt & esitant Rhapha-
nos: vt minores (quod de Rapo Rubro monuimus) sic esu suauiores, minus acres, lautio-
resque ex aqua salita excitandæ appetentiæ, quam costæ prorsum euertit: foetet namque
admodum siue per se, siue carnibus incocta, tum hæc, tum alba, eoque sale & de prima
mensa consultius est vt edantur.

SINAPI SATIUM Erucæ, aut Rapi folium.

{ *Gall. Senene domestique. Belg. Mostaert.*
Germ. Seneff. } Ang. Musterd, Senbeye.
Ital. Senape Mostarda.

F. iiii.

MA

MAGIS abest Sinapi à napo viriūm acrimonia, quā specie, facie, vel nomine, quod quidem tum liniamenta plantæ, tum effrenis acrimonia insinuant. Napi enim im-mite aut vehemens interpretantur, cuiusmodi est Sinapi semen vrendo, sternutamenta lachrymāque ciendo: vnde notissimum siue diuitum, siue pauperum mensis, præsertim fatium, caule, fronde, flore, siliquāq; Rapacea, semine minore acerrimo, oleoso, copio-fo, aruis mandari solito, non secus atque rapæ. Folia etiam tenera in acetaria veniunt.

SINAPI ALTERVM Satium.

{ Gallis, Seneue blanc.
 { Belgis, wyt mostaert.
 { Germ. Weisser Seuff.

ERVCÆ albo semine est fatium Sinapi alterum, cuius vsus Officinis ad compositiones vt Diasatyrione, Elect: de Ovo. Prorsus figura & semine Napi vulgaris, sed albo ma-iore duplò.

SINAPI AGRESTE Apij, aut potius Laueris folia,

{ Gall. Seneue sauage.
 { Ger. Wilder Seuff.
 { Belg. wilden mostaert.

HVIUS haud admodum dispar figura aut feminis acrimonia, tametsi folia incifura fi-tutūque & natalibus, magis Lauerem vel Apium exprimant, nec non ruribus semen ni-grum penuriam fatiui refarciat, quod ostendit flore & siliquis ad satorum viarūque ri-uulos & depletas fossas luxuriare solitum.

*SINAPI STLVES. minus Irionis veri folio, aut
 Bursa pastoris*

ARIDIUS tamen locis iuxta margines, & rudera, propè vrbes nascitur, foliis lacinio-sis admodum burse pastoris similibus, sed acutioribus minutoribūque laciniiis. Um-bellofi flores & siliquæ secundum summitates Irionis Dioscoridis, caulis pedalis, minore multo, sed tota planta gustu Synapi feruidissima.

ERVCAE, & IRIONES seu Erysimi.

DVM postremò in Iriones commentabatur Senensis dictator, augurabatur non defu-turos canes (sic enim modestè omnes etiam se doctiores solitus nuncupare) qui se ita ambiguum & consciū suæ hinc imperitiæ allatrarent. Vtinam habuisset ille canes similes non ad latradum sed vestigandum Erysimum, quod vel pharmacopœorum Monspellien-sium lixæ possent illi hodie in triuijs & ruderibus passim indicare: est enim ibi doctis & indoctis vt vsu frequentissimum, ita multiplici & felici successu notissimū. Ac vt perspi-cuū fiat vniuersum hoc *Erucarum & Irionis genus*, vno nos capite omnia complectemur.

ERVCA SATIVÆ DVÆ.

{ Gallis, Roquette.
 { Belg. Rakette & Roomsche Rakette.
 { Ang. Great Rockett.

ERVCA **S**ATIVÆ duæ cibus gratiores & nobiliores: Maior Hispanica vocata, à nostrati maio-
 maior siue Hi-ribus foliis Sisymbrii & semine nigro, floribus luteis, corniculo Sinapi maiore, distat.
 spanica & Gen- Hæc vel quia in condimentis lautior, vel ad Venerem vegetior erat Gentilis vulgò voca-
 tilis. ta fuit: quo vocabulo Hispanica & Itala gens designat quamlibet rem aptam reddere
 hominem lætum & experrectum ad munia vulgò pausibilia, vt ioca, ludicra & Venerem.
 Quæ commoda vt ex ea perciperet Monachorū Saginata, caterua in perquam amœna
 Magalonæ insula maris Norbonensis, huius Gentilis Erucæ semine à fratre quodam Hi-
 spano

spano ambulone donata, quotānis hocce ferebat & in mensis cuilibet vel maximo gula irritamento vel blandimento praeferbat: nimirum vsu gnara quantū frequens esus conferret ad calorem Venereum in illis otio & frequenti crapula obrutum, ad vigorem animi excitandum, & praesertim corpus obesum extenuandum, somnumque excutiendum, quo illi veluti vsi glyrésue tota hyeme saginati, fermē adipe suffocabantur. Verū istō Hispanico remedio adeo hilarescebant & gentiles fiebant, vt plerumq; recinctis lumbis castitate, coacti essent vota & cenobii mœnia transilire, & aliquid solatii Venerei ab vicinis plebanis efflagitare: nobis hæc visa & risa. Eruca verò inibi superstes est copiosissima, monumentum futura Monastica castitatis & rei veritatis, nec eget vtrius fusiōis descriptionis, cum vulgaris sit notissima & ex illa facillimē percipiatur hispanica,

ERUCA SYLVESTRIS.

Belgis. wild Raketten.

SYLVESTRIS serratica squallido solo vel parietinis passim oriens, Dentis leonis diuisura, floribus luteis brassica, notior etiam quā depingatur. Et hætenus tres species priores & notissimæ Erucæ.

Eruca sylvestris

IRIO, sine ERTSIMVM. Diosc.

Anglis. Cadloke, kedloke.

HIS proxime accedunt Iriones. Dioscoridis Irio, quem medici docti notis & experimentis commendant, est radice lignosa, foliis Erucæ sylvestris, quæ primū erumpentia non nisi ab oculis exercitatis possūt à Bursæ pastoris foliis discerni, quæ huic non ita viridia, & in extremo magis acuta sunt: illi erysimo verò lacinia gradior & in summo rotundū retusiusue foliū subpingue, quod multiplex in imo solum operit. Caulis sesquicubitalis, interdum maior: semen in siliquis Erucæ sylvestris multo minoribus, acre, feruidum: flosculi in summo lutei. In compitis, sepulchretis, & ruinosis locis frequens, multis Galliarum regionibus notissima, sed in Anglia nō item, quamuis nō minus obuia. Nā ne Medicis quidem aut pharmacopœis peritioribus certū stat, quā sit Irio: hoc factū, aut quia in vsū Medicū nondū fuit hic deductus, aut quia à Mathiolo, cuius cōmentaria plerisq; sunt veluti Sybillæ folia,



Irio.

Rapistrum.

Rapistrum vulgi à sapore Rapæ, & nonnulla foliorum similitudine, loco Irionis acceptum. Quod neque Dioscoridi respōdet, neque cum Mathioli erucæ sylvestris foliis similitudinē inuit, tum sapor, odor rapæ, nec adeo vt Irionis acris, nec proinde ab hac spectanda eximie genuini Erysimi dotes quæ asthmaticis & fæctui Pulmonum vocique rauæ etiā diuturnæ & prope inuictæ sūt adeo præsentī præsidio, vt fidē fermē superēt. Est enim moderata quædā tenuis substantiæ & incidentis, cum humidis abstergentibus partibus permixtio, cuius beneficio crassæ blennosæque pituitæ citra exsiccationem nimiam inciduntur, & incisæ propter flatum nonnihil commixtum non magno conatu expectorantur, & abstergantur. Arteriacum igitur est laudatissimum, nempe idem vnum præparatum & educens. Exempli succurrunt quamplurima, quæ secundissimē tum præceptoribus, tum nobis postea successerunt. Phonascos memini tum iuuenes, tum ætatis prouectæ, quibus fermē iam amissa voce & spiritu, limpida sonoræque vox pauculis diebus restituta fuit,

fuit, vnius Erysimi & opera eximii præceptoris Rondelletij qui primus vsum monuit. Mathioli æquanimitas, quasi suæ imbecillitatis cōscia primo suo Irioni subdidit aliū in postremo auctario, quem potius primo putat, quia folia minora, & cornicula paulo vegetiora sint, vt ex iconibus, inquit cōmentator, patet. Sic nos auidos discendi huius mutata sententiæ causam aliquam, vt solitus est, in sicco deserit. Quid hīc folia minora, & cornicula vegetiora agant, nescimus: vt vt sit, nos benignè omnia interpretamur, nēpe tantum virum (vt constantis & grauis animi opinionem, quam de se doctis viris istis cōmētariis excitauit, retineret & foueret) noluisse quicquam demere, aut demendum esse suspicionem dare, sed humano more & prudentia tacitè meliora, quæ à meliore tum suo tum aliorum iudicio profecta essent, deterioribus prioribus subdere, quasque vniuersum opus de integro recoquere, Magni Ciceronis exemplo, qui se dedit recoquendum Molonio Rhodio oratori: id videre hīc est, capite de Mēo, Sefeli, Cumino Syluestri, ac passim hoc nouo opere magno sculptorum & bibliopolarum applausu.

Λάμψανα LAMP SAN A.

Ital. Di landri, & di Lasana.

Gallis. Sanues blanches quasi sinapistrum album.

Erysimū Theop.
Dod. sed fallitur
fol. 431.

ETIAM Napis & synapi reddenda Lampšana, vt quam olim Romani Napum syluestrem vocarunt, vulgus etiamnum in Gallia *Sanues blanches*; quasi Sinapistrum album dicit, a foliorum mollitie caduca, decubitu in humum, quam quia lambere videntur Lampšana dicta putatur: nisi potius fuerit à Lasana matella nempe, siue ventris oneri excipiendo vase contemptus causa sic vocitata. Etenim olus olim fuisse Lampšanam admodum contemptibile, sed non parum vtile, præsertim plebeculæ, pauperum, & esuritioni militum annona deficiente, vel diui Iulij Cæsaris milites carminibus testatum fecere, qui exprobauerunt ea se vixisse apud Dirrhachium præmiorum parcimoniam cauillantes, vt narrat Plinius, qui olus Syluestre pedalis altitudinis trium foliorum Napi simillimorum candidiore flore & in cibo coqui eam describit: vnde satis liquet esse istud olus syluestrebique aruorum, satorum præsertim margines, foliorum florumque luteorum vberissimo luxu claudere solitum, perperam Theophrasti Erysimū putatum, à Doct. Do. qui aliam plantā parietinis, ruderibus, & aruorum marginibus frequentem statuit lampšanam. Sed neutiquam est hæc Synapi Napis aut Brassicis congener, potius Hieracis, floribus nimirum luteis stellatis, non brassicæ. Folia item Cichorij syluestris Hieracii laciniis sesquipedem & binos pedes altos, grandes caules è fibrosa radice exigua emittit, semine pusillo, nec vlla sui parte planta in olera mandi putamus. Eapropter vera existimanda lampšana rapistrum post Rapas superius descriptum, vt quod per egestatem in vsu venerat, & è cuius floribus apes mellificantes & oblectantur, qualem intellexit Columella Lampšanam. Senensis verò cōmentator interfertis alienis plumis, ac multis Plinij verbis ambiguos ipse ambiguus, quod statuerit nos deserens, euolat. Cum saltem fuit nudi recitatoris plantam quam intellexit verbis exprimere, & boni cōmētatoris explicare, non truncare verba Plinii trium foliorum simillimorum Napi, quibus videtur Plinius innuere cum Iriones & Napi huic congeneres multis foliis insternant operiantque humum, Lampšanam vt plurimū tribus foliis extremis cespitem tangere, aut tegere, eaque nota vocatam sic esse, & ab illis dissidere.

Lampšan. Dod.
pag. 385.

TSEVDOBVNIAS potius quam.

TSEVDOBVNIUM, BARBARE A

sive Herba S. Barbara vulgi.

Histo. dod. 435.

POSTEA quam docuimus plurimū abesse Bunium à Buniade in promptu cui libet est, Barbaream vulgo dictā neutiquā Pseudobunium esse, sed potius Pseudobuniadē, si cui libuerit, dici posse. Est quippe incisura, magnitudine, floribus, & siliqua Napi siue Bunia.

STIRP IV *M aduersaria noua.*

71

Buniadis, qualem descripsimus, in aruis humidis & veruactis depressioribus, tota nitet virore atro: sapore aliquantū acri rapaceo, sed interpret hallucinatus nominum afinitate, folia non bunii, vt Dioscorides, sed Napi, siue Buniadis fortē ex Plinio falsō attribuit.

Nisi itaque verū sit Bunium, ea quam censuimus bulbocastanon dicta planta, nulla prorsum succurrit, quæ Bunii adumbret vel nomenclaturam, tantō minū ostēdat aliam plantam, nisi sit foliū Cratē, quæ Pseudobunii Dioscoridis folia, ramulōsque ferat: sin autem sit, vtī non paucis vīsum, non nos fallit coniectura de illa noua planta ferulacea, quam Pseudobunium Dioscoridis fecimus, & suo loco pictam descriptamque dedimus.

SIVM SIVE LAVER DIOSCORIDIS

Olusari folio, siue aquatica pastinaca.

BVNIADVM, Napi, Sinapi, Erucarumq; generi, quia ortus, vultus, vsq; oleraceus Sionis, Sifimbrii & nasturtii non multum sunt diuersa, hic succedent demum annectenda Thlaspis, Ibiridi, Drabis, & similibus, quæ paucioribus & facilius postea addiscentur. *Dodo. de florib. Libello. 240.*

Duabus diuersæ figuræ plātis aquaticis indidēre nomē Sionis, ἀπὸ τοῦ σελεῖν quia quatiuntur, vacillandōque in aquis iugiter succutiuntur præterlabentibus vndis, atque iugiter alluentibus: vnde etiam Laueris Latinis nomenclatio, nisi quis malit suspicari ab vrinis calculisq; ciendis, & excutiendis dictam. Earum alteram, quam Dioscorides lato olusatri folio minore, odorato, erectā fruticulā esculentam depingit, herbarii pharmacopœi Pastinacam aquaticam ab odore & foliorum effigie, propterquam etiam Germania Effsch water id est, apium aquaticum, quod diuersum simile tamen paludapio est, vocitat. Quo fit vt quin hæc sit verum Dioscoridis Sion nulli dubitandum sit, & si perbonus & doctus medicus Dodon. hallucinans Crateuæ Sion fecerit, quod. neque notas ē Dioscoride, neque Germanicam appellationem perperenderit.

CRATEVÆ SION ERVCÆFOLIUM.

ET ENIM Crateuæ Sion esse nasturtium nostrum vulgi vbiq; iisdem riuplis fonticulisue lymphidis fruticās, cunctæ descriptionis partes testantur: sunt namq; ipsa folia singula, rotundiora & latiora quàm Minthæ nigricātia, & extremis oris incisuris profundioribus Erucæ syluestris similibus, gustu non perinde odorato, vt Dioscoridis Sion, minūsq; medicato & acri sapore, idcirco plebecula in quadragenō Veris ieiunio multū huius in acetariis vorat, vocatq; Nasturtiū aquaticū. Videtur etiam eadē de causa Crateuas hanc vocasse ὀλίγη id est, vilem, aut paruificiendam, vt quidam interpretantur, si cum priore viribus efficaciori & medicatori cōferatur, tametsi vires non instrenuas exerat ad quosdam morbos, præsertim ad eos qui Stomacace morbo difficili, siue Scorbutō vexantur: vnde pari ratione & notione ac Cochlearea & Becabungæ Scorbutyk & Scerbuck vocatur. *Mathcol. 287.*

Huius varietas duplex ē magnitudine, siquidē riuiulis altioribus enata fruticat, foliis fermē Terebinthi magnitudine: aliis verò exiguis & penē arentibus riuiulis, triplō minor, æquali fermē Diosc. Sioni siue Laueri, cui conuictor, & similis eatenus, vt non rarō rustici vtramuīs pro vtralibet accipiant in acetariis, & potionibus ad calculum, nec malē cedit imperitiā illis, nam vtriusvis vires paris sunt commodi.

CARDAMINE siue NASTVRTIA AQUATICA.

ca, siue alterum Sifymbrium, Dioscor.

ACARDAMO, cuius acrimoniam vescentibus refert, dicta Cardamine fuit, veluti Helleborine ab Helleboro, tametsi propius accedit Crateuæ Laueri, siue Nasturtio vulgari aut vero, quàm Dioscoridis Sio, aut etiam quàm Sifymbrio: etsi Dioscorides Sifymbrii fecerit speciē tribueritque idem nominis plantē menthē hortensi simillimē, atq; huic aquaticæ, anasq; Plinio confundendi vires laueris atq; huius Sifymbrii, quod Sion etiā

VO-

vocarint. Est enim fontium lymphidorumque riuulorum sectatrix hæc ubi Sion, sed tota tenella, gracilisq; folia promēs ima strata latiūs, in nerueis cauliculis rotūda Eruca, aut aquatici Nasturcij vulgaris: quæ autē in caule sesquipalmari vel pedali angustiora multo sunt, etiamq; hortēsis Nasturtij diuisura: floribus sumis albidis, acri gustu, acin acetariis tamen minoris commendationis. Sed enim primum illud Sisymbrium apud Diosc. in familiā potius Menthe & Menthastri relegandū, cum quibus tantopere illi conuenit, vt quasi naturę symbolo mutuo, altera in alterā abeat, nempe mentha in Sisymbriū, hoc in illam, propter confusā naturā principia in femine.

SINAPI & THLASPI media Prouincialis planta.

ET hanc nouā visum fuit hisce inferere, propter cōmunes inter Sinapi, Buniadē, & Thlaspi figuram & vires. Prouenit ea nō procul Magdalene fano, & cautibus illis celsissimis famigeratissimis Galloprovinciæ, florēsq; Augusto promit luteos Erysimi, nec siliquas dispare: in gracilibus ramis ad summū & imū vna ē radice digitū crassa, fibrosa, pedē lōga, Rapiſtri folia, Thlaspi, aut Drabæ, leuiter laciniata, albida & hirsuta, sapore erysimi, aut Buniadis Barbareæ.



Καρδαμου ΝΑΣΤΥΡΚΙΥΜ HORTENSE.

Ger. Garten kress.
 Anglis. Gardyn cressys and Towne cressys.
 Ital. Nasturtio & Agretto.
 Gal. Nasitort & Cresson Alnoys, siue Cresson de Iardin.

Math. 565.

ACRIMONIÆ vehementia os narēsq; vellicando Sinapi imitatum nasturtiū, è Græco καρδαμῶ dictum fuit: etenim nares rugare siue cōnuendo cōtrahere assolent, qui acrius cape edūt, aut Sinapi multum carnes intingūt: vnde factū verbū καρδαμῶν id est connuere, tametsi quia cordi vitam vigorēque tueretur præsentiorē, Cardamū dictum putant, Persis præsertim & Lacedæmonibus, apud quos olim olus istud multo celeberrimum fuit obsonium: nihil enim addere ad panem præterquam nasturtium solita fuit Spartana inuenta, vt apud Xenophontem, & Plutarchum, & in Tusculanis legitur. Hodie autem in acetariis & medicamentis vsus plurimus, & notissima planta plebi nomine Cresson, fortē quia perenni sobole, summis feruoribus, vel etiam Brumæ rigoribus spretis, crescit. Francigenæ etiam Cresson d' Alenois ab alendo fortē vocant. Notissima planta, laciniosis, angustis Eruca foliis & Coriandri adultis non ita dissimilibus, acri sapore Thlaspi, semineque secundum thyrsulos Iberidis multiplici.

Dod. Histo.
 436.

THLASPI, siue Nasturtium tectorum, Nasturtium Syl. Scandulaceum, Capsella.
 Θλάστι Θλάστιον ἢ Σίνκπι ἀγρίου Germ. Baurnsenf & kress Bisemifraut. Ital. Thlaspi.
 Gallis. Senene sauuage, Belgis. Boeren kressc.

QVEMADMODVM Phyteumati, Echio, Pſyllio aliſq; nō paucis herbis ob quampiā notam cōſpicuam ſeminis nomen adſcitum fuit, ſic & Thlaſpi tranſuerſim per mediū inue incuſſo aut diſſecto ſeminis inuolucro foliaceo appellatio data: tamenſi dici potuit Thlaſpidium quaſi fraſum clypeolū, qualem adumbrant folioſæ circinnatæ peſtæ ſemen cohibentes Naſturtij, cui ſuccedit ordinis conſequentione.

DIOSCORIDIS Thlaſpi Draba & Chameline folio.

EMVLTIſ Thlaſpi differentijs adeoq; longè pluribus quā quot antiqui meminerint nulla ſit obuia, quæ æquè congruat Dioſcoridis deliniationi ac illud Thlaſpi nuſquam non in aruiſ copioſum proueniens Gallie, Germaniæ, Angliæ, folijs lōgioribus, anguſtis, mollioribus, leuiter lacinioſis Drabæ, Iberidis, Chameline ſiue Myagri, caulēq; multis aliſ circa imum diuiſo lentis, ſequacibus, gracilibus, flores albidos Iunio ferentibus puſilloſ; deinde cōpreſſa copioſa foliacea inuolucra exactè circinnata præterquam ſupernè, quæ parum depreſſa & fiſſa ſunt, ſemenq; continent puſillum, rotundum, oblongum, nigrum Naſturtij, fauces adurens mandendo, ac quiddam Allij, Sinapi aut Cape ſapore exhibendo: vnde vulgus Sinapi agreſte vocat & Naſturtium Teſtorum, quia non rarò in maceſcijs vetuſtioribus viſitur. Quare quin ſit Thlaſpi ſpecies nulli negandū, an autem ſit folijs *ἀκρογῶλον* non proſum videtur: ſunt enim vno ductu ſerè ſinuata tota, non diuiſa, proindeq; illa verba (in ſummis diuiſa) ſi quis de thyſſulorum, ramulorum aut ſeminis diuiſura accipiat, nec Naturæ aduerſaturus videtur, nec Græcæ deſcriptioni vim vllā facturur: verū ſic forent alię ſpecies Thlaſpi mox dicendę, quæ ſeminis effigie & acrimonia propiūſ vero accedent.

THLAſPI Græcum propinquius forè Dioſcor. Polygonati folio, aut Olea, Lentis ſemine.

ETENIM iſtud dumtaxat calidarū regionum Syrię, Candię, etiamq; Prouincię Norbonenſis indigena eſt, ramuliſ multis in ſummo diuiſiſ, & ſemine ſecundū longitudinē bina ſerie digeſto, planè lentis effigie compreſſe, ſed nonnihil depreſſi inſtar umbilicelli medio oſtendente, & quaſi incuſſum cōtuſū inue ſcutulum aut Thlaſpidiō exactiūſ effigiatē, ſemenq; cohibet Naſturtij acre, vehemens, ſecundū totos ramuloſ lentos, obſequioſoſ, cōpaſtoſ, albidos, in caule ſarmentoſo rotundo folia puſilla, glauca albidāue habente Leucoij Lutei ſed multò minora, radice exili lignoſa etiam in hortis Italiſ.

THLAſPI STRIACVM vel Græcum alterum anguloſo bifori-pericarpio lentifolio.

FERVNT & alterū eſſe Syriacum aut Græcum illud, quod nos habuimus Venetijs & in hortis vidimus minoribus ramuliſ, minūſq; compaſtiſ, albidis geminaq; donatiſ ſerie, ſeminis anguloſi, acroſi, rotūdi, compreſſi, medioq; ſui fiſſiliſ in duas glumas minores acriora ſemina terna aut quaterna amplexaſ, folijs non ita diſſimilibuſ ſuperiori. Nuſquam niſi inquilinam hortis putamus naſci, nec ſcimus ſitne illud tertium Mathioli, quod ille nulla apta deſcriptione genera diſtinxerit, ſed in chartaſ tantum negligenter picturaſ congeſſerit.

THLAſPI Vulgaſiſſimum Vaccariæ folio aut Myagri pinnato.

MVLTO vberimè prouenit cultiſ & incultiſ aruiſ Italię, Germaniæ, Galliæ & Angliæ iſtud omniſ Thlaſpi vocatū & receptū, cuiuſ folia ima lōgiora, maioraq; quā primi noſtratiſ, parum crenata, ſuperiora autem anguſtiora in acutum ſenſim deſinentia, baſimq; habentia vtrinq; pinnula aut ligula porrectiore non quaſi appendice addita, ſed continuata, multoſ è caule ſequipedali ramuloſ ambientia ſtipatoſ floribuſ albidis, ſubq; Eſtatem crebriſ paſtorie Burſe non diſſimilibuſ in duas glumas

hiantibus inuolucris, acri semine & sapore Sinapi aut Nasturcij, officinis in vsu ad antidota pro vero accipitur.

*Osyridis folio THLASPI minus Hortense vulgare,
acerrimum Luteum & album.*

PAULO diligentiores Pharmacopœi & Herbarij Angliæ & Germaniæ istam minorem speciem Thlaspi vocant, & alunt in hortis ad medicum usum, quia sit feruidioris gustus. Eius cæteroquin tota facies, ramulis multis floribus & foliolis Thlaspi fatetur, eatenusque differre videtur, quia tota minor & tantopere sarmentosa, ut scoparum vice sit ad verrendum, non secus ac Iberis, cuius etiam & floribus, albidis, crebribus, paruis. Eadem in horto Morgani nostri, etiam luteis floribus visebatur hoc in ense Iunio.

*THLASPI paruum Hieracii folium, siue Lunaria lutea
Monspel. & Leucoium luteum marinum.*

IN prata MonsPELLIENSIA secus Lanum amnem & Gramuntium lucum studiosi ludibundi prodeuntes, nos comilitonesque nostri sapissimè hoc collegimus, & minorem alteram Lunariam, propter lunatos folliculos elegantes, vocitabamus. Sed attentius perpendentes, huic nullus locus certior, aut aptior, quam inter Thlaspi omnium iudicio, putabatur. Radix qualis Bursæ Pastoris aut Maluæ, folia mox a radice crebra sibi mutuo incumbunt, alben colore Hieracii aut Leucoij sed minora, undulata, laciniosaque in terram dehiscunt. Caulis folijs exutus, exilis, cubitalis & pedalis, qui in cauliculos exit onustos multis clypeolis foliaceis pallescentibus Lentis compressæ effigie qui prætenues sunt & fermè pellucidi, quibus inest semè singulum singulo foliolo, Leucoij purpurei & albi sapore & effigie, potius quam Nasturtij. Flos in summo paruus, luteus aut pallidus. Hæc primum culta in hortis Italicis & peregrina credita, vocabatur ab illis nomenclatoribus Leucoium luteum marinum, non ita magna similitudine: maiorem sanè multò sortita est cum Thlaspi. Sed etiam cum Thlaspi nonnihil folijs & viribus cognationis habent Leucoij, præsertim purpurei & albi.



*THLASPI alterum minus clypeatum Serpilli folio
etiam Norbonense.*

NECVSPĪA nobis istud visum, nisi in agro Norbonensi MonsPELLIENSISQUE, locis squallidis, sabulosis propè pusillas Anchusas: folia, flores, seminâque ex luteo pallent, & peltæ superioris aut Tordyllij sunt sed penè pargamene instar pellucida sunt tenuia, similitudine, sapore, Leucoij, vnde quidam Leucoium luteum marinum autumabant: ramuli sunt exiles, palmares, nitidi, foliolis albicantibus Thymi non ita numerosis.



THLASPI

STIRPVM aduersaria noua.

75

THLASPI NORBONENSE CENTVMCVLI

angustifolio, Alysson Italorum.

FECERANT iamdiu hanc Itali Alysson quodpiā, eosque Cōmentator sequutus, lubenter, inquit, posuissē, si habuissē: igitur factum benē quod nō habuerit, quippe doctiorum omnium Monspelliensium, apud quos frequēs oritur, suffragio, Thlaspi hęc annumerāda est, nō Alysson: cui aliā multō aptiorem iamdiu compararūt seduli vestigatores Belgæ & Franci, quā in hortis alunt: in Italia non nisi aridam vidimus. Istud verō pusillū Thlaspi prope Monspel. Nouū Castr. cis Lanum amnē, aridifq; viarū crepidinibus, in ramulis multis sparsis rectis vimineis, palmaribus & sesquipalmaribus albidis, Thlaspi: foliola Polygonati minora aut Centūculi, aut lauedulæ: & flosculos albidos Iberidis, Thlaspi Cretici, aut Syriaci, Clypeolis nō dissimiles, sed duplō minores fert: tota planta albicat, gustūque Thlaspi aut Nasturcium indicat.



THLASPI CANDIÆ umbellatum Iberidis folio.

ALTERVM descripserunt & vocarunt iamdiu Belgii herbarii THLASPI Candia, foliis est serratis vulgatæ Iberidis, sed maioribus, caulis cubitalis multos cauliculos fūdēns, in quorum extremis umbellæ & flores Sambuci palustris similes, ex candido purascentes, Iulio vel Augusto: tūcque semen affatim cernitur in folliculis Thlaspi minoris similibus, acre gustūque feruens. Quæ affinitas eruditō & modesto medico Dodonæo hac naturæ parte exercitatissimo videtur persuasisse, vt Drabam hanc censuerit: nempe umbellæ Sambucinae & seminis acrimonia, quæ non magni momenti sunt notæ. Cognita quibus est Lepidii foliis, umbellis albescentibus vera Draba, non opus est pluribus ad demonstrandum, tum errorem, tum discrimen.

Hist. Dodo. 438.

THLASPI ALTERVM MINVS VMBELLATUM

Nasturcii hortensis folio, Norbonense.

MONTOSISSATIS Norbonæ ad Lupi montis radices Maio & Iunio hęc copiosa flores muscosos vmbellifq; cōsertos, superioris nō absimiles edit, sed albidos, semēnq; minus multō, sed admodū acre, folia exiliora, diuisura Nasturcii hortensis per totos cauliculos numerosos, grandes è radice non profunda, nec multum fibrosa, sapore acerrimo Thlaspi: verum non magis hęc quam superior vñ recepta.



AN THLASPI CRATEVÆ, SINAPI

Perficum, vocatum latis foliis, radicibus magnis. Ischiadicis utile, sit noster Rhabbanus agrestis, qui & Lepidium Pauli in Lepidio dictum.

G.ij.

D 2

DE Crateuæ Thlaspi admodû difficilis assertio: si quis tamen de paucis à Dioscori. recensitis notis, sit certæ coniecturæ locus, nulla aptius statuatur planta, quā illa, quæ nonnullis Sinapi, propter radicis in condimentis vsum, nonnullis Rhaphanus Syluestris propter nonnullam similitudinem, nuncupatur. Foliis est amplis Lepidii aut Piperitidis maioris, plerumque latioribus: radicibus etiā prægrandibus, glomeratis, albicantibus. Semen illi in filiquis Sinapi modo: flores Thlaspi conferti & elegantes magis quadrare videtur, quā Lunariæ vulgò nuncupatæ Rhaphanitis, quæ à nonnullis istud Crateuæ Thlaspi credebatur, cuius acrimonia ad Ischiaticos multò inefficacior, radix & vsum dispar.

*Lunaria Rapha
nitis,*

BURSA PASTORIS.

*Germa. Toschel Kraut.
Gall. Bourse de Pasteur, ou berger.
Bel. Bojsekens.*

*Effig. Mathiol.
569.*

RECENTIORVM fuit planta & nomenclatura Pastoria bursa dicta à marsupiolis, siue theculis compressis, cordis aut crumenæ effigiem referentibus, thlaspi quadamtenus, cui etiā congener est, vbiuis copiosissima & notissima, secus urbium areas, & mœniorû ambulacra: foliis & facie Irionis aut Erucæ: floribus albicantibus thlaspi non dissimilibus, tametsi gustu nō perinde acri, sed exiccante potius quā refrigerante. Nam qui quia sanguinem sistat (sistit autem strenuè) frigidam faciunt, infœlici argumento nituntur, etenim umbellæ, floresq; gustanti aliquid acrimoniæ inurunt, indicioque sunt siccando colligendoque sistere, vt porri succus, Vitriolum, vrtica, nō refrigerando.

RHESDA PLINII NEOTERICORVM

Belgis vulgo Eruca peregrina, Italica vel Cantabrica.

SUPERIORIBVS annis diligenter perscunctati sumus Bononiæ dum versaremur, clarissimum Medicæ materiæ professorem Cæsarem Odonem & D. Aldroandum, atque indefessum quærendo doctû Anguillarâ Ferrariæ quænam planta illa esset, quæ apud Rauēnam, Rimanum, locaque Pefaro finitima, Plinio memorata propter miram supersticiosamque opem morbis ritu præstare solita?, qui eadem esse coniectabant (vt etiamnum pleriq; omnes herbarii) quam nos non modò in Italia non procul Rauēna, Arminio, etiāmq; toto illo littore maritimo inuenimus, sed etiam in Gallia Lugduni & Ventsuntii in Burgundia, etiāmq; hortis Belgis & Anglis, vbi quidam vocitabant Erucam Italicam. Est namque foliis albidis vel pullis, & diuisura Erucæ Syluestris, Sinapi syluestris, vel Cakile Serapionis, ab ima, tenui, longa, albicâte radice profunda, cauliculos graciles cubitales, ad medium vsque ambientibus, vbi flores thyrsulue densè spicati Oleæ summos ambiunt cauliculos, elegantésque relinquunt per Augustum & Septembrem theculas membranas, instar calicis superne hiulcas, semen nigricans, pullum, pusillum Hyoschiami continentes, tota gustu & nonnulla tenui acrimonia Luteolæ adstringente: vnde non abs re



doctissimi illi putarunt ex Plinio hanc Resedam esse, possèq; collectiones & inflamationes discutere: nec tamen putarim opus esse additis illis verbulis, aut murmurillis anilis dementiæ cõmentis ad efficacitatis commendationem fucatam, nempe hæc sunt. *Reseda morbos reseda, scisne, scisne, quis hic pullos egerit radices, nec pedes, nec caput habeant? Hæc iter dicunt, totiesq; respuunt, inquit Plinius.* Cui nos malumus eum assensum præstare, qualem merentur balbutiones carminum iacturæ brassicæ apud Caronem, quàm excipiendo vel ineptire, vel asserendo fidem temerare nostram & alienam.

*CAKILE SERAPIONIS, Eruca folio, Napi flore,
Vulgo Eruca Marina.*

NVSPIAM hæc nisi littoreis maritimis, aut inde in hortis culta visitur, plurima autē prope Venetias, Magalonā, etiamq; Angliæ insulā meridionalem Vectim. Folijs hæc sinuatis, diuisura crebra Senecionē vel Erucam, nisi crassiora albidioraq; essent, præfert. Flores autem purpureos iuxta caulifū ramulos sparsos magnitudine & similitudine Napi habet, semine est oblongo mucronato fungoso ex singulo flore secundum caulem, bino sibi; mutuo apicum duntaxat cohesu iuncto, gustu Erucæ aut Napi salso & purgante. Radice lignosa καλῆ, propter quam plurima nascitur, putaturq; ea, quam Serapio Cakile vocauit,

LEPIDIVM Herbula Dioscoridi, Damocryti & Galeno BERIS CARDAMANTICE Nasturtij folia, sine alterum Pauli LEPIDIVM BERIAS, quæ irrepsit alienissimo loco Dioscoridis codici. Lib. 1. cap. ultimo.

Eadem Aëtij Lepidio Seridis angustifoliæ Holeraceo quod cum lacte conditum seruandum Tetrabibl. 4. Sermone. 2. Cap. 133.

Sed Lepidium primum Pauli superiore Cardamantice multò maius, vrentius, minùs aptum cibo, Rhaphanus Syluestris Francis & Belgis Pharmacopœis.

FECIT vis vrida cutiq; deglubendæ & squammis excitandis (quod contingit fieri plerumq; inter curandum Coxendico morbo affectos) apta, vt nomē Lepidium hisce feruidis plantis fecerint antiqui: λεπίδες enim etiam squammas è cute deciduas significant, vnde etiam lepra dicta. Ne porro tædio lectori simus, ad recentiorū conuiuem⁹ pleraq; quæ diu nos fefellerūt, & animaduersionis & castigationis egerent. Nūc fiat animus, non vt illi morosi declamatores, potiùs latratores, perorādo authores quoslibet proscindere, sed quantum plurimū possumus amico lectori perspicuè & candidè communicare. Iberis & Lepidium nomina sunt πολύσημα id est diuersas res vnius generis designantia, Dialecticis æ quiuoca, & imponere solita, nisi prius finibus secernantur, quod hīc faciendum. Iberis vel Dioscoridi Herbam insinuat folijs Nasturtij cubitalem, flore lacteo, radice nasturtij, hæc notissima Lepidio Dioscoridis eadem, quantū ex Galeno & Ægineta colligitur, qui Lib. tertio, Cap. de Coxendico, eam Iberidē Lepidiū vel agreste Nasturtium nuncupari scribit: vel indigitat fruticantem quandam plantam folijs Laurinis, sed multò maioribus, cuius antiqui medici in coxendico atq; affectibus chronicis multū periculum fecerint: verno tempore multò vegetior, frequens in Æginetæ patria, cuius foliorum si desit copia, inquit idem, radice corticem deglubito, & ex adipe subactum in cataplasma effingito. Itidem in Simplicium elencho, Iberiadem seu Lepidium recenset ex quarto calfacientium ordine vnum, alterum verò Lepidium nasturtio viribus simile, minùs siccando pollere. Hic igitur paucis verbis cui plantæ sunt notæ ab oculis pepulit caliginem. Vides Iberidē Dioscoridis & Lepidium eiusdem eandem esse plantam, rursum & Iberiadem alteram, qua de lib. 3. Capite de Coxendico, Paul. agit eiusdē Pauli esse Lepidium: id multis vsuuenit plantis vt re eedem sint, nomenclaturis variæ. Ac nequis arguetur Gingidio asmulatum Dioscoridis Lepidium, sciēdum Gingidium vel authoris assensu simile Nasturtio esse. Iam haud arduū componere istorū procerū fastidiosas lites, cum & Iberis seu Lepidiū Dioscoridis notissimū sit, & Pyperitis Galliæ plebi *Passarage*: plusquam rabida à feruido gustu Pauli etiamq; Plinij Iberidis sue Lepidij notas expleat. Futiliter igitur & impiè tenebricosus dictator Senensis viris eximijs Barbaro & Ruellio insultat, quum lapsos dicit, vt putarint *Raphano* Italici dictum Lepidium esse:

G. iij.

perspicuè

Effig. Math.
608. & 609.

perspicuè Ruellius hunc errorem detexit. Sed hunc fortè tunc Mathiolus Italus non intellexit, tersior enim & nitidior scriptor erat, quàm ab Herbario latinè vix balbutiente percipi probè posset. Id res ipsa docet multis locis. Sed hic probū quemlibet offensione vexat: illi primum posteris fecerunt glaciem, & scipionem ad vadum transmittendum porrexerunt ingratè ambitioni, cuius postea proditoriis ictibus posternerentur. Cumq; Authorū sparsas passim sententias nobis suis immensis vigiliis collegissent, Cōmentator neque illis intellectis, & istis spretis, nesciuit ex Pauli perspicuis locis distinguere duo Lepidia, totidemque Iberides, sed vt consuevit, re infecta ad calumniam deflexit, quam tandem, cum futilem & scutica dignam esse conscientia moneret, istis fomentis leniuit: nimirum fortasse illos Piperitim Plinianum Pauli Lepidium intellexisse, quod illi illic monuerant herbarios Lutetianos pharmacopœos & Antuerpianos, te nondum nato herbario. Hodierna enim die vocatur Rhaphanus agrestis officinis & mulierculis Belgis. Hæc Piperitis Lepidium secus ripas aquarū fruticat, radice oblonga indicè æquāte, vel maiore, caule cubitali & bicubitali, durioribus foliis Costi hortenſis vel Lauri, sed multo maioribus, molliusculis, ambitu leniter crenatis, colore ex viridi palleſcente, flore exiguo muscoso candido Iberidis. Dolendū tantum virum deceptum à Plebecula sua, nam illa pro Rhaphano maximā illam plantā, quam Verbasco comparabas intelligit: Gallica verò nomine Rhaphani Syluestris Piperitim seu Lepidiū vocitat, vt monet Ruellius te decipiens, neutiquam deceptus.

Αραβία
ἀραβία

ARABIS sue DRABA, & Nasturtium Babylonium.

Gallis. Draue.

Effig. Math.
71.

QUISQUE is ille fuerit doctus, qui Iberidem Cardamanticen adiectam primi libri Dioscoridis calci descripsit, videtur vsus fuisse verbis comptioribus, & oratione floridiore, quā consueuerit Dioscorid. & ex verbo *ἀραβικῶτερον* occasionem nominis Drabæ suggestisse quā enim *θεῖρος γαλακτικὸν ἄνθος περιβάλλει* (vides phrasim neutiquā Dioscorideā) id est cum ætate promit florē lacteū *καὶ τότε ἀραβικῶτερον*, tunc efficacior est, inquit. Quo ex epitheto potuit nominare alius quispiā Drabam: & comparare partim cum cardamine, siue Iberide Lepidio vocato, utpote quæ etiam holeracea esset & cubitalis: partim cum Lepidij *Æginetæ* & Plinij foliis, apud quos, quamuis multo plura quàm Dioscorides collegerint, nulla mentio fit Drabæ. Quæ si minus placeat coniectura, certè valdè consentaneum rationi videtur quempiam fuisse non imperitum, sed ætate posteriorem, qui hanc Drabā sibi de facie & viribus notam descripserit, Lepidiūq; *Æginetæ* vel Plinij foliis similem fecerit: neutra enim à Dioscoride descripta, nescitur an cognita: aut demū huc inserta fuerit, nullo alterius alicuius iudicio. Nā aliōqui ista Drabæ plenè satis expresse, & in vsum iamdiu deductæ folia, Lepidij forma & aliquantum incisura, mollicella colore albescētē hirsuta radice ab ima vmbellis tenus vestientia caulem cubitalem fermè exilē, quæ albicant lacteolis floribus Sambuco minoribus: semen acre subrotundum, albidum Milij magnitudinē, acriore & feruentiore gustu, quàm planta. Radice albida & nonnihil tuberculis interdum extantibus. Optandum hic, vt Senensis cōmentator nos docuisset, posteaquam reiecit hanc Dioscoridis familia, quibus rationibus indubitatum sit illi (vt loquitur) hanc vnam esse legitimam Drabam: tam multis frustra inculcatis, quid non addit pauca necessaria? An non posset Piperitis, an non Dentillaria Rondel. Lepidium Pauli hic recens, innuere? quid si idem Lepidio Dioscoridis similem fecit, lōgè magis vt aberres, fecit enim Gingidio aut Nasturtio. Variæ sunt plantæ adhuc Recentiorum, quæ Lepidium dici possunt vaga illa nomenclatura, & facultate cutem vlcerandi, squammāsue excitandi, quas ne nostro instituto officiāt, suis quamq; popularibus & similibus subdemus, vt Dentillariā Rondelletij, Costum Hortense, Rhaphanum magnum.

Μάργου ΜΥΑΓΡΥΜ.

Germ. & }
Gall. } Cameline.

Apud

APUD Æginetam in elencho M duæ leguntur plantæ, nomine & oleoso succo vel semine quadatenus affines: quarum hæc rectius videtur inibi vocata *μύαρον* quàm *μύαρον*: *μύαρον* namque sonat prauum, impurum, sordidum, cuiusmodi est Melampyrum, multum vicinam segetem lædens, & deterius multo, si conferatur cum reliquis triticis existens. Alteram verò *μύαρον* scitè effectus argumento dictam istam nouam & perelegantem muscipulam siue muscariam putamus, quia adfidentes aut se præteruolantes muscas ramulis & glutine suo implicet, ut alibi diximus.

Neglectis etiam aruis, nec Segetum mediocri dispendio nascens vitium Myagros, ea Dod. fig. 337. est quam minus Sesamum putarunt, ut cuius est semine Sesami persimili oleum multum multis in locis prematur, lucernis & cibis idem æquè aptum. Exit hæc sesquicubitum alta & multis angustis folijs Rubiæ vel potius Lithospermi septa latioribus, perpaucis ut Thlaspi in ambitu denticellis eminetibus, mollibus & albicantibus folijs. Secundum extrema flosculi lutei Alysi, aut Erysimi, quibus propagantur capsulæ compressæ Drabæ aut Lini, semen Sesamo aut fœnogræco fuluum, sed duplò minus & oblongum. Emendauit sedulitas recentiorum, ubi legebatur *τρεχίλωϊνος τηλίδος*, non fœnigræco simile, tamen de toto calyculo dictum accipi potuit, intus namque semina condita situ, & appressu inter se verticillatum quid & oblongum videtur efformare: sed ista leuiores sunt. Leuissimè verò ineptit hic & balbutit Senensis dum doctis nulla rationis umbra, aut rei cognitione, aut melioris historiæ commutatione aduersatur. Nempe si in Angliæ, Galliæ, Batauiæ, Lotharingiæ & Leodij aruis prouentum & compedium mercatorum, huius nouisset, eam potius agnouisset quàm Pseudo nescio quid semper, ut solitus est, quæ vaccaria videtur perperam intrussisset.

μύαρον SENECIO, siue Erigeron.

<i>Ital. carduncello</i>	<i>Gallis seuelfon</i>
<i>Ger. Crenz Witz</i>	<i>Belgis Cruyscruyt</i>
<i>Lat. Grindkraut.</i>	<i>Angl. Groundswell.</i>

CVIVS regioni & soli conditioni innascitur Senecio, æstus æquè ac frigoris patiens, Effig. Math. 1132. qualibet fermè Luna flores luteos instaurans nouos, qui in pappos breui abeunt Dētis Leonis modo. Calyculi teneri virides, Cicerbitæ minores, non nihil rubentes, quos folia infernè amplectuntur oblonga laciniosa Erucae, Cichoriæ diuisura. Phlegmonum initijs atque Erysipelatibus optimè facit: peptica namque est, paucula adstrictione, moderatiore calore, aut digerit aut suppurationem promouet. Sapor insulsus & oleraceus.

IACOBÆA SENECIO.

Herba Sancti Iacobi
Belgis & Ger. S. Jacobs bloum.

NVL I quam Senecioni propior videtur Iacobæa vocata recentioribus inuestigatori- Math. 1133. bus. Locis latatur amœnis, ut pratis & collibus riguis: quam Senecio maior multò, virgas rectiores firmiores striatas, & interdum subrubentes, sesquicubitales & cubitales radice fibrosa emergentes, emittit. Folia Senecionis Artemisiæ situ & diuisura ex atro viuentia. Flores stellati lutei, papposi, itidem Senecionis vel Tripolij: odor nullus, sapor amarus adstringens, non tamen ita calidus succus est.

MARINA IACOBÆA, vel Chrysanthemum
*marina & Artemisia marina neo-
tericorum.*

G. iij.

Rarior

Cineraria.

RARIOR hæc etiam littoreis tractibus, quorum est indigena: maior fruticosiorq; Senecione, pluribus virgis duris, & folijs maioribus profundiusq; incisis & sinuatis, vt Artemisia, rigidioribus, crassioribus, cinereo tomento obductis, vt reliquæ partes: vnde nomen illi Cineraria inditum. Flores item melini Iacobæ Senecionis pappis diffuentes. Exiccat valdè, digerit, & inodora est. Cætera nondum comperta. Colunt Belgici Horti de Mediterraneo littore lectam.



BOTRYS.

Angl. Oke of Hierusalem
 Ger. Traubenkraut
 Gal. Pymont
 Belg. Druyckenkraut

Encsh. 100.

IN Oliuetis Namausij cæterisq; tepidioribus & apricis aruis agri Norbonësis, vel Nitiobrigi suapte sponte fruticat Botrys: Flandris, Germanis & Anglis in Hortis. Radice est sparsa inq; diuersum acta mutuo fibrarũ complexu, ramulos complures ab vno scapo emittit holeraceos striatos, eq; internodijs folia tres vncias longa, vnciamq; lata, per ambitum angulosis lacinijs profundè sinuatis Cichorij, potius Hieracij, vel Eruce haud disparibus, flosculorum innumera fætura onusti ramuli, secus, pone, supràq; folia speciem primulũ florentis vix exhibentes (vnde nomen illi) sed languidè lutei, vt tota plãta ex luteo viret. Pertinacis odoris gratia fragrat, odoremq; haud ita dissimilem Ambrosiæ, sed multò vegetiorem vibrat. Condiunt recentiores hanc Saccharo, vtunturq; ad Cordis affectus.

SERIDES siue JNTYBA.

ADDucenda & huc intubacea, quorum cunctas familias aptè & singillatim Herciscere, etsi maioris est molestiæ, quàm laudis, non contemnendæ tamè erit vtilitatis, quando videmus plerosq; Pharmacopœos, vtinã non & celeberrimos Medicos senio confectos, etiamnum valdè anxios, quid in suis, quidue in Nicolai compositionibus quotidiano vsu tritis, pro Intybis, vtroq; Soncho, Cicerbita, Taraxacone, Lactuca agrestis & similibus, sint accepturi. Quare nobis, tametsi hanc oppellam successiuis Horis & furtiuis cudentibus, non licet esse tam ociosis: tamen amicis quorundam petitioni, & memoriæ nostræ subsidio paucis & perspicuis hæc discernere, atq; in seriem cõcinniore digere lubitum fuit, additis insuper, quas noueramus rarioris huius cognationis plantis.

Syluestrem

Syluestrem Picrim sine Cichoriū Sonchi asperi vel Dēris Leonis folio
Cultam altilem eandem, qua latioribus, habitioribusque foliis Intybi
Scariole fit, & aliquanto gratior.

Plinianam Hedynoin sine Picrim luteam pratensem dentis Leo-
nis flore Hieracii folio, an eadem Verrucaria Cichoracea luteo flo-
re & sulcatis capitulis sylvestris Cichorii folio.

Pusillum bulbosum Hieracium marinum Dioscoridis alterum, an
Theoph: Perdion?

Condrillā Belgicam, flore cœruleo Cichori, folio multum lacinio-
so Cichorii agrestis aut Eruca sylvestris, Taraxacon Officinariū.

SER. SYL.

Condrillam vulgare luteam maiorem } folio dentis Leonis,
& minorem }

Dentem Leonis siue vrinariam, vulgi, Tragopogi flore & semine,
folio Cichori dentatis pinnis.

Dentem Leonis Norbonensium, Asphodeli aut Leucacanthæ bul-
billis.

Condrillā viminosam viscidam vinearum, Norbonensium.

Condrillā Syriacā, etiamque in Norbonensi & Galloprouincijs obuiā
Cyani aut Eruca sylvestris diuisura.

Intybolacana, qua Gale-
nus ex antiquis vocat,
siue Serides, sunt multi-
plicis differentia, quarū
summa tres, nobis do-
ctrina causa erunt: Syl-
uestris Picris, hortensis,
atque Sonchus: illa vt
natura prior sic plures
habet species nempe

SER. DO.

Seridem Endiniam horten-
sem communem flore Cicho-
rii hortensis folio Lactuca,
Habet varietatem.

Angustifoliā vocatam Endiniam,
Syluestrem Officinis, flore Lactuca.

Alterā varietatem Crispam, folio Ci-
chorii, folio Lactuca crispæ.

Tertiā varietatem satiuam Serio-
lam: paruiam Seridem vocatam Ci-
chorii hortensis folio & flore.

SONCH.

Asperam viarum folio laciniato Cichori aut Hieracii.

Leuem maiorem altioribus foliorum laciniis Papaneris corniculati
flore luteo Cicerbitā, Officinarum siue Rostrum porcinum.

Alterū leuem minore Rheadis papaueris folio, flore luteo Senecionis.
Hicque, congener, simileque Hieracii maius unicaule, non dispa-
ri folio & flore, spinulis asperum.

Hieracium minus præmorsa radice Diaboli vulgò Hibernie, acutis
lacinijs foliis, parvis, paucis è radice, flore luteo minore.

Hieracium alterum pusillum non lacinosum foliis, Piloselle.

Hieracium longius radicatū, caule numerofo nudo foliis humi in-
orbem accubantibus, obtusè laciniatis, flore Dentis Leonis.

Hieracium montanū Sabaudum grandius, foliis & laciniis Condril-
la Cœruleæ, flore luteo.

Hieracium montanum folio Lycopsis, Cirsii Sequanorum flore.

SERIDIBVS INTYBACEOVS GENERI

cognata Tridaces, siue Lactuca merito accensentur: quippe quarum
agrestis sit mixta è Seridum & Papauerum natura;

STIRP IV M aduersaria noua.

Lactuca { *Agræstis Scariola hortensis*, folio *Lactuca*, flore *Opij* odore uehementi, soporifero, & viroso.
Satua vulgaris Retundifolia Brassica.
Satua Romana dulcior, nigriore & Scariola hortensis folio, semine nigro.
Satua Sessilis sine Capitata rugosis crispis Brassica folijs.

SERIS SYLVESTRIS PICRIS, CICHORIV M.

Serides tingides { *Gallis*. Cichoree sauuage. { *Ang.* Wild Cyborye.
Germ. Wilde wegwarden. { *Belgis.* wilde Cicoeye.
Ital. Cicorea saluatica.

SERIS siue Intybum est, aut potest esse, summum genus, ad omnia quæ Galenus nomine conflato Latinogræco Intybolachana, id est intybo-olera appellat coniectetq; quispiam sesqui-Varro nomen inde ductum, quia Seridi natura agræstis cumeslet, mitioris in hortis oleris causa fereretur, quod verbum etiam è Græco σέρις manauit, & eodem videtur alludere Varonis verba, Lib. 3. de re rustica: vbi ferunt, inquit, herbam quæ seris vocatur. Intyba autem à cauo tube-
Ambubeia specie caule videntur dixisse: nam Cichotium & Ambubeia Ægyptia sunt vocabula, picris amaræque caule insignem connotat amarorè præsertim Seridis, quæ cæteris est amarore prior, nusquā non frequentissima, saluberrima, celeberrimāq; apud omnes gentes cōmendatione, quam à satua Seride Scariola dignosces faciliè de laciniosis magis, minūsq; obscure viridantibus, angustioribus foliis, & amarore ingratiore, totiusq; plantæ habitu, & radice scabriore, duriore, exuctiore.

CICHORIV M satinum, cœruleum, picris eadem, sed cultu variatum.

{ *Germ.* Sam Blauwegwart.
Gal. Cichoree des Iardins.
Belg. Tamme Cicoeye.
An. Cyborye.

NON nisi cultu & solo istud distare inde manifestum, quia in Taurinensi agro, Sabauda, inque vinetis Burgundiacis lætioris soli nec liniamentis, nec sapore, aliæue nota distet à superiore. Brugis ac Antuerpiæ in Flandria depangunt tenellas plantas in patentibus aruis, quas seuerint post Solstitium, aut festum S. Ioannis, ne in florē luxurient: vt per hyemen maiores tenerioresque radices foueant ad vescendum: minū tamen laciniosa & similis illi est, vbi multū colitur, illique abundè suggeritur alimentum in hortis: alioqui flore & semine non dispari.

HEDYPNOIS Plinii, *Cichorium* luteum pratense, *Dentis Leonis*
Flōre, Hieracij folio: & an eadem sit Verrucarium Cichorium
luteo flore, & sulcatis capitulis?

SI, vti peritioribus visum est, hæc sit Plinii Hedypnois, quam suauiter halantem vel somnum conciliantem interpretantur, quin sit Cichorii species, haud dubium: quippe domestici Cichorii radix, foliorum ortus positus & numerus, caulis & flores, vniuersūq; habitus, planè Cichorium Sylvestre imitantur. Hoc tamen dignoscuntur, quòd huic omnia maiora sunt, folia albidiora, latiora leniūsq; laciniosa, & toti ramoso cauli adnata, luteique flores, papposi globi longè maiores, & succo amaro pedalis radix turget: in pratorum, vrbiūque aggeribus passim occurrat, vocata Germanis *Seelward*: Gallis luteum Cichorium.

BELGARVM *Condrilla cœrulea Cichorij sylue. aut Eruca syl. diuisura.*

CONDRILLÆ differentias esse Seridi subalternas, atque simillimas, vel hæc indicio est, quæ dumtaxat à Cichorio sylvestri videtur differre exilitate foliorum, cauliūq; nitidiorum elegantia: pauciores etiā alas habet, sed flores non dispares, vt nec radices, quæ similes similiter Cichorio eduntur, tametsi non nisi hortis Gallicis & Belgicis nobis visa, quia rara,

CON-

CONDRILLA pusilla Marina lutea Bulbosa, an Diosco. radice rotunda orbiculata *σεγγύλη* & *an Theoph. Cichorium Perdiōne?*

SAN E quam rara Seridis species illa Cichoracea bulbosa, quam videtur Theophrast⁹ innuere. Folia sunt Seridis syluestris diuisura, aliquanto minora. Caule ferme nudo tenero, in cuius summo vnicus flos luteus Dēti Leonis, minor tamen, & itidem in pappos euāescens: imo cauli subsunt filamenta terna vel quaterna, quibus totidem pluresue interdum bulbi appensi sunt perlucidi ex albo purpurascētes, solidi & succi pleni, qui carnē Rha-phani ferme praeferunt colore & pelluciditate. In locis paucis, sed tamen magno prouentu oritur. In Italia doctiorum nullus se vidisse nos monuit, neq; vidimus ipsi alio loco, quā secus insulam & lacustres tractus Montis Cœti Narbonæ ad piscatorum attegias. Hæc merita est argutam pictoris manum, vt sit Diuini philosophi Theophrasti monumentum, qui nos illius monuit, recentiorum nullus. Quæ si Athenis nobis dono missa fuisset, haud tamen continuò magis Atheniēsum, quā Monspelliēsum, Narbonensiumue cichorium nuncupanda fuisset.



Monspelliensium Dens Leonis Asphodeli vel Leucacantha bulbillis oblongis an Condrilla altera Dioscoridis?

NIS I illud Bulbosum Cichorium nostræ etati innotuisset, meritò quis putasset hanc esse Condrillam Dioscoridis oblongis & circumrosis folijs, humi sparsis: radice rotunda, quam etiam Plinius radice fabæ simili aliquando numerosa describit. Verum vt trouis modo accipias, è Pliniana designatione, aut Dioscoridis codice certum est, illi Cōdrillæ melius congruere vel bulbosum Cichorium nostrum, vel Dentem Leonis vulgarem: etenim si Pliniū sequaris, nostrum Bulbosum dicas illum exscripsisse ex Theophrasto, cuius quidam Perdiōn Herbam esse augurantur, aut alio quopiam Botanico. Sin non legas apud Dioscoridem radicem *κόνδριον καὶ σεγγύλην* non perperam Dentem Leonis vulgarem statues esse secundam veram Condrillam, atq; intelliges deprauatam fuisse lectionem, fortèq; legendum, non *κόνδριον*, sed *κονυφῆν σεγγύλην*, quā videtur doctissimus Ruellius interpretatus. Quippe minùs aptè quadraret, radicem Sonchi huius benè adultam esse & succo plenā dicere, eandemq; leuem aut minùs ponderosam. *BYLRAS.* At sic etiam aptior foret hæc, quam vtrauis illarum ex hac & Pliniana interpretatione. *PHODEL;* Radices namque huius plantæ tenues sunt, carnosæ, succo refertæ, rotundæ in mucronem ad verticem, oblongæ fabæ quadamtenus similes, vt Plinius notat, quem hallucinatum, vt alias putassemus in collatione primi Sonchi Dioscoridis (cui adnascuntur grumi, nodiue gummei circum caulem fabæ tuberculo similes) nisi Plinius non primam, sed secundam Condrillam describeret hîc verbum de verbo fermè è Dioscoride, aut consimili classico autore. Huius facilis prouentus in Hetruriæ, Galloprovinciæ, & Norbonæ marginibus satorum & pratorum Iunio & Iulio flores luteos, papposq; gestat multò maiores, pallidiores quā Dentis Leonis: nec tubi caulium ab similes multum, folia etiam humi strata, sed minùs altè incisa, aliquantum glauca & hirsuta propiùs Cichorium Syluestre referentia, sed multò latiora. Gustu amaro acri & Dentis Leonis: *vi- 504. Math.* res, quas dicemus alibi oportuniùs, latuere nostrum Commentatorem, qui hunc Dētem Leonis nouitatis & peregrinitatis titulo iactat Constantinopolitanum Cichorium, cum tamen Sienæ illius patriæ, inque Hetruriæ, Liguriæ, Galloprovinciæ & Norbonæ pratis non parum copiosum istud propeniat. Neq; enim si flores sunt huic duplò fermè maiores magisq; pallentes, quā communis, propterea putādum sit feliciùs prouenire aut frequentius Constantinopoli, quā Mafsileæ, aut Monspelli, vnde scimus tum Commentatori, tum alijs non paucis scriptoribus hodiernis missas & obtrusas ple- rasq; plantas pro Aphricis, Syriacis & Constantinopolitanis. Sic res cadit pigris & ambiti- osis ingenijs, quos res nondum visæ oblectant, vt pueros picturæ capiunt & decipiūt.

An

An putat peritos illicò istud Cichorium admiraturos, quia Constantinopolitanum erat & à Casareo oratore missum? An non pudet tantum rei Herbariæ scrutatorem non dum nosse Cichorium patrum, & plus credere oratori occupato muneribus aulicis, quàm exercitato ad discendas varias species Seridis.

VVLGIDENS Leonis, siue Vrinaria, Tragopogi flore & semine,
folio pinnis dentato.

Ger. Korkkaut et Phaffenblat.
Belg. pappen cruyt.
Ang. Dent de Lyon.
Gall. Pissenlit & Dent de Lyon.

NEOYE hæc sit Chodrilla, vt cui prorsū absint tuberculi, tum radicis, quales Plinius & Dioscorides innuere videntur, tum cauli imo grumi desunt quos nomen designat: *χόδρις* enim grumi sunt, concretionē siue nodosā, cuiusmodi in mammis, in quibus lac coaluerit, inq; duritiē cōcreuerit, quas *μαγνὸς χόδρις* Græci, dicūt nisi Dēti Leonis contigerit idem quod Drabæ, cuius radici interdū inest tuberculus, interdū nullus, atq; nostrati idē quod fœniculo, Tragacanthæ, Rutæ & mastichæ, quæ quibuscūq; in regionib⁹ micæ Gummi, lacteæue concretionis tuberculos habent: in nostris tractibus vt plurimū tale nihil. Etenim secundum illam plantam cœruleam & Cichoreaceam, quam priorem Condrillam posuimus, nō parum refert Cichorium & Condrillam Dens Leonis vocata, siue Vrinaria Herba *Pissenlit* Gallis pueris dicta, quasi Lectiminga: aluum namq; supprimendo, obstructionēq; referendo. Meseraicarum plus lotij deriuat in vesicam, quàm quantum pueruli retinendo sint, præsertim inter dormiendum, coq; tunc imprudentes & inuiti stragula permingunt. Siquidem mulierculæ medicæ & pueruli rustici in pratis, prope tumulos aggerulosue Talparum terra semiobruta eōq; (veluti Endiuæ cōtingit) germina suauiora minūsq; amara, candidiora effossa in acetarijs vorant, aut iusculis indunt. Alit, vrinas ciet & somnum conciliat, quapropter Hedyoin quidam maluerunt dicere, quam superius Luteum Cichorium: tametī appellatio pluribus Intybaceis & Condrillis congruere potest. Cuilibet genti hæc multò notissima, folijs Cichorij sylvestris, latiorib⁹ & lacinijs altiorib⁹ vtrinq; dentatim, ferratis, humiq; fermè stratis. Eradice Cichorij digitum crassa, aliquantum lutea, & lacteum succum, dum vulneratur, fundente, pediculorum tubuli potius quam caules tenelli nitentes, lacteq; turgentes florem speciosum, luteū, multipolum Tragopogi vel Scorfonæræ promūt, vere & æstate partikulatim, cesarie papposa dilapsa, capitula instar Monachi capitis glabri aut calui visutur.

CONDRILLA Coronopi aut Cyari tenuifolia,
lutea vinearum.

PVTARVNT etiam nonnulli doctissimi hanc esse alteram Condrillam Dioscoridis, vt qui superiores nōdum nossent, nec hæc sanè ita absimilis, turget enim amariore & pluri lacte quàm Cichorium. Sponte tota æstate calidiorum regionum vinetis & oliuetis glareosis obuia passim est, folijs palmum & sesquipalmum longis angustis acutisq;, laciniarū ligulis vtrinq; dētatis, crassiorib⁹, pallidis Resedæ magnitudine, similitudine & situ, caulem stipantibus striatum Cichorij agrestis, luteum diuisum alis flore Hieracij aut Lactuæ gerentibus, inq; pappos diffluentibus, amariore & acriore sapore.

CONDRILLA viminea viscosa
vinearum.

Iisdem

I S D E M ferme natalibus agri Linguagotici est quædam Condrilla visu pulcherrima. Plurima Iunio & Iulio floret cis pontē Castrinoui à Monspellio vix sesquimiliare. Radix vniuersaq; planta lacte turget, & viscida est tactui, creberrimis vimineis viticulis, flexu mollibus, candidis, rectis, cōfertis, affurgit, duorum altitudine cubitorum, folia in imò Cichorij aut Cyani incisura, sed valde exilia & tenera, reliqua foliola secundum viticulorum longitudinem certis & æquis distincta intervallis ad fastigium vsq; porriguntur, speciemq; virgarum viridi albq; variegatarum præbent, summis viticulis prodeunt, flosculi lutei in pappos dehiscences. Hic pictura adest.



Verruca CONDRILLA.

Cæterum Condrillam Cichoriumué illud Syluestre quod Zacyntham vsq; peregrinitatem affectans vocat Commentator: tam certum est oriri in Italia, (ne è Zacyntho insula Græca eam euocet) quam parum certum semel voratam, quod aut idem, vt multi de alijs quam plurimis fabulantur, delere verrucas: Illita verò posse, certum & commune illi est cum quamplurimis, quarum succo exurantur aut exsiccantur verrucarum radices & appendices tum calidis vt Tithymalo, tum frigidis vt Plantagine equiseti, intermedijs vt Heliotropijs de quo nomen verrucariæ testatur idem.

*SERIS, sine INTUBUM Satium, Latifolium, ENDIUIA,
& SCARIOLOA officinis.*

*Ger. Scariol & Endiuien.
Gall. Endiui.
Belg. witte Endiue.
Ang. White Endine.*

QUAMVIS Intubi nomen Latinis cunctas complexum esset Seridis differentias, tamē postea Græca prolatio ex Intubo Endibion, quasi Intubion detorsit, atq; dūtaxat vni speciei domesticæ Seridis adstrinxit, quā Endiuia & Scariolam (pariter è Seride deprauatam) dicimus vulgo. Ea gravioris amaroris, præsertim si mitescat Holitorum industria, sed frigidioris facultatis est quam Cichorium, à quò non tantū cultu gradu, agriue bonitate, sed etiam generica differentia distat: nullo enim neglectu, transmutatione alioué incommodo visa fuit vnquam in Syluestrem aut picrim Cichorium degenerasse, aut hæc ad speciem huius Seridis promouisse. Et manifesta radicum differētia, est enim Cichorij bene habita carnosæ admodum grata: Endiuia verò fibrosa penè nulla nulliusq; vsus in cibis, alicubi tamen in quibusdam compositionibus, Et tametsi non negarim omnia summa genera in naturæ ditione fuisse Syluestria, antequam seri, aut coli cœpta fuissent: tamen certum est tum placitis, tum obseruationibus rei Rusticæ multis, quamplurimas plantas esse quæ nunquam nostro saltem orbi Europæo fuerunt, aut fieri potuerunt Syluestres: tametsi aliquantum variant vt hæc, angustioribus iam, iamq; latioribus folijs, & latiore habitu: verum semper ideam suā sibi aut retinet, aut interit.

H. j.

Latior

Latior multò exit è femine Italico, aut cuiuspiam regionis meridionalis, vnde solent ferere quidam Brabanti, Angli, & Germani holitores : simul ac terna, quaternauè foliola eruperunt, in solum pinguius latamine multo transmouetur, lateritioq; frustro media oneratur folia, quo latius se porrigant luxurientq; qua industria amarorem exiit, gratiamq; initum Hybernis mensis ad acetaria, seruatur obruta terra, fimeto, straminèq; infimæ plebeculæ notissima, nomine *Albe Endiuie*, quando folia sunt candorem assequuta, per Autumnū, & Hyemen virens, folijs latis oblongis, ex candore viridantibus initio est, Lactuceis proximis, proximum caulem amplexis, in quo flores cærulei Seridis, Cichorii semina, (& interdum flos) alba, non secus atq; Cichorium interdum meminimus: radice albida, proluxa, marcescente, dum semen maturuit.

Crispa.

HANC (quod idem Lactucis & Brassicæ contigit) apud cultiores Romanos holitores videre meminimus: folijs amplioribus, rugosis, inq; plicas contractis, crispantibus, Brassicæ in morem, caulem, flores, & semen non disparia alentibus.

Varietas.

Seriola aut Endiuola.

EANDEM hanc acutis, non altis lacinijs, folijs angustioribus, nec diuersam caule, flore, semine, & radice alunt, quidam Horti Ligurum, Tuscorum, & Gallorum, vocantq; Endiuolam, & Seriolam, quia minor tota sit.

SERIS DOMESTICA, altera Lactucina Diosco. amara, angustifolia, Officiniana molim, sola ENDIUIA, agnita & recepta, perperam recentioribus Lactuca Sylvestris putata.

SPECIEM hanc incultam Seridis satiuæ, non varietatem facimus. Est enim folijs dum primulum pullulant, & emergunt altius, Scariolæ hortensis: postea adultiora in effigiem Dentis Leonis sinuantur dentatis oris, & nonnullis quasi in dorsi spina aculeis uti in nostra vera Sylvestri Lactuca: Caulis quaternum cubitorum, hispidus, vnicus, rectus, lacte turgidus, floribus luteis, pallidis Lactucæ donatus: amaro gustu, & præsertim vetustioris, acri radice, pusilla, fibrosa, Seridis hortensis, Syrupo de radicibus miscenda consuetudine Practicantium, quos doctissimos barbaros, tam proteruè quam inscitè, quidā declamatores putidi ridet, & spurcis conuicijs lacerant, quod hanc plantam Endiuiam veram putarint, & etiamnū vsurpent nō modo ad Syrupos de radicibus, de succo Endiuie & alios Nicolai, sed etiam stillatitias ex ea eliciant, quibus suas Rhabbarbari macerationes parent. Esse quippe nimis calidam, amaram, ingratam, quidam illorum reprehensorum, alij autem esse Sylvestrem Lactucam, nec aliam se nosse dicunt. Sed enim qui institutum perpenderit veteris Barbarorum nostrorum scholæ, animaduertet illos magna ratione & experimento nequiquam contemnendo fultos. Quippe non solum hanc Endiuiam, aptiorem esse decocto succo, & stillatitia ad intemperies, obturationes Hepatis, & primarum venarum, sed etiam macerationes Rhabbarbari, Myrobalanorum, & similiū medicamentorum: cum enim sit paulo tenuiore & minus excrementoso humido, melius referat, & abstergit: tum etiam intima rerum macerandarum peruadit, nec calore exuperat, aut amarore nocet, cum eius amaror non sit à calido, aut saltem non calidus, ut norunt cultioris Philosophiæ periti, & studiosi conciliare apud Galenum, & Auerroem, questionem de Opio, Meconio, Papauere, Lactuca, Mādragora, & non parum multis alijs amaris, multum tamen frigidis, quæ accuratè in remedijs dicentur. Quin Dioscori. docete, Sylvestria Intuba, siue Serides Sylvestres, stomacho meliores satiuis, quia ipsum estuantem & tenore resolutum refocillet: in cibis voratæ, & foris admotæ. Et notæ huius melius congruunt Endiuie siue Seridi amaræ angustifoliæ, quam Lactucæ Sylvestri, cui nostra paulò inferius describenda, paucis adhuc cognita & nulli depicta plenè quadrat.

STIRP IV M aduersaria noua.

87

SONCHVS ASPERA, Vulgi flore Hieracij, folijs Dentis Leonis, alias
Dipsaci & Lactuca, an Dioscoridis ARBORESCENS
SONCHVS tenerior latifolia?

{ Germ. Gens distel.
Ang. Sow thistle.
Ital. Cicerbita.
Gall. Laiteron & Laiteron.
Bel. Bansen distel & Melckewep.

PROPIETAS adeo est Sonchi natura Endiujs, vt multi etiam hodie putent spinosam Endiuam nostram, esse Sonchum asperam: verum tres, cum notissimas habeamus Sonchos, illam Endiuam vt Officinarum retinuimus. Sunt autem he tres lacte pregnantiores vera Sonchi Græcis παρὰ τὸ σῶον χεῖν quia salubrem succum de se fundant, ad estuofas stomachi lincinationes & Hepatis biliofas obstructions vtilissimum, Cicerbitam Latini & Itali etiamnum vocant Gens distel Germani: siue spinā anserinā, spinosę namq; sunt omnes Sonchi, sed quedam horridiuscula aculeis, quedam perpusillis aut nullis ferè visitur. Quarum duę frequentiores maiores sponte, cultis & incultis, segetibus & vinetis: minor, minus obuia & nota. Aspera quę vocatur, è radice proluxa, subflaua, stipatu fibrarum comosa, caulem erigit concuum, quaternum & senum cubitorū, bene adultum, alatum, & floribus donatū, luteis papposis, Senecionis, aut Hieracij minoribus. Folia ab imò numerosa, laciniosa, Dentis Leonis vbi solo squallidiore oritur, sin verò lætiore aruo & pingui, lactuceacea sunt: Dipsaci magnitudine leuiusculis, per ambitum lacinijs & spinulis aspera, cunctisq; sui partibus adeo tenerescit & fruticat, vt arboream senum, septenumuē cubitorū proceritatem equet, cibo etiamq; tunc fit mitior & aptior: quare multò commodius statuisse, istam esse Dioscoridis arboream, cum duę sint adhuc notiores, & aptiores ad explendum Dioscoridis trium Sonchi differentiarum descriptiones, quam Endiuam illam Officinarum, de qua superius. Et faueret coniecturę plantę huius teneritudo, ac foliorum latitudo, quam dicimus contingere. Soli bonitate aerisue & regionis varietate, quemadmodū in Cichorijs & lactucis, quę cum agreſtes sunt, hirsutiores & spinosiores proueniunt: cum verò scelicus adolescunt, tenerascunt, minusq; horridę fiunt. Verum Endiuia illa nec tenerescit, nec vnquam esculenta fit, potius amarescit, & sarmentosa euadit, simul ac floruit.

SONCHVS LÆVIS, laciniaſ folijs.

{ Ger. Lasenkol.
Bel. Bansen latauwe ende Caupnenkrup.
Ital. Cicerbita liscia.

ALTERAM vero leuem dixerūt, etsi folijs sit magis scabris altioribus, angustioribus & inconditis lacinijs, longioribus, minus tamen multò spinis horridis caule ambiētibus: per quosdam quasi genicularū exortus rectū stratum, rubellum, concuum, lacte turgidum, floribus papposis Senecionis aut Iacobę habitu ipso, foliorum quadamtenus Papauer Corniculatum prefert: Oleracea tamen esse potest, tamen quia non colitur non mandatur.

Varietas.

Diuerſam quandam ab vtraque superiore, passim iisdem in locis, vinetis & segetibus obseruauimus: tenuiorem totam & foliorum incisura, atq; similitudine Papaueris erratici (quemadmodum superior cornuti) circumfusa, imo cauli è Radice parua fibrosa, pedali & cubitali Hieracij modo alato & floribus luteis non diuerſis.

H.ij.

HIERACIA.

NON secus ac Elaphoboscum à Cerno, Chelidonia ab Hirundine, Perdicias à Perdice, permultaq; aliæ plantæ mutuatum est nomen Hieracium ab aue cognomine, quæ sibi huius succo aciem calliginosam collustrare consueffet, aliòquin è genere Sonchis non diuerso sed proximo est omne Hieracium, cuius multæ vel differentiæ, vel varietates sunt: & omnium frequentissima quæ maius vocatur.

Maius.

EST itaq; Maius vocatum vbiq; vinetis, agrorum marginibus, & pratis ficcioribus frequentissimum, è radice fibrosa, Endiuæ vel Sonchi aspera, folia laciniata pinnata Dentis Leonis vel Sonchi diuisura promit, caulis inanis striatus nonnihil interdum rubens pedalis & sesquicubitalis flores Senecionis vel Sonchi ex luteo pallentes sunt. Tota lacte turget non secus ac Lactucæ & Sonchi.

HIERACIVM minus premorsa radice, folijs acutè laciniatis, flore luteo.

MINUS Hieracium pratis montosis Angliæ admodum familiarè, cauliculos fundit iunceos, læues, graciles, sesquipalmes: è radice parua fibrosa, plantaginis aut Succisæ modo præmorsa, eoq; plebeculæ Hybernæ, Morsum Diaboli vocatū. Folia pinnata angustius laciniola, delicatiora, minora, vti etiam flores luteoli, in pappos euolantes.

HIERACIVM aliud minus, non lacinosum folijs Pilosella.

ALIVD etiam in squallidis, sterilibus, saxosis, glariosis, ericetis agri Norbonensis hirsutis, palmaribus, cauliculis, exit & sesquipalmaribus folijs pusillis pilosellæ aut potius Hieraci Bulbosi: & Diofcoridis, radice perpusillis capilla mentis fibrosa, floribus item papposis paruis non dissimilibus.

Varietas.

HIERACIVM longius radiculatum, caule numerofo nudo folijs humi in orbem accubantibus, obtusè laciniatis, flore Dentis Leonis.

QVOD in sabuletis Belgicis & Northmanicis passim obuïu agris vt plurimū folia in orbē humi strata crassiora edit, magis quā bursæ pastoris, circinnatis lacinijs Eruæ, cauliculos, graciliores glabros mucrona os, alis multis diuisos, floribus donatos, Dentis Leonis sed minoribus inq; pappos euolantibus, radice nuda nec fibrosa caulem longitudine æquante.

HIERACIVM montanum folio Lycopsis, Cirsij, Sequanorum flore.

MAIUS & rarius cæteris istud in montosis Sabaudia, Allobrogum, & Iuræ finitimis: quod in vireto Stirpium delicijs ditissimo cuius Londinensis & Pharmacopœi peritissimi Hugonis Morgani flores edidit Iunio Cirsij lutæos semenq; hirsutum Tragopogi, ortus & caulis aliquantum Carduum Benedictum assimulant aut Cirsium, cuius etiam est folijs obscuris per ambitum crenulis peracutis asperatum & acrius, nec perinde vt superiora lacteum.

HIERACIVM Sabaudum Montanum folijs & lacinijs Condrilla cerulea, flore Luteo Dentis Leonis.

Eidem


ET EM Morgano floruit altera Hieracij species Iulio & Iunio, Condrillæ caruleæ folijs altius incisis, viridibus, in caule flaccido & molli glabro. Flores Dentis Leonis alijs quantò minores, radice Tragopogi.

TRIDACHES: sine LACTVCAE.

QVemadmodum Seridis recensuimus multas species subalternas quarum quædam longius, quædam verò propius à se ipsis absunt, sic possumus constituere lactucam illius Endiuæ speciem quam Lactuceis folijs donatam ex Dioscoride descripsimus. Quippe Lactuce nomenclatio, à lacte ducta & distincta fuit speciei huius, quia plus lactis resudaret cæteris Endiujs & vescentibus mulierculis augeret. Ea propter Græcæ Τριδαχ dicta, τὰ τὰ δὲ τὰ quæ folio ficulneo (vt videtur) vocarūt, utpote, lactis non expertia. Cum autem lactuca hortensi esculenta nulum olus frequentius aut notius sit de cuius collatione Sylvestris lactuca noscenda fuit & censenda recentioribus.

LACTVCA AGRESTIS: Scariola hortensis folio, Lactuca flore, Opij Odore vehementi, saporifero & viroso.

NAM ea Seridis species quæ folia habet Dentis Leonis ritu incisa, quam propter & proceros caules & frequentes aculeos Sonchum arboream Sylvestremue quidā putarunt, nihil lactucæ simile habet præterquam lac & semen. Folia aded intybacea sunt vt Pharmacopœos ubiq; etiamnum ea in pertinacia alat qui hancce pro Sylvestri Endiuia agnoscunt & vsurpant, tum Syrupis, tum Syllatitijs liquoribus. Horum plerisq; adeoq; etiam Doctis præceptoribus nostris, vt Rondelletio & Assatio maximo styrium Norbonensium indagatori, altera lactuca non minus præsertim hic in Anglia frequens quam illa, sed longe proprius accedens qualibet sui parte ad lactucam vel ad seridis latifolij vulgo Scariolam lactucæ simillimam, feruentibus solibus Norbonæ locis apricis huius lacteum succum exuberantis & præcopia transfluentis dum colligeremus, vix saporiferum ferre poteram⁹ odorem qui teter & ingratus vt opij. Caulis bicubitalis, glutinosus, Flores lactucæ, semen aliquantò minus nigricans. Eandem seuit in horto Morganus Londinensis Pharmacopœus peritus, vbi à fatiua specie diuersam facile discere ac meminisse par est, ne cultæ quidem foliorum rotundam oram, ac pro sui magnitudine latam, amplam, nec laciniosam, (qualem vult Theophrastus & Dioscorides) Dentis Leonis modo inesse, vt Endiuæ Officinarum præsertim adultæ,



Lactuca Sylvestris verna.

LACTVCA SATIVA, Folio Scariola.

ET fatiux quidè lactucæ notius nihil, cuius varietates complures sunt nō secus ac Brastica. E Radice fibrosa Endiuæ caulem, cubitalem & sesquicubitalem, rectum alis diuisum, & lacte pregnantem edit, cui insunt folia seridis fatiux similia. Flores copiosi
H. iij. pusilli

pusilli luteolj in pappos abeunt. Semen pusillum album teres compressum Phalaridis lauius, angustius.

LACTUCA CRISPA, non capitata.

ELEGANTIAE studiosi Olitores, in hortis colūt: quamplures huius Lactucae varietates, nempe Crispam, quae eadem cum superiore esset, nisi illi essent folia reductiora, contractiora & bullatis, rugis crispata: vnde tota tenerior & olere gravior habetur. Semine alioqui & reliquis partibus, à superiore non differt.

LACTUCA, ROMANA. dulcior, nigriore & Scariole hortensis folio, semine nigro.

Semine varietates.

RARIUS hæc in Gallicis & Germaniæ hortis colitur, frequentissima tamen Italicis, Romanis præsertim, vnde Romana vocata fuit: nec à vulgari distat, nisi quia nigriore folio, nec perinde scabro semine nigro, tenella tota, gustu dulcior, eoq; gravior, aptior ventri mouendo, quam merito putet quis scitè illo Martialis carmine designatam. *Prima tibi dabitur, ventri Lactuca mouendo.*

LACTUCA satina, sessilis, siue capitata, rugosis crispis Brassicæ folijs.

CAPITATA verò quæ vocatur, propter glomum foliorum conuolutorum, atq; stipitorum in sese, quasi multæ tunicæ mutuo appressæ, ad æmulationem Brassicæ capitatæ & sessilis vocatæ, quia vixdum à radice exiens foliorum globo, infideat humi, qua de nota est cuius notissima, ac tenerrima: primæ in acetarijs commendationis, albicat. Si quæ sunt præter ea Lactucae minus verè dictæ nomine, vt Theophrasti marina, vel lacte, vt Tithymali, suis locis dicentur. Per multa alià experiuntur Lactucae mangonia scitè conuenta veluti & Brassicæ, quibus facies & fructio, in olere non admodum dispar.

BRASSICÆ.

- Alba, Sessilis, glomerosa, aut capitata, Lactucae habitu.*
- Eadem conuoluta & arctè occlusa, apud Belgas, rubra colore, enematis aptior.*
- Sabauda, Vulgo Sauoye, patula & minus occlusa, foris virens, intus albicans.*
- Racemosa, non globosa, vulgo Ital. Cauli flore, siue florida Pompeiana.*
- Laciniosa alba, & Rubra Cumana, vulgatior.*
- Nigra vndantibus, crispis & laciniosis folijs.*
- Marina multiflora, Sylvestris, monosperma.*
- Caulorapa, brassica peregrina, medio caule turbinata & rapata.*

Caules siue Brassicæ diuersæ.

VOLVIMVS superius Raporum generi comparare & subdere Brassicas, propterea quia mutua sit quædam amicitia & affinitas vtriusvis seminis, vetustioris præsertim, vtramvis plantam generandi, vnde antiqui Græci Raphanum Brassicam, vel hanc Raphanum vocitabant. Attamen commodior occursum, aliarum plantarum fecit, vt huc post Lactucae distulerimus, historiam, Brassicæ quam ἀπὸ τῆς βραχέως à vorando è Græco dictam

dicta verissimile est. Estur namq; tota à plebecula tū cruda, tum cocta, vel muria seruata, etiamnum hodie apud Germanos & Italos: dictam etiam *κεδμεν* quasi *κεαμεν* aut pupillas oculorum lederent, Columellæ hortus & verficulus statuit, *Nunc veniat quamuis oculis inimica corambe*. Tametsi placuit nonnullis à *κόρα* & *αντίση*, quia ebrietati aduersetur: qua quidem viget commendatione apud Germanos, si vspiam alibi. Sed vbiq; notissima, quare nullum est opere prætium tam vulgarem exactius notis designare, satis futurum, quòt cultu vel euetu alio varios subit habitus & varietates, summatim perstringere: Est quippe omnis Brassica caule meduloso, rugoso, squammatim & geniculatim scabro, radice lignosa, fibrosa, floribus, semine & filiqua Rapæ: folia ortu & aspectu Lactuce, cuius etiam varietates imitatur.

Caterum Brassicam marinam siue Soldonellam, magis vsu & nomine quam re similem, inter volubiles dicemus.

BRASSICA alba Sessilis glomerosa, aut capitata Lactuca habitus.

κεδμεν

Gall. Chou cabu, blanc.
Ger. Kappistrout
Belg. witte Auytkoolen & Cabuytkoolen.
Ang. Cabbage.

Nihil similius Crispæ capitatæ Lactucæ quam hæc Brassica: folijs etenim admodum crispis, densè inter se conuolutis, intus forisq; albis teneris, interna parte concavis carinatis & quasi media costa, exterius verò nervis venosis, digitum crassius medijs & secundum longitudinem hinc inde cursantibus, aut obliquantibus, cuius in olere apud Italos & Gallos prima commendatio.

Eadem conuoluta & artè occlusa, apud Belgas, RYBRO colore, enematis, aptior.

Hæc nisi colore, à superiore qui ex purpureo elampelino, in cœruleum languet differt. Vtriusq; nusquam maior prouentus & fetura quam apud Belgas visitur, qui naves onustas in vicinas Germaniæ, Angliæ & Hispaniæ, regiones deuehunt. Hyeme cibis sunt gratiores, enematis, valdè accommoda, quare sapissime miscent, Germani & Belgæ medici. Vere primo panduntur folia & in caule bicubitali, tricubitali vnciam crasso erumpunt flores, filiquæ & cornicula Rapi similia.

BRASSICA PATVLA, Sabauda vulg. Sauoye, Intus Albidis, foris virentibus folijs.

Nec minus speciosa quam Sabaudam recentiores hodie vocant, à sessili Capitata diffidet tantum colore. Capitulo patulo, minus clauso, & floribus albis. Impatiens frigoris admodum, quare in Italia, Sabauda, maritima plurima, rarior ad Septentrionē, vbi reliquæ brassicæ frequentissimè coluntur & eduntur.

BRASSICA florida.

ELEGANTIÆ peregrinæ est quæ vocatur florida, aut potius racemosa, vel botritis: sunt enim quædam germinula florum, quæ densissimis, muscosisq; albidis, oleæ erumpunt: oblongis racemis è medio quasi foliorum centro, vbi quasi vtero, conduntur & fouentur, semine Rapæ, gustu in olere delicatiore.

EA quæ vulgarissima Brassica folijs Rapæ laciniosis nec inter se implexis est: vt plurimum ex albido & pullo albicat.

Eademq; in hortis Rubro colore ex cæsis, crebra visitur. Cui interdum carneæ costæ carinæ ué dorsi foliorum rubent solæ: Interdum solæ albæ sunt, reliqua foliorum tunica purpurante, aut vndante, oris & fimbrijs crispantibus.

ANGLICA MINIMA BRASSICA.

MEMINIMVS, etiam in Angliæ hortis pugillam brassicellam, totam niuem præterquam extremas oras laciniosas fimbriatâsq; plicis crispantibus, & vndulis rugosis, purpureis, aspersas maculis, quas etiam ad corollas & olfactoriola nectenda: dum tennella adhuc est in hortis colunt.

REGIONIBVS ad meridiem quibus præsertim oleum abundat, hæc multum familiaris in olera quia suauissimo gustu est, oleo præsertim vel condita, vel elixa, aqua mixta: folijs est quam superiore vulgata, nigrioribus, viridioribus, & rugosioribus.

Brassica, MARINA, SYLVESTRIS, multiflora, monosperma.

PRÆTER hæc elegantias, fimbriatæ, crispatæ, & floridæ, Brassicæ: quæ in Belgio, Francia & Anglia, magna copia feruntur: est etiam perquam pulchra Brassica Sylvestris, Dioscoridis specie diuersa, locis oriunda Angliæ maritimis, ad Portlandiam insulam: sed quia inculta, neglecta, Hispidior tota & predura est, cymæ ingratiores multò, cibo toleranda tamē. Cuius semine iam diu Medicus Anglus hac parte exercitatus, Turnerus nos donarat, eaq; monocauli & μονοσπερμον vocandam, à semine singulari volebat. Sunt enim in florum pallentium alborum congerie eleganti, densa & umbellosa, multis in ramis filiquæ breuiores crassiusculæ, quibus singulis singulum inest semen, paulo minus Pisi, Soldonellæ, aut Orobi equale. Folia eadem ferme quæ Brassicæ nigre, sed crassiora & satiore aspectu, & fimbrijs vndulatis plicisq; admodum artificiosis.



CAVLORAPA, BRASSICA peregrina, medio caule turbinata & Rapata.

SVPEREST mirifica illa Naturæ lusus recentioribus, Caulorapum vocata, planta peregrina, è Græcis, hortis nostris inquilina: Rarior Septentrionalibus, vtpote, cælo rigidiori minime affueta. In Italia nobis, Florétia, Patauij, alijsq; locis visa, folia illi vulgaris albæ tum aquatæ Brassicæ, per ambitum latius sinuata, radicæ lignosiore caulem effert: non altiore pede, qua folia oriuntur, quorum exortus ambiunt & inuoluunt: protuberantem bulbi instar capitatû, fungosa carne Rapum, vnde nomen Caulorapum conflatum, vti natura ipsa. Quod tuberosum Rapum, Cauli reliquo concolor est, & sapore, medullæ eodem quo caulis.

STIRPVM aduersaria noua.

93

BETA, BLITVM, AMARANTHVS.

Beta alba Lactuca & Rumicis folio, flosculis luteolis CICLA Officinarum
Sicula Theophrasti.

Beta nigrifolia.

Beta rubra siue purpurea, Amaranthi & Blitifolia, radice turbinata.

Beta rubra vulgaris, non turbinata.

Blitum album, folio Betae, Attriplicis flore.

Nigrifolium rubrum Blitum.

Blitum paruum angustifolium.

Amaranthus purpurea sativa coccinea.

Amaranthus maior floribus & pannulis caudatis purpureis.

Amaranthus tricolor, vulgo Papagalli.

Amaranthus holosericeis, sanguineis, teniatis, reticulatis floribus, hilariore aspectu.

BETA ALBA. τεῦτλον, ἡ σεῦτλον:

Gal. Bete, Iotte, blanche.

Germ. Weissert Mangolt.

Belg. witte Bete.

An. White Betis.

QV o modo non frustra optent probi primates, in qualibet re publica bene instituta, vt Pharmacopœi sint non modo fidi & industrij, sed etiam simplicium cognitione exercitati, qua sine eorum ars fucus est aut scelus, quando hodie videas eorum peritissimos qui se vocari cupiunt, & quasi medici cui famulantur Theseos qui quid intersit inter Blitum & Betam, nec legendo in libro aut horto oculis manuê discernere nequeant. Sed vtrumlibet pro altero accipiunt, proter geminam nempe nominum & foliorum similitudinē, tametsi non parum distent inter se.

Betam etenim a litera Græca β ita sic dictam volunt, & canit Lucius Columella, seu litera proxima prima, deprimitur folio viridis pede candida Beta. σεῦτλον etiam opinantur vocatam, quia in proceritatem amplissimumq; ambitum impellantur folia & caulis à radice, presertim albæ Betæ, quæ maior, vtilior & vsitator, cæteris est, vocaturq; Officinis Cicla detorto nomine à Sicula siue Scicilia insula vnde primum nomen habuit. Nullus hortus caret hac, folijs Lactucæ per initia magna similitudine, deinde Rumicis aut Plantaginis maioris, Caule pedali & sesquipedali striato anguloso alis diuiso in quo flores copiosi ex viridi luteoli & semen nigrum lucidum inuolucro herbaceo Isatidis Syluestris modo oclusum, Radix digitum crassa sesquipalmū longa fibrosa. Hæc quam reliquæ multò nitrosior & mordacior est, mucum elicit naribus sæccus: gustu quia mordacior discerni potest à Blitis, quæ sunt ignauiores, insulso gustu, magis humentes, et Choleram faciunt quemadmodum Cucurbitæ, Pepones, quæ dum nequeunt excitare facultatem expultricem cunctando corrumpunt cibum, ipsiq; corrupti vomitiones turbidasq; ventriculi motiones excitant, flatu multo mixto.

NIGRA BETA.

EADEM est & hæc, sed Nigram vocant, à foliorum colore, ex obscuro magis virentium.

RUBRA.

Ang.

STIRPVM aduersarianoua.

Ang. Redde Betis.
 Gall. Bete rouge.
 Ger. Koter Mangolt.
 Belg. Rode Beete.

Ab illis duabus distat hæc radice effigie, medio sui ventriosa & turbinata, Napi modo, foris intusq; tota rubet, sanguineo cruore suffusa, edendo suauior, nec perinde falsa est folijs, caule, floribus & semine superioribus non dissimilibus. Hæc rarior.

BETA RVBRA Vulgatior.

Nec hæc differt ab alba sine Cicla, nisi colore saturo rubente.

BLITVM Maius album.

βλῖτον

Gall. Blette.
 Ger. Mayer.
 Ang. Wilde sine orrage.

Math. 454.

Hisce natura & figura finiti ma Bliti ab insulso fatuoué sapore qui in eo percipitur nomen indepti, siquidem βλῖξ inertem, stolidum, stupidumq; signat, & antiqui βλῖ-
 τος quos Latini murcidos, stolidos, bardos, fatuos, bliteosq; dixerūt: indeq; Gallis con-
 uicium, *Belitre* & *Blitre*, in nullius frugis aut ingenij homines: tametsi videtur etiam La-
 tini Betam, pro specie Bliti aut pro Blito ipso accepisse, nisi lepidissimus Martialis non
 bene norit discrimen illo disticho.

Ut sapiant fatua fabrorum prandia Beta,
 O quam sæpe petet vina, piperq; coquus.

MAIORI & vulgatori radix gracilior est, folia fere Ocimi, aut Atriplicis glabra, ci-
 nereo colore, floribus item Atriplicis & semine pusillis Vrtice, compressis pericarp-
 is Betæ in cluso in caule trium quaternumue pedum, inuisa aut contempta Olitoribus,
 qui eam eruncant extruduntq; è suis hortis.

BLITVM MINVS album.

EST etiam hæc minor aliquantò in hortis, caule viridante, multis alis diuiso, angustis
 folijs triplo, quam Betæ minoribus, rubidis ex nigro floribus, radix multis fibris, se-
 men aggestum vt in Atriplice.

BLITVM RVBRVM.

Mat. effig. 453 Nec diuersa ab illa est Rubrum Blitum, nisi quia intensè rutilant sanguineo Caules,
 & folia ex rubro liuent: Semine ferme concolori.

BLITVM RVBVM MINVS.

MINOR hæc sponte etiam inter olera, sed puriorem & saturiorem fundit cruorem,
 quo exarantur characteres, non dispari nitore & rubore, atq; è Brasilio aut Cocci-
 nis baccis. Folia etiam Xerampelino exuperantissimo commendantur colore.

A M A-

STIRP IVM aduersaria noua.

95

AMARANTHVS Purpureus, saturo Coccineo.

{ Ital. Fior velluto.
Ger. Samat bluom & dausent schoon.
Gal. Passevelours.
Ang. Flower gentill.
Belg. Frouweelbloemen.

NOmenclatio Amaranthi ἀπὸ τῆς μὴ ἀδραχνέσθαι, cunctis cōgruit floribus, qui pēren- Effig. Math.
nes ac immarcescibiles diutius perstant, quare & Chrysocome, Heranthemo, agera- 1047.
to, alijsq; pertinacis coloris & decoris attributum fuit, cuiusmodi est istud Blitum: per-
pulchra florum purpura nitidum, nec senis, aut septenis annis vietum, decolorq; futurū,
eoq; *Passevelours* Gallis vocatur. Quod an Theophrasti, Diosanthos, & Phlox, in Ado-
nide herba dictum.

Vulgatior.

Elegantia studio apud Italos, Gallos, Germanos, & Anglos, in hortis multis feruntur,
& coluntur, quę non difficile ē superiorum effigie percipi possunt. Hęc autē est latis
Bliti Solani, aut Ocymo longioribus folijs, per interualla binis, secundum quę spicę
pannularum oriuntur aspectu blandę, holosericum mollitię, vellere, ac nitore prouocan-
tes, semine nigro, pūfillo nitente.

AMARANTHVS MAIOR, floribus pannulis
spicatis purpureis.

NEc huic dissimilem, sed floribus superna parte luxuriantibus, multis pannulis spica- *Blitam maius*
tis inflexis, se mutuo implicantibus, iucundissimo spectaculo, sed obsoletiore cocci- *Ma. 452. effig.*
na: cuncta reliqua non dissimilia sed maiora, caulis octuum aut denum pedum striatus,
& folia maiora multo.

AMARANTHVS tricolor, vulgo Papagalli sinē, THEOM-
BROTVM Persarum apud Plinium.

HVius venustas non de flore sed ē foliorum triplicis coloris, maculis scitē distinctis,
pendetur. Sunt enim Ocymi, aut Bliti, interdum luteo viuido, vel purpureo, nun-
quam etiam triplici viridi, luteo & sanguineo concolori, Psitacorum alis: quare plebe-
cula Flandra Papagalli vocant. Semē & flores Atriplicis aut Bliti: Hęc omniū rarissima.

AMARANTHVS Holosericeis, sanguineis, taniatis, reticulatis
floribus, hilariore aspectu.

SEd venustatis eximīa illa quę rarior in hortis Italicis, vberem prouentum florum
fundit maioribus, in arcum flexis, & quasi se mutuo decussantibus ligularum, vel pan-
nularum, caudis vegeto, & pleno rubro cruentatis, semine plurimo pregnantibus. Mag-
næ apud mulierculas commendationis non modo voluptatis Coronarię ergō, sed etiam
matricis renunq; profluuiia sanguinea & vlcera sanie manantia.

ATRIPLICES.

{ Satina albida & veluti farina aspersa.
Satina folio & flore purpurea, linens.
Sylvestris sinuata.
Sylvestris siue. Anserinus pes latifolia laceris lacinijs.
Atriplex. { Marina repens lutea & Xerampelina.
Pusilla olida hircina & vulnaria vocata, garum olens & poline argenteo aspersa.
Tota bona Spinacia facie.
Spinacia.
Atriplex Sylvestris, Polygoni, aut Helxines folia.

Helxine

Helxine Parietaria.
Helxine Cysampelos, inter Volubiles.

Phyllon thelygonum.
Phyllon arrhenogonum.

Mercurialis {mas,
 femina.}

Cynocrambe.

Heliotropium {maius,
 minus repens.}

Tornefol, vulgaris *Verrucaria*, & *Tricoccum Heliotropium* Pl.

Hortense siue *Holeraceum.*

Vesicarium, siue *Halicacabum.*

Vesicarium leguminosum, siue *cordatum pisum* inter legumina.

Sonniferum & *Lethale.*

Furiosum.

Solanum {*Sonniferum* Math: *Verticillatum.*

Arboreum, siue *Amonum* Italicorum,

Maniacum, an *Stramonium*?

Cacubalum Plinij, quasi maleficum.

Circaea.

Vua Paris.

Mandragoras {mas,
 femina.}

Melongenae siue *Melazana.*

Hyoschiamus {albus,
 luteus.
 niger.}

ἀτρίπλεξ. *ATRIPLEX SATIVA.*

Gall. Arroche.

Ital. *Atriplice.*

Hisp. Armoles.

Ger. zam *Molten* siue *Miltten.*

Belg. *Taine melde.*

Ang. *Orrage.*

NO n minus multiplex *Atriplicum* genus, nec illis adeo dissimile est ortu, facie, sapore, olere, & incrementi celeritate, vnde retinuit nomen à Græcis apud Latinos, ἀτρίπλεξ ἀνγίων quia suā celerrimē assequatur amplitudinē: cuius vnam speciem aut varietatem *Chrysolachanon* vocarunt *Dioscorides* tum antiquiores, tum posteriores cui folia quia marcescentia è luteo vel flauo in aureum vergunt, aut ex erampelino corruscant. Tametsi hæc aptius congrueret *marino*, cuius multa facta mentio apud *Dioscoridem*, quem & eius coarctos scriptores tacitè videtur negligentia arcessere *Plinius* in *Chrysolachano* flore aureo, folijs olcris tantum indicato. De *Chrysolachano* (inquit) non satis dici scio, nec plura reperio. Hodie tamen notissima quā plurimā *Atriplicis* differentia, Syluestris, domestica, maritima. Cunctis tamen quadantenus *Bliti* folia, ortus, modus, præsertim domestica sunt: radix fibris capillata, rectos scapos emittens, proceritate hominis striatos, in imo teretes, superius angulosos, ramulis diuisos, istidis foliis semine onustis: postquam lutei flosculi numerosi æstate & Autumno defluerint, folia sunt latiora ad basim quam *Betæ*, sed albida atq; farinacea, puluere muscido obducta.

ARTIPLEX SATIVA altera, folio & flore purpurea, linens.

Huic domestica prorsus eadem est ea quæ ex liuido purpurascit, aut rubet, caule & flore, alioqui non vlla sui parte dissimilis.

ARTI-

STIRPVM aduersaria noua.

97

ATRIPLEX Syluestris sinuata.

{ Germa. Wild Molken.
{ Gallis. Arroches sauuares.
{ Belgis. wilde Melde.
{ Ang. Wilde orrage.

SYLVESTREM distare specie à domestica, præter cultum frustra tentatum, folia etiã docent, quæ nigricant plumbeo colore Solani (qui cum lubens sociatur in viarum marginibus) ideoque antiquis atrum olus putabatur dicta: vbique locorum circum mœnia & fimeta multa, nota & neglecta syluestris Atriplex: luxuriat foliis minoribus, angustioribus obtusè per ambitum sinuatis vel dentatis, floribus item ex luteo herbidis,

ATRIPLEX Syluest. siue Pes Anserinus latifolia, laceris lacinijs.

{ Ger. Gensfuß, & Schweinstodt, & Gewtocht, quod sues interimat.
{ Gal. Pied d'Oye.
{ Ital. Pede di Ocha.
{ Angl. Goose foote.
{ Belgis. Gansen voet.

ANSERINVS spes, vulgò dictus, folio Solani, Atriplicis, & instar pedis Anserini laciniato est: Flore & semine racemoso xerampelino colore, radice fibris capillata, & circa hortorum & viarum fimeta passim non secus ac Atriplex obuia. Nullius in Officinis vsus; sues interimere fertur: Fusch. ico. 375.

ATRIPLEX MARINA REPENS, lutea, & xerampelina.

MARITIMIS Mediterraneis, & Adriaticis nusquam nõ obuia humi strata Atriplex, Caule, semine foliis laciniatis Syluestris Atriplicis & Spinaciae, interdum colore, sed crassioribus, latioribus xerampelino, interdum & luteo, sapore salso nitrofiore,

PVSILLA ATRIPLEX OLIDA

Hircina, Vulvaria vocata, garum olens, polline argenteo aspersa.

EST in Nitiobrigum agro, aliisque locis quàm plurimis herbula Atriplici censenda, Atriplicem caninam quidem si polline interspersa. Hanc notissimam fecit odor, & fermè infamem: odoratu nam dixerunt, qui eam ex urina Canis nasci arbitrantur. que Hircus teterque spiritus oplet nares, quo imbuti queruntur permulti se meretricum impuros oculos subodoratos esse: planèque referre odorem illum virosum quem prostituta libidinis scorta ex impura colluie congesta spirant. Inde vulgò futuariam dictitant: atque autumant, hac illitas vestium muliebrum plicas canes sagire, atque arrecto veretro Veneris æstu actos illas amplexos cupere inire, præsertim in templis ubi tetrius odor spirat, & minus ventis diffatur. Hæc vulgi sunt, tota cibus abdicanda.

TOTA BONA, Spinaciae facit. Bonus Henricus.

{ Germa. Guter Heinrich.
{ Ang. English Mercury.

SED TOTA BONA perquàm optima, magisquæ vsu quàm vlla peritia recepta, Mercurialis credita fuit iamdiu à plebe muliercularum, aut illis non multo peritioribus Pharmacopœis Anglis, quàm adhuc inscitiam magis pertinacia quàm vlla ratione fouent, quia fauit illis euentus. Siquidem est huic planta Fusch. Rumicis tertium genus. con. 262:

I.i.

deter-

deterforia facultas multò quàm Mercuriali, tutior in morbis feruidis, nec tamen est igna-
uæ in attrahendo facultatis, cibis verò multò Mercuriali gratior, tametsi plusculum
flatuum habet, & non ita procùl à Spinaciis natura abesse videtur.

SPINACIA.

Germa. Spinat siue Spinnet.
Gallis. Elspinars.
Italis. Spinacci.
Belgis. Spinagie.
Ang. Spynache.

SPINACIA siue Spinaceum olus à spinosis seminum aculeis dictum Latinis videtur.
Foliis est primo pullulatu triangularibus & sagittæ modo cuspidatis, deinde laciniis
& pinnis dentatis Atriplicis longioribus, sapore Betæ, semine aculeato, flosculo cadu-
co viridante Blitti, cibo quàm Beta alimentum suauius præbet.

ATRIPLEX SYLVESTRIS POLYGONI

aut Helxines folia.

IN vinetis & agrorum marginibus non rarò occurrit angustis foliis Lithospermi æ-
qualibus Sylvestris Atriplex, spargens humi ramulos striatos, cubitales & sesquicubi-
tales, follioso semine Isatidis, aut Atriplicis hortensis, & flore moschoso onu-
stos.

ἑλξίνη HELXINE PARIETARIA, VITRIO-
la, siue Perdicium.

Germa. Tag und nacht, maukraut. *Gallis. Parietoire & parietaire.*
Ita. Parietaria. *Belgi. parietarie &*
Hisp. Yerua del muro. *glascruyt.*
Ang. Pellitory of the wall.

NOTISSIMA de facie natalibus, & herente vestibus, semine & foliis, vnde nomi-
nis occasio, Helxine. Nullius enim regiones parietes muscidi vetustioræque rudera
hac non scatent: quæ etiam semel hortis adulta vix exigi potest, folium & facies A-
maranthi, aut Mercurialis, cauliculis è radice fibrosa rubellis teneris succulentis, foliis a-
spera hirsutæ pilorum, & semina Betæ, obuium quemlibet pannum arripiunt. Floscu-
li muscosi herbidi pallentes, multi vsus tota ad enemata, & balnea absterfioni accom-
moda, gustu item vt superficie abstergente nitroso bliteo, cui admodum similis. Cissam
pelos vero Helxine in conuoluulis dicitur.

Mathe. effigi.
1113.

PHYLLON ἑλὺγον siue Feminiparum.

TAMETSI diu vexarit exercitatiores illa disquisitio nempe foretne idem Phyllon
vtrumque cum vtrâque *Linozofide* seu Mercuriali herba, tamen cum iamdiu ex stir-
pium cognitione descriptionibus collata satis liqueat in cognata generis classe multum
ipsas inter se differre, hic commodum omnes vtpotè congeneres subdemus. Nec enim
aptiori loco possunt hæc duæ quas damus Phylli species, imò ferme nullo alio collocari
queunt: adeo namque sunt simili structura & partium partibus habitu responsive vt
minus mirum sit autores ad res consimiles designandas iisdem ferè vsos comparatio-
nibus & vocibus quæ opinionem fecerint recentioribus (nondum repertis plantis,)
bis eiusdem rei inculcatæ mentionis. Atqui secus est multò, nec istud caput, irreptiti-
um, deprauatumue esse magis videtur, quàm alia multa, quæ non minus negotij pro-
pter ambiguitatem facessunt. Enimvero Dioscorides non plantas quin sint, qualisue
sint in dubium reuocat: sed dumtaxat ambigit num, sexus optionis compotem quem-
piam

piam facere potis sit earum vtrâvis, nempè maris aut fœminæ, quod Crateus pròdiderat, & fabulæ affine esse Theophrastus monuerat. Dioscoridis igitur sunt descriptiones non Crateæ, aut saltem non solius, sed ex alijs Dioscoride mutuante autoribus. Differentia verò conspicua satis, cum vtriusq; inter se, tum potissimum cum vtrâq; Linozostide, cui folia Ocimi superficie & crenulis in ambitu, habitus & facies Parietariæ vt scitè autor dicit: At Phyllo quod Eleophyllon, oleæ folium nuncupat & itidem florum eruptionis argumento Bryoniam, asperifaxeæ & aridi cliui & margines sunt plurimum natales, Galliæ Norbonensis Monspelij, secus vias & ad collem squallidum & glareosum suspendij paulòq; vterius, eis Pontem Castrî noui, alijsq; quàm plurimis locis, frequentissimum Phyllon cuius perquam manifestæ duæ differentiæ, vtrîq; Mercuriali apprinè & singillatim obuersæ sunt: nempè maris & fœminæ, quæ folia planè oleæ colore crassitie & figura: Portulacæ marinæ magnitudine, glauca & quàm oleæ vel salicis pallidiora incana numerosa: Caules item rigidos quadratos habet, cubitum altos & concolores in multas diductos Polij modo alas, quas iuxta & folia flores muscosi oliuæq; in modum pusilli palliduli erumpunt, è pedicellis breuioribus gemina pròdeunt marsupiolâ testiculorum ritu & in speciem iuncta bina Cynocrambe aut maris Mercurialis modo, quibus per Augustum & Iulium, dehiscentibus & vt minoris Heliotropij exiliunt semina immatura albida, maturâ vero Cyaneo nitent colore rotunda, & quâ pa pauers maiora, gustu feruida & nonnihil pinguis. Radix lignosa exilis.

PHYLLON θάλλιονον fœminiparum.

MAS.

FŒMINA.



PHYLLON Mas seu Arrhenogonum Mariparum.

HVIVS sapius frustra cōnati sumus semen aut intueri, aut excipere, & mirati sumus racemulos muscosos in pediculis porrectis oblongis, oleæ floribus, iam marcidis & cādūcis non absimiles pallentes vel potius Mercurialis fœminæ, ex luteo instar nucamenti colurni aut Phylteræ, nullo conspecto seminis vestigio defluxisse. Cæteròquin eadem planè fœminæ est hæc, nec minus calida acria gustanti folia, aut deglutienti vel tantillum, tametsi non perindè feruorem primoribus labris, & linguæ atq; gutturi inurit: Quæ omnia indicio sunt nobis haud temerè antiquos hæcè varijs nomenclaturis & orationis picturis representasse. Hincq; vires subducendi aluum, quas in Mercuriali nouerant minimè assignasse, natalisq; longè diuersos, & si quid huc facit, etiam Phyllon semine donatum, fœminificum fecisse. Marem verò seu Marificum semine cassum & orbatum & frugiperdum, non secus atq; oleæ floribus & Mercuriali fœminæ floribus contingit: & tamen contra euenit Mercuriali fœminæ, quippè cui semen nullum aut fluxum, mari verò probè maturum, a Phyllo tamen non parum diuersum inest.

Senensis planta nutanti coniectura, & descriptione mutilla huc adducta an sit *Noli me tangere* Italicorum, videndum. Sed quòrsum serratum folium, & Mercuriali breuius asserendo Arrhenogono oleæ folio inesse? Deindè si non noris primum & præcipuum nempè Theliogonum, qui potes asseuerare & dicere: quasi iam non dubitet, plantam ait quam reperi esse legitimum Arrhenogonum. Saltem accurata descriptione & icone patefecisset, sed plerâq; alias vel notissimas alienissimo loco apposuit: vel quæ nusquam fuere in natum, vel illi nusquam notæ fuerunt, præterquam de comentariorum figura, lectione vel auditione mera.

I. ij.

Phyllon

THEOPHRASTI verò Phyllon ob prolem masculam, foeminamq; propagandam, vt idem inquit, sic vocatum videtur Mercurialem propius designare, quam Crateua vel Dioscoridis Eleophyllon cum quo propter prolificas illas & mirificas communes vtriq; dotes commune nomen sit sortitum, vt alia passim non parum multa in authoribus: & aliòquin Ocimi folia, semenq; dydimon, non foemine vti Phyllo Dioscorides attribuit, etiàq; proximo capite ἀρρενόγονον vocat Satyrion maiusculū Bulbo, minor οὐλίγονο. Sed mari vti mercuriali vindicat verum vbi foeminificā Mercurialis semē καὶ ἀπὲρ ἐλαίας βέβηκε ὡχρότερος ἀνδρὶ addit, id est, instar Oleæ florentis musci, pallidius tamen esse, & verba & res Eleophyllon Dioscoridis magis accedunt, neq; enim Mercurialis semen ὡχρότερος siue pallidius, sed χλωρότερος seu herbaceum magis & viridans est. Mox masculificij semen oleæ primulū ē muscoflo flore emergente οἷον περὶ ἐλαίαν ὅταν ἀρτί φύεται ἐκ τῆς βέβης iisdem penè verbis quibus hīc seu Crateuas seu Dioscorides designant suum; Eòq; dignior venia Plinius, eumq; recentiores sequuti, si ex ancipiti & fortè in vnam flatam diuersa gemināq; descriptione vnam confarcinarint, & notionem confunderint.

ἀνδρὸς ὡς ἰς. *MERCVRIALIS MAS & Foemina.*

Ital. Mercorella. *Gal. Vignoble, seu Mercuriale.*
Ang. French Mercury. *Belg. Bīngelcruyt & Mercurial.*
Ger. Bīngelkraut.

Dod. effig. 59. **L**INOSOSTIDEM seu Parthenium & Mercurij herbam alterutram qui norit ambas cognorit, adeò sunt per omnia similes & duntaxat semine diuersa, Ocimi & parietariae folio, plurimis geniculis maiusculis perficatrice, multos teneros holeraceos caules quadratos & alas cingentibus: subnitroso sapore & nonnihil viroso succo multo porraceo purgante & medicato, ad multa perquam vtili vti tota herba vbiuis gentium notissima & vfu maximè recepta, vt pluribus ad cognoscendum nihil sit opus cum id abundè dudum capite de Phyllo quānam foret & quantum differret sit dictum. Linguagotiae Monspellij praesertim Pharmacopoei multum vtuntur melle Mercuriato vocato, nempe succi expressi libris tribus incoquant mellis boni ℥. ii. vel. ℥. ij. ad enemata & muliebria encathismata. Huius loco hic in Anglia vbi non minus frequens, sed tamen non aequè nota superiore seculo utebantur Tota bona seu bono Henrico dicto quem etiamnum vulgus Mercurialem appellat & putat errore quidem non paruo, sed ad vsum non magno incommodo, praesertim si ad enemata tantum addatur, minus enim calefacit, lenius lubricat: at olere vel ore, aliouè sumpta modo nonnullos multum torsionibus, vexat vti dictum inter Atriplices.

Tota bona Anglis Mercurialis

CYNOCRAMBE, quasi dicas Caninam Brassicam.
Mercurialis mas, Syluestris.

Dod. effig. 59. **Q**UAE passim in Europa tota secus umbrosas vias & in Syluis vdisuè locis praesertim septentrionalibus & minus calidis copiosissima oritur & vulgò Syluestris Mercurialis vocatur, tantam cum mari tota habet similitudinem, folijs per interualla binis in geniculis indidemq; semine didymo ē pediculis lōgis, caulibus quadratis tenellis, vt quin vera sit nulli dubium: rectis tamen binis, ternis & interdum quaternis, non alatis caulibus prouenit: folia subpallida sunt Mercuriali longiora, sapor, odor, holle raceus & subuirosus. Radix latior humiq; serpens sparsa, tota facies Mercurialem docet: vñus nullus tametsi optimus futurus ad serofos & Melancholicos humores educendos.

HELIOTROPIVM, ἡλιότροπον, officinis Verrucaria scorpioides.

Quam

STIRP IV M aduersaria noua. 101

QVAMVIS permultæ sint stirpes quæ Heliotropiæ, & Helioscopiæ dici merentur, quia Sole puro collustratæ, quasi illius fruendi auidæ hient: eoque Cœli medium tenente pandantur prorsum, deinde abeunt gyratione quâpiam, atque quasi in eum nutu pronæ & coniuuentibus floribus prosequantur; illius abitu & desiderio sese mo-
tantes (quod in Narcisso Calendula, Tragopogo, Cichoriis & quamplurimis aliis cer-
nere est.) Tamen hisce Dioscoridis Heliotropiis, id nominis particulatim congruere vi-
detur, quia Solstitio tantum florere author est Theophrastus, & obseruatio. Serius quip-
pe sponte prodeunt & florent.

*HELIOTROPIUM maius, Solanifolio flore Echij,
adunco, caudato scorpioidis.*

HORM maius vocatum vbique Lugdunensis, & Norbonensis Galliæ, cultis & incul-
tis marginibus aridis obuium, nec non in Italia & Pedemonte. Pedem altos, caules
erectos, foliis donatos, Ocimo aut Calaméthi montani, Solani maioribus, albidioribus,
hirsutioribus, quibus singulis in summo elegantes insunt florum series, fastigiatæ, race-
mosa, caudicellas inflexas scorpiionis, aut Echij scorpioidis imitatæ albidæ, seminis plene
miliacei oblongi pusilli virentis, ad tumores stumosos verrucas & vlcera phadagenica
veluti est tota planta magni experimenti. Angliæ in hortis & Franciæ.

*Matheo. effig.
1300.*

MINUS HELIOTROPIUM repens.

NON facile reperitur istud nisi paucis in locis
& scrobibus lutulentis, Grammontiæ syluæ,
Monspelliæ inter Pulegios ceruinos subter Tha-
mariscos, & Lunellam inter & D. Egidium: qui-
busdam paludosis scrobibus, Sarculis multis fle-
xilibus, teneris, gracilioribus reptat: folia roton-
diora, triplo minora quam magni Heliotropii,
numerosa & simillima florésque assimiles breui-
oribus multo glomeratisq; sed minus reflexis cau-
dicellis nulla serie, tam intra, iam subter folia pen-
dulis vt in Tornesole, nec per interualla foliorum
singuli totis ramis alternato situ qualem non de-
scriptum, sed male pictum, aut multo à vero diuersum Commentator habet, radice pu-
silla simplici vsu incognita adhuc, etiamque de facie, nisi amicis quibusdam Lugdunen-
sibus, & Antuerpianis, quibus eam eiusque magnam seminis copiam misimus, non valde
dissimile à maiore Heliotropio, an autem illis satum creuerit incertum habemus. Hic Lon-
dini nobis Bruma sequente periit & Morgano nostro.



*HELIOTROPIUM Vulgare TORNESOL Gallorum, sine
Plinij tricoccon.*

NON modo de vernacula voce Gallorum qui Tornesol hanc vocat, sed etiam Plinia-
na lectione qui eandem Tricoccon Heliotropion appellat, cui libet innotescere po-
test huius plantæ figuram, & Historiam Heliotropiis deberi: tametsi Dioscoridi videtur
præterita, aut cum minore in vnam descriptionem contracta. Folia huic facièsque tota
maioris Heliotropii, nigriora viridiora folia Calamenthi montani, aut potius Solani flo-
res lutei exiles, oleæ, facile defluentes. Seminâque tricocca capsula Tithymali aut Cha-
maleæ proxima, sed scabra, ex viridi nigricante affrictâque pannis, aut chartis, viro-
rem viuacem impertiente, qui mox in cœruleum hilarem & purpureum mutatur: ma-
gno quæstu colligunt rustici Lunellæ, Malsillarges aliisque Norbonæ tractibus oliuetor-
um, vbi plurima maturâque Septembri sunt, quæ distrahunt insectoribus, & Chirur-
gis nonnullis, huius plantæ vires ad medica præsidia supra quâ dici potest efferentibus,

I. iij.

de

de quibus nos in selectis remediis dicemus, duce & auspice Christo. Romani agri vine-
tis etiam familiare, Belgis, Francis, Germanis, & Anglis in hortis. Pannosa lacinia,
quæ in Officinis nomine Tornesolis veneunt, ad vinum gelatinas & alia medicamen-
ta coloranda, pereleganti purpura huius succo vinoque remisto creduntur imbutæ.

SOLANI GENERA.

STRYCHNON viteum, capreolum, vitem vel acinum, aut tale quidam signat, in So-
lanorum classe quibus cunctis proprium acinos plures vel pauciores habere, nisi quis
malit στυχίου Theophrasto suspicari, aut βοστυχίου in στυχίου mutatum.

PLURA quam Dioscoridi reperta hodie genera, verūtamen non Dioscoridis om-
nia: nullū enim manicum foliis Erucæ ad Paderotæ Acanthi similitudinem & corym-
bosum, quale est apud eundem vsquam auditione vel inspectione innotuit nobis, nisi
sit Stramonium vocatum quod inferius post Somniferum perpendetur.

στυχίου κικασίος, SOLANVM HORTENSE, CIRCEÆ,
aut Phaseoli folio.

{ Germ. Nachtschadt.
Galli. Morelle.
Ital. Solatro.
Belg. Nalcaye & nachtscade.
Ang. Nightshade, morell. peye morell, boynides berre.

Fusc. ico 395. CÆTERORVM omnium holeraceum dictum hortense vulgatissimum siue Meri-
dianæ, siue Septentrionalis gentis viarum & hortorū, cultis incultis scrobibus mar-
ginibus & arcis ramulos edit multiplices, lentos, fruticosos, pedē & cubitū longos, fo-
liis latioribus flaccidis succulentis, Basilici vel Atriplicis sylu. nigricantibus, donatos Iu-
njo & Iulio flosculi, albidī, stellati, plusculi præeunt, bacculis succulentis quasi in corym-
bum Circeæ nostræ collectis, initio viridantibus, deinde nigris, fuscis, alias rubris pur-
pureis, alias fuluis rutilis. Pusilla in summo cespite radice albida, fibrosa, sub hyemem
moribunda.

στυχίου ἁλινδναεος. SOLANVM HALICACABVM Alkekengi.

{ Germ. Juden docklin & Kirschen.
Ang. Wynter cherye.
Belg. Krickē van ouer zee.
Ital. Halicacabo.
Galli. Baguenaudes, & cerises
doutre mer.

Fusc. ico. 396. VBIUS vel pueris notissimum qui etiā in Heluetia, Sabaudia, & Pedemontium se-
cus scopes & in squalidis dumetis huius vvas lectas mandunt: Augusto & Septem-
bri, etiāque hyeme ineunte septentrionalibus, quibus ideo Hyberna Cerasa Winter
Ceris dicuntur; acini qui semine latiusculo, compresso, subfuluo, Leucoii, vel potius Si-
liquastri pregnant. Folia item Solani hortensis, aut Phaseoli maiora viridantia in
sarmentosis caulibus sesquicubitum altis, flores maiores pallidiores Solani folliculis
herbaceis, deinde phœniceis cordato Piso peregrino similibus, quibus acinum sin-
gulum inclusum ceraso parem & similem descripsimus: reptrice radice, & restibili so-
bole sese quotannis reparante, Celeberrimus huius ad calculosos lotiumque ciendum
usus.

SOMNIFERVM, & LETHALÆ. An Mandra-
goras Theophrasti, Belladonna Italarum.

{ Germ. Dolttraut, Seuttraut.
Belg. Broote nalcaye & Dulcruyt.
Angl. Dwale, greate Morell.

STIRPIVM aduersaria noua.

103

MERIDIONALIBVS magna huius paucitas, apud Germanos verò & maxime in Angliavbique obuio prouentu fruticat: tota Solani facie virgis longis, rectis nigricantibus ternos & quaternos cubitos longis, digitum minimum æquantibus, foliaque gerentibus atra aliquantum hirsuta, & utrônis Solano maiora, nonnihil ad Mandragoram florum calathis fuscis, aspectu mæstis & obsoletis, e quorum singulorum cauo emicat bacca nitida cerasæ, aut potius vix Paridis par & concolor.

Radice non modo annotina sobole rediuiua, sed etiam adeo viuaci & importuna vt semel in hortos ascita, vix exigi deleriuè queat: imò vel tantillo frustillo relicto, aut inoffo repullet. Præsens nex esu hec cerasæ, vt multi nostra memoria morte sunt experti, pueri præsertim: namque Angli adolescentuli qui per imprudentiam peregrè sitibundi in via esitassent, lymphatici sed somno semel sepulti interiere. Etiàmque Antuerpiæ non multis abhinc annis quidam impuberes, huius æsum morte luebant. Memoranda huius radice facultas qua nugiendi Agyrtæ in Italia plebeculæ attonitæ concursum plausum & pecuniam captant: tantillum namque radice admodum sitibundis conferuæ Saccharatæ Rosarum, violarum ue cuiuslibet addunt, atque deglutienda dant citissimo aduersum sitim, etiàm si quis ea prope modum enectus foret leuamento & refocillamento, sed nequissimo: stupefactis namque vt reor faucium interioribus nervulis ad æsophagum inum, languet prorsum appetentia præsertim potus & interdum cibi, vnde postea malè habent nisi repente colluant aceto guttur, & quippiam Absynthites vini, aut Theriacæ deglutiant. Caterum ridiculum iuxta ac pertinacem commentatorem se præbuit Senensis, qui dono acceptum, nec vel verbo declaratum Solanum, nedum probatum studiosis obtrufit, verticillatis floribus, aliisque quàm plurimis indicis, quiduis potius quàm Solanum exprimentibus, nec viribus aliòquin similibus: idq; (sed Musis botanicis iratis) nostrati vulgato quod ap-
Solanum Somniferum.
Matheol. Foli.
 1071.

STRAMONIUM PEREGRINUM an SOLANUM

Manicum? sine Poma spinosa Recentiorum,
Metel Italorum.

IAM quamuis putarint Stramonium, vel Strychmonium illud peregrinum ab Strychno deductum & idem esse cum Dioscoridis Solano Manico, ducti nonnulla pilula, aut pomi echinati similitudine, tamen non parum differre vel ipsa docent folia, nedum fructus pilulæ, (Sunt enim hortensis Solani leuius per ambitum sinnata nonnihil) quæ squamulis spinosis multis compactæ sunt, quadatenus nucis Metel Officinarum, vel nuculæ Cupressi, aut rugosæ gallæ immaturæ similes, sed echinata spinulis. Folia autem pilosa & ad Solanum hortensem accedentia, florum calathis volubilis maioris, aut Scammonij albis ex folliculo Hyoscyami, sed odorem suauem lilij halantibus, vnde pilula in caule pedem & sesquipedem alto, hirsuto, non profunda nec magna radice, florentem vidimus plusquam duodecim abhinc annis in orto Patauino & in Belgio. Verûtamen multa desunt huic ad explendâ reliquam delinitionem, nisi sit illa luxata, vt quidam suspicantur, qui in Stramonie foliis veterinos quiddam agrestis Lactucæ, aut Meconij odorantur, affectusque non discrepantes experiuntur, verum ne sic quidem vnquam facient fidem, & multo minus persuadebunt, qui Christophorianam, tametsi Corrymbaceis floribus & baccis, folio multum dissecto sit, cuius venenata facultas maiorem opinionem huius Solani, quam Stramonie facere potuit, vt in Elleboris dicemus.

STRYCNODENDRON & AMOMVM

Pl: vulgo Italorum, putatum.

Solanum arborescens Belgarum, an Theophrast. Solanum folijs
Tithymali, fructu rubro, radice rubra.

I.iii.

Pl. 8-

PLERIQUE Itali, Galli, Germani, Belgæq;, in viretis aut Adonidis pensilibus hortis voluptatis causa serunt peregrinam Indicam baccam, ex qua fruticat pumilla trinum & quaternum cubitorum planta arborea Persici, aut Amygdalæ facie, & fronde, flore per Æstatem & Autumnum, Solani hortensis, & baccis nitidis coccineis, aut miniatis paribus & concoloribus Alkekengi, nec intus gygartis diuersis in Brumam etiam & Ianuarii mensē usque aduersus frigoris sæuitiam edurantibus, colorēque tuentibus. Amomum quidam Plinii putarunt: rectius alij Strychnodendrum vocarunt.

Recentiorum planta, *Alfines maioris facie baccis Solani*,
 αν καυβαλου, *CACVBALVM* quasi maleficum Plinij.

ESYLVOSIS vdis Germaniæ, Flandriæ, & Angliæ, in hortos transfouerunt Herbarij quandam fruticosam plantam, reptantem humi, ortu Rubiæ tenellis ramulis & fractu facilibus. Folijs per interualla geniculata pallentibus, Rubiæ, & Conifæ mediæ quadatenus. Flosculis albis, Holostij aut Alfines, fructu nigro, Solani hortensis: radices im portuna viuacitate etiam erutę repullulat, non secus ac Solani Somniferi, & nihilo secius mansu interficere dicunt.

CIRCÆA.

Germ. Je lenger ie lieber & Lysnschkrant. *Lati.* Amara dulcis,
Gall. Solanum lignosum.
Belg. Alfranke.

EST NE quam Solanum ligneum vel lignosum vulgò, Herbarum studiosi Lutetiæ, & Monspellij præsertim vocitabant? Videtur sane eadem, nec nulladum cognita nobis, propius accedit. Et ut non esset, tamen merita est huc suffici, tum ob faciem haud ita disparem, tum propter vires non contemnendas & illi cum Circæa communes: deinde quia notissima, & plurima vbique regionum secus sæpes, viasq;, vliginosas luxuriat & Monspellij etiam in ruderibus, macerijs & macilentis, portæ Latensis Solanis adiungenda fruticat, flagellis multis sarmentosis non prolixo reptatu, sed innixu hæretibus ternos quaternosque cubitos æquantibus, rotundis, lignosis: folia Solani & vt Similacis, vel Sigilli mariæ, sensim acuminata obscure virentia, Solani superficie quibus infernè vtrinq; appendicula vna quasi auricula vel pinnula inest, acetosæ minoris, aut Saluæ nobilis modo. Flores quamplures violaceis saturiores Sycomori Venetorum, aut Afarch daracę, quinq; partitæ appicello in medio luteolo, vnde acinuli conferti primulum virides, deinde maturi hortensis Solani rubri oblongi, & teretes granulis intus miliaceis compressis, ita racematim conditi: qui soli quominus hanc planè audeamus asferere Circæam, dissuadent: tamen si non dicit Dioscorides cornicula, sed veluti in corniculis semina, nos tamen vt cuius exploratam habemus naturam, hanc malumus quam nullam, nec vnus aut alterius notulæ penuria, fortè peruersione, aut metathesi vnus vocolæ apud Dioscoridē lubet illicò respuere, dum facultates quadrant. Est quippè nonnihil sicca, moderatè calida, aut potius frigidiuscula, nādum vt feruida sit quod nonnulli rentur, & Diosco. persuasus fuit, fortè propter amarorē, & tantillum acrimoniæ. Nam si plusculum amaroris primum gustanti exhibet, non proinde fit calida magis quam Endiuia, Cichoria, Hyeracia, & Rosa: eius quippè quantū percepimus, calor & acrimonia illicò abeunt, persistente dulciculo & imbecillo quopiam sapore mandendo radices & virgulta, sarmentosa, lignosa, medulla albida, amarore ingrato, primū & diu linguam afficiunt: tandem dulcedine multa Glycirrhizę ingratiore fastidium pariunt, magis, magisque dulcorē offundendo, idcirco Germanis vocata *Je lenger ie lieber*, Anglicè *Sneyt bitter*, Latini Dulciamara. Vnde vires mirificas & penè Circæas conicias: nam admotam foris inflammationibus, & decoctionibus epotam Solani vires expleuiffe scimus: ad internos autem affectus refrigerata calfacit, calfactaque refrigerat, eadem etiam qua Alkekengi siue Halicacabus pollet facultate, moderatè enim citra virium dispen-

dispendium viscerū incendium egerit per sudores vrināsq; aquas, atq; obstructions demolitur quæ sūt Icteridis & Hydropisis præuij & alumnæ, qua item facultate lac māmīs suggerere fructus potis est, non secus atq; multa quæ exsiccando serum & defœcando sanguinem illuc vrgent puriores benigniorēq; partes. Sic fœniculum, sic Bryoniæ turiones tenelli cum ijdem duriores & acriores potius lac populentur, & absument, quod discrimen est inter menses cientia & lac generantia. Eoq; forbitiones parandas iubet Dioscorides, non iussurus nisi vesca foret. Et Circæam dixerūt nonnulla vt par est cum Mandragora similitudine virium: quippe Circæa Mandragoræ nomen fuit, & forsā vtriūq; ad amatoria vsus fuit veluti Dioscorides de Mandragora innuit, nempe Phyltro illo frigiditati odoræ coniuncto, cuius ad amorem amicitiaq; ferruminandas vis mira & adamantea vel magnetica. Hæc interfuit Commentatoris Senensis enucleare, at hic vbi quid cōmentetur oblitus nobis elapsus est in Plinij perorat lapsum iamdiu notatum & confossum aliorum criticorum obellis, & fortè immeritò, fieri enim potuit vt ita legerit & verterit ex quopiam Botanicorum: nec enim, vt vult Senensis, ex Dioscoride semper necessum aut consuetum fuit illi mutare, nec verisimilè vt cuius nusquam mentionem facit, alióqui candidus & multus in ciendis & laudandis suis authoribus, & non raro Dioscorides Galenus plurimū atq; ex vtróq; Ægineta cæteri; Græci meri sunt, dumtaxat aliorum recitatores, non secus atq; Plinius, qui seū ex alio quā Dioscoride accepit, vel quā è Dioscoride verterit, seu aliquid peruerterit, ferendus homo Romanus & aulicus non minus quā Dioscorid. qui Saluiam extinguere semen, contra quam Aristoteles & antequi in Problemat. prodidit: & alioqui pronus valde est lapsus in virium attributis, quod vulgò quotidie euenire videmus: sic Cassiam siliquam propter affinitatē nominis, ducere menses putarunt, at sistit, vt si quis Circæam, Mandragoram lac inhibere audiisset, & idem huic qua de mentio fit Circææ cognomini similitudine deceptus attribuisset. Doctus Plinianus Ecclesiastes sic Plinij verba legebat. Semine lac mouet (vulgati codices minuit) vino aut mulsā aqua pota, sic Dioscorides κατὰ τὴν trahere, allicere, vel mouere, extremis namq; tantum non item re differunt, tractio & protrusio. Nos hæc his semel tametsi pluribus quā volumus, quò facebant isti maleferiati Aristarchi, adq; rerum commentationem cognitionēq; accuratiorem vires ingenij contendant.

Math. 1282.
100. pro Vite
Syl.

Cassia siliqua nō
ducit menses.

SOLANVM TETRAPHYLLVM, siue HERBA PARIS.

Vua Lupina, Pardalianches putata.

QUIBUS nondū notæ essent primi Aconiti differētiæ non abs re vua Lupina versauē à recetioribus dicta, Pardalianche Dioscoridis credita fuit: quaternis nāq; est vtī q; herbula folijs decussatim aut ex aduerso sibi mutuo exortis, summo fermè é caule enatis nigricātibus rotūdis oblōgis, tenuib⁹: cauli rotūdo gracili, sesquipalmū alto subest fibrosa variēq; sparsa cespite summo radix, vnico in flore stellato, & ex luteo herbaceo, acius Solani Maniaci similis, nec dispar est. Natales amat umbrosos, frigidiusculos Septentrionales, cuiusmodi Germaniæ propè Basileā, aliisq; Galliæ, Belgiæ, & Angliæ syluosis Hæc qui Aconitū coniectabāt venenatā prodiderūt: noxianè sit nondū certū habemus, tametsi sæpius collegimus sæpissimè dedimus canibus & agnis nullo percepto incōmodo, quin potius raro & perquam iucundo spectaculo meminimus fuisse nobis amicisq; nostris Bathoniæ Heluetiorū, dum Thermas illic inuiferimus: Etiāq; Lugduni antidotum qualem mox describemus ex hac potissimū aliisq; nonnullis conflatū. Canum par vinctum loris meminimus, vtriq; vi & bacillo in fauces intimas indita fuit Arsenici & Mercurij sublimati añ. 3. f. carnibus aditam (neq; enim nisi inuiti vorarunt) é vestigio vterq; canum ore patulo aerem captabant, spumas elidebāt, anxioq; & crebro conatu sed irritō vomere nitebantur: latratus edebant ore & assultu rabido, ructūq; minaci proximum quēq; inuasuri videbantur. Hora vix exacta cœptus vterq; frigidior & quietior fieri decubuit moribundus. Tum pulueris huius 3. ij. ex Rubello vino infusæ fuerunt in fauces vnus, ac nec tum quicquam euomuit: quin potius ali-

quantò

Fusch. 48.
Math. 1093.

quantò post quàm socius periculi iam enectus esset hinc nobis attractantibus visus fuit calescere itaq; coepit ore reptare, oculos referare & animum virésq; adeò repentè recipere, vt hilaris & ludibundus aliquòt horis post cœnam sub mensa coeperit, planèq; conualuerit. Idem euenit ad Badēses Thermas canibus quibus data fuisset cum Arsenico mixta nuxvomica: sed hi vertigine ventrisq; diris cruciatibus acti sese in gyrum indefinenter versabant. Pulueris hæc descriptio.

Rec.	{	Vtriùsq; Angelicæ (innuit) domesticæ, & Syluestrem.	} añ. drach. iiii.
		Vicetoxici.	
		Valerianæ domesticæ.	
		Polypodij querni.	
		Radicum Althææ & vrticæ.	

Corticis Mezerei Germanici. drach. ij.

Granorum Herbæ Paridis. N. 24.

Foliorum eiusdem cum toto N. 36.

Ex maceratis in aceto radicibus & siccatis fit omnium puluis.

Herba Paris refrigerat insigniter, ideo Arsenici vim reprimat.

μανδράγας. *MANDRAGORAS MAS.*

{	Ger. Meum meumlin.
	Gall. Mandragore ou Mandegloyre.
	Ang. Mandrake.
	Belg. Mandragora manneken.

Mat. Ico. 1076 **Q**UIA antra atq; specus vmbrosas vtpote Solis feruidioris impatiens, lubens sectaretur Mandragoras dicta fuit. *Mandre* enim aprica loca quò se recipiunt & stabulantur armenta etiam hodiè Itali è Græco significant, & ad amatoria non parum posse olim credita fuit & vocitata Circea à Circe inuentrice magica Solis filia Pytagoreis etiam ἀνδροπρόσος, quod humanum truncum & artus nonnihil adumbrarent radices implexæ crura bina & clunes quasi disparata ostentantes, quàm ad interpretationem alludit non inscitè Septentrionalis nomenclatio, quæ Mandragoram quasi Man & draghen: virigeram suæ homigeram cónostat. Duum generum hodiè Italiæ, Prouinciæ, Norbonæ, & Hispaniæ hortis florem maláq; maturat, semine aut radicibus ex Candia & Cycladibus insulis aduectis. In reliqua Gallia non perindè tameti superiore anno florem pomáq; apprimè matura nobis dederunt Bristoiæ Occiduo Angliæ aprico & tepidiusculo horto, trima aut quadrima non fert, sed iam anicula poma dat aurea odore suauis sopiente Mas, Mespilo paria médulla etiámq; fermè granis latioribus compressis pullis, folia humi strata numerosa Betæ, aut Lactucæ, virètia, rugosa, crispa Dipfaci olida: flores in gracilibus pediculis Bellidis, (caule námq; vacat) candidicant, vel purpurascunt, Maliiniani non dissimiles.

MANDRAGORAS FOEMINA.

Mat. Ico. 1077 **F**OEMINAM quasi minorem, vel imbecilliolem sexu, hanc propter pallidius malum atq; altero tanto minus Sorbo pusillo lutescenti par & concolor rotundius, radice minore, duobus tribusue Empusæ caudiculis crurum ritu humanorum claniculatim comissis & intortis. Folia vt omnia mari minora. Augusto maturant Francis, Angliæ, tametfi multo longius ab æqualore absit Iulio & Iunio meminimus.

MELONGENA, vel Mala insana, exotica.

{	Gall. &	}	veramgenes	{	Ger. Melantzang
	Belg.				

Affinita

AFFINI A cum essent Mandragoris hæc cœrulo purpurea poma siue aliud ab Ætii Malozeno, ex fusco violacœa, effigie quanta oui oblongi subit quibusdam recentiorum suspicari esse marem Theophrasti Mandragoram, eoque esu læthalem rati, insana mala vocarunt. Sed apud Theophrastum multa lectionis labe, fortè non distincta stirpium deliniatio, ne dicā farrago omniū congenerū, è quibus hæc eximenda est & Cucumerū familiæ, aut potiùs Mandragoris & Hyoscyamis ascribenda: foliis Cucumeris est asinini hirsutic molliore Solano Somnifero Hyoscyamo albo, vel Mandragoræ proxima in caule hirsuto pedem alto recto, cui medio sursum versùs è pediculo breui appensa flores & mala sunt semine paruo congesto pullo vel fuluescente & fusco. Radix summū cæspitè fibris amplexa colitur, viridiorū voluptati & gulonū auiditati, qui interdum hosce fructus uti Cucumeres in acetariis helluntur, uti Romæ, Genuæ, Neapoli, maiore voluptate quam utilitate: deterioris enim succo vel quolibet Pepone, aut Cucumere est.

Matheol. effig. 1078.

ΥΟΨΥΜΟΝ **HYOSCYAMVS NIGER**, siue Apolinaris herba.

ARABIVS
Altercum.

Germ. Bilsomen Sewbon.
Ital. Iusquiamo.
Gall. Iusquame, & Hanebane.
Belg. Bilsen, & Bilsencruyt.
An. Henebane, Hennequale.

SVILLAM fabam dixerent cuius esu olfactūque sues prostrati resoluantur: opplet snāque cuiuslibet animalis cerebrum viroso, foetidūque halitu, multò quàm qui è fabis comestis deteriore hominibus, quibus mentem percellit quasi Apollinis cestro, vnde Apolinaris herba dicta & Altercum quia altercando, rixandōque setorqueant Hyoscyamo demētati: tametsi meminimus mulierculam iuuenem cui dentium dolor fortu Hyoscyami sedatus fuisset triduum penè totum lætari & temulentæ, non tamen morosæ, simillimam fuisse. Admodum notæ iam sunt tres Hyoscyami Dioscoridei differentias, quarum familiarissima calidis & frigidis campestribus vbiuis Europæorum niger: per amplis foliis hirsutis verbasci, sed Acanthi laciniosis, pedis Anserini diuisuris flaccidis crassis, succulentis, in ramoso frutescente caule sparso, hirsuto bicubitali, tricubitali numerofo, qui medio sui flores è fusco pallescentes in purpuram cæruleam tristem vergentes (frustra negante Comētatore) calathi similes promit, quibus mense Augusto seminum pullorum Papaueris plenæ pixidulæ succedunt, cytini effigie præsepiolis disceptæ & superne, asperæ cuspidatæ: radix albicat crassa estuta facilis, & perquam ad anodina utilis: minùsque quàm folia foetens, & obnoxia putredini.

Scitè effig. M. 1
theol. 1084.

HYOSCYAMVS Albus, mitior, hirsutior.

NO n æquè notus albus, ac proinde in hortis Pharmacopœorum colendus. Ei penè eadem facies & magnitudo, nisi frondēs latiores, rotundiores, molliores, & albidiores, & hirsutiores forent. Floribus iuxta folia & in summitate non versiculo, colore albo, languido, alabastriculis minus asperis, etiam semen albius alterius fountibus: radice minore minùsque viuaci. In Norbonæ ad Aurantiam, siue Auracum & inferius cis trānsq; Rhodani ostia variis satorum & veruactorum secus vias marginibus spontè adolescit. Belgio, Angliæ, & Franciæ in hortis seritur & moritur quōtannis. Mitior & tutior multo huius vsus.

Matheol. effig. 1065.

DVBIVS HYOSCYAMVS luteus Solanifolius.

AMBIGIT hæc inter Hyoscyamum & Solanū furiosum, cuius folia similia sunt, sed huius aliquantò maiora, molliora, albidiora, neutiquàm per ambitum incisa pallentes futeoli flores Saponariæ, calices relinquunt: Hyoscyami nigri minores, rotundiores, tene- riores, semen sublatum Irionis & pusillum: radice tenella, & quōtannis instauranda in hortis vbi dumtaxat vidimus, neutiquàm vsu recepta, aut explorata: gustu tamen acre semen nec odore, aut calice videtur Hyoscyamum præferre.

Matheol. effig. 2066.

GAL-

Glaucium, sine Poma amoris.

Papaueris corniculati species una, gemina varietas.

Papaueris capitati species quatuor, varietates septem, nempe

Satiuum album { semine albo, & flore Malua hortensis.
semine albo, & flore fimbriato.

Papauer { Satiuum nigrum ex quo Opium { Flore Malua hortensis, aut Pœonia.
& Meconium Officinarum { Flore simili, sed cristato.

{ Spontaneum, hortense, Sylvestre album.

{ Idem, nigrum, alterum, flore Phœniceo.

Rhœas sine Caduco flore pūniceo Papauer.

Papauer spumeum apud Hyssopum.

Argemone Rhœadis prorsum effigie.

Anemone bulbosa radice.

Anemone Norbonensis corniculata.

Anemone minor Coriandri folia flore Pulsatilla, capitulis hirsutis,
nec ut Papauer corolla donatis.

An. Galeni Anemone lutea eadem, sit cum Germanica?

Anemone Math:

Pulsatilla { Alba.
Lutea.
Rubra. }

Adonis.

POMA AMORIS, & Pomum aureum Lycopersicum quorundam,
an Glaucium Dioscoridis?

{ Germ. Golt oppel.

{ Belg. Gulden appelen.

{ Gal. Pommes dorées.

{ An. Gold apel.

PARITER & hæc peregrina duplicis vel ancipitis naturæ habetur, Mandragoræ nempe, Solani & Cornuti Papaueris, inter quæ igitur fuit adducenda, vel etiam quia tū hanc, tum Papauer Cornutum, nonnulli Glauciū putarunt, tametsi si non sit hæc: Glaucium, nequit esse earum vlla quas croceū succum fundere nouimus: non Cornutum Papauer Dioscoride monente, non maius Chelidonium facultate exulceratrice refragante: Et inter ænanthæ species quæ maxima ex radicibus succum luteum remittens, calore etiam pollet. An vero potius sit quæ Amoris mala Pomæue vocata fert? nè id quidem satis liquet; non enim ex Dioscoride nisi vna, aut altera nota suppetit, foliorum & succi. Ac succus huius quidem valdequam oportunus incipienti epiphoræ fluxionibus oculorum feruidis glaucoma facturis; si per initia admoneantur, vnde nomen Glaucii: nisi vt Plinio placet, à foliorum superficie æquori & afflatu maritimo concolori dicta fuerit. Non modo enim irruentis humoris insultum compescit, sed etiam calorem moderatur, sæpius periculo à recentioribus facto. Quinetiam erispelatis, ignibusque sacris vehementer oblectatur, vnde frigida nimium & penè narcotica putatur etiam ipsa tula: verum succus eductus è concrematissimis furculis enatis in Syriaco solo & feruido, fieri

feri potest vt tum mitior, tum crassior & colore saturiore euadat : est enim aqueus & dilutus pomi præsertim subflauus cuiusmodi Meloni, & alioqui folia haud ita dissimilia, aut male quadrant : sunt enim prælonga, alata, crassa, & pingua, fractu facilia, colore glauco vel cæcio, incisura serrata, sinuata, & laciniosa Papaueris Rhœadis Corniculati ritu. Teneriuscula vniuersa planta, succulenta & humi reptas, Cucumeris agrestis in modum, cuius similes flores luteos ex alis promit : fructus verò cum maximus Aurantij; magnitudine & modo visitur, torulis radiatim deductis in ambitum quasi sectiunculis à pediculi centro ad apicem porrectis. Color renidet nonnunquam fuluus, interdum & purpureus, cuiusmodi Charantiz, vel Alkekengi, cuius etiam semina compressa, flauetia, sunt similia. Italis nonnullis esistantur poma, non secus atq; Melones : sed quem halat vniuersa planta teter spiritus, paruo emolumento, & parum tuto in cibos venire satis prodit. SED GLAUCIO quo Veneti cæteræq; Italæ Officinæ vtuntur, frustra recensiores assensum præstant : quia inquit ruffescit superficie, flauet intus, amarus, odore ingrato, ferè omnibus notis Dioscoridis respondens : Quasi non in Glaucio nouando, vafro & inexplebili nummi ingenio Hebreorum Syriacorum liceat, quod in non parum multis alijs deprauandis, odores, colores, saporisq; ementiri, vt iam tum Dioscoridis æuo factitatum. Potest tamen & hic per bonum vsum præstare, tametsi non sit è Glaucio, non tamen Glaucium erit : Quin si mihi optem tutum & vtile ἀποκρυστικόν initijs fluxionum, malim è Soncho siue Cicerbita aut Condrillis succum quadantenus virosum, lacteum, subfuluum elicere, & in permixtum admouere, ad ea quæ Dioscorides Glaucio, sanat, non minori sed certiori commodo, idem effecturum. Harum enim nonnullæ proximè facie, & viribus Papauer atq; Glaucium representare videntur.

Poma aurea.

Glaucij Succo-
dauem.Glaucium Ve-
netorum.

μικρὸν κερκίτης. PAPAVER CORNICVLATVM.

- { Ang. Horne poppie.
Hisp. Domidra marina.
Belg. Beel huel & Bozuehuel.
Ger. Gelbolmag ende Gehornter Magsamen, Moen & Beel Magsamen.
Gall. Pauot cornu.

NISI iam monuisset Dioscorides, quosdam deceptos foliorum similitudine ex isto Papauere fieri Glaucium putasse, putassemus & nos è Papauerum genere esse Glaucium, quod Plinius congener Rhœadi, siue erratico fecit, eorum fortè persuasus lectione quos Dioscorides hallucinatos dixerat : nascitur (inquit) in afflatu maris, aut nitroso loco, vnde nomen Parallion, etiam alio nomine assumpsit. At Dioscorides inter Papauera, aut post non tacuisset : aut suo capite omisisset. Istius autem Papaueris natales sunt squallida maritima, cuiuslibet oris siue Oceani siue Mediterranei, tum ad calidos Hispaniæ, Norbonæ Prouinciæ, & Genuæ : tum ad frigidos Angliæ, & Hiberniæ tractus : vbi flores colore iam luteo, iam phæniceo, purpureo legimus sæpius. Etenim vulgatius dictum cornutum siliquis Leucioij, aut Chelidonioij maioris, seminis nigri Plantaginis plenius Iunio floret. Folij diuisura papaueris Rhœadis, aut Argemones, crassi, hirsuti, rugosi, crispatis, sparso scapo multis alis, glauco, vti tota planta colore, & succo croceo foetido,

PAPAVER CORNVTVM flore

Phæniceo.

Varietas. { Ad Frontignanam Norbonæ, & portlandiam Angliæ, aliq; in afflatu maritimo loca, flores fert aliquanto minores, colore non luteo pallente, sed phæniceo in purpureum languente, succo, nec alia sui parte dissimili, nisi quia tota delicatior est planta.

K.j.

Папанер

μῆκων ἡμερος. PAPAVER ALBUM.

Ital. Papauero domestico.

Ang. White garden Poppie.

Gal. Pauot blanc, & Pauot priué.

Belg. Tamen eude witte Dael & Mancop.

Ger. zamer Magsomen.

Hisp. Dormidera.

QVAMVIS hanc Papauerum recensioem concinnius Lactucis anneſti potuit, quibus adeò coniuncta eſt genere, vt apud Galenum κατὰ τόνους quædam Lactuca atra, & amara ob lactis ſoporiferi copiam μῆκων ſive papaueracea vocetur: tamen nec intempeſtiuè hîc ſuccedet, & nos plerumq; nolentes aufert commodior aliarum occuſus, nullibi equè oportunos poſtea ad ſeriem plantarum continuandam futuros, eòq; huc hæc dilata eſt tractatio Papaueris, Græcis μῆκων dicti παρὰ τῶν μῆκων quia vincti papauereo ſopore ſenſus, membrâq; ſtupefacta, nequeant quicquam agere: niſi dictum ſit eadem qua Cicuta notione: κωίων enim à vertigine & calligine quam inuehit vtrûmq; vt de Cicuta liquet, & de ſucco huius dicebat Andreas apud Pliniû, excacari protinus oculos, niſi is fuerit adulteratus Alexâdriæ. Tritè admodum cognitionis omne papaueris genus, ſed difficilis dignotio ab anemone, cui ſimilitudine tanta coniungitur Rhœas vt planè eadè iudicio multitudinis ſint, niſi ſic diſtingantur. Calidorû, & frigidarû regionû ſatu in hortis maximus Papaueris proventus, præſertim aruiſ maritimis aut aſſatu maritimo obnoxiijs, quibus impendio oblectatur, vt ad Lio inſulam Venetijs vicinâ, & Septétrionalibus in Hollandiæ propè Oceanû aggeribus, vbi totæ habitiores lacte plurimo ſcatent ad Meconium conficiendum: capitâq; ſerunt magnitudinis conſpicuæ maioris pomi Nymphææ, malum Granatum non mediocre etiam equantia, diſſepientibus interdum calicem membranulis tranſuerſim ſe decuſantibus, ſemen copioſum, album, rotundû, ſuaue Amigdalæ, aut Melonis ſapore ad placêtas & medicamêta vtiliſſimû farctis. Oleum etiam premunt Officinæ dulce nec Amygdalino abſimile, albidius tamè & tabidis commodius: Iunio flores latioribus quaternis plurimum folijs candidis, Maluæ hortenſis aut Rhœadis Papaueris caule vnico: ſed alis diuiſo inſunt, recto, ternum & quaternum cubitorum, quem totum folia ambiunt Scariolæ hortenſis, aut Hyoſcyami nigri lacinijs tenera, ſuccum lacteum ſactu remittêtia: qui effuſus vna aut altera diecula poſt ſuaueſcit, radice exigua Lactucæ.

Fimbriatum album.

Varietas. SSERITVR & hæc eadem & oritur apud Belgas: flore ſpecioſiore, oris criſtatis & fimbriatis, capitis etiam quæ operculo ineſt corolla, radiolis multo argutioribus & dentatim crenato ambitu viſitur.

PAPAVER Nigrum Satium, flore Maluæ hortenſis aut Pœoniæ.

ATIVI alteram ſpeciem alunt, nigrumq; à ſemine vocant nigricante, tutiore in Syrupum de Papauere quam ſpontanei hortenſis ſemen, quod viroſius eſt. Flores emicant ſanguineo ſaturo Pœoniæ, non diuerſo tempore, folia autem & capita tanta ſunt ſimilitudine, vt ea niſi effracta neſciant dignoſcere Pharmacopœi qui ſeuerint.

SATIVVM NIGRVM CRISTATVM.

Quam

STIRP IVM aduersaria noua.

III

QUAM in satiuo albo notauimus florum orę cristatę & capitulorum corollę, eadem planę cernere est in nigro satiuo, quod non dissimile colore, aut magnitudine.

varietas

PAP AVER PATVLVM.

INTER superius album & istud rubrum vulgare, etiam quoddam est Officinis notum, quod nulla re discrepat, nisi foraminulis patulis in superna parte capituli, vnde operculo diducto ę commissura peripherię rinas agente, elabitur semen.

OPIVM,

PAP AVERVM est lachryma liquorię, gummeus, vulnere aut sponte emanans; quem *ῥαβδῶδες ὄπιον* & *ὄπιον* antiqui vocarunt viribus ad dolorum immanitatem placandam summūq; conciliandū, & stupefaciendū decantatissimis, & verissimis, etiam nū hodie, præsertim apud Turchas, Maurós, & Persas, vbi vsus tam frequens & securus, vt id quasi quoppiā nepenthe ad animi corporisq; exhilarandas facultates, largius & sapius esitent, qui verò assueuerint esui, si prorsum abstineant, moriuntur, aut periclitantur valde: ac rursus si largius esitent, vt facilius fontes quos tædet vitæ, aut manet grauius, supplicium mancipia: extinguuntur. Esse verū & merum istud quod Officinæ ex Syria & Alexandria habent, nec Glaucio addito calidius acriusq; & amarius factum (vt Commentator somniat) certum est: nam quidam Pharmacopœi Veneti, & alii non pauci alibi, ad Theriaces simplicium delectum exceperunt Opium ę satiuo Papauere albo, prorsus idem cum peregrino Asiatico, vbi ex albo tum ex nigro satiuo fit: quare eorum Amphiam esse Opium Græcorum, liquido patet, nomēque indidem commutatū fuisse vtrūque perquam amarum: vehemens odore, acre gustu, & fauces quadatenus accendens, luminibus obiectum flagrat; etiam deterius & nigrius istud in Officinis nostratibus. Nam illud Venetum, purius & vt Aloe pellucidum, sed glutinosum fuit, lacteum eximilis viribus, arrimonia & amarore, insigni. Quo minus fuit cominiscendum Senensi propter immistum Glaucium, acrius & feruidius Opium esse; etenim Glaucium nullum verum hodie cognoscitur, nec etiam calidum sed frigidum a Dioscori, de proditur.

MECONIVM.

MECONIVM verò non modo ex vtrōque Nigro & Albo satiuo, sed etiā Lactuce syl: veræ contusis foliis & expressis, partim habuimus, partim etiam parandum curauimus; facultates comparabuntur & expenduntur cum opij viribus, inter lecta remedia nostrā.

PAP AVER SPONTANEVM *Hortense Syl: Semine interdum nigro, alias albo.*

PRETEREA sponte in hortis prouenit, quædam species foliis minoribus, floribus dilute rubentibus, obsoleto aspectu, capitulis triplo minoribus numerosis, semine interdum nigro, alias albo; quandoque hiuleis osculis, quandoque occlusis, cohibentibus semen, quod parum gratum, aut probatum habetur, præsertim nigrum.

ῥαβδῶδες. **RHOEAS**, siue caduco flore puniceo Papauer;

Germ. Klapper Rosen.
Gallis. Pautot sauage, confanons, Poncean, & Coquelicot.
Ital. Papauero.
Belg. Root Colbloemen quasi Rozenblommē & Rozenroosen.
An. Wild redde poppye and Red weede.

NIHI L frequentius isto in segetibus, quod vocarunt authore Dioscoride *ῥαβδῶδες*; a conditione fluxa floris quem parum diu seruat. Folia hirsuta, incisa, altius laciniosa,

K. ij.

Eruca

Eruce, Ambrosie, aut Bursæ pastoris, ambitu rutilant ex atro cruenlati flores minores, tenuiores, flaccidiores, satiuus, nigris, in medio apiculis villosis, per initia occlu si inuolucro hirsuto herbaceo Cucumeris Asinini pusilli effigie. Capitula sunt Pseudo melanthii magnitudine, similitudine, & supernè etiam vertice coronato, seminis plena Hyoscyami, aut Pseudomelanthij. Caulis asper cubitalis & sesquicubitalis; radice non magna, quæ attrectando quippiam illinit manibus cruenti, aut subpurpurei, ad morbos eodèdem proficui quos iuuant Syrupus è floribus, & stillaticia, magnæ apud nonnullos Medicos, & Officinas commendationis.

ARGEMON E.

QUIA huius succus argemas & nubeculas oculis dispelleret Argemone vocata fuit, cui cum syluestri Papauere, & Anemone perquã similis tota facies, folia, color, modus: has tamen vt inuicem discernere mus, fecit natura dissimilitudinem quãdam, & varietatem in similitudine, quæ exercitatis oculis, tametsi notis adductis à Dioscoride, tum intuitu facilè inotescent; tamè quoniam potius antiquorum quàm nostro standum est iudicio, nunquam perciperemus planè aut rem, aut eius dissimilitudinem, nisi verba quæ sunt rerum indicia intelligamus. At illa videntur hic vno, aut altero loco, aut mãca, aut minimè vera: nã quorsum hîc de Eupatorio cum illis spectat collatio, nesciunt docti: proindè ex rationis illatione satis liquet non Eupatorium, neuuè Agrimoniam, sed Argemonem eo loci legendum. Sic enim ait, *Anemone, & Rhœadi capitula syluestris Papaueris, sed illi supernè crassiusculum, huic subangustius*, tum paulo mox, *Anemones nodulos carere*. Iam si codiũ est capitulum, aut pixidula qua clauduntur semina: (quod DIACODIUM nomen videtur insinuare) negabit eidè adesse Capitulum, quod illi paulo superius asserbat. Ergo sic habendum, *ut & alia capitula hîc aliud esse quam Codia* (quod interdum etiam Theophrasto Fabæ crassius gibbum indicat) natura magis quam vocum vsu docente: vt in Papauere, vides caule summo Capsulam rotundam terebrem, cui summo superfici ei medio erigitur cupulus caliculũsue Punici mali in modũ. Istum hîc Dioscorides codion nuncupat, eoque magis vera quam scita distinctione eundem Anemone abesse indicat, vt inspectio etiam testatur, quæ quemlibet hæc monitũ facilè germanam differentiam docebit. Ista Intererat accurati & probi interpretis potius extricare, quàm meras aliorum icones congerere, aut Ruellio huius historię parenti bene-meritò notas imperitiæ inurere.

Esse quãdam Papaueris, Rhœadis speciem, cui succus flauescens pressu extillet in Plantarum diariis, & memoria habemus: an verò radix illi rotunda haud succurrit memorię, quibusdã geminis locis extat, nec tamen cuiuslibet se prodit intuenti color istius Papaueris, quam Argemonem putamus; vt neque in Rhœadis radicibus, quas si digitis fregeris, aut Papyro affricueris, non nisi una est: non in radice sed in cute colorem purpureum, vel sanguineum intueberis: hanc quilibet sed altera plãtã, paulo gnauior, qui multas Rhœadis plantas collegerit facilè animaduertet. Flores vtriusque altera pars virescens interdum adeo saturi flammeiue coloris sunt, vt atrorem præferant Adonidis floribus parem.

ANEMONE.

PERSIMILIS Rhœadi Papaueris, Anemone, quàm quia primo cuiq; afflatui venti flores pandat & referet, sic appellatam volunt. Potuit etiam non inconcinne à cognati affectu Rhœadis floris persimilis, cui defluunt folia cito, siue flatu, siue spontè, unde vulgò dicebant Pulsatille, & Herbã Venti: nam hiare patereque flantibus ventis per æstatem, permultis vsu venit herbis. Deinde quotquot Anemones vel cultis, vel neglectis locis legitimas agnoscimus; oportet perquam similes esse floribus, præsertim Rhœadi Papaueris, & Argemone, Dioscoride monente: alioqui frustra solito diligentius Dioscorides hæc inter se collatas discreuisset, monuissetque Anemone succum & calycem deesse, dumtaxat Asparagi pullulationemue cacuminosam inesse. At Rhœadi & Argemone succum tum Codion siue calycem suum esse. quas cunctas differentias, qui

STIRPIVM aduersaria noua.

113

in Romano agro Norbonensi voluerint animaduertere, illicò deprehēdent. Tametsi radices non sint tuberosæ harum nonnullis, quæ tamen certiores & notiores multò sunt illis Ranunculis, & Napellis, quas quidā falsò Anemonas iactant: illo excepto quem Venetijs virentem è Syrio semine prognatum euulsumus.

ANEMONE, Bulbosa radice.

FLORES sunt Papaueris Rhœadis aut Monspelliacæ Anemone pares, sed colore saturatiore viuidiore qualis Adonidis, cauliculis multis sesquipalmaribus & pedalibus, teneris hirsutis, folia Coriandri aut Pulsatillæ, radix tuberculus est quātus Doronici oblongus, aliquammultis fibris capillatus.

NORBONENSIS Anemone maior, corniculata.

NOTISSIMÆ verò apud Norbonenses duæ, primo intuitu Papaueris Rhœadis florem ostentant, in cultis præsertim, quarum maior folia habet etiam Coriandri diuisura: sed Papaueris Rhœadis modo hirsuta, in caule pedali & sesquipedali: flores verò ex rubro in purpureum violaceum deficiunt, quos perquam tenellos Papaueris Rhœadis ritu vel lenissimus austræ appulsus celeriter aufert, remanente tereti hirsuto longiore corniculo, cornuti Papaueris non dissimili, sed minore & graciliore: quasi natura alludere voluisset, isto descripto ad Papaueris cornuti reliquas, & altero ad Argemonæ glomerata capitula, in acutum fastigiata non operculo munita, vt Papauera omnia sunt,



MINOR ANEMONE, CORIANDRI folia.

flore Pulsatille capitulis hirsutis nec vt Papauer corolla donatis.

MINOR autem delicatiore caule non dissimili, minutiore folio & diuisura quam Coriandri, valde quam hirsutis, & satis rigidis, hirsuta capitula, flore eleganti relinquire multò minora quadantenus similia Rhœadis Papaueris, semine nigro Hyoscyami, radice pusilla superiori haud dispari, quibus si tuberculum adesset, nullæ notæ deessent: ac si non sint Anemones, sanè vix sint vllæ propriiores aut illis, aut Argemonæ, aut nouæ putandæ sint, vel suspicandam capite de Anemone duo genera descripsisse Dioscoridem. Quorum vnum radice sit tuberosa, alteram non dissimili Rhœadi, quod videntur inuere verba initio, deinde confirmare, vbi discrimen ponit Papaueris, Argemonæ & Anemone, huius tuberculi nulla interim facta mentione, cum tamen maximè oportuit: quare fortè idem illi contigit, quod Drabæ radici, quæ alicubi tuberosa, aliubi plana & æquabilis visitur. Idcirco



K. iij.

à Mon-

*An. Gal. Anemo Lutea lib. 2.
носта тѣмъ
eadem sit Germanica.*

à Monspeliaceis Medicis verè putantur, frequentèsq; inibi oriuntur in vinetis ac veruatis, præsertim iuxta prædium Præceptoris & harum seduli vestigatoris D. Aslatij, qui cum alijs multis opinabatur illam Germanicam & recentiorum Anemonem, stellatis luteis Ranunculi floribus & semine, radice multis bulbilis tuberosis Bulbocastani donatam, speciem esse Bulbosam Batrachij: nam tametsi eiusdem flores interdum albidum aut purpureum sint, tamen nihil ferme habet tota quod quadantenus præferat Papauer Rhœas: sunt enim folia Geracij columbini aut Ranunculi, cuius vrentem facultatem itidem habet: qua propter illuc nos referendum duxissemus, nisi à Galeno memorata Anemone luteo flore nos suspensos sententiæ de hac planta magis quam certos retinisset.

ANEMONES Mathioli.

*M. icones. 617.
618, 619.*

PORRO cōplures Anemones vt non necessarias, ita parum notis & locis expressas adducit Mathioli, quarum partem nunquam vidimus, partem verò bis inculcatam putamus, nempe hæc & in Ranunculis; quas tamē vltimas ponit, veriores intermedijs coniectatur, potius quam afferimus: quia ex illo profuso magis quam profuturo picturarum apparatu, nullò aut perparca verborum explicatione, locorum designatione, & stirpium distinctione subnixo, nihil penè certi capere valemus. Vtinam tantus Herbariorum dictator, potius posuisset operam nostro desiderio discendi explendo, quam Ruellio, Fuschio, Brasauola, Manardo alijsq; viris meritisimis carpendis cum alibi crebro & falso, tum hæc in Pulsatille & Venti herba quæ apud vulgus complures herbas denotat, Othonnæ panosa arrosa folia, Solidaginem minorem, Pulsatillum, & alias.

PULSATILLA, an Syluestris Anemone.

*Mathe, ico.
620.*

HVIVS comosi & tremuli seminum pappi quia huc atq; illuc vel leuissimo quocq; flatu pultaretur, Pulsatillam barbari vocitarunt, Anemonemq; coniectantes & vertentes Venti herbam pleriq; dixerunt: & sanè meritò non multum visa fuit abesse à Syluestri quibusdam doctissimis. Quippè folijs est Anemones tuberosæ, Bulbocastani aut Coriandri, rigidioribus, hirsutioribus, nigricantibus, crassioribus, durioribus, caulem palmarem & sesquipalmarem hirsutum Geranij amplexis, in quibus flores Papaueris Rhœadis aut potius Anemones, quinque & senis folijs purpureo cæruleis, è medio quorum exeruntur apiculi staminatue lutea Aquilegiæ aut herbæ Trinitatis siue trifolij Hepatici, à quorum delapsu se prodit cæsaribus villosa, cirris crebrius, & cincinnis calamistratis pennas delictiores sericeas pulli coloris implexas, aut carminatum bombacis pensum referentibus, cuiusmodi in Caryophyllata, Scotino, & spongia Bedeguari: quibus conditur semen exiguum Asclepiadis: Radice digitum crassa non admodum acris nec feruida. Quare inuerecunda ratione inculcat Fuschium erroris Commentator, hancq; recusat quia cum primum erumpit, emittat hirsuta folia laciniata, quæ acrimonia sint Ranunculi aut Flammulæ: inferius tamen paulò, dulcem saporem radicis idem Senensis agnoscit, non acrem cuiusmodi in caule & folijs: At Dioscorides vult vtramq; Anemonem acrem & acriorem illam cui folia nigra sunt, qualia sunt huius Pulsatillæ, quæ crustas emarginat admotis folijs, quemadmodum de Anemone dicit Dioscorides, qui intro sumenda folia pituita extrahit. Flore albidam, pallentem, Mendini montes, & Auerniæ, dant. Pedemontium Tau rinenses, interdum luteam ferunt: ex Alepo Syriæ rubram etiam habuimus. Non procul Basileâ in Heluetia meminimus frequentem hanc cæruleam & purpuream, qua propter qui Ritus Apium Dioscoridis hanc autumant, risum potius quam responsum merentur.

RECENTIORVM ADONIS, aut ADONIVM Poetarum,
Species Anemone, non Eranthemis.

Belgicæ

Belgis. Brunettekens.

CERTIVS etiam augurarentur, si eximiæ pulchritudinis florem istum vulgò Adonis vocatum, vel Adonium qui etiam inter segetes passim in Gallia, Germania, & Anglia reperitur, & in hortis coronaria habetur, ad anemonas retulissent: Etenim Eranthemum cur non sit, diximus inibi, cur autem anemonas sit, & eadem cum Poetarum Adonide videatur, faciunt flores punicei anemonas Galenicæ aut Germanicæ, intenso cruore saturati & aliquantùm nigricando lucidi. Folia, caulis, ramuli, & radices Cotulæ, aut anemone Monspelliacæ: semen in pusillis oblongis racemosis, Ranunculi longioribus fastigiolis, Asparagi primum pullulantis, vt signanter monuit Dioscorides in anemone: tota gustu subacri, vnde Monspellienses eruditi pleriq; in anemonas potius quàm Eranthemum ducendani voluerunt. Sententiæ quorum fauent etiam è Nicandri Theriaco cõiecturæ, vt qui hanc Adonidis cruore genitum, anemonem vocent, & Ouidius itidem

Effig. Math.
906.
Eranthemum
Dod. Fol. 140.

Cum flos. de sanguine concolor ortus,
Qualem qua lento celant sub cortice granum
Punica ferre solent,
Nimiam leuitate caducum,
Excutiunt ydem, qui persolant omnia, venti.

Vbi vides anemonem, & vulgi nomenclaturam, herbam venti adumbratam.

LAPATHI, siue RVMICVM genera.

CVM Paulo superius Lapatij differentias cunctas Atriplicibus & Betis, inferere consiliũ fuisset: Nec tamẽ id apte fieri potuisset, quod nunc possumus proxime eas hic adiungemus: Deinde vt quæq; sese offerent simillima, ita proxima serie ad hunc modum erunt collocanda.

LAPATHIUM. { Oxylapathum pratense, & Paludosum folio acutè mucronato.
Pratense alterum obtusiore folio.
Lapathiolum, siue paruum fontium.
Hydrolapathum magnum.
Hippolapathum hortense, Patientia vulgi, & Rhabarbarum Monachorum.
Hippolapathum rotundi folium, Pseudo Rha Recentiorum.
Alterum Rha spurium acutifolium.
Rha { Ponticum,
Barbarum.
Lapathum sanguineum, siue Sanguis Draconis Recentiorum.
Lapathum Oxalida, siue Oxalis.
Oxalis Gallica rotundiore folio.
Oxalis minima.

{ Bistorta. { Maior } Draguntia Plinij quorundam, an Britannica?
{ Minor }
{ Minima }

K.iii.

Rha.

- Rha capitatum Centaurij maioris facie, Enule folio.*
Pulmonaria maculosis Betae folijs, an Britannica?
Britannica altera Gesneri.
Herba Doria.
Virga Aurea.
Solidago Saracenica.
Tripolum.
Limonium utrumq.
Pyrola.
Sanicula altera Primula veris.
Cochlearia cum Frisia & Anglia.
Alisma sine Damasonium qua Plantago aquatica.
Sagittaria.
Alisma recentioram, & H. Morgani.
Calceolus Maria.
Ophris, sine Bifolium.
Vnifolium.
Plantago. { *Maior leuis.*
Maior pillosa.
Quinq. nervia.
Rosæ.
marina. }
Potamogeton.
Folium Indum Diosc.
Folium Malabatri.
Tembul.
Betre.
Gentiana. { *Maior.*
Minor Crutiata.
Gentianellatres. }
Nardum. { *Celticum.*
Celticum alterum. }
Nardum montanum cum valeriana.
Elleborus albus. { *Flore racemoso albo,*
& rubro. }
Elleborine alba.
Saponaria.
Persicaria mitis.
Persicaria Hydropiper.
Capficum sine Piper indicum maius, &
minus. }
Balsamine femina.
Costus hortensis, vulgo Cocq & Baume, Tragi Alisma.
Noli me tangere recentiorum.
Lepidium Aeginetæ, sine Raphanus fyl. vulgi Gallorum, & Belgarum.
Raphanus magnus Rusticanus.
Bolbonac sine Raphanus agrestis recentiorum, non est Diosc. Armoracia.
Viola matronalis.
Viola Mariana, an Medium antiquorum?
Trachelion flore. { *ceruleo,*
albo. } *maius & minus.*
Campanula hortensis, Phyteuma Mathioli falso.
Pes Locustæ Auicennæ, sine Rapunculus minor.
Rapuntium maius, Alopecori comoso flore.

STIRP IV M aduersaria noua.

117

LAPATHIVM ACUTVM.

QVOD Latini aluū mollire, lenire, exinanire, id λαπτειν Græci dicunt: vnde Lapathum & ἀλάπαθα, vt quidam legebant, vocatæ fuerunt. Herba notissima & lubricandi vi donatæ holeraceæ, cuius permultæ sunt differentia, cunctæ vbiuis abundè prouenientes: vt est ea quam adhuc hodie LAPATHIVM ACUTVM siue acutifolium vocant. Pratis nusquam defit, foliis Acetosæ nigrioribus, Betæ longioribus, angustioribus in caule cubitum & sesquicubitum alto, rotundo, profundè striato, purpurascente, alis pluribus donato, quibus flores muscosi, & semen triquetrum, in folliculis Attriplicis, vel Acetosæ concoloribus paribus non dissimilibus. Radix subest pedem longa, vnciam crassa, flaua vel fulua, foris ad lotiones, fots & linimenta, etiàmque, intrò in decoctis vsurpari Officinis solita, totius nomine Lapathii acuti, non reiectis ramulis vel foliis.

LAPATHVM FOLIO RETVSO.

nun. acuto.

NON diuersi generis, Officinæ vocant non acutum, quoddam Lapathium foliis superne retusis, breuioribus, rotundioribus, iisdem locis circa rudera & areas æquè familiare, ac semine, caule, flore, & radice à superiore vix discernendum: vsu minus receptum, propter superius acutum vocatum.

HYDROLAPATHVM MAGNVM

siue aquaticum.

QVIA frequens in aquis, nec alibi sponte exiret Hydrolapathū vocarunt istud, etiàm tota facie Hippolapathum satium referens: folio nigriore, non dispari, vti neque caule & semine; radice dumtaxat breuiore, fibrosiore, foris nigriore, intus vero rubriore, eoque ad Behen Rubrum ementiendum aptiore; Hanc enim quidem Antuerpiani, & Galliaudaculi Seplasiarii ad Medicos vsus sufficiebant, Behen rubro, cuius facultates & notas non minus adumbrat quam Limonium.

PVSILLVM FONTILAPATHVM,

& lapatholum vocatum tenellum.

ISTi etiàm aquæ sunt natales, sed non nisi lympidæ & fontanæ, trans quas è fundo exerit cauliculos teneriusculos, flaccidos, graciles, non absquè hinc inde filamentis, vt ceteræ aquaticæ, stipantibus & pendulis: folia sunt item admodum tenuia & mollicella, nec tamen aquæ innatantia ritu Potamogetonis, sed erecta viridantia ex atro Læceolæ, angustiora multò quam Potamogetonis, quæ miscenda colligebant sedulo, quidam Pharmacopœi Norbonenses, præsertim Namausi (vbi hæc, nec temere alibi, reperitur) ad vnguenti Martiati nominum & rerum farraginem confusissimam: tuebanturque semper idem non aliud generis Lapathii miscendum esse illi vnguento.

SATIVVM Hippolapathum latifolium vulgi, &

Rhabbarbarum Monachorum.

AD Eo familiaris notitæ istud est, vt in medicamentis familias ad emolliendum ventrem & olere ad vescendum habeant plerique horti; alioqui rarò sponte prouenit. Folia sunt Hydrolapatho paria, vel latiora, minus acuta, & rigida, in caule triū, aut quatuor cubitorum, radice adultiore, flauiore & gustu atque facultate deiectoria Rhabbarbarum imitante, idcirco Rheum Barbarum Monachorum, apud quos coleretur & cum vulgo Rhabbarbarum putaretur, propter commodum consimile flauam bilem, & serofos humores educendos nequaquam aspernendum dictum fuit; tametsi & aliud mox hic subdendū etiàm Monachorum sit vocatum Rha.

HIP.

PAVCI, & diligentiores Herbarii vt Antuerpienses Pharmacopœi istud colunt, & agnoscunt, quasi multò cognatius vero Rheo Barbaro, quia folio sit rotundiore, & superno ambitu retusiore, propioréque ad Personatam, aut Petasitem, quibus fermè magnitudine æquiparatur, nec tamen maiore, aut ita diuersa radice Hippolapatho, v-fuue, aut natura dissimili.

RHACAPITATVM Centaurij maioris facie, Enulæ folio.

MVLTI etiam abhinc annis aliud Rha ex semine Turcico habuerunt nonnulli, in hortis Galliæ & Flandriæ, quod magno studio cultum, non parum diu inibi perrennauit; foliis etiam Bardanæ, sed non perinde latis, longioribus, Enulæ, vel Phlomi, ambitu ferratis, & fimbriatis, læua & aduersa superficie virentibus, auersa autem glauca lanugine pullis, caulem rectum sesquipedem & cubitum amplexis, capite fastigiatum, foris squamulis loricato, ac per maturitatem stamine purpureo pleno, cuiusmodi in Cynaris, Carduis purpureis: femine dum circa Iunium & Iulium maturuit; Cetaurii maioris, vel Carthami longiore: Radix etiam fungosior, maior, & Rhabbarbo similior quam Centaureo.

PONTICVM RHA Antiquorum.

RHA è Ponti flumine cognomine Rha, RHA VED Seni è Chinarum India seu Rhabbarbarum Chologogon.

APVD Arabes & recetiores, duplex radix peregrina nomine Rha designatur; sed quia cuiusnam vtrius, stirpis sit, hactenus doctis ignoratur, & numnam eiusdem ambæ sint plantæ ambigitur, paucis & perspicuis resectis turbulentis argutationum acerbis, & authoritatibus, lis ex rerum inspectione & accurata collatione dirimenda. Qui sapius manibus & ore versarit radices hæc quinque nimirum Rhapontici, Rhauedseni, Centaurei maioris vtriusq; & Hippolapathi Monastici, facile percipiet omnes pariter & vnam quamlibet inter se, tum similes esse, tum etiam non parum discrepare. Quod si harum tres istæ indigenæ, nobis tam parum notæ forent, ac illæ duæ peregrinæ sunt, Pontici & Barbarici Rha, facile quis leuiusculæ coniectura addita adduci posset, vt Centaurium Rha Ponticum crederet, atque Hippolapathum Rhabbarbo idem, aut congener faceret. Nunc cum hæc diuersa esse satis constet, nullus nisi apprimè veris argumentis fretus, asserere debet, Rhaponticum idem esse Barbaro Rha. Est enim illud non modo molestum tyroni lectori, sed etiam impedimentum ad simplicium percipiendas qualitates notas, varietates, differentias, & usum; quin cauillis & ad ostentationem concinnatis sophismatis contrariæ, fermè naturæ res eadem esse probantur. Quippe si quis istud Rha Dioscorideum, nunc postremo cognitum gustu exploret, primum pauculum amarorem, vehementem astrictionem, glutinosum viscidumue quippiam adiunctum, acrimoniæ expers, inodorū, leue, mansu nō, cuiusmodi Rhabbarbari, Crocei deprehēdet sed croceorum, tramitū, colorem, atriorem tamen & ferruginem aceto dilutam ostendentem, fractu facilē, adeo vt minutim etiam non attritu in frustula diuellatur; intus neūtiqum RHABARBARI colore, sed textura & fibris tenuissimis, longè quam Rhabbarbari delicatioribus, à centro in ambitum radiatis, colore cinericio pulloue, venulis trāsuerfis pallei coloris. Crassitudo radiceis maximæ nobis visē quāta Cetaurei maioris; mediocres pollicē æquant: recens laxioris solutiorisq; substantiæ magis quā Rhabbarbarum, etiam vetustate cariosum & minus graue. Longè aliud est ab illo quod Mathio. innūit; Anguillaræ Appolinisq; monitu, nam merito hi cōiectabant; vti res erat, suam illam radicem esse tantū præcocē & præcisam à iuuentula Rhabbarbari planta: etenim anno ferme 1561, miserāt copiam istius in Italiā, & Rhabbarbari Pontici nomine donarant: flaua erat grauis & gracilis radix, sed vetustior, & teredenibus exesa, leuior, pallidior, magni tamē tunc habebatur, quia in Math. cōmentariis celebrabatur, etiāq; vt asserēbāt nōnulli purgabat, plusculū sumpta, vt videre meminimus Florētiae in Nofontrophii officina; & etiam

Rhabbarbari & Rhapontici discrimen.

etiā Venetijs plerisq; locis alijs. Quo verò anno 1564. Math. in Bohemia, eius verò con-
mētaria praelijs Valgrissianis Venetijs hārebāt Sequinus Martinello doctus & perquā
in hac Palæstra versatus, istum alterum postremum fratri Alberto ad Angeli symbolū mi-
sit: quod Medici Veneti nulla nota reclamante Theriacis addiderunt, & ad ceteros affe-
ctus in vsum deduxerunt: præsertim Lugduni in Gallia, Medicus singularis Dalescam-
pius: neūtiqum purgabat, sed astringebat & duntaxat præstabat ea quæ de eodem pro-
diderant antiqui. Sic & Pharmacopœi nonnulli, vt Valerandus Donrez insulanus valde
ingeniosus, huius non semel fecit, & vidit periculum factum. Ceterum parum solidis pe-
dicis fulcit Anguillara spuriam illam Ponticam radicem, quam si quis huic nostræ vellet
aptare, longē magis aberraret: hanc etiam cum magna copia recentem habuerimus;
(pendebant tamen & in singulas vncias ducatum ad Theriacæ compositionem Pharma-
copœi) semper leuiusculam corticibus crassioribus, & absolutis, vt supra dictum obserua-
uimus: cum potius debuit grauior esse recens quā adulta, aut arida, contra quā An-
guillara putat Raved istud purgans. Frustra & ridicule facessunt negotium, dum quibus
ex orbis regionib. aut emporijs Venetias aduehatur anxie anquirūt: nam alijs nauigatio-
nibus ex Indijs Orientalibus, ad Septentriones a cœli volucris & Neptunis Hispanis
Vlisiponem indeq; Antuerpiam deuehitur: venumq; exponitur dimidio fermē mino-
ris quā Venetijs. Magnus Mathiolus magna prosequitur venerationē, Apollinem istum
Iambicum, qui æquo animo ferat illius falsa & asperiuscula monita, nec conuicium in il-
lum regerat, quæ tamen nec lacepsitus in alios doctissimos solitus est congerere: verū pru-
denter & catē sic factum vt siluerit: & vt puto ne istam Mathioli laternam lustraret, aut
vasta commentaria suis illis radijs Iambicis conficeret, & vreret.

LAPATHVM sanguineum.

Belg. *Draeken bloet*, aut sanguis Draconis vulg.
Gall. Sang de Dragon.

SEPTENTRIONIS hortis sponte hæc etiam oritur, rariùs in calidis plagis, quā
quispiam putasset Limonium, cum quia Blitea illi sint folia, tum etiam quod neruulis,
& venis crebribus sanguineis eadem sint intertexta: qualia quidam in Limonio deside-
rant, cum apud Dioscoridem *νευγοειδές* nuncupatum legunt, id est, nerueam, aut neruis
donatam: verum è Lapathorum est hæc genere, quod habitu toto ipso præfert, tamen
nitrosiore gustu, & Bliteo folio & facie, vel Lapathij acuti angustiore, longiore, numerofo
sanguineis, purpureis, saturatis extantibus neruulis, aut venis cruore plenis, quoquouer-
sum sparsis, & labyrinthis ductibus, folij fuscum virorem maculantibus. Reliquaq; om-
nia sunt prorsum Lapathij acuti, aluumq; cient iusculo, aut expresso succo sanguineo to-
tius plantæ, quam idcirco *Draeken bloet* Germani vocant,

OXALIS, siue LAPATHVM OXALIDA, Acetosa offi.

{ Gall. Ouseille. { Ang. Sorrell.
{ Ger. Saur amphier. { Ital. Acetosa.
{ Belg. Surkele.

OXALIDES tamen non perinde nisi nomine expressæ fuerint à Dioscoride, tamen
quin fuerint Lapathi quartum genus constitutæ nulli dubium: nam quod cuiuspiam
minus placere posset, semen *Αξιμύς* inibi dici, sic accipiendum, vt vulgò interdum loqui-
tur, acidum siue *aigre* cum acri confundens: alioqui cur illi notissimum, vt semper fuit vel
mulierculis, non putemus? & Oxys seu Oxalidis vox, non modo foliū, sed etiam sapore
connotat, qui acutus ab acie cultrorum proportionē & similitudine dicitur, Oxis siue
acutus, quibus etiam Lapathum vocatur Oxalis, vt sane est: folijs quippè acuti Lapathij
tenuioribus, delicatioribus, & magis holeraceis, ima basi latioribus, lunatis & pinnatis
Spinaciis, & Atriplicem referentibus: caulem multum striatum, rubellum, succulentum
am-

Effig. Dod. 383

ambientibus admodum acidis : radice ex Crocco flauet fibrosa, semen angulosum acutum, in folliculis Lathyrus ceteris non dissimilibus. Vbiq; pratis & hortis quolibet anni tempore viget, suppetit Officinis & culinis ad embamata.

Oxalis TENVIFOLIA, sinuata *Veruecina*.

Belg. *Schaep Surckel*.

Gall. Surelle, ou Oseille de brebis.

PERSIMILI huic, & tanto luxu sabulosis Brabantiae, Picardiae, Nortmaniae, & Angliae importuna, ut segetes enecet, vires aut incrementum praepediat, fusco purpureo feminum caulium, & foliorum colore solum ipsum operiens. Gustu etiam acida pecori non ingrata, eoque fortè vocata Belgis *Schaep Surckel*, id est, Acetosa veruecina. Minor tota & gracilior, palmum & sesquipalmum alta : radice exili & tenella, plurima etiam in collibus quibusvis squalidis & macilentis.

Satiua FRANCA, rotundifolia repens.

Pliniana Oxis
inter trifolia di-
catur.

GRATISSIMA & tenerissima in holere haec in Fracia Lutetiam, & Aureliam circum: tam hortis ad intinctus ciborum & medicamenta, quam superiores duae reliquis regionibus frequens : ac ideò Romana vocata, quia cunctis praeferretur, gustu & acciditate delicatior. Quamuis & in montibus GalloProuinciae glareosis multa scateat, serpatq; flexis pediculis & cauliculis pedalibus & sesquipedalibus, in quibus folia circinata supernè, pusilla carnosae Soldanellae, sed reductis, ad imum sinuatis lateribus, aliquantum pinnatis : semine & flore pusillis non diuersis à superiore Oxalide.

Triplex BISTORTA, quarum una quauis aseritur
BRITANNICA.

PRIMUM intuenti utramvis Bistortam, videntur illae à Rumicum syluestrium familia, quare & de Dioscoridis foliorumq; comparatione Britannica iudicata fuit. Sed maioris multò commendationis antiquorum Plinijq; elogio Britannica olim fuit, quam hodie sit exploratae notitiae. Factum quippè videtur negligentiuscula recensione, fortè & una immutata vocula, aut sanè labecula in radice exprimenda, quod vsu venit nostra & auorum memoria, ut quam perditam aut ignotam duceremus, vsu tritam quotidiano, nomine sub alio inuulgatam, familiarem admodum habeamus. Quare qui Bistortam nolunt, propter radicem λεπτὴν, id est, tenuem memoratam, neq; nihil penitus dicunt: neq; tamen tantum inaccommodum adducunt, ut cum cetera omnia exquisitè ei faueant tum figurae, tum virium signa : cum ipsi nihil aequè commodum, nedum melius afferant, sit illis illicò credendum: totum quippè disceptationis momentum in radice vertitur: alioqui Rumici agresti adeò est similis facie, ut non pauci Rumicem dicant. μελάντερον καὶ δασύτερον si vellicant, in Graecula notione trita calligat : saturiore quippè & quasi purpura nigricante ut in viola quam μελαίναν vocat, Martia esse folia interiora innuit δασύτερον non pilosiora, neq; enim de pilosis hinc comparatio est, neq; notio ea commoda hinc est, sed rigidiora, hirta, & firmitiora. βραχύτερον, id est, breuem, sanè videre licet etiam cum Lathyrus, aut minoribus collata. λεπτὴν, tenuem sanè, ut non lubet, ita inuitus dico, fortè quod verissimum est : aut illum minoris Bistortae radicem intellexisse, quae non admodum crassa est, aut quempiam amanuësem, qui breuem radicem legisset, tenuem è crasso mutasse παχύν in λεπτήν, nempe rei ignarus, ratus id aptius congruere, quia quae sunt breues radices ut plurimum sunt tennes : tamen si ipsis etiam autoribus eadem excidere possunt errata leuiuscula, humanae Mineruae. Ut ut sit, vsus & fructus Bistortae nequit extorqueri illis, quos viginti annos, eoque plus torset Britannica sedula disquisitio : qui sciunt ipsidem planè viribus, & longè pluribus, quàm quot attribuerit Dioscorides Britannicae, pollere. Quarum expansio retinet nos in eadem sententia eo lubentius, quod nullam planè videamus, quae aequè congruat.

Minor.

STIRPVM aduersaria noua.

121

MAIOR.

MAIOR enim promit folia, Rumicis acuti simillima, aliquanto minora, nigriora, ple-
nora, rigidiora, ambitu tantillum lacinioso, aut alicubi reducto, auersa caesia, te-
neros, glabros, pedales exiles, & in summo spicatos flores purpureos Betonica, aut Per-
ficaria, caules edit. Radix nigra, instar contorti, intróque reflexi pollicis digiti manus, in-
tus rufescens, sapore perquam austero, astringente, quandantenus Tormentilla, foris fi-
brofa, nigra.

Bistorta MINOR, & MINIMA.

PRORSVM eadem primæ minor & minima, etiam quò loci omnes vnà sponte oriun-
tur, sed hisce folia angustiora, leuiora, continuísque oris: breuiore item implexu conuo-
luta, minórque radix, & nullis penè fibrillis. Celsi mótes & frigida pratésia has alunt om-
nes, vt Baldus Veronensis, & colles herbidi multi in Anglia Occidua. Vbiuis etiam colunt
horti Pharmacopœorù efficacissimas omnes ad vulcera effrenè serpentina, & ad fungosos
polyporù in naribus, & palato interiore flagellos absumendos, aqua stallatitia, quæ etiã
ad hepaticam sanguineamque refudationem plurimum pollet epota.

BRITANNICA GESNERI & Lugdunensium.

QUÆ enim nobis primum indicata, ab exercitatissimæ cognitionis Valerando Don-
re Insulano, vt non parum foliis, & radice responderere videtur, ita plurimum il-
lis astringendi viribus & oris fauciumque, vel tonsillarù vlcera iuuandi, defici, haud obscu-
rù: & vehemèter amara, atque nonnihil calida est:
Conizæ quiddam odore, & sapore testatur. Ma-
gna copia Lugduni etiam ad mœnia, & intra po-
meria peninsulæ herbidis amœnæ, quæ alluunt, &
distinguinat duo nobilissima flumina; hinc Rho-
danus ab Oriente, illinc Arar ab Occidente, &
vocant vernaculè *Ayne*. Caule plurimum sin-
gulari, rotundo, duriore, pallente, cubitù alto:
in geniculis folia ima nonnulla emittète Morsus
Diaboli minora, aut Conizæ maioris, Bellidis,
nonnihil nigricantia. Flores in pusillis alis summis
lutei, circinati, Conizæ maiores, sed non absimi-
les, abeutes, maturo semine, in pappos: nec semè
dissimile Conizæ maioris. Radix breuis, tenuis,
albicans, fibrosa, minor, radice Succisæ aut Bel-
lidis par. Qualitates quales diximus, vsum
nescimus. Hanc tamen non displicuisse Gesne-
ro & Dalescampio, magni nominis medicis,
forte de facie dumtaxat, eandem iudicantibus certum.



Pulmonariã recentiorù Britanicã hodie putatam; quia folio, effigie, floribus atque muc-
co Symphiti est, rectius illic ponemus, & disquiremus, ecquid à Britanica vera discrepet.

*Pulmonaria an-
Britannica.*

COCHLEARIA duplex, Britannica, & Batava.

NEQVE nescimus, etiã non paucis eruditissimis Britannicã verã visam fuisse, inferiori
Germaniæ; & præsertim Oceano finitimis Frisiæ & Hollandiæ frequētissimam, quã
Germani *Leffelkraut*, Belgi *lepelcruyt*, id est, herbã Cochlearis siue Cochleariã, à foliorù
circinata, cauãque rotunditate cochlearis cõuexum intimãque superficiẽ exprimète, voca-
antur, quas Cæsaris milites trans Rhenum promotis castris aduersus Inem illam, &
dentium, neruorùque noxam; edocti à Frisis colonis experti sunt: vt idem fufius
narrat. Verùm cum hæc neutiqum illius Plinianæ descriptioni congruat, & per-
multæ aliæ sint plantæ aquaticæ, vt Nasturtia & Sion Cardamine eidem persimi-

*AN BRITAN-
nica Plinij?*

L.i.

les

les gustu, nec admodum disimiles habitu, idem remedii dent, nullum inde certum suppetit argumentum, quo hanc Britannicam asseuerent. Sunt enim folia prima pul- lulatione oblonga Pyrolæ, aut Ophioglossi, moxque crassiora, & umbilicata euadunt; & nonnihil caua, Rorellæ Solis modo, sed magnitudine Soldanellæ, nonnihil ambitu angulosa, cochlear aliquantum præferetia; flosculis Cardamine albidis, in cauliculis pal- mum & sesquipalmum altis; per æstatem semen serie gemina, in vtriculis siliquosis con- datur, Thlapsi minus fuscum, compressum: radix tenuis albicans, parum fibrata, gustu acri, herbaceo, Nasturtij, aut Sisymbrii Cardamine.

COCHLEARIA Anglica, Atriplicis folia.

QVI Frisiam Cochleariam antiquorum Britannicam profitentur, cōmodius suam opinionem tuerentur, si scirent in Anglia ad amœnissimi Tamesis fluentia, quæ Londinum præterlapsus est, etiāque in Bristolæ sinu Occidui Oceani, quod allidunt per stata incrementa vndæ, aliam esse congenèrem, & similem illi, flore semine, & sapo- re; sed foliis non æquè umbilicatis, aut cochleatis, potius Atriplicem, aut Laphathio- lum effigiantibus, vnciam latis, inque sesquiuncia, aut vnciarum duarum longitudinē porrectis, crassis, densis, & succulentis, gustu & colore alterius Cochleariæ; Radice ma- iore, vt qualibet sui parte, minus tamen alstringente, nec commoda ad ea quæ suæ Britan- nicæ Dioscorides attribuit: tametsi æquè vt superior, laudata ad Stomachacem, Scorbu- tum: quibus vehementer afflictos ægros aliquot huius ope iutos vidimus, superiore Vere.

PYROLA à Pyris folio: LIMONIUM Germanicum.

Germa. Wald mangold, à syluestri Beta,
cui similis.

NON defuerunt etiam qui aliā istis similem, superiori, & inferiori Germaniis adeo- que vniuerso Septétrioni notā, Britanicam deuinarint: quod esset foliis Betæ & lapa- thiolis: ob idque Limonium hodie autumant, nomine etiam viriditatis perennis suffra- gante, *Winteregruyn* Germanicè, siue hyemis virorem sonante, quippe æterno virore penè atro aduersum Brumæ rugores perstat, montosis syluosis, & frigidis vdis, præ quibus te- pidos hortorum recessus, locaque vrba, & mitiora viridaria aspernit, inque illis quasi in- uita ægrotat, ac tandem emoritur. Proinde Chirurgi, Germanici præsertim Theophrasti- ni Heluetii, & Lansqueneti, ad potiones vulnerarias sibi de Alpibus finitimis, aut mon- tosis lectam curant, principemque vnam è vulnerariis ænemis, & vulneribus ferruminan- dis addunt; Brabantis in *Berchem* Sylua Antuerpiæ contermina aliisque Belgii syluosis, rarior Italis, & Gallis meridionalibus. Exigua de radice & tenera, subrussa, nonnihil ru- gosa, caulem dodrantalem & pedalem magnitudine promit, floribus in summo albis, & in medio stamina, apicisue emittentibus, odoris Lilii Conualii haud disparibus: & in- imo compluria quina, septena, octonauæ folia, rotundiora, minora multò Betæ; Pyro pro- piora, nigriora, viridiora, non secus ac cunctæ partes siccitatis, & astrictionis vehemē- tissimæ, euidentis frige factionis. Vnde non defunt coniecturæ quibus sententiam Li- monii foueant Docti nonnulli, qui illud prius *Behen* descriptum non norunt; propterea quia minus in pratis, aut littoribus herbidis, totius Oceani Germanici, aut Anglici re- peritur.

Λιμόνιον. LIMONIUM.

Effig. Matheo.
980.

HERBIDVS viror, pratenscsque, & palustres natales Limonio nomen dederunt; quasi tu pratensem dicas herbā, aut cū Plinio Syluestre pratense Blitū, huius quippe etiam videtur, aut species, aut per quā affinis nigræ Betæ, quæ esu etiam siliere alui Dio- sco. autor est. Verum recentiorū sedulitas complures huic descriptioni aptauit pratenses pallustresue plantas, forte non inscitè: tamen nulli congruit magis Limonij & nomen &

& notio, quam isti pratenſi & maritimo recepto : cui folia ſunt Betæ nigræ magis affinia : Semen copioſum, oblongum, ruſſeſcens ex cæruleo: flores purpurei, cærulei coloris tenaces: caules tenues, radixq; rubeſcunt, magnitudine Lapathi acuti, cui totus accedit, & guſtu ſubaſtringunt, vnde Pharmacopœis anſa porrecta, vt Behen rubrū nuncuparint, & qui vñum Lugdunum duxiſſent, alijs quorum in patria, & præ pedibus erat, quaſi rarum non paruo pretio & noſtro riſu diſtraxerint, vt alias factum diximus, in radice Hydrolathi. Non niſi locis herbidis, & vdis maritimis præ pratis, vidimus, vt Adriaticis & Norbonenſibus littoribus vbi maxima copia . Hic magis vt Behen ridemus, quam recenſemus: tantum indagare volumus, quid cæteris diſcreparet: quæ internotiones, ſunt in re herbaria multo vtiliſſimæ.

PARVVM LIMONIVM Norbonenſe, Oleæ folium.

Hic alterum prorſum ſimile, ſed minus multo, inter ſalebroſa littora, & rupes montis Ceti, & alibi Norbonæ, & GalloProuinciæ ſaxoſis oritur frequēs, quod Empetri ſeu fœniculi marini aſſociatur lubens, folijs minoribus Oleæ, aut Myrthi paribus, humi radici proximis: circū pedales caules, & cauliculos graciles inflexos, cæruleis muſcoſis floribus ſuperioris non diſſimilibus onuſtos, folia longe minora fœniculum Marinum, ſiue Empetrum ſatis exprimunt.



Mathioli Secundum LIMONIVM.

Dvo namq; cum appinxerit, nihil diſtinxit, ac ne quidem monuit, neutrumné. an vtrum eſſet verum: ſed quaſi rerum neſcius, ne verbo quidem explicat: & tamen certò doctis conſtat ſecundi ab illo deſcripti, flores non ita paſſim videri inter multa millena plantarum.

Τριπόλιον. Littorum TRIPOLIVM.

FERVNT ſic vocatum à ter, ſingula die, mutato florum colore, quod quidem fieri poſſe equidem iam lubet credere, qui videamus è naturæ Officina multo mirabilia euenire: an verò fiat, equidem neſcimus: illud ſcimus, in Maris Mediterranei, & Occidui vniuerſi penè littoribus, & fluminum oſtijs: plantam copioſè prouenire, non ita folijs aſimilem Limonio primo : cæterò qui Tripolio exquiſitè congruentem, quæ non quidè ternā coloris interdiu mutuatione experiatur: ſed quia duplicis eſt floris, nempe lutei, & purpurei in Phœnicei, interdum & cæruleum vergētis, lutea foliola radiatim aſita ſuperne deſuete primum ſolita, admodum ſtudioſe obſeruauimus, partim verò introſpecti & purpuræ vel albida cerni, relictis interim nonnullis inibi foliolis, & multis ſtamimbus albidis, & purpureis ſuperſtitibus, quæ plebeculæ opinionē faciūt, ter die mutati coloris: quod idem nonnullis ſtirpiū noſtratiū alio cōtingere modo, iamdiu obſeruauimus. Scatent hac Norbonica, & Anglica littora, & fluminū crepidines, quas refluxus, & Maris eſtus, inundant vbi ſerme nulla alia herba comparet, folijs Glaſti aut Limonij, minoribus, deſis, leuibus, ſuſcis, craſſis, circa caules ſeſquipedales & ſeſquicubitales in ſummo ramulos diuiſos, multos herbariæ Doræ nō magnitudine, ſed nōnulla ſimilitudine, radice etiā craſſa, fibroſa, flores medijs ſubterq; lutej & ambitu purpurej perelegātes, vt plātavni uerſa multū aſteri Attico mōtano ſimilis flori exortu & effigie, vt latius monuim⁹ cap.

L.ij.

de

An ſit Damasonium, Phlegmagogum & Cholagogum Macelli cripi?

de Aftere Attico & alibi : In Turbith diximus esse Serapionis Turbith. Radix depasta
fibris crassa, non tamen aluum ciet decocto & succo pota, nec apud nos Gummofa.

Norbonensium DOREA quasi aurea, quam perperam DORIAM vocant,
folijs Limonij aut Rumicis, flore luteo Tripolij, aut Iacobeæ : an Theo-
phraſti PANAX Chironium & Plinij PHAR-
NACEVM?

NEVTIQVAM Doræ duci trirremium claffis Gallicæ, & Imperatoriæ præfecto, qua
fi exoticæ huius repertæ laudem verè afferunt Herbarij quidam: cum hæc fit Gal-
lo Prouinciæ & Norbonæ annibus non admodum rapidis, & ijsdem etiam natalibus ori-
unda, quibus Limōni-
um, cuius multa simi-
lia habet, & inde in
hortos Belgij & An-
glie translata fuit, vbi
etiam hac ætate, Lō-
dini Morgano nostro
creuit: perquam pro-
cera & elegans fepte-
num & octonum cu-
bitorum ſcapo recto:
radix quam pro ſtir-
pis magnitudine mi-
nor, maximam Helle-
bori albi æquat radi-
cem: cui etiam com-
pluribus filamētis, re-
cta prolixâque ſparſis,
& habitu toto ſimilis
eſt: à qua, & reliquo
caule mox ſuperne
ſurritur numeroſa
ſoboles foliorum, Hy-
drolapathi longitudi-
ne, craſſis & oblique
extantibus purpuraſ-
cētibus neruis trāſuer-
ſim: & quæ valde an-
guſta in imo ſunt, pal-
mæ latitudinē, ſed me-
dia ſui partē æquant,
virore intenſo, rigida,
& craſſa vt Limonij,
aut Tripolij præſertim
in ſummo caule, qui
procero homine pro-
cerior eſt, rotundus,
craſſus digitū, Lapathi modo in ſummo turiones habet variæ lōgitudinis, quibus iſtores
Senecionis aut Tripolij marini, in pappos abeuntibus. Sapor, odor, radici & folijs arōma-
tus & medicatus Angelicæ Syl. & nō nihil nitroſi, minime acris. Plurimum hac vtūtur vul-
nerarij curſores, plurimiq; faciunt quidam Medici: quæ coniectura cæteris congruenti-
bus notis, magis perſuadet eſſe Theophrasti Chironium, Lapathi ſimile: aut ſanè vnum
eorum, quæ ad Theophrastum Plinius retulit, vt Pharnaceum.



STIRPVM aduersaria noua.

125

CONSOLIDA AVREANemorum, Limonii folio,

non *Alisma montanum*.

IN AVRELIAE Gallicae syluosis densissimis est quae nostro H. Morgano perelegans floruit hoc mense Iunio Londini, radiatis multis in ambitu foliolis, Nardi Montanae, aut Doronici florem & colorem similem habentibus, foliis nigrae Betae, aut potius Limonii, atrius virentibus, carnosius, aliquantum hirsutis, crassis, venosis, Doreae similibus, amplexis pedales Doronici cauliculos binos, aut ternos, floribus radiatis Doronici, aut Calendulae, & concoloribus scite pectinatis confertis, & comis foliolis, antequam pandantur, eleganti spectaculo, radice multis filamentis albidis sparsa in cespitem summum, Bellidis modo: sapore Mediae Consolidae, tantillum acrimoniae prodentis, aut Herbae Doreae, cuius etiam vires & quandam aromaticitatem aemulatur.



AVREA VIRGA Villanovani, Limonii, aut Costi hortensis folij,

Doria floribus, an *Leucographis* Plinii?

NEc minus celebris haec apud vulnerarios Aurea Virga vocata, nec non multum similis superiori, sed multo frequentior & notior, praesertim Germaniae, Franciae, Angliae, atque caeteris Septemtrionalibus nemorosis & saltuosius opacis, ubi multo maxima copia. Caulem gracilem laevem, leniter rubentem, cubitalem & sesquicubitalem foliis ambientibus immum persicae latioribus, tenuibus, tantillum crenatis, Costi hortensis modo, multo angustioribus, & reliquo caulij; qui multos in ramulos diuisus visitur, floribus confertim ornatos aureis Doriae, vel Consolidae Saracenicae, in pappos disparatibus: radice fusca fibrosa: supernè rubella Costi hortensis. Conizae semine, vi altringendo efficaci, sed sicca: do multo efficaciore, mirum quantum calculo exterendo laudata, atque sanguini sistendo vlcerebus vulneribusq; cogendis, capropter persuasum nonnullis hodie Leucographin esse Plinii; qui tamen sibi notam non modo negat, sed ne lectam quidem apud quempiam autorem, miratur; quum (inquit) adeo esset utilis. Et Virgae aureae nulla vspia linearum vestigia insunt, quae nominis argumento respondeant: vires autem non tam ad sistendum sanguinem intro compertas habemus, quam ad alios affectus admirabilem experti sumus.

Dodon. 108.

SOLIDAGO Sarracenica.

CLAUDEBERE iungeré, aut coferruminare, vulneris labra, consolidare Barbari Chirurgi dicunt, vnde haec vocata Consolida, cognomento Sarracenica; quod Turcae & Sarraceni opinionem magnae peritiae, in medicamentis vulneris praesertim, essent apud Europaeos assequuti. Et sane haec est perquam accommoda renibus, hepati, intestinisq; vlcerebus, atq; dissolutis. Foris vero nihilo secius ad vulnera utilisima. Iisdem ferme natalibus nemorosis, quibus Aurea Virga, sed magis vdis & depressis, apud Septemtrionales: apud vero Meridionales, montosis vdis, inter Valerianas sylvestres fruticat, è radice pluribus & crassioribus fibris capillata, caulem rectum erigit, trium, aut quatuor cubitorum, rubellum, rotundum, cauum, secundum quem totum, folia Lyfimachiae luteae, aut Amygdali longiora, parum quid crenata: sumis alis & floribus palidis virga Aurea aemulatur

Dodon. 107.

Lilij. in

in pappos etiam perduntur, vnā cum Conizæ semine. Vuluerariis in hortis viret.

AQUATICA Plantago, foliis Beta, aut Plantaginis
flore Galii albi, Est-ne LIMONIUM, aut potius
ALISMA?

{ *Germa.* Wasserwegrich.
{ *Gallis.* Plantain d'eau.
{ *Belgis.* water wegebrye.
{ *An.* Water plantaine.

QUISPAM possit interpretari dictum ἄλισμα, quia in aquis nasceretur & iactaretur, siquidem ἄλισμα etiam apud Dioscoridem Maris est allisio, atque iactatio, qualis vulgari aquatica Plantagini contigit. Sed enim Recentiorum satagentia maluit quippiam diuinare, quā quod certius erat sequi, aut tantisper retinere, dum quid melius obuium haberet. Itaque aquatica Plantagine contempta intruserunt Bifolium, seu Ophrin alii, alii verò Limoniū, nonnulli Saponariam; quidam Calceolum Mariæ vocatum, est qui Epipactidem Hellebori foliis, ac non nemo Commentator, sed Musis plane iratis Botanicis, quæ se vti nos queruntur delusas, quasi præstigiator quidam, visus aliquid (fastiditis cæterorū iudiciis) & reiecto Alismate suffecisse, nihil tādē nisi mutā plantæ vmbra, id est picturā plantę indicte, nescitur cuius, reliquit nobis hiātibus, atq; aliquid saltē noui, si non veri, audiēdi auidis, & repēte se subduxit. Cui autē animo fuerit, hæc omnes stirpes de veris cunctis notis & accurata collatione expendere, nullā non poculā Damasonii deliniatione literaria Diosc, tū verò & natura, & facultate agēdi abesse, præterquā vnā istā aquaticā Plantaginē vocatā, quę minus istis morosulis placet, quia fortē Græca litera nonnihil labis, aut hiatus perpeffa est, veluti vbi σερότερα: id est, angustiora folia habētur, idē potuit esse significatus, & voculæ permutatio; cuiusmodi in Helenio, Meo, aliisq; nō paucis. Quin locis aquaticis, quorū indigenā facit hanc Plantaginē, nusquā gentiū aliā videas plantā, quæ quicquā ferē aut vultus, aut viriū expleat: vires si quidē perquā congruunt ferē omnes, verū Galenus qui legisset, radices huius acres eōq; ædemata discutere; suo more nōnihil Dioscorid. tacitē aduersatur: de cætero verò illi assentitur, sēque reliquarum facultatum, vt frangendi calculi, periculum fecisse testatur: eōque non acrimoniæ, sed absterfioni, calculi expulsionem acceptam fert, quæ de radice verū esse experimento & ipsi scimus, equidem melius quā Plantaginis, cuius folia, & radices similes habet; quæ cōferuntur Helleboro: ac ē foliis etiam quæ κλάμενα ἐπὶ γῆρι: id est, deorsum versus reflexa, vt huius non rarō sunt, καύλους λεπτοὺς ἀπλᾶς, aut vt quidā doctus legit καυλὸς ἀσπῆρας, nō ἀπλος, sed ἀπλᾶς, id est caules plurali numero, tenues seu graciles, teneros, cubitū altos: Sic etiā sunt huius ἔχων κεφαλὰ θύρσοειδῆς habens Thyrsi specie capitula, cuiusmodi sanē habet, nondū explicatis, egressisue floribus, pusillos rotundos acinulos, Persicariæ modo. Tandem ἀνθὶ λεπτὰ καὶ λευκὰ καὶ ἰσχυρὰ flores tenues, albidos, & pallentes adeo congruunt, vt vel hac nota, nulli ignota esse debeat: quæ in nullam cæterarum prorsū superius propositarum, conueniunt.

Vt in sumaria.

*Quidā Bodævo-
edus, racemosa
capitula.*

PISTANA Magonis, sive Plinii, SAGITTARIA
aquatica: an. Stæbe scæmina?

*Matheo. effigie.
1138.*

PERMULTIS hæc amnibus ac leniter labentibus in Italia, Gallia, Germania, & Anglia; subter aquas è fundo vadoso, radice multum capillosa, & prolixa, albida, nonnullis oblongis fibris crassis & bulbosis adnatis, pediculos prægrandes, triquetros viridantes glabros exerit: singulos singulo folio donatos triquetro, vtrinque pinnato, reductis lateribus in quē mucronem deficientibus, & prorsum harundinem cuspidatam effigiantibus, cauli selquicubitali medio læui cauo, molli, ternæ aut quaternæ pilulæ echinatæ Vnedonis, aut Ricini non dissimiles, aut Caricis, quibus affinis videtur: post florum delapsū, qui terna foetura prodeunt, totidēque foliolis constant cādidis, è medio pauca stamina emittentibus, Maio & Iunio in Anglia prope Oxonium

STIRP IV M aduersaria noua.

127

nium, ponè mœnia, in amœnissimis illis residibus, sed lymphidissimis aquis: etiam Londini ad arcis Regiæ vallum, & in Tamesis crepidinibus palludosis gustu astringente: sicco, non ingrato.

SAGITTA Minor.

Varietas { NON secus atquea quatica Plantago, interdū, multò angustiora foliis, & acutioribus visitur: sic hæc reperitur alis acutioribus, longioribus, latioribusque foliis, magis vtrinq̃ exhaustis, acutioribus cuspidatis, tota ceterū minor. *Matheo. effigies 1139.*

BIFOLIUM NON EST ALISMA,

videtur Ophris Plini:

ET hæc quod esset foliis Plantagineis, locisq̃ humentibus familiaris, opinionem Damafonii quibusdam fecit: aliis, & quidē aptius, Pliniana Ophris dicta fuit, nō quia superciliis fucandis, aut lenocinio apta comperta hæcenus sit, sed à binis vtrique foliis vnde *zuyblat*, id est, Bifolium dicit Germania, vbi syluosis in pratis, & vdis frigidioribus plurima, caule rotundo, glabro sesquipalmari, cuius ab imo duo sibi vtrinq̃ vnum ex aduerso surriguntur folia Orchis, & Plantaginis aquaticæ, viridantia, & secundum longitudinem neruulis intexta; deinde à medio ferinè, summo tenus flores sunt deinceps, vtrinq̃ gemina serie, ex pallido herbacei, muscæ, aut volucellæ plumis exutæ, nō multum ab Orchii diuersi; radice huc & illuc multis fibris sparfa, facultate nec astringente, vt sit Damafonium, tametsi alia dote vulneribus & fracturis proficua sit, & Alisma & Ophrin aliquantum adumbret, neutra tamen asseri potest.

Μορόφυλλον, RECENTIORVM,

ORT v Bifolii foliōque Plantagineo est, etiam *Einblatt*, siue vnifolium Germanorum nulli opaco luco, vel nemori non occurrens, per Maium flosculos promit albos, Galii & similiter odoros, vnde acinuli pallidi rotundi rubelli, dum maturuerint, gustu amaro & ingrato, sed facultate ad neruorum fæctus eximia. Folium vnum per initia in imo, deinde femine iam perfecto, aliud se prodit folium minus in summo; vtrūq̃ Plantagineum & neruulis donatum est, supernè acutius, & nonnihil ad volubilem accedentibus: cætera prorsum similia Lilio Conuallio dicto, antiquis nō memorata: transuersim radix gracilis geniculata excurrit.

Recentiorum. CALCEOLVS Maria, siue

{ Germa. Grawenschuh.
{ Belgis. Wouwen schoen, & papen schoen.

PRISCIS etiam præterita videtur illa floris larua perquàm spectabilis, etiam Plantagineis foliis, aut Bifolii, quam nonnulli Alisma opinati sunt, vulgus Septemtrionalium, *Wouwen schoen*, vel *papen schoen*, id est, Virginis calceum, vel Sacerdotis *Effigie. Dod. de flo: 77.* crepidam vocitat, à floris effigie, quæ quatuor constat foliolis dilutè purpurantibus, & rubentibus, sui è medio prominentibus vtriculum quendam purpureum, intus vacuum, rotundum Fuci, aut Asylonis cadauer, vel Vnedonis caliculos florum nonnihil referens, sed supernè, aut latere vno patulum, instar crepidæ oræ patulæ, quâ inseritur pes; foliis Plantaginis, aut Alismatis in longitudinem venosis; radice transuersa, nec altè depacta, nec multū fibrosa. In Heluetia & Oenoponti finitimis Alpinis opacis, habuimus,

ἀγροϋλας P L A N T A G O latifolia leuis.

{ Germa. Wegerich. { Ital. Plantagine.
{ Gallis. Plantain. { An. Plantayne.

L. iiii.

V. 2.

VERUM Ophioglosson, Cynoglosson, sic Arnoglosson, quasi Agninam tu dicas ligum, vocarunt Plantaginem Græci: ab omni memoria peruagata notionis, ex utilitate & feracitate vbiuis gentium penè immensa, cuius varietates & nomenclaturas, foliorum magnitudo, & modus, diuersas constituit.

MAIOR LATIFOLIA.

QUAE namque latifolia maiore Plantago, nulli negata regioni rotundioribus est foliis, & sui medio plenioribus, latioribus, humi accumbentibus, e radice lateratim fibrosa, candida, & in medio præcisa, siue mutilata; Morfus Diaboli fermè modo: floribus spicatis, caudicellas murium imitantibus, obscure purpureis & pullis: Semine Portulacæ pusillo, fusco, aut rubigineo.

PLANTAGO Incana.

CVI verò folia incana superficie pubent, rigidiora, crassiora, inque ambitum humi nervulis magis extantibus refracta: radix crassior, longior, minusque fibrata, rectioribus, altioribus cauliculis, floribus breuioribus, sed magis sparsis & speciosis, albidis caudatis, Iunio & Iulio defluentibus.

PLANTAGO Rosea.

QUAE DAM autem voluptatis ergò in hortis Belgicis, & Anglis colitur, merita quæ postertati scripto, & icone innotescat: Ei omnia Plantagini maioris similia, præterquam cauliculus summus, elegantis ambitu, multis foliolis sibi æqua serie mutuo incumbentibus, atque sensim in fastigium cœuntibus, vbi quasi imbricatim, squammatimue sese decussantia folia, umbellam elegantem, quasi florem constituunt herhidum, uti in quadam specie Primulæ Veris ferme cernere est. Semen è medijs foliorum interstitiis exilit, sed priori simile.



PLANTAGO Quinque Nervia, Lanceola,

{ Germa. Spitziger wegrich.
{ Belg. Montribben.

{ An. Ribbe Wortte.

Fusch, ico. 23.

QUINQUE NERVIA siue πεντάνευρον vocarunt hanc, cuius folia nervuli quinque percurrunt, nonnullis raris per ambitum denticulis, angustiora, rigidiora reductiora, utrinque lateribus & mucronata, unde Lanceolam vocant Barbari. Radix, rotundior, breuior, pluribus capillamentis depacta, emittit iunceos angulosos cauliculos, floribus albidis stipatos, in glomerosis & breuioribus spicis. Siccior est hæc, & commendatiore dote ad vulnerarias potiones, vnguenta, & hernias: nec minus ubique obuia cæteris.

PLANTAGO Marina.

Dodo, 7con. 70.

ALIA M Plantaginem putant, Marinam quandam herbulam, foliis crebribus angustis, exilibus, Porraceis, tum colore, tum consistentia; Et si sæpe littoreis Norbonæ, & Angliæ visa & animadversa, nullidum certò quænam sit asseuerare licet; nulli tamè similior umbellis, quam Plantagini, aut Coronopo.

POTAMOGETON, siue Fontalis, & spicata.

σαχβιτης. Gal. Ephy deane.

NON

NON solum fluuiorum est hæc vicina, vt eius nomenclatura sonat, sed etiam alumna stagnantium lacustrium & torpentium aquarum, aut segnius labentium, earum superficie strata, quasi humo viseretur, folijs Plantaginis aquaticæ, aut Betæ minoribus, aut Perficariæ, dæriusculis, neruosis, in pediculis à multis flexilibus geniculatis cauliculis caducis, quibus spicati insunt flores Bistortæ, aut Perficariæ similes, obsoleta purpura Iunio & Iulio. Radice flexuoso anfractu excurrit è geniculis, multas propagans fibras, trans aquam fundo immerfas, è quo alimentum fugit, vt in Malabatro statim dicitur: gustu astringente siccante.

Nostrate FOLIVM, MALABATRV M est.

NIHIL lubet aut licet asserere de Malabatro antiquorum, quando ex eorum monumentis, Dioscorides prodidit sine radice innatare paludibus: cum tamen nullo vspiam angulo totius Indiæ illius, quæ nostræ ætati multo notior est, quam illis fuerit sua Græcia, comparuit hætenus istud folium, quod nec expressit satis Dioscorides: vnde gemina hæsitandi occasio, primum notumne habuerit: deinde quæ possit fieri, vllum vt sit folium non modo sine caulis adminiculo, sed etiam sine radice, id est, sine ore: & tamen solitum sit filo trajici, quia odorum, magnum, crassum, & humentis naturæ: id eo solitum filo transui ad siccandum. Quare satius sit de illo fateri nos nescire quam de Priscis minus bene sentire, aut à nuperis parum gratiæ inire. Illi namq; adeo laxa notione rem signarunt, vt quid capias, nescias: & hi dum vt cumulo fidem faciant, authoritates acervant, plus porro quærendum relinquunt, nosq; inopes inter ignotas opes deferunt. Nam quid obstat quò minus vnū sit è tam multis, præsertim quatuor nobilioribus, illud Malabattrum imitantibus. Quod sit quidem verum, sed eius ortus & natales aliquantum deprauatè tradatur, vt in Ægarico videre est. Quare id sanè fuerit istud nostrate Malabattrum, iamdiu Arabibus cognitum & hodie Italis medicis vsu receptum, non modo quia in Malabar Indiæ regione cognomine oritur, sed etiam quod propter eximias vires, plus proportionis habet cum plantis aquaticis, quam illa folia Cinnamomi, aut Caryophylli, quibus folium laurinum ferme est. At illud folium crassiusculum cuiusmodi Nymphetæ est: fibre verò secundum dorfi longitudinem ductæ, cuiusmodi Potamogetoni, qui propter figuræ & natalitium similitudinem, nonnullis ineptè folium putabatur: Nobis secus, cum huius folia apud Anguillaram & alios harum rerum consultissimos, non multis abhinc annis vidissemus, quibus adhuc hærebant lignej pedicelli: & quasi surculi è ramis effracti (quin potius integros ramos meminimus). Cinnamomi autè folio & Caryophyllis facies ferme eadè, nitidus læuor, aromaticus, suauissimq; odor. Temperamentum, crasis, modus & vsus non ita disparia sunt, & halitum commendant omnia vt Dioscorides Malabatro attribuit, de quibus commodius alibi. Obijcient literatores nobis Dioscoridis verba. FOLIVM AQVIS INNATANS SINE RADICE. An vllum folium, aut oriri, aut viuere sine radice, id est, sine ore, queat, quilibet nouit: nam Lenticula, Semperuinum, & etiam Muha, seu Opontia, aut radicem habent, aut quippiam radice loco. Quin & Lenticulæ plantarum minimæ, nec radicellæ suæ defunt, & illis subsunt quædam terræ sordes & quisquilæ, quibus aluntur & fulciuntur.

γεντιανή GENTIANA maior.

{ Germ. Gentiam, Bitter Wrtz.
Belgis & } Gentiane & Felworte.
Ang.
Gall. Gentiane.
Ita. Gentiana.

VSUS & celebritatis notissimæ à Gentio rege Gentiana Illyrica, Helleboro albo folijs & natalibus adeo proxima, vt minus exercitatu minus eludat: vti nos admodum inuenes qui defessi & potaturi, cum in poculum vino plenum radicem Gentianæ quam

Dod. 223.

Fusc. ico. 111.

ad

ad lassitudinem discutiendam, & appetitum excitandum commendare audissemus. Huius loco Hellebori radicem similitudine foliorum hallucinati immisimus, at penè perijimus. Putredinis hæc hostis infestissima, & veneni mors: Pesti adeò remedium præsens, vt non modo homini, sed etiam brutis incolumitatè tueatur: & amissam instauret, eòq; solita Heluetia plebs istam cum flâmula porcis, & olim Monachis propinare, ne anima in viuo cadauere puteret.

Non nisi in montosis querenda sponte exiens Gentiana, quæ aliòqui repertu facilis: & frequens, planè fronde & aspectu ante quàm floreat, similis Plantaginis, viridâtia, aut rubetia folia, venosis striatum plicis extantibus, è radice crassa pedem longa, intus flaua, sapore perquam amaro: caulem cubitalem, quem summo ornant flores, verticillati, lutei, oblongis Saponarie caliculis, Leucoij femine rufius, exilius, nec medulosum.

Gentiana MINOR, CRUCIATA, recentiorum.

{ Ger. Modelgeer & Speeren such.
{ Bel. Madelgeer.

Dod. 224.

HANC DOCTI non pauci Gentianæ speciem faciunt, facie & facultatibus ducti. Locis tamen non ita arduis, ac Gentiana, multa & passim oritur, vti propè Basileam, & Maconium Burgundiæ Gallicæ, depressis collibus inter Chamædrin exuberans. Huius tamen non flores lutei, sed cærulei diluti, radix verò secundum longitudinem tripartitò aut quadripartitò fissa, vnde cruciatam putant, sed folijs potius crutiatim cauli incumbenibus, nominis etymon debetur.

PNEVMONANTE Cordi. Gentiana minoris species.

Ger. Lungeublume.

Cordus. 162.

CRUCIATÆ similis aut eadem quæ in pratis etiam montosis oritur, folijs angustioribus, minorib. flore cæruleo Calathi modo, radice fibrosa, neutiquam incisa: à Mathiolo graphicè descripta. In Pedemontanis pratis propè Susani, & Riuoli multâ.

*GENTIANELLA CAMPANULÆ FLORE
purpureo, Heluetia.*

DVAS verò hîc exhibemus, quia nondum descriptæ tamen elegantes sūt. Altera est radice exigua flauescen te fibrosa, foliola conferta numerosa, imò caulé ambiūt circinatin folijs Oleæ, aut Plâtiginis similia, minimæ Gentianæ colore & modo. Cauliculo vix palmum alto, folijs fermè exuto, nisi proximè florem: vbi minuta bina ternæue visuntur. Purpurascit calathus figura & magnitudine, & colore Violæ Marianæ, valdè quam amara. In Patauinis collibus & decliuibus, vbi viperæ capi solitæ sunt etiamq; in Heluetia.



GENTIANA minima.

MINIMA quæ omnium speciosissima in montibus arduis fruticat, Centaurij minoris modo, quem vtcumq; refert, plurima in celsis verticibus montium qui Dannubio in Sep-

Septentrionem, Orientalem, & Atheſi rapido in Italiam præcipitante originem dant; prope lacustres voragineſ, & montem Nicolai, puſilla tota, palmo præcerior, foliolis, & radice Centaurei minoris, multò minoribus, & modo, ex internodiis geminatim oriuntur: & cauliculos exiles ſtipant; partim ab imo, partimque medio exortos, quorum ſummis caliculus foliaceus Caryophyllæ forma, & floſculus cæruleus, cæleſti atque incomparabili purpura. Amariſſima & hæc, vulneribus commendata, & idcirco conſenſu curſorū Gentianella dicta, nobis alióqui Centaureo minori, aut eadem, aut æmula.



Ἥλεβορος λευκός. *HELLEBORVM ALBVM*, ſive *Veratrum*.

{	<i>Germa.</i> Weiß; Weißwurz.	{	<i>Hiſp.</i> Yerua de baleſte.
	<i>Gallis.</i> Helleboire blanc.		
	<i>Ital.</i> Helleboro bianco.		
	<i>Belg.</i> wit ſielſcruyt.		

VD A MONTIVM Alpiumque iuga, huius ſunt ſcæraſſima, præſertim quæ frigidiffima, celfa, & præteſſa, quibus Gætiana maior gaudet; vti alibi Hellebori ſtipatu & cōuictu, cui adeo ſimilis folia eminus intuēti, vt non rarò oculis illudat: præſertim cum æſtate cætero proſum gramine arefacto, vel manſo, vtrique pecus præ amarore (puta) parcat. Radix quamplurimis ſparſa humi fibris, quæ ſuperne medio quaſi trunco, vel nodulo collectæ ſunt, non abſimiles Plantaginis, ſed maiores, cui etiam folia multum accedunt; tametſi maiora, rigidiora, ſtriatisque ſecundum longitudinem liris acutioribus, & media cœſia eunte linea, mutuò implexu, quaſi tunicæ conuoluta, humi ſtrata, partimque amplexa caulem concavum, glabrum ſucculentum bipedale, è cuius medio, ſummo tenuis, alternis pediculis ſurrecti florū thyrfi hapsiue, Botrys modo, racemoſis floribus ornati, colore albicante viſuntur. Quibuſdam in hortis Belgicis videre eſt, floribus purpureis: Maximi atque certiſſimi vſus, herba vniuerſæ Europæ ſatis nota, vulgo *Veraire*.

EPIPACTIS, ſive *HELLEBORINE*.

NO n inde quia ſimilis foret Helleboro videtur Epipactis dicta Helleborine, ſed propterea quod Helleboris miſceretur, & iſdem locis naſceretur, forètq; quaſi frenum impræſſioni vehementiſſimæ pharmaci Helleborati: eòq; Dioſcorides ad venenata cōmendat, iecorūque amicam ait: nèq; vtri Helleboro ſimilem fecerit conſtat, imo ne fe-ciſſe quidem, non magis quam de neutra Sefamoide. Eapropter quid hîc Commentator harioletur, qui volet videat, & rideat. Eius nos commentitiâ Helleborinē, quam è Tragio mutuatus fuit, nec talem eſſe docuit, commodiori loco ponemus.

Nec alia de re Helleborinæ vocata fuit, quàm quod illius ſemine Hellebori albo addito vomitus cōmodius cieretur, vti de verbis Theophraſti liquet Libr. 9 Capit vndecimo, vbi Helleborinem iſtius commodi vocat herbulam, vnde nonnulli noſtratē Herniariā autumabant. Semen cuius, ſuccus, & folia, hepatis obſtructioni & renum lapillis, magna dote pollet: quin ſi quid huc facit, minus comperta qualitate ſternutamenta ciet foliorum pollen. Quod fieri potuit, vt mixto cum Helleboro fuerit ſtimuli vice ad facultatē proritandam: quemadmodum proditum eſt, antiquos ſolitòs miſcere ſalem & acetum, quo celerius exigeretur Helleborus.

*Herniaria. Miſ-
legrana Cento-
grana.*

EPI-

EPIPACTIS, Duplex Recentiorum, siue HELLEBORINE.

AT Recentiores nominis sono illecti, putarunt herbulam Helleboro facie similem interpretandum, eoque duplicem vtrique nimirum albo, & nigro Helleboro suam affixerunt: qui si quam præcipientes ad asserendum, tam seduli ad inuestigandum fuissent, habuissent ex Theophrast. quò se ab errore vindicassent: Is quippe Lib 9. Cap. 11. huius semen Helleborifinis propotifinisque addi solitum ait, quasi calcar futurum vomitorio medicamento, vocatque herbulam *βοτάνιον*, quare vti dudum monuimus: Helleborine quasi veratrulū, nō perinde vt Cardamine à Cardamo simili, dicta fuit, sed Epithymū, & Sefamoidem, non propter similitudinem, sed propter vsum, Helleborum vocitarunt prisci. Et Senensis arbiter, decernit nobis Epipactidē pictam, nec descriptam; vt solet innumeris locis, vtpote aliunde mutuatus, nec stirpem conspicatus: at sicubi fuerit nactus brasicas aut vrticas describendas, vel alienas inuaserit deliniationes, enecat verbis, aut Crambe recocta. Sed rariores, & cognitu digniores, pictori mandat; & illico elogio illo centies inculcato addit, *Est similis prorsus nullis reclamantibus notis*: subditq; non ad nostram cognitionem, sed ad sui ostentationem, non quidem se scire num Helleborine sit; sed tamen Epipactida esse: ridiculū perinde ac si dicat quis, incertum esse num sit Helleborum, sed tamen certum esse Veratrum. Quin etsi quis largiatur illud, nimirum propter similitudinem superius collatā, Dios. intellectum fuisse Helleborum, quis diuinabit? cum nē nunc qui dem vti docuimus, Hellebori nigri vsquequaque descriptio congruat. Verum nos quo consulamus cognitionis audis vtrāmq; recentiorum subdemus, albo affinē hic, alteram commodius nigro Helleboro inferius.

HELLEBORINE siue EPIPACTIS,


Recentiorum & Belgarum.

Germa. & Belgis, wilder wit præsecruit.

Dod, Hist 235. MV L I o propius saltem facie ad album Helleborum accedit, quæ Gallia, Belgiaque locis, nemorosis, vmbrosis, prouenit: caulē rectum, pedalem, inuolutū Arnoglosi, vel albi Hellebori foliis angustioribus, floribus summū conuestientibus, albidis, vel purpura obsoleta, medio pertusis, notisque partim luteis, partimq; coccineis distinctis, cuiusmodi in Digitali interiore, quā etiam repræsentat. In filiquis semen pusillum Digitalis: Radice quā Hellebori albi fibris paucioribus, variē vagantibus, nigricantibus, duro libro, & amaro.

NARDVS CELTICA, Saliunca.

IT I D E M montosis iisdem fermē Gaudet Celtica, aut potius hodie nuncupanda Lygustica Nardus, nec Gentianellis admodum abfimilis folii aromaticitate, ipsōque habitu, quam S E L I G A, vallesii vernaculē quasi Saliuncam dicunt: nec dubium quin sit ea, quam Maronis versus innuunt: *Puniceis humilis quantum Saliunca rosetis, Iudicio nostro, tantum tibi cedit Amyntas*. Pusilla namque herbula, aliquantum proserpens, deinde se surrigens, cauliculo palmum & sesquipalmum alto, ad quem immum folia cespites summos constant, exigua tenuia Gnaphalii montani, aut Gentianellæ minimæ, pallida & sublutea, infernē angusta, quā radicis ceruicis squarosa, aut squamulis tuniceis obsita, spicatim digesta innituntur; subtérque multæ fibræ, fusæ, villosæque propagines Afari odore, & modo in terram sparguntur: acri, amaricante, aromatico Spicam Nardi spirante: in Genuensibus, Lyguriæque Alpiniis sterilibus, non procul Saona vrbe, vnde Genuam, lucellæ causa ferunt Coloni.



CEL-

MVLTO elegantior, nec parum similior Gentianæ Cruciatæ folijs, alia nobis reperta est prope Cœnobium quoddam, inter Dei viridarium & Calcaris mōtes, in agro Narbonensi, magni & vulgati nominis. Radice est Valerianæ maioris, paulò minore, geniculis Doronici modo distincta, humi strata, acri sapore, erodente, aromatico & amaro, Nardi æmulo, folijs Saponariæ vulgaris flaccidis, ex flauo pallescentibus, senis, septennissue, Gentianellæ adeò cognatis, vt primo intuitu eandem putes. Caulis eum maxime cubitum altus, mediocri sesquipalium : flore radiato, aureo, Bupthalmi æmulo. Hanc Rondelletius Nardi Gallicæ speciem esse coniectabat: tunc temporis cum Cœnobium fortè esset nobis hospitium in illis desertis locis, cuidam è lignipedum Canonicorum dyssuria laboranti, & nostram opem obnixè poscenti, potiunculam ex huius Mei; radicibus decocto parandam iussimus, vrinæq; copiam eliciamus.



HIRCVLVS.

RARIOR multò Hirculus, quem nunquam nobis recens visum fatemur, & lubenter assentimur, gratiamq; habemus de illius assertione, stirpiū exoticarum peritissimo, Carolo Clusio, qui hunc nactus inter Spicæ Celticæ fasciculos, posteritati scitè patefecit, in suis è Garcia Lusitano Medico versionibus.

SAPONARIA vulg. folijs Plantagineis, aut Gentianæ, floribus Ocimoidis non est STRUTHIUM DIOSC. SIVE ARAB. CONDISI, de quo in Hippophaë, & Hippo:

QUAMVIS permultæ plantæ etiānum Struthia vocari queant, à facultate vsq; Lanæ proluendæ, & candidæ faciendæ, quod *σπῆρδα* Græci dicebant: tamen nostram Saponariam non esse Antiquorum Struthium Theophrasti verba monent: esse quippe esculentum caulem, lanuginosum, & ferulaceum, nasci vbiq; Asiæ præsertim, spontè & cultam, saxosis & asperis, spinosam folio Oleæ inodorā, semine nullo: radice magna, quæ conditur ad proluendas, curandas, & emaculandas lanas: Deinde quia nunquā inoleuit, aut certè iādū exoleuit cōsuetudō apud nostrates fullones, lanas radice aut succo herbarum curandi, nescitur iam quodnam illud fuerit *σπῆρδα*. Et sedula plebecula lotorū apud Belgas hodie, non herbis aut succis, sed Sapone, Lanæ primū carminatæ, Oleoq; aut Butyro delibutæ, candorem niueum, & sericeam molliem conciliat. Nonnulli coniectant hodie Ocimoidem illam, quam Papauer spumeum etiam dicunt, quia sit folijs Oleæ, esse Struthium: verū abest à facultatibus, & plurimū discrepat reliquis indicijs. Hæc verò vulgi Saponaria, quasi quis dicat lotricem, aut purgatricem, tametsi nitrosum extergentem pressu remittat succum, emundandis pannis aptum, tamen non in asperis aut squalidis, sed secus herbidas amnium conualles, & depressos apricorum vidorum margines fruticat: multis virgis crebrò geniculatis, teretibus, gracilibus, cubitum, sesquicubitum surrectis, multis binis è geniculis stipantibus, folijsq; venosis, crassis, pinguibus, Gentianæ cruciatæ dictæ, aut Plâtiginis, horum reflexis, speciosis florum oblongis caliculis Lychnidis, aut floris Constantinopolitanj obsoletè purpurantibus, & albidis staminulis egressis inter quina florum foliola: radicibus multum diuisis, & sparsis, diu durantibus, quando in hortis colitur Regionum Septentrionalium, vbi non perinde spontè obuia fit. Non igitur sit Arabum Condisi, si non sit Græcorum Struthium: quia hæc duo nomina, eandem designant plantam.

Dod. sce.

PEREGRINA voce Piperis cum vernacula apud Græcos ὑδροπiper, conflatum nomen Hydropiperi fuit, seu tu dicas aquarum Piper: prouenit etenim ubiq; scrobibus aquæ stillantibus in herbis vdis, caulibus innumeris, inq; ramulos diuisis, Persici fronde nigricante ex virore: è geniculis sinuq; foliorum & alarum flores Iunio, & Augusto permulti, albi & purpurascetes, caudatis spicis, racemosis Bistortæ, aut Potamogetonis, radicibus plurimum fibrosis: semen subnigricans, latiusculum, minutum acre Sinapi, aut Piperis sapore, ubiq; notissimū: Gallis *Culraige* vocatū, vt cuius folia quæ quis podici (honoris sit auribus) abstergeri causa affricuerit, inurât rabiem clunibus, siue vt loquuntur Legulei, culo. Vnam hanc Parascelus ille ter maximus, per aquam frigidam traiectam, quibuslibet vlcerum lincinationibus, & laniationibus remedio summo cælitus parato fore affirmat: Cui cum fidem habuisset nuper quidā amicus, dicebat illum Apollonij Thianæi apud Philostratum φιλομύθηον, aut potius φιλομύθηον furatum fuisse.

PERSICARIA mitis.

Dod. sce. de
flor. 269.

ALTERA Dioscoridi, vt verisimile sit præterita, tantopere huic effigie, loco habitūq; toto cōuenit, vt neutra ab altera queas discernere, nisi sapore: qui planè facit, vt diuerse sint, nec eadem planè putentur: est namq; is frigidus, siccus, & nonnihil acidus: in folij superficie media nonnullæ maculæ conspiciuntur nigræ.

CAPSICVM καψιον Actuarij, siue Caninum Zingiber
Auienna, Calecutium Recentiorib.Effi. Dod. 441.
C 442.

COEPIT nostra memoria ista perpulchra planta adferri ex Goa, & Calecutijs oris in Europam, vbi Piperis vicem explet, & voluptati in hortis, pensilibusq; vasis apud Gallos, & Germanos est spectatori triplicis differentia, non tamen admodū magni discriminis, nisi fructu. Est enim caule quadrangulo, pedali, sesquipedali, fusco, sparso, folia in pedicellis habente Solani, aut Persicariae, aut Amomi Pliniani: nigrioribus, acutioribus, floribus cædidis, pusillis, Solani, vel Vincæ Peruinæ, exiguis foliolis, quorum cætrum tenet, asteriscus, herbis, exiguus: deinde siliqua succrescit nitido virore & lauore, per maturitatem rubidæ & miniatæ, purpureæ, oblonga, mucronata, crassiora, coriacea, cui insunt multa granula lata, compressa, ex luteo pallida: inscula, & condimenta colore croceo, & gustu Pipereo commendat.

Varietas. { Vaginulis non disparibus siliquosis, sed minus crassis, longioribus acutioribusq; rostris, eandem planè, tamen iisdem in vasis alunt hanc.
Interdum & multò breuioribus, rotundis, turbinatis, eodem semine prægnantes, Augusto & Septembri maturat siliquas.

BALSAMINA femina, Persicifolia.

ASCIVIT hæc peregrina vulneraria credita, eandem quam Balsamine Cucumerina nomenclationem, propter easdem facultates, & fructum nonnihil similem. Alioquin stipites crassi, turgentisq; succo, Mercurialis habitiores sūt, folia & facies admodum Persicariam vtrāvis referunt, quare etiam hanc Persicariam nonnulli dicunt: tametsi non minus propter vires consimiles & vulnerarias, quales in Persicaria recetiores agnouerūt, dicta putari possit. Flores subter folia per intervalla penduli, purpurei, diluti, incarulum vergētis, Delphinij Cōsolidæ effigie caudatæ, vel Noli me tægere vocatæ, quæ etiam multum huic similis: pusilli fructus penduli, etiā sunt Augusto nuclei Pruni vtrinq; acuminati

STIRPVM aduersaria noua.

135

nati similitudine, primū viridante, deinde luteolo, & foris scabro dehiscēte, per maturitatem se men eruū, aut Rapi elidente vix digitis summis tacto, ritu Noli me tangere herbæ.

PERSICARIA Silicosa, sive Noli me tangere.

INDIGENA hæc montium colliumque asperiorū Germaniæ, & Galliæ Sabaudæ, quam Belgæ alunt frequens, vocantque vt Germani *Sprincftraut*, quasi erupticem siue salientē, aut subsilientē herbam, propter filiquā, quæ teres, gracilis, longa, pédula Chelidonij, semina parua, rotūda, Balsaminæ femine claudit, quibus turget, simul ac tantillum tangitur in vultū proximi cuiusq; quasi impetu vindicabūda, & se tangi queribūda excludit. Idcirco *Nolime tangere*, vulgus herbariorū vocat, qua nota & nomine notissima iamdiu. Folia, faciēsque & virgulta Balsaminæ, Mercurialē, & Amaranthū exprimūt: quare cauendū ne quis Mercurialē putet, eamque in vsus eosdē legat, vt nonnulli hallucinati fecerunt: quippe venenatam quidam autumant, præstareque exploratis, quam incerta hac vtī monēt. Tametsi alios ad effectus meritō laudent.



RAPHANVS Syl: Officinis Francis, & Belgis.

LEPIDIVM Egineta, folijs quàm Lauri maioribus, floribus, racemosis Galy albi.

{ *Lepidium Peperitis. Gal. Passerage,*
Ang. Dittammer.
Germ. Pfefferkraut.
Belg. Depercruyt.

QUAM potuimus aptè ab altero Pauli ex Dioscoride Lepidio minore, siue Cardamantice discreuimus istud pagina 77. ostendimusque multò vrentius esse, & efficacius illo Democratis carminibus celebri. Perquam notum est istud regionibus calidis, & frigidis, vt Norbonæ, Belgio, & Angliæ, ad decliua riparum fruticare solitum, plebeculæque Raphanus syl. & *Passerage* vocatum, id est, extrema rabies, propter feruorem igneum, qui etiam testatur hanc legitimū Lepidiū: folijs namq; Laurinis, latioribus tantillum crenatis, ex pallido virentibus, Hyoscyami quadatenus lutei, aut Costi hortēsis, in flexilibus, ramosis virgis, cubitum & sesquicubitum altis: flores albos muscosos, Iunio & Iulio edentibus, semēneque pusillum: pèrreptat subter humū radix, & quotannis noua pullulatione se reparat, ad ischiadicum dolorem efficacissima tusa, & axungia excepta.

Effigi. Mathco. 609.

Crassaradice, RAPHANVS RVSTICANVS, Lapathii folio, videtur MOLYBDEN A Plinij.

Sinapi Persicum. Germa. Meerrettich & Kern.

POTEST HYDROPIPER dici etiam hæc, aquaticis, & substillis pratenibus fruticans, quam multi Lepidium Pauli, & Plinii dixerunt: vt cui sint folia latoria, circinata, serrata, longioraque Laurinis, & rigidiora, viciniora tamen

M. ij.

Hip-

Hippolatho, à radice crassa longa, acrique tusa vescendo in condimentis Sinapi sapore. Floribus albidis, Sinapi aut Brassicæ minoribus, in ramulis, secundū quos hærent filiquulæ Erisimi, aut Rhaphani, cum quo similitudinem quandam habet, eoque vocatus fuit Raphanus rusticanus à Plebecula.

DENTARIA, vel Dentillaria RONDELLETII, & Norbonensium, ÆGINETÆ LEPIDIVM itidem putatum.

NEc abs re Lepidium quoppia fecerunt perelegantem istam plantam, Norbonenses præceptores nostri. Fruticat ea passim in Romano, & Mòspelliaco agro prope sèpes & fata, radice lógiuscula, caule bicubitali, turionibus multifida, folia ima maioria caulis Isatidis, Drabæue ritu incumbencia, pusillæ violæ modo. Floribus purpureis, dilutis, extremo caulis ambitui confertim aggestis, quibus defluentibus, semina gemmeis, & vilosis hirsutis, & aliquā tum tenacibus pericarpis includuntur nigra, acri vniuersa planta gustu, & vrentis facultatis, qua tantò pere pollet, vt etiam volè manui vibicem callumue inurat furum, aut plumbeum, vnde viros Doctos in opinionē duxit Molibdenā esse Plinij, aut Lepidium Æginetæ. Dentillariam, aut potius Dètariam vulgus studiosorum putabat vocatā à Rondelletio, qui vt Pyrethris, aut similibus vrentibus utebatur, ad rabidum dentium cruciatum placandum; etiāmq; in Balneis filius Regis Sapor.



HORTORVM Costus Cassiani Bassi, Mentha folio, aut Lepidij.

{ Germ. Grauwentkraut id est, Herba D. Mariæ.
Gal. Coq.
Belgi. Balsème, id est, Balsamum.

Offic. Mentha Græca, & Sarracenica.

Dodo. 175.

SCIMVS, & hanc quòd feruido esset Costi, aut Lepidii gustu, à nonnullis Recetiorum Lepidium putatam, quam Mentham Græcam Pharmacopœi, & Sarracenicam quidam è libro περί σωμάτων dicunt vtrique non absque plausibili coniectura: Est enim foliis Lauri, sed interdum maioribus, ferratis, viridibus, pallentibus, molliusculis, radice fibrosa, inflexa, & summo cespite sparsa, caule cubitali, floribus luteis Tanacetis: horis familiaris, & nota conspicua amaritudine, feruoretamen non superioribus inferior. Vulnerariam cursores Chirurgi, & mulierculæ citissimæ opis experimuntur: eoque Baume apud Gallos, id est, Balsamum vocitant.

BVLBOSA foliata, Officinarum, BOLBANAC, LVNARIA
Græca Recentiorum, non est ARMORACIA, sive syl. RAPHANVS
Dioscori. aut THLASPI lati-folium Cratœna:
vt è pagina 75. liquet.

CV in hac in Alpinis, Galloprovinciæ conterminisq; Pedemontij oriatur, apud Flan- Dod. de flor. 26.
 dros verò Francos & Anglos tantum hortis colatur, rectius videntur Bolbanac dixisse Barbari, à radicibus bulbosis, esculētis, oblongis, crassis, longius porrectis, porosis quod dantenus Asphodeli, aut Pœoniæ, sed minus protuberantibus, quam Græcam Lunariam, aut Violam latifoliam nuperi quidam. Erutam enim è montibus Alpinis Galloprovinciæ & Pedemontij conterminis scimus, & in eadem fortè colitur in Flandria, Francia, & Anglia, radicibus exilioribus, flaccidioribus minuscq; protuberantibus, sed similibus & sparsis Asphodeli Lutei, aut Leucacanthæ Monspelliacæ, albidis prorsus carnosiss, caules teretes, ramis multis donatos, foliaq; pauca prominentibus, oblonga, latiora multò quàm Violæ Matronalis, virètia, in ambitu parum crenata, floribus, primo Vere, Dentillariæ aut Violæ alba purpureis, & subcæreuleis, post quæ orbis siliquosi, aut foliacei oriuntur, ex triplici quasi membranula còpacti, pellucidi, semina quaterna aut quina complexi, media nempe dissepiente, candida cuticula sericea ipsa Lentis effigie semina, non secus atq; in Alyso cernitur, vnde **PENNINCK** Brabantii, id est, nummi florem vocant, & quidam Lunariam. Calido, acrisq; gustu est, præsertim semine, sed tamen radices acetarijs, vt Rapuntia, manduntur, nec perinde sunt acres, vt Crateuæ Thlaspi radices traduntur.

Varietas. Non diu est cum aliam vidimus siccam, huic non ita diuersam, duntaxat tota minor est, & Hyeme perennis viret, durioribus caulibus, breuioribus, floribus dilutioribus, folijs aliquot non disparibus, radice rediuiua.

MATRONALIS Viola, aut Damascena.

Bel. Damas blommen & winter violen, id est, Hyberna viola.

Gal. Violes de Damas & Giroffles des Dames, id est, Matronalis viola.

NEc consultius faciunt, qui istam similem illis plantam, Marinam violam, Damascenam, & exoticam vocitant, cum in Nitiobrigum montosis & Veganijs syluosis, etiamq; Angliæ in pratis fruticet, vnde horti habuerunt: è radice fibrosa, densa, ampla folijs est Drabæ, aut Erucæ, minus laciniosis, nigris, crebribus, ab imo caules rectos, cubitales & sesquicubitales ambientibus Aprilij, Maio, & Iunio, florum caliculos multos ex cædido purpureos, & rubellos edētibus Saponariæ aut Dentariæ: corniculi siliquarum Synapi sunt, vbi semen acre, fuscum, aut rufescens, & Erucam, Thlaspi, aut Rapuntium gustu tota sapit, quibus idcirco affinis naturâ putatur. Dod. de flor. 24.

MEDIUM, an sit MARIANA VIOLA?

MINVS mirum etiâ nunc Medium esse nullius aut ambiguae lectionis, cū codices & Effig. Hist. 129.
 autores fuerint valde variæ lectionis. Qui namq; cū vulgatis Dioscoridis codicibus, & Plinianis, Iridis folia legebant, superioribus illam maritimam Iridem, cuius vt nouæ mentionem in Meo fecimus, & iconem, plenamq; descriptionem in Iride dedimus, statuebant: inter quos præceptor, & D. Aflatius, Callotus, atq; Dioscorides Barallius Monspellienses. Sed nonnullæ notæ magnitudinis & figuræ, potius quam virium, refragari visæ sunt. At candidissimus Gesnerus, & deinde Italorum doctissimi nonnulli, qui alijs in codicibus, & hos secutis Græcis authoribus Seridis folia haberent, iam plusquam octenium abhinc monebant nos, Violam MARIANAM dictam, vulgatissimam plantam, quam tamen postremo sibi notam seruitor Commētator Cortusij optimi munere gratulatur, Medium, vt si quæ alia planta referre, quorum lectioni & sententiæ nos eo libentius assentiebamur, quia Iridis syluestris nullius meminerit Dioscorides, nec syluestris folia à fatiua, nisi magnitudine diuersa sint, nonnulliq; Theophrastum negasse vllâ Syluestre Iridem extare Matthiolum scribât. Seridis verò Syluestris metipse atq; Dioscorides meminerint. Violæ autè Marianæ, & Mariæ dictæ à Belgis (qui muneri elegantiae florum causa, primi dederunt Mariæ Hungariæ viragini illi Heroinæ bellicis fascinatoribus, & incendijs nobilitatæ) nostra etiam memoria, cultu hortensi florum calathis longè speciosissimis tantâ magnitudinem

M. iij.

nitundinem

nitudinē assequuntur, vt instar calycis aut poculi poturis voluptatis causa, vinū contineant. Sunt namq; nolæ oblongæ effigie, nonnullis laciniosis crenis, cærule hilari interdū purpureascente, interdū dilutiores, & candidiores, emergentibus ab imo calyce, quibus reflexis, aut elapsis in vtriculi, & florū basi Rapūtio, aut Trachelio assimili clauduntur; triquetra numerosa semina Acetosæ, colore, & paritate. Bicubitales caules toti, & alæ hirsutæ, & hirtæ ab imo folia habent longiora, latiora, tunicis hirsuta, rigida minus quā Licopis, aut Pulmonaria vulgaris Intibj seu Seridi domesticæ potius quā Syluestris, quæ laciniosa est. Radix autem candida, tenera, esculenta palmum longa Rapūtij similitudine, vt semen & flores sed duplo maior, nec gustu multum dispari: siquidem in acetarijs Rapuntij modo esitauimus verna quadragesima Belgicæ præsertim, & Couentriæ Angliæ, vbi etiam in Syluosis quæ plurimis enata, sed minor & strigosior, eò postea incrementi progreditur, cultu in hortis passim, vt longè maior adultior, suauiorq; edendo sit, Calidioribus Italiæ, & Galliæ inferiori infrequens, magis figura ad Medium quam facultatibus alludit, siquidem dulcis acriuscula minime altringens percipitur.

Ἐπιμήδιον. EPIMEDIUM.

an Epipetron & Epimetron Plin?

ÆQUUM arduum statuere Epimedium quænam sit Planta, & an hodiè nostro orbi Europæo cognita. Quippe perpaucae sunt plantæ caule donatæ, quin flores, aut quædam eorum rudimēta ædant, vt Filix, Ficus arbor, & alia nonnulla. Qua de nota si in hisce regionibus nasceretur, facillè cognosceretur Epimedium quod suspicamur, esse Epipetrum, vt Plinius legisse videtur Theophrasto memoratum libro 7. capite octauo (non vt vulgo legunt Epimetrum.) Siquidem saxis, & petris innasci affirmat Dioscorides. Cui si idem vsu venit hic atq; in Bechio, Dictamno, Onosmate, fortè & Cynoglossio, iam facillius accedemus peritiorū Herbariorum sententiæ, quam non semel super Epimedio (atq; de hac eleganti, & noua quā pictam damus planta) rogauimus. Antequam in fœnicetijs inter cremia enatam sponte, non procul Pistoia, in Florétina præfectura vidissemus, virentem dono acceperamus à Ioanne Pomello Veneto Pharmacopœo non vulgaris peritiæ, ad Buccentoris symbolum, qui in hortis colebat, & alicunde è proximis Vincentiæ, aut Patauij agris habuerat. Hac etiam nos donauit clarissimus Bononiensis Doctor, & professor medicus Cæsar Odonus. Viticulis est quasi iuncis, non crassis, sed nitidis, albidis, prolixioribus, tenellis cubiti, & sesquicubiti exilibus nutatibus, sparsis per summa singuli in ternos, quasi pediculos diuisis, in quibus summis quasi in alis multo tenerioribus ternis pedicellis, terna insunt folia, id est nouè, aut decem magnitudine, colore, leuore Hederaceo, sed teneriora, ad Theophrasti Libanotidè accedentia, auersa parte glauca vel albicantia, & extrema ora nonnullis denticellis spinosis serratim extantibus: radicem non vidimus, sed ab ipsdē auditione accepimus: iam tum defloruisse semenq; amisisse, viroso odore: & prolixis ambagibus radicem incuruari atq; in latera diffundi, subastringentis, & siccantis gustus esse: etiam nunc postremum dum literis mandaremus nobis gustantibus folia multum amara, gustu fermè Chamæleæ percipiebantur, per quam rara nec nobis vspiciam, præterquam in Italia visa.



Et vna cum fructu
Et u. florum spem
prodigere.

Epipetrum.

Τραχήλιον. TRACHELIVM, sine Cernicaria & Vularia.

{ Belg. & } Dalk kraut.
{ Ger. }

STIRP IV M aduersaria noua.

139

DVÆ sunt præterea quæ non parum folijs, & qualitatibus illas designant, veteribus *Effig. Dod. 127.*
indictæ, nostra memoria nuncupatæ Trachelium, Germanis, *Balztrauc*, siue Ceruicaria, à ceruicibus colliq; partibus vicinis, internis & externis, quibus tumefactis, & vlceratis multum opitulantur: vnde Vuularia ab vuula etiam dicitur. Maiori harum folia sunt quadantenus Bolbonac aut Vrtice, Hispida, rigida, latiora, ad Imum, supernè acuta & ambitu crenata, Vrtice habitu & superficie: floribus albidis, plurimum cæruleis Viola Mariana minoribus: radice alba tenera Rapunculij in acetarijs apta ieiunio Verno præsertim.

TRACHELIVM, minus.

MIMORI CERVICARIÆ, iidem natales squallidorum marginū, & Montium Prætorum Germaniæ, & Angliæ Occidua sunt: Caules breuiiores, folia item aspera Rapuntij aut Saluiæ, pilosa, flores densi pulcelli superioris sunt, Rapuntij sapore, primòq; vere acetarijs etiam adduntur. *Effig. Dod. 127.*

Varietas. Quandoq; in Maritimis, & cliuosis aridis quædam non absimilis, Ceruicariæ maioris folijs, leuiora minus rigida, aut ambitu dentata, in breuioribus cauliculis, quibus subsunt radices latius vagantes albidæ, Flores Iunio & Iulio, non pusillis purpuræ languidæ.

Nostrates *CAMPANVLÆ* dua hortenses, Persicifolia lacticinosa, flore volubilis, an *IASIONE* Theoph?

OB LONGA, angusta, & obscurè virentia folia, imum caulem cubitalem, atq; radicem stipantia sunt caules recti in longitudinem striati in quibus totis insunt florum calathi, vel nolæ Cæreulæ, albide, cæreuleis etiam vel albis explicantibus sese nonnullis staminibus, ambitu constantes & quasi vnico folio, sexangulo, idcirco putatur meritò Theophrasti Iasione: capitula insunt foraminulis peruia, quod imposuit Commentatori Senensi, qui idcirco illicò putauit, & sanxit esse Phyteuma. Horti voluptatis causa habet, tametsi in olera mandi queat. *Effig. Dod. 128.*

CAMPANVLA Minor.

EADEM sponte propè scrobes, & sepes prouenit: multò minor, caule breuiore: folia sunt ad imum strata, rotundiora, & volubilem viarum propius accidentia, flores purpurei, & radices exiliores.

RAPUNTIVM paruum, vulgo Pes Locustæ Auicennæ.

Gal. Responce petit.
Ger. Klein Rapuntzlein.
Bel. Cleen Rapoucellet.

QUEMADMODVM propter radices & vsus non valde dissimiles, antiqui Bunium, *Dod. 412.*
id est Napulam à Buniade diriuasse videntur, sic ætas sequuta iam inde ab Auicennæ temporibus Rapuntium siue Rapulum istam vocauit: siue quia putarit plebecula eadem aut congenerem, siue quia ad vascendū, & ad aspectū, Napum aut Rapulam præ se fert radix: Est enim pollicis lōgitudine & crassitie Rapi in morem, aut Raphani oblonga, & medio sui nonnihil ventriosa: sed multò minor pellucida, candida, tenera, acetarijs vernæ Quadragenæ longè quouis Rapo aut Raphano delicatior. Inter namq; primas, prima tum erumpit, folijs Oleæ, Gentianellæ, aut Campanulæ hortensis breuioribus, in caule gracili, nec huic dissimili flores cæreulei, quatuor foliolis, vt Lini, cōpacti sed reflexis campanulæ modo: semine in oblongis theculis pusillo. Non modo hortis & satis familiare ybinis, sed etiam syluosis & sepibus tum frigidarum, tum calidarum regionum.

M. iij.

Rapunt.

Dec. Hist. 412 MINVS istud obuium multis locis, nec nisi montosis aut aliosis pratis, & cōuallibus, uti sunt Mindeni, & Norbonæ Aquitanicæ vicinis pinguibus, etiam Belgij & Angliæ numerosis. Figura, radicēq; maiore Rapuntium imitante, & comoso flore purpureo cæruleo multum diuerso à Rapis, Napis & minore Rapuntio. Folia enim per initia latiora imò, supernè acuta Hederæ, aut Trachelij, sed longiora in caule recto, pedem sesquipedemq; alto, gestante densum comosumq; spicatum, ex corniculis crebribus in quatuor foliola supernè dehiscētib; Melampyri florem cæruleum purpurantem, iam glaucum, iam pallidum. Iulio, & Augusto theculas relinquente rotundas, Rapuntij marsupiolis non dissimiles, uti & radix non dissimili gustu & figura est, vnde dicta videtur Rapuntium, tametsi neutra inter Rapos collocanda.

Leucoium	Album,
	Purpureum,
	Luteum,
	Marinum { maius, } purpureum.
	{ minus, }
	Duplicato flore.
Lychnides	Agrestis.
	Agrestis altera.
	Agrestis multiflora Anglica.
	Coronaria.
	Lychnis Chalcedonia.
	Marina Anglica.
	Ocimoides siue Ocimastrum.
	Ocimastrum alterum.
	Ocimastrum Valerianthos.
	Ocimoides repens Polygonij folia, flore Saponaria.
Lysimachia	Lutea.
	Pliniana fortè.
	Siliquosa, filius ante patrem:
	eiusdem gemina v arietas.
	Cerulea hortensis.
Conisa.	Maior Monspelliensium vera.
	Media, qua Calamintha tertia Fusch. vulgo geel wynter.
	Minor Monspel. Fusch. Media.
	Minima.
Aster siue stella Attica.	Monspelliensium aureo flore.
	Italorum fruticosus, luteo Olea folio, Conisa facie.
	Aster minor Monspel. Tripolij flore, medio purpureo, Linaria folio.
	Aster Montanus duplex pragranti Conisa aut Helenij flore.
Glastū siue Isatis.	Sativa.
	Syluestris.
	Luteola.
	Vaccaria.

λευκοιον. LEUCOION, VIOLA alba.

{ Bel. Violieren. } Ger. Weiß garden Diele.
 { Ang. White Gillouer, or stocke Gillouer. } Gal. Violiers blancs.
 { Hisp. Violetas amarithas, seu violetas blāquas } Ital. Viola bianca.

Viola

STIRPIVM aduersaria noua.

141

VIOLE nomen ἀπὸ τῆς λέγειν, quasi ire, aut prouenire, aut primum prorūpere dixeret. Veris nāmque præuia viola, & Lutea *Keiri* dicta, quarum capti venustate, & fragrantia, vt vsum ad coronamenta sic nomen commune sanxere, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem, quam rationem sequuti, multos & varios flores 876. *Effig. Mathiol.* res Violas nuncuparunt. Idem nomen variis atque longè diuersis plantis inditum: quippe apud Theophrastum Viola est bulbosa, nigra & alba: quas nos suis quaque locis exequuti sumus. Hic verò Leucoium speciem dumtaxat leuiter perstringemus, quæ non à florum albedine, sed foliorum canitie, cinericioue colore dicta alba videtur. Etiamnum hodie, vt Dioscoridis æuo, vulgarissimæ cognitionis illa triplex è floribus varietas: vbiuis propemodum gentium. Ditissima peræquè omnium florum foetura. Sed albâ & pureacærulea non nisi satū.

LEUCOIVM LVTEVM, *Keiri Arab.*

Germa. Geel garden veiel.
Ital. Viola lalla:
Gal. Violes de muretz,
An. Walle Gyllofer.

LUTEA verò parietinis præsertim, etiam spontè læta floret & vernat, Februariò & Martio, hæcque vt frequentior, & odoratiór, ita nõ parum utilior Medico vsui, cuius *Effig. Mathiol.* semen etiam efficacissimum compressum in siliquis, sed minoribus multò, atque Eruca 877. sylvestris paribus. Folia etiam angustiora, virentia Ligustri, vel Phylereæ. Caules farnientosi, recti, complures, radice lignosa, fibrosa cõmissuris & rimis parietum incuneata. Hic in Anglia vt plerásque alias Nataliciis Christi sapius floribus luxuriantè vidimus, etiã hoc anno: non tamen perennat.

SVI similis & vnà dumtaxat, quæ plurimum albos, sæpe purpureos, interdum, præsertim anotina flores, exoleti coloris in cæruleum vinaceū languescentis fert: Cornicula *Varietas* quanta & cuiusmodi cornuti Papaueris, geminū item seminum ordinem, membranula secundū longitudinem intercurrit. Folia accedunt ad Calendulam albicantia, è radice lignosa: Hæc non perinde feruet gustu.

LEUCOIVM MARITIMVM *Mains.*

SED Maritima, quæ plurima Mediterraneis Norbonæ littoribus, rarior multò, Thlaspi gustu & sapore videtur. Flosculi æstate quaternis foliolis dilutæ purpuræ: siliqua & semine similis, sed folio ad Cichorij, vel Eruca modum diuiso, crasso albido, cõcolori, & pari hortensis.

LEUCOIVM MARITIMVM, minus.

ISDem locis non raro pusilla duplòque minor oritur, & ab hac differre videtur: vt Thlaspi minimū, à mediocri: vehementius tamen a credine vellicat linguam.



LEUCOIA DVPLIS FLORIBVS.

MAN-

MANCONIO holitorio repetitâq; crebriore transplâtatione, tum lutei, tum purpurei, flores magnitudinē luculentam assequuntur: multiplici singuli prāgnanti foliorum foetura, Rosam moschatā æquante: Sed vti viola Martia floribus donata, semine orba fit.

AUXVIG. *LYCHNIS Coronaria.*

Ger. Grauen Kossin, Marien Kossin, & Himmel Kossin, siue Coelestis
Gal. Oeillets, & Oëillets Dieu. Rosula.
Bel. Christus ooghen.
An. Rose Campion.

Ionis flos Theoph. non Phlox, siue flammula Plin.

CERTVM liquet de authorum monumentis & comparatione cum Rosâ, Violâ atque Anthyrrhini floribus, flâmco colore, lucidâue, aut sanguinea, purpura fulgentibus, dictas fuisse Lychnides, quasi lucidos luculētosue flores, qui elegantia illecebris in coronamenta venerint. Eiusmodi est Viridariorū delicia lectissimus flos, Ocellus vocatus, Gallice *Oeillet*, *Christus ooghen* Flādricē, cuius tres quatuorūc numerantur differentia: quas omnes huius arcto notionis ambitu cōplexi sumus: Satiūe radix fibrosa, longiuscula, folia flaccida, crassiora, tomentosa, vti *Æthyopis*, magnitudinē *Leucoii*, vel *Saluia* æquante. Incani item caules surrecti, teretes, geniculis atque ramulis pluribus donati, qui singuli, flores explicant, è calycibus *Pseudomelanthii* æmulis, Rosea purpura rutilos, atque nitore flammantes, oculorūq; aciem interdum perstringentes, *Pyropi*, aut lapidis *Lychnidis* modo, vnde nomen vtrique cōmune fuit. Hæc vt omnium pulcherrima, ita colitur sola, eoque flores adeo confertos & ingeminatos fert: vt semine postea orba fit, exhausta nimirum formæ vi, & pabulo in florum cōmodum absumpto: cuiusmodi in *Viola Martia* exemplum videre est. Haud dispar natura earum quæ ruri, interdum sponte oriuntur, aut in hortis negliguntur. Præterquam quod floribus candidis paucioribus, minoribus, & semine donantur.

Varietas.

LYCHNIDES SYLVESTRES.

AFFINES etiamnum tres, quarum duæ passim fecus satorum sæpes ex-
unt: radice non ita magna, gracilioribus, ac paucioribus, tum cauliculis,
tum foliis, & mollioribus, nec perinde tomentosis, sed ex pallido herbaceis. Alteri flores rubelli dilutiorisue Rosæ, alteri vero niveo candore renident.

Ang. *Doble Rose Campion.*



MULTIFLORA.

Varietas

TRANSVECTÆ vtriūque in hortos cultu adeo flores foetura luxuriant, vt maximum *Africanum* florem, vel *Rosam* æquent, aut superent.

LYCHNIS MARINA, ANGLICA.

Altr-

ALTERA quam hic pictam damus, in aggeribus maritimis Vectis Insulæ Angliæ, totòq; illo littore frequens. Herbula est ab ima radice multis folijs cincta, crassis, minoribus, & angustioribus quàm Portulacæ Mariniæ. Caules creberrimi, flexiles, humi fissi, cubitales & sesquicubitales: in quorum summo caliculus albus Ocimastræ, aut Lychnidis est, cui hærent flosculi candidi perquam elegantes, Ocimastræ non dissimiles, apiculis intus nigris. Semen in folliculis fuscum Lychnidis, aut Ocimastræ. Salso est gustu, non tamè insuauis, esu tenera: non nisi inter filices & Brassicas marinas quæ ferme vndæ alluunt enatam videas. Floret mense Iunio, Iulio, Augusto, & Septembri.



LYCHNIS Chalcidonica, siue Constantinopolitana miniata.

FACTIB harum pulcherrimam elegantia prouocat, aut superat florum delicia plantam Chalcedonia illa, cui florem Constantinopolitanum nomen indiderunt. Huius radices exiles, fibrosæ, aliquantum acres, caules exerunt numerosos, teneros, graciles, geniculis & aspredine cinctos, è quibus singulis folia bina, quadantenus Syluestris Lychnidis, sed nonnihil viridiora, hirsutiora, & asperiora, semen in cauliculis oblongis nigrum Papaueris Rhœadis. Flores in umbellis radiatis, latiuiculis concinnè disiti, & minio purpureo, rutilo fulgentibus, viuidioribus, quàm in Martagone vel Canna Indica, adeò ut quia in odores sunt isti coronarij omnes, proindeq; florum voluptate duntaxat asciti, merito hic Lychnis multò omnium pulcherrima sit habenda.

OCIMOIDES siue Ocimastrum. Jacea alba Monspel.
Herba Tunica Gordonij.

NON tantum propter foliorum cum Ocymo similitudinem, sed etiam adeòq; multò aptius ob vires aduersum viperinos morsus exploratas, cui maxime confert Ocimum, Ocimoides, aut Ocimastrum vocasse videntur. Cuius non parum plenè omnes explet notas ista planta vulgatæ cognitionis, quæ nusquam non inter segetes, & viarum marginumq; gramina vberè luxuriat. Radix alba crassitie digitæ æquans, tenera nonnullis fibris sparsa: exiles rectosq; nonnihil hirsutos, cubitales exerens caules, per interualla geniculos habentes, è quibus singulis folia maiuscula Ocymi, aut Lychnidis syluestris hirsuta bina, & plerumq; quaterna, nouis succrescentibus binis pusillis, in summo ternos, aut quaternos foliosos calyces ventriosos supernè angustos fert: vbi semen fuscum Pseudomelanthij, flores Lychnidis syluestris albi.

SPVMEVM Papauer vulgò, est Ocimastrum alterum.

NE c minore prouentu, nec alijs locis oritur hæc, vulgò Norbonensium notissima, & propter spumeam spumeamue asperginem, quæ non rarò albicans foliorum, & Behen album geniculorum sinibus insidet, spumeum Papauer putata: superiori Ocimaastro admodum similis, cunctis sui partibus, sed caules leues nitidi hirsuta, ad Tunicem magis acceptiorum tamen ventriosos. Belgarum: neuentriosos tamen ventriosos.

Ocimastrum

Narcissus Virgilij & Columella fortè.

Valeriana rubra Belgarum.

LONGE hac floribus pulchriorem, alioquin folijs, caule, & facie non ita dissimilem, alunt herbarij Belgæ: radice tamen aliquantùm crassiore, habitiore, & magis tereti æquè alba, odoratiore. Longiora, maiorq; aliquatò tum folia, tum caules sunt. Flores verò creberrimi, elegantissimi affatim in muscarijs propendentibus, & ex pusillis caliculis oblongis congesti, Valerianæ partim, & Iasmini. Vnde illuc Valeriana Rubra vocatur. Purpura namq; diluta nitent flores, Iunio exeunte. Vnde etiam Rubrum Behen vocitarunt idem: non nisi in hortis pensilibusq; puluinis, & figlinis enatam vidimus.

OCIMOIDES REPENS. Polygonifolia, flore Saponaria.

NON modò Taurinensium ad Padum collium vmbrosis, Syluosis, & iuxta sæpes hæc frequens oritur, sed etiam Seuena Vegani herbidis, & vmbrosis marginibus, secus riuiolos & fluenta proximè Asarinam in saxorum commissuris. E caliculis gracilibus, geniculatis, reptantibus, teneris, flexuosis Alfinis maioris, folia exeunt bina, iuxta geniculos Oleæ syluestris, Myrthi, aut Polygoni, sed paulò latiora. Flores verò in caliculis oblongis Saponariæ concoloribus, multò minoribus: radix exilis, vsus hodie incompti & neglecti.

Λυσιμάχιον καὶ λυτέα *LYSIMACHIA LVTEA, sine Salicaria.*
Gal. Perce bossé. Soufy d'eau. Corneille.
Ger. Geel Weidrich.

HVC laus nomenq; à pugna dirimenda, id enim est: Λύει τὴν μάχην, certamen dirimere vel pacè componere, quod nominis Reginam etiam Lysimachia imposuisse dixerunt. Est tamen ea plantæ vis, vt etiam belluarum animos feroces, & mutuos hostiles congressus pacet. Faceret vtinam rerum arbitra, & hera Prouidentia, vt quàm nota est hodie herba Lysimachia, tam esset nobis copia illius cœlestis Lysimachia, quæ est Paracleti interpres, & alumna pacis gratia, qua rabies, & rerum humanarum æstus, atq; infania plusquàm Cerberæ, ad lenitatè perpetuumq; perennis amicitiaæ fœdus, reducerentur. Tametsi tres posteritatis sedulitate animaduersæ sunt Lysimachia species, Dioscoridi indictæ, tamè vix vlla earũ vsu hæcenus recepta fuit. Eapropter lutea notissima, vsq; frequentior. Messibus flores luteos elegantia visendos, in ramulis, Hypericonis modo edit, inodoros, multos, còsertos, folia autè frondis Salignæ, aut Perficariæ, pallentia, in caule bicubitali parum anguloso, geniculato, quaterna ternaq; sibi ex aduerso sita. Radix cespite vagatur, latius sparsa, editq; teneram sobolem purpurascantium turionum, Semen rotundum Coriandri, pallidum. Marginibus hæc & ripis minus, vdis, atq; mersis, quàm reliquæ tres aquaticæ. Vbiq; Angliæ, Galliæ, Germaniæ, peruia, quæ Officinæ multam ad gargarifmata, & parulides exesalq; oris inflammationes vsurpant. Gustu astringit & desiccet.

LYSIMACHIAE fortè Pliniane.

SVNT qui Plinio mentionatam Lysimachiam diuersam illi specie arbitratur, quippe qui flore purpureo, & odore graui eas discernisse videtur: earũq; vnâ proinde innuisse, quæ nusquàm emeris conspicuntur: è riuiulis pigris, & palludosis lacunis, floribus, spicatis, intè se purpureis, palmum & sesquipalmũ longis, è Sertis purpureis semine concluso in angustum deficientibus, Viticis aut Lauendulæ ritu. Caules geniculatos, & folia Luteæ similia, aut Salicis angustifolia sunt, ex interuallis bina subpurpurea. Radix maior quàm Luteæ, & similiter turiones, quotannis teneros promès, lignosâ, nigricans: nò tamè odore tetro. Quare tametsi non magni nostra referat cuius sit Plinianæ an Dioscorideæ, tamen subodorari quiuisset, Pliniũ non aliam interpretatũ, à Lutea, Sed πύρεον, siue purpureũ vertisse, aut πόνος πύρεον legisse: & grauem odorem habere, quod quando adoletur, verum asferit Dioscorides.

LYSI-

STIRPVM aduersaria noua.

145

LYSIMACHIA Siliquosa, Filius ante patrem.

EST etiam vulgatioꝛ hæc à siliquato fœtu præcoci, qui auctu & incremêto florũ eruptioni anteuertit, quasi proles parente prior, Filius ante patrẽ vocitata. Non aliis hæc natalibus, sed multò vberioꝛe & variato prouentu oriunda, caule & foliis haud diuersa, nisi quia angustiora & leuiter crenata. Flosculos foliolis quaternis constantes purpureos, patulos: Geranii colubini, quibus quasi caliculus foret, subsunt teretia exilia & longiuscula cornicula, quæ semine perquam minuto Conizæ, aut Dentis leonis, vnâ cum papposis inuolucris, dum siliquæ huius & bifidæ disparantur, perduntur.

Varietas **H**VIUS filii ante patrem in Belgio, sed in Anglia facillimè, varietas duplex obseruatur, non iisdem tamen locis semper, attamen vmbrosis, saxosis, aut minus vdis. Frequentior est omnino folio, siliqua, caule iisdem, sed magnitudine inferior, & tenera adeò, vt vix siliquam florẽmq; fulcire queat. Flos verò propius Caryophylleam Tunicâ dictam, paulò minorem, rubẽum exprimit.

ALTERA varietas cernitur in floribus, pallidioribus, quadripartitis, angustioribus foliolis, ex aduersa cruciatim, aut decussatim assitis, in parili siliqua, cui cætera omnia subsunt similia.

LYSIMACHIA CÆRVLEA hortensis, Veronica
RECTA quorundam.

ETHæc non absimilis folio, Filii ante Patrem, aut maioris Veronicæ, sed longiore, crassiore, sed tota minor, cubitum & pedem alta, & quasi ex vtraque Lysimachia mixta: ramulos in summo spicatos, floribus cœruleis, nitidis Teucris, Germandræ, aut Lauen-
dula longioribus: pluribus exiguis marsupiolis contentum semen minutum: exigua & fibrosa radice, nititur. Rarior hæc etiam hortis: Londini hoc anno Iunio & Iulio floruit in horto H. Morgani nostri: Belgicis etiam syluis dicitur crescere sponte. Parcior, aut rarior harum omnium vsus, præter quam Luteæ, vti dictum,

CONIZA MINIMA siue Pulicaria.

IN quadruplici differentia est Coniza, quarum Media & Minima vbiuis Gallia, Germania, & Angliæ locis lacustribus, & humentibus aruis multa. In *Benardgreyn* ara & fossis, altero à Londino lapide fruticat minima, inter Camemillam Romanam, inter & Pulgium Regale: sesquipalmm caulibus superat, multis alis donatis, hirsutis, pul-
lis vel cineritiis, rotundis, rigidiusculis, quos folia ambiunt ab imò crebra, incana, & Phylli Thelegoni ferme paria, aut Gnaphalii vulgaris; quem habitu & colore tota refert, sed maiora multò & obscuriore obsoletiorẽque lanugine. Flores rotundi, bullis Agerati vel Tanaceti, sed minus vegeto colore & cõpressi, quibus elapsis semen subest Anthemidis, acerosum minutũ: exigua lignosãq; radice, minime omnium hæc glutinosa, minúsque quam Media foetida, quam dumtaxat vestigio olido testatur,

MEDIA,

EODEM loci secus Regiam viã atq; humentes scrobes, Media illi prorsum similis, sed duplò maioribus foliis, crassis, densis, virentibus, asperis, rigidis, squallidis, caulẽ bicubitalẽ & alas multas ambientibus, ima falcata, basi Glasti Dentillarię modo. Radiatis floribus, luteis, Chrysanthemi, aut Buphthalmi, semen haud dissimile, radix pusilla, halitum virosum, & quiddam Cimicum, aut foetidę Cotulæ efflat. Parum aut minus multò quam maior, & minor glutinosa.

CONIZA MAIOR Vera.

SED maior tepidiore Austrinõq; cœlo & aëre maritimo oblectatur, cuiusmodi est Hetru-
rię inter Floretiã, Aquaspedulas, & Romã, atq; Nitiobrigũ in maritimis Venetis & aruo-
rum mar-

N.i.

marginibus Lunellæ, Mafilar-
ges, Mōspellii. Binū trinū-
ue cubitorum frutex, multis
propagatur virgultis, rectis,
rigidis, rotundis, foliis mul-
tis coherentibus, densis, ex
viridi pallentibus, crassis, pin-
guibus, Oleæ similibus, aut
Asteri attici Italici. Extremi
caules multis ornātur secun-
dū lōgitudinē floribus, luteis,
rotundis, Hieracij, aut Sene-
cionis, in pappos euolanti-
bus: nec non semen exigū,
vt Hieracij: radix lignosa, fi-
brofa. Præstātor cæteris mul-
tò hæc, cum odore vehemen-
ter suauis, tū viribus, nec mi-
nus Ledo Chisto glutinosa
tangenti, cuius odorem, sed
cum ea quam mediam iam
descripsimus, nōnihil confu-
sum imitatur, adeò vt omnes
norit, qui ambas, mediā nem-
pè & istā nouerit. Adeò sunt
inter se consimiles, & Dios-
coridis lineamentis affabrè
bellè congruentes.



CONIZA MINOR Vera.

HV c tamen præ cæteris assimilatur natalibus, viribus, odore & facie, quam minorē
Dioscoridis astruemus. Quæ prorsus eadē foret, nisi proceritate & caulium luxu-
ria vinceretur. Vnico sed- enim est vt plurimum caule, gracili, cubitali & sesquicubitali,
paucioribus, minoribusque foliis Lynariæ, vel
Chisti Ledi angustifolij: color, odor, modus, se-
men, tum illis, tum floribus, haud diuersa: ra-
dix exigua. Gramuntia syluæ finitimis agris,
hanc non modò, sed etiam publica via maiorē,
in depressis Syluæ lacunis minimam, non semel,
Pulegij Ceruini conuicticæ, legimus: Mediam
verò passim vbique locis vdis, sic inibi omnes
studiosis paulò exercitioribus iamdiu notæ:
quibus risui fuit Senensis audax commentum,
qui longè diuersam, vti in Baccharide dictum,
plantam, Nullis reclamantibus, vt ille semper affir-
mat (vti nos hîc omnibus aduersantibus) notis,
intrusit huc. Parum certè illi notam, & quod
minus ferendum, nō descriptā. Spirat huius nā-
que radix odorem, non tetrum, sed aromaticū
Garryophylleum. Caule, & foliis Verbasci, aut
Blattariæ non Oleæ, glutinis nihil penitus ha-
bentibus. Flores ex luteo purpurascens: cæ-
tera etiam planè dissimilia, multò magis viribus: quare nunquam Senensis dignitas
nostratibus mulierculis Galloprovinciæ persuadebit, vt scopas euiscandis, & enecandis
pulicibus, ex Baccharide potius quàm vulgata illæ Pullicaria colligant.



Coniza maior
Muthiolo falso
tradita.

Monspell. Bac-
charis.

ASTER

STIRPVM aduersaria noua. 147

ASTER, siue STELLA ATTICA *Monspelliensium, aureo flore.*

ATTICÆ stellæ nomen, si non à flore, sed à foliolis florem in stellæ morem cingentibus, factum fuit, vt Dioscorides videtur expressisse: non aliam hodie plantam commodius potest designare, quàm Monspelliensium Asterem vocatam inibi Norbonensi agro, prope pratorum margines, & fluenta perfamilia. Florem etenim edit æstate aureum, circinata, sed compressæ, nec admodum extuberantis rotunditatis, Buphthalmi aut Chrysanthemi, quem ambiunt quina senaue foliola angusta, mucronata, rigida, longiuscula, Stellam marinam piscem, non parum referentia: caules pedales terni aut quaterni, duri, hirsuti, quibus totis insunt folia oblôga Lychnidis aut Verbasci Saluifoliæ tenuioris, pilosa rigidiuscula, viridia, in fuscum obscura. Radice capillofa, sparsa. Sapore astringente, amaricante, non acri, nec ita ingrato. Semine anthemidis Augusto maturis vel Septembri in Franciæ, Belgij, Germaniæ, & Angliæ hortis. Nam ruri illis non prouenit. Purpurasunt quibusdam in locis florum foliola subtus, non secus ac in Tripolio.

ASTER ITALORVM *luteum fruticosum oleæfolio Conisæ facië.*

EST & istud non modò Italiæ saxosis & aridis valdè frequens, sed etiam Galloprovinciæ Norbone, præsertim via Auenione Nemansum petenti ad læuam, inter Augustæ antiquitatis Romanæq; munificentia rudera, ruinosaq; triplicis forniciis pontis Gauri vocati eximia monumenta, nec non prope *Bottonettum*, & secus Lanum Monspelliacum amnem ad pontem. Virgultis quamplurimis, durioribus, nigricantibus, pedilibus, & sesquipedilibus: folia Oleæ Conisæ, vel Myrthi maioris, aut potius Conisæ facië & flore. Luteo, papposo circinato squamulis acerosis foris septo, in Iacæ morem. Fibrosa radice, gustus vniuersæ subastringentis & siccantis, parum quid amarooris aromatici & odori; commodi hætenus incerti. Incertumq; sitne *Amelus Virgilij*. Videtur equidem neq; *Ameli* veri, neq; Dioscoridis Asteris opinionem tueri posse, vt prescius expendenti stirpes ipsas, & vtriusq; authoris lectioni dicat liquet.

ASTER MINOR *Norbonensium tripolij flore, Lynaria folio medio purpureum.*

NI SI hic (non in pratis) locis aridis & collibus saxosis proueniret, vt sunt Oliueta circum Monspellium & ad Castrum nouum, cæteris plenius expleret Dioscoridis Asteris & *Ameli Virgiliani* notionē. Flores quippe radiatim multis foliolis stellulas effigiant, aureo purpureoq; mixto fulgore micantes Tripolij. Nam Dioscoridi pingitur aliquid purpurei luteo immixtum, vt videre est quando dicit, florū partem purpuream bubonis præsidio esse. Sic enim vertendum est, & vertit doctissimus Marcellus. In gracilibus virgis, numerosis, rectis, pedilibus & sesquipedilibus ab vno radicis fibrosæ cespite: foliola oblonga, angustiora quàm superiorum, Lynariam referentia. Similis tota, sed minor & gracilior Tripolio, quod *AMELV* *Virgilianum* signantius exprimit, non modò quia secus fluentia & pratorum riguorum conualles amœniores, vt Padi, siue famigeratissimi Eridani prope Ferrariā, Pataniū, & pæssim in Lombardia: sed etiā quia tū florū & foliorū, tū cauliū superficies, interdū ex virore purpurascūt, speciosamq; radiantium Stellarum in luteo purpurascētium syluam ostentant cymæ.



ASTER MONTANIS *duplex prægrandi Helenij flore.*

N. ij.

ME-

MERENTVR ETIAM Asteris nomen plātā illā duā, quā non nisi rarō in mōtibus Allobrogū & Galloprovinciā celsis, florē vnicū luculentā magnitudinis ostentāt. Magnitudine ferē, colōre, & effigie Helenij, in caule singulari, cubitali, recto, gracili, folia ferenti fusca, magnitudine Asteris Italici, & adeō similia, vt planē eadē putes. Radice fibrosa, Succisā, aut Britanica, Lugdunensis.



Aster folio & caule hirsutis.

Alter proceritate, & florē non ab similibus, sed caule, & folijs hirsutis, longioribus, Cynoglossi nostri parui paribus, & similibus: radice verō minus fibrosa.

GLASTVM Satium.

HVIUS satiui & longē omnium optimi immensi tractus consiti Tholosanam ditant regionem, vbi virens herba *Guede*: tabefacta autem & putrefacta, inq; mola trusili expressa herbacea sanies, in prægrandes glebas aceruatur, & *Pastel* vernaculē vocatur, indeq; Galliæ, Angliæ, & Belgio suppetit ad pannorum infecturas. Serunt etiam circa Insulas Belgij urbem, & in Germania vbi solū pingue, & latum, per bonum dat Isatidem nec multū Tholosana inferiorem. In Italia minus frequens, eoq; minus mirum si doctus Anguillara se nosse negarit, & aliam Norbonensem sylvestris Glasti speciem, pro satiui Glasto descripserit: quam nescio cur Dodoneus Vaccariam vocarit, cum apud nos neq; vaccæ eam pascantur, nec vllam cum ea habet similitudinem, vllive vsui sit: Et illius conspicua differentia ab vtroq; Glasto, quibus tamen congener videtur.

Glastum enim Satium infecturæ commendatione vbiq; notum est. Aruis pinguibus feritur quotannis, exitq; folijs ab imo totos caules cubitales & bicubitales rectos stipantibus, crassis, pinguibus, angustis, atroceruleis aut virētibz Cynoglossi, aut Thlaspi latifoliæ effigie hærentibus, in summis ramulis numerosis, Maio mense, & Iunio flores lutei, pallidi, numerosi exeunt, secundum quos theculæ compressæ, acutæ in linguæ figuram erumpunt, & semen maturant nigricans. Radix albicat, non altè depacta.

GLASTVM siue ISATIS Sylvestris.

Math. 635.

SYLVESTRIS fegetibus obest, & multò procerius priore luxuriat, folijs Endiuia imitantibus, tamen multò minoribus, vnde Plinio occasio, vt in Lactucas reijceret: radice exigua, caule lignoso, recto, ab imò folijs compluribus stipato, è quorum alis alternis interuallis propagantur flores, sed in summo multiplici conferti, melino diluto colore. Galloprovinciæ plebeculæ coronaria est.

ISATIS sylvestris Ocimastris caliculo, flore exiguo pallido, Vaccaria dicta Norbo.

SYLVESTRIS autem siue Vaccaria, & Ocimoides dicta, importuno proventu Triticeæ segeti immiscetur: angustiora folia promēs, quàm sylvestris Isatis, Ocimastris, siue Papaueris spumei similia, rariora, in caule cubitali alis sparso, & ornato floribus pusillis Ocimastris, aut Pseudomelanthij, alabastriculis albidis, & pallentibus, nec semine dispari: non vllius adhuc commodi comperti.

MAGNO vsui & emolumento est Luteola, recentioribus tantum cognita, ad colorem fuluum aureumue pannis conciliandum valde expetita, praesertim in Belgio, vbi magna copia: tametsi aliis etiam plerisque locis Gallia, & Angliae ruderibus, & semitibus occurrat. Hæc tertia Glaſti species constitui rectè potest: radix oblonga, folia habitiora, Ifatidis figura, sed angustiora, fusco virore, caule recto, sesquicubitali, Thyrsus muscosum gerit, ex multis flosculis, luteolis, pallescentibus, Oleæ similitudine, & magnitudine, decussatim explicatis: Semen nigrum, Vrticæ Romanæ, sed minus.

TITHYMALI

Parallius, siue Marinus.
 Myrsinites, siue Myrthifolius.
 Helioscopius Soliseguius, Portulacæ folio.
 Cyparissius Cupressinus, vel Humipinus.
 Pitynsa, siue Pineæ: Esula minor Officinarum.
 Esula maior Germanica, an sit Dioscoridis prægrandis frutescens Pitynsa.
 Dendroides, siue Arboreſcens, Myrthifolius.
 Platiphyllus, est Characias nuperorum.
 Characias Anglicus, & Francus.
 Montpellierensium serratifolius, an Characias?
 Lathyrus, siue Cataputia minor.
 Peplus, siue rotunda Esula.

Peplis.

Chamaesyce.

Nerion { Purpureum.
 Album.

Alpigena Chamaerhododendros { Odora.
 Altera.

Montana Allobrogum Lentiscifolia, Chamalea folia, vel, Oliustrifolia
 minus odora.

Chamedaphne, siue pusilla Laurus, an Germanicum Mezereon, an nunc
 potius nostrum Chamaerhododendrum?

Granum Gnidium.

Daphnoides, siue Laureola.

Thymelea; Granignidi.

Chamalea tricoccus, Mezereon Arabum.

Chamalea montana hirsuta.

Alypum, Terribilis, Herba Norbonensium.

Scrapionis, & Arabum.

Mesue.

Turbith { Aetharij.

Officinarum triplex.

Tarton Traire Massiliensium, Galloprovinciæ.

Esula rara, siue Alypum in Lio Venetorum, insula.

Maius crenatum Myrthifolium measum ceretifolium.

Minus.

Minimum, siue Illecebra.

Anthyllis, siue Vermicularis frutescens, siue arboreſcens

Sedum { Arboreſcens Gracum, Ilyricum, & Anglicum. Maius.
 Aloe. Minus.

Cotyledon.

Cotyledon minus, Montanum Sedifolio.

Cotyledon aquatica, acris Septentrio nali.

Androsachis.

Portulaca } *Sativa.*
 } *Agrēstis.*
Portulaca marina
Halimus.
Telephium, an. Crassula?
Scorpioides.

TITHYMALI.

τιθυμάλαι, Lactaria.
Germa. Wolszmilch.
 } *Gallis. Tithymales, ou Herbe au lait.*
 } *Belg. wolszmelck.*
Ang. Wilde spurge.

ASYCCO lacteo quo turgent differentia cūctę, nomen factum cōmune Tithymalis, vel per diphthongū potius, Tithoimalis, quod mammā, siue papillā vberis exitiosā virosāue non inscitē interpretatur. Plures hodie quam apud Dioscoridem extant, habemus; quarum partim confusas à Comentatore, nec verbis designatas, partim affictas orationi non intelletz Dioscoridis, quamlibet suis indiciis illustrabimus, & paucis emendabimus: Dioscoridis oratione quasi filo Ariadnæ ducti, sed nostrum ordinem sequuti, accuratiorēque ex inspectione descriptionem: quod quælibet planta cui propius quadret, Magis perspicuum fiat. Paralium primum ponemus.

παράλλιος. PARALLIUS.

PARALLIUS siue hæc maritima appellata nuspiam hic nisi sabuloso steriliq; litorum solo Mediterranei, Occidui, & Germanici maris, vbi quāplurima exit, virgis & radice, rectis rubellis, tactui glutinosis, foliis densē stipātibus, subnigris, Lino latioribus, Alypi terribilis paribus, & similibus. Flosculis ex herbaceo luteolis: in summis pediculis circinata foliola media traicientibus, sicq; vmbellam efformantibus & semen edentibus tricoccum, Chamælez, aut Latiridis non dissimile, minus & coactius: intus medullosa tria grana sunt verrucariæ Tornefolis: radice simplici, proluxa, lignosa.

μυρσινίτης. MYRSINITES Myrthifolius. Fœmina
repens Dioscorid.

PROXIMA illi facie hæc, sed breuioribus pedaliibus, pinguioribus, reptat humi furculis, quos folia prorsum Chamælez latiora, Myrthi, vel Rusci, mucronata crebra stipant, vt Paralium, pallidē virentia, & in summo magis sparsa Sedi maioris, aut Laureolæ ambitu, è quo trans folia concava & vmbilicata, disparantur quaterni, aut quini pediculi Iunio & Iulio, flores luteos, herbaceos, pusillos, muscosos gestāt, & semina triquetra Paralii Augusto maturant, maiora, quæ itidem tribus compacta lateribus, in tri-carinas valvulas dehiscunt, singulas singulum granum, teres, oblungum, fuscum: medulla alba acri non ingrata. Angliæ, Belgiæ, & Franciæ horti hunc sæpius alunt: nec aliibi natum vidimus.

ηλιοσκοπιός. Helioscopius. TITHYMALVS, Solis-
quius Portulacifolius.

} *Germ. Sonnewende wolszmelck.*
 } *Gallis. Reueille matin suiuant le Soleil.*
 } *Belgis. Croonkens cruyt.*
Ang. Wertgrasse, & Wertworte.

CVNCIUS gentibus familiaris hic & notior, foliis Portulacæ minus crassius, Halimi breuioribus, ambitu non nihil crenato vt noster Charatias, caules paruos pedales in humum

hamum flexos, quaternos & quinos, rubellos, cingentibus floribus ex luteo in pallidū languentibus, inque umbellam collectis, semine non diuerso: sed Norbonæ, vbi maturerit plenè, adeo spiritu vapido turget, vt soli relictū, quasi se motaret, exiliat, mediūque crepet; pueris raro spectaculo est, quemadmodum Thamariscī semen.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ TITHYMALVS Cyparissias, sine Cupressinus.
vel Humipinus.

APPRIME referunt huius densi ramuli rubētes, sesquipalmares, positi ortu, effigie, & quabili circinatōq; habitu pusillā Cupressum: folia autē angustiora, longiora, & multo quam Chamælea, aut Thymælea, Pino propiora, molliora: semine alioqui in summitatibus, pixidata foliola trāsmittentibus, nec à superioris, nisi quia minora sunt, diuersis: vicinioribus tamen Parallio Tithymalo, & Pituisq; Crepidines sabulose fluminū, & vicini colles fræquentius hunc alunt, vt sunt Ligeris ad Aureliam, Bituriges Galliæ, & Norbonæ Lani, non procul Monspello, alibique passim Maio, & Iunio, quum interdum propter anni & loci rigores, vel feruores alben folia, & minor tota reperitur, etiam in maritimis: quemadmodum cæruleū etiam totum habemus Parallium, & Amygdaloidem sanguineum.

ΠΙΤΥΣΑ PITYUSA, sine Pineæ, Offici. Esula minor.

ILLI ADEO affinis hæc Pineæ Tithymalus, nomine & facie, viribus, natalibus, & foliis præfertim, vt ne quemquam falleret assimiliatio, Dioscorides diuersas esse species monendum duxerit. Ac quāquam videri possēt vna quæpiam Cyparissie Tithymali varietas, quales aliquot notauimus, tamen hic non vniuersum habitum, & lineamenta Plantæ, sed dumtaxat folia Picæ esse tradit. Quare coniectura fert verisimilior, Pityusam esse eandem cum Officinarum Esula minore, quæ etiam Esulæ vox, quasi abscisa à Pityusula, nempe Pityusa minore videtur. Passimque cognoscitur, cum Linariæ collatione, de verficatoris carminulo rithmico. Esula Lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Exit namq; cauliculis gracilibus, pede & cubito maioribus, per interualla disparia Polygoni more, ramulos, & folia pauciora promētibus, Osyridis, siue Linariæ, longis, acutis, angustis, & nulli Tithymalorum quam Cyparisso propinquieribus: cui etiam flosculi

theca eadem: radix digitum minimū æquat, albicās, cuius uolo ligneo exāteratus vsui Officinis, nec fructui est lentis coridis habet, cui potius mendum subesse suspicamur, i suffragante & monente perpensione: & sane aut nullum prum (quorum omnium inter ipsos eadem, & triquetra) fuit illis notū, vel descriptum, aut amanuensium incuria fuit, luxatāque aliquot locis germana lectio: vt mox fundæ, simul pudendæ Commentatoris commenticiæ, Tis effigiaturæ, quas non è plantis ipsis expinxit, sed vt in hi fructu, & capitulo Gnaphali marini, Poterio; atq; quāconis mendacio, posteritatis theatro illulit; ex quo exerimo viro suspicionem fecit, & fouit meritò, non vno loco gisse tesseram, nec illi deinceps, nisi benè re perpensa, in dendum. Pratorum margines, & sepium, istam sæpius lgio, & Angliæ, non nisi horti Pharmacopœorum,

maior Germanica, an sit Dioscoridis prægrandis
frutescens Pityusa?

nos, & Belgas Pharmacopœos hæc recepta est, Esula maior,
ciei quam Pityusæ propior videtur, & alioqui nisi huc ac
N.iiij. com-



Portulaca { *Sativa.*
 Agrestis.
Portulaca marina
Halimus.
Telephium, an. Crassula?
Scorpioides.

TITHYMALI.

τιθυμάλαι, *Laetaria.*

Germa. Wolfsmilch.

{ *Gallis. Tithymales, ou Herbe au lait.*

{ *Belg. wolfsmelck.*

{ *Ang. Wilde spurge.*

ASVCCO lacteo quo turgent differentia cūctę, nomen factum cōmune Tithymalis, vel per diphtongū potius, Tithoimalis, quod mammā, siue papillā vberis exitiosam virosamue non inscitē interpretatur. Plures hodie quam apud Dioscoridem extent, habemus; quarum partim confusas à Comentatore, nec verbis designatas, partim affictas orationi non intellectę Dioscoridis, quamlibet suis iudiciis illustrabimus, & paucis emendabimus: Dioscoridis oratione quasi filo Ariadnę ducti, sed nostrum ordinem sequuti, accuratiorēque ex inspectione descriptionem: quod quālibet planta cui propius quadret, Magis perspicuum fiat. Paralium primum ponemus.

παράλλιος. PARALLIUS.

PARALLIUS siue hæc maritima appellata nuspiam hic nisi sabuloso sterilique lit-
torum solo Mediterranei, Occidui, & Germanici maris, vbi quāplurima exit, virgis à radice, rectis rubellis, tactui glutinosi, foliis densē stipātibus, subnigris, Lino latioribus, Alypi terribilis paribus, & similibus. Flosculis ex herbaceo luteolis: in summis pediculis circinata foliola media traicientibus, sicque umbellam efformantibus & semen edentibus tricoccum, Chamæleæ, aut Latiridis non dissimile, minùs & coactius: intus medullosa tria grana sunt verrucarię Tornefolis: radice simplici, proluxa, lignosa.

μυρσινίτης. MYRSINITES Myr
repens Dioscorid.

PROXIMA illi facie hæc, sed breuioribus pedali-
furculis, quos folia prorsum Chamæleæ latiora crebra stipant, vt Paralium; pallidē virentia, & in summ
Laureolę ambitu, è quo trans folia concava & umbilic
ni pediculi Iunio & Iulio, flores luteos, herbaceos, pusil
quetra Paralii Augusto maturant, maiora, quę itidem t
carinas valvulas dehiscunt, singulas singulum granum,
dulla alba acri non ingrata. Anglię, Belgię, & Francię
bi natum vidimus.

ἡλιοσκοπία. Helioscopius. TITHYI
quius Portulacifolius.

{ *Germa. Sonnewende wol*

{ *Gallis. Reucille matin*

{ *Belgis. Croonkens cri*

{ *Ang. Wertgrasse, & W*

CVNCTIS gentibus familiaris hic & notior, foliis I
breuioribus, ambitu nonnihil crenato vt noster Chi

humum flexos, quaternos & quinos, rubellos, cingentibus floribus ex luteo in pallidū languentibus, inque umbellam collectis, semine non diuerso: sed Norbonæ, vbi maturerit plenè, adeo spiritu vapido turget, vt foli relictū, quasi se motaret, exiliat, mediūque crepet; pueris raro spectaculo est, quemadmodum Thamarisci semen.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ TITHYMALVS *Cyparissias, sine Cupressinus.*
vel *Humipinus.*

APPRIME referunt huius densi ramuli rubētes, sesquipalmares, positi ortu, effigie, & quabili circinatōq; habitu pusillā Cupressum: folia autē angustiora, longiora, & multo quam Chamælea, aut Thymelea, Pino propiora, molliora: semine alioqui in summitatibus, pixidata foliola trāsmittentibus, nec à superioris, nisi quia minora sunt, diuersis: vicinioribus tamen Parallio Tithymalo, & Pituisq; Crepidines sabulose fluminū, & vicini colles fræquentius hunc alunt, vt sunt Ligeris ad Aureliam, Bituriges Galliæ, & Norbonæ Lani, non procul Monspello, alibique passim Maio, & Iunio, quum interdum propter anni & loci rigores, vel feruores alben folia, & minor tota reperitur, etiam in maritimis: quemadmodum cæruleū etiam totum habemus Parallium, & Amygdaloidem sanguineum.

ΠΙΤΥΣΑ PITYUSA, *sine Pinea, Offici. Esula minor.*

ILLI ADEO affinis hæc Pinea Tithymalus, nomine & facie, viribus, natalibus, & foliis præsertim, vt ne quemquam falleret assimiliatio, Dioscorides diuersas esse species monendum duxerit. Ac quāquam videri posset vna quæpiam Cyparissie Tithymali varietas, quales aliquot notauimus, tamen hîc non vniuersum habitum, & lineamenta Plantæ, sed dumtaxat folia Piceæ esse tradit. Quare coniectura fert verisimilior, Pityusam esse eandem cum Officinarum Esula minore, quæ etiam Esulæ vox, quasi abscisa à Pityusula, nempe Pityusa minore videtur. Passimque cognoscitur, cum Linariæ collatione, de verficatoris carminulo rithmico. *Esula Lactescit, sine lacte Linaria crescit.*

Exit namq; cauliculis gracilibus, pede & cubito maioribus, per interualla disparia Polygoni more, ramulos, & folia pauciora promētib; Olyridis, siue Linariæ, longis, acutis, angustis, & nulli Tithymalorum quam Cyparisso propinquieribus: cui etiam flosculi prorsus, & seminum triquetra theca eadem: radix digitum minimū æquat, albicās, cuius cortex aceto maceratus, & torulo ligneo exāteratus vsui Officinis, nec fructui est lentis figura, cuiusmodi codex Dioscoridis habet, cui potius mendum subesse suspicamur, quā standum putamus, rerum suffragante & monente perpensione: & sane aut nullum prorsus nostratum Tithymalorum (quorum omnium inter ipsos eadem, & triquetra pericarpia, siue inuolucra sunt,) fuit illis notū, vel descriptum, aut amanuensium incuria (nolim Dioscoridis) temerata fuit, luxatāque aliquot locis germana lectio: vt mox fusius monemus: hinc simul ridendæ, simul pudendæ Commentatoris commenticiæ, Tithymali, Paralii, & Mursynitidis effigiaturæ, quas non è plantis ipsis expinxit, sed vt in Antirrhini floribus, Tragacanthi fructu, & capitulo Gnaphali marini, Poterio; atq; quāplurimis aliis locis, plausibilis iconis mendacio, posteritatis theatro illudit; ex quo exercitatisimo cuique, & cordatissimo viro suspicionem fecit, & fouit meritò, non vno loco fidei classici authoris illum fregisse tesseram, nec illi deinceps, nisi benè re perpensa, in medicatoria pollicitatione credendum. Pratorum margines, & sepium, istam sæpius alunt Esulam. In Francia, Belgio, & Anglia, non nisi horti Pharmacopœorum,

ESULA maior Germanica, an. sit Dioscoridis prægrandis
frutescens Pityusa?

VT vsu crebro apud Germanos, & Belgas Pharmacopœos hæc recepta est, Esula maior, sic sanè nulli Tithymali speciei quam Pityusæ propior videtur, & alioqui nisi huc ac-

commodetur, Dioscoridi, aut minus nota, aut prætermiſſa fuit. Ex ampla multiſque adnatis implexa radice, craſſo, denſoq; pullo cortice amiſta, innumera furriguntur virgulta, minimū digitū craſſa, & binū cubitorum proceritate viridātia, folia ferentia Latyridis crebra, aut arboſcentis Tithymali, nec ſemine diſſimili: ſed partim ſecundū caulis & foliorū interualla, partim in umbella, ſed minus lata, & minus in orbem collecta, cætera non diſſident à reliquis Tithymalis. Verū rarior hæc in Italia & Gallia, & Anglia, niſi in hortis colatur. Germaniæ verò ſuperioris, & inferioris ad Rhenum.



DENDROIDES, ſine arboreus Myrthifolius, Myrthæ ſpecie non à foliis, ſed frutico.

CALIDIORIS ſoli collibus apricis, & ſaxeis, ſiue aſperis, ſecus fluentia Norbonæ, & Hetruriæ Romaniæque prouenit Arboris æmulatione, ab vno ſtipite pollicis craſſitie, plures emittit ramos, amplos, bicubitales, digitū craſſos, Eſulæ maioris folia paria & admodum ſimilia, veluti cuncta planta: quam radix exilior, ſtipes craſſior, & umbella maior, ab Eſulæ maiore diſtinguit: vti etiam arboreus vultus, quem hæc præfert, vnde illi nomen.

PLATIPHYLLON Characias Mathioli, Vallaris.

POSTEA quàm habemus plures, quàm quot Dioscoridi annumeratæ ſint Tithymalorum ſpecies, & huic præ cæteris folia ineſſe latiora, vt Plinio etiam viſum, ad Violæ albæ, & minimi Sylueſtris verbaſci accedentia, ſimilitudine, ortū, & parilitate, videmur tutò affirmaturi, latifolium hunc Tithymalum dici oportere: & præſertim cum duos in ſuper ſimus naſti, quos ſi nouiſſet Commentator, Characiā feciſſet, noſque hoc labore leuaſſet. Quem igitur Characiam noſtra ætate ſcriptores putant, nos Platiphyllum opinamur, quemadmodum Platiphyllon Iteam, ſiue Salicem appellant illi. Eſt namque latioribus, longioribus cæterarum foliis, ramis ſeſquicubitum & duos altis, aliòquin Dendroidi, aut Pityufæ maiori aſſimilatur. In Norbonæ Galloprovinciæ, Lugdunenſiq; præfectura, ac aliis quàm plurimis Galliæ, & Germaniæ ſyluoſis, & fluentum ripis, nihil frequentius. Floret, Maio & Iunio, vnicaulis, vt plurimum hinc: eoque Dendroidi cognatior.

CHARACIAS Anglicus & Francus.

HIC admodum ſimilis Platiphyllō, ſed minor caule, & foliis. Frequentior etiā in Germaniis, & Franciæ Aureliæ vicinis ſyluoſis, quàm calidiori ſolo: Nullibi quàm in Angliā copioſior. Primo Vere floret, caulēſque complures à radice lignoſa, fuſca, rubentes emittit. In quibus folia multò minora, purpurantia Amygdalinæ frondis effigie, Paralij maiora. Luteſcente ſoſculorum foetura, & paritura, per Iunii meſſes trilateram, & trigranā: non diuerſam à cæteris ſiliquam, paulò ſuperius quàm ſint Peltata concava folia, pertranſeant umbellæ ramuli.

STIRPVM aduersaria noua.

153

MONSPELLIENSIVM SERRATVS TITHYMALVS,
an Cavacias?

NON temerè alibi (ne in Italia quidē) quàm Norbonensi agro istum reperias, qui inibi vulgatissimus, & à foliorum crenistenellis, serratus vocatus: exeūt à radice alba, Eringij simili, pingui cortice, carnosa pulpa, pollicē crassa, proluxa binū & ternū pedū, gūneo & percocto succo pregnante, eoq; Turbit suspicionem faciente: exeunt surculi plures cubitales, & pedales viridantes: Folijs Mirsinididis, angustioribus, aut myrthi maioris, crassioribus, pinguioribus, & elegāter per ambitū, sed leniter, crenatis: in summo ramulis spargitur, & donatur umbellis umbelliscatæ rotunditatis, foliola trijcientibus, florem, & thecam haud diuersam ab alijs, estate. Si vilius horum omnium radix affabrè ementitur Turpeti Alexandrini radicem, sanè hæc foret.



LATHYRIS sine CATAPVTIA minor: maior est Richius.

POSTREMVM omnium Tithymalorum notissima, & vstatissima Lathyris, cui appellatio indita videtur, quæ congenerem quidem, sed efficaciorē, & virosam magis signaret Tithymalum, idcircoq; Catapotiam, quia dixerat Dioscorides ἐν κατὰ ποτίῳ λαμβανόμενα, id est, in pilulis grana sumpta purgare. Nūquam non in hortis, etiamq; in agrorum Anglorum, & Galliæ marginibus occurrit, caule singulari, bipedali, sed ramoso assurgit: quem per intervalla ab imo bina cingunt folia, Rhododendri, aut Platiphylli Tithymali, crassa, pingua, succo lacteo virosiore gliscentia. Flores æstate pusillo, & semen edit Augusto, & Septembri, maius Tithymalis ceteris, non tamen diuersum, tricoccum, trilaterum, expressiore ternum granorum commissura, qualis Chamelez, quæ maior, & figuratior, & angulosior magis, ideo conspicua. Idcircoq; plenius, & signatius à Dioscoride descripta, aliorū Tithymali pericarpia, & semina nō perinde. Quare nobis subscribente natua rerum imagine fuerunt interdum immutandæ, interdumq; expressius ponendæ designationes, non vt faciunt ista mancipia mendaciorum, qui ne videantur ignorasse, malunt ignota blaterare, sibiq; ipsis & naturæ monstra commentari.

PEPLUS, sine ROTVNDÆSVLA.

QVOD ramulorum ambitu, & quasi rotundo amictu, velum efformaret, aut tellurem operiret, Peplus dicta, nisi potius ob purpuream foliorum superficiem, siue xerampelinam, quæ huic in vinetis nascenti, & Peplidi in maritimis sabuletis degenti, vt plurimum inest. Peplum namq; fuisse purpurei, vel pheniceæ coloris, cum multæ historiæ, tum flāmeolum testatur, sic à flāmneo dictū colore. Germanijs & Gallijs passim Peplus sponte prouenit, secus sepēs, fossimenta, margines hortorum, & in vinetis. Radice prolixiore, pusilla, fibrosa, ramulos promit fruticosos, sesquipalmares, complures, graciles, tenellos: foliola Rustæ, Alfinæ, vel Helioscopij Tithymali minora, bina, & post flosculos luteolos iuxta exortum singulum, marsupiolum exile tricoccum, nec diuersum à cæteris Tithymalis: tametsi exile admodum, semine intus meduloso candicante Papauerino. Succum lacteum tota fundit planta, planēq; Tithymali speciem fatetur.

PEPLIS.

VT nomine sic effigie hæc Peplum præfert, & propius adhuc etymum Pepli, vel flāmneoli exprimit: idcirco θειμός ἀμφιλαφής Dioscoridi designatur, quia fruticat vberiore

Effi. Mat. 1260 vberiore vndequaq; ramulorum comosa concinnaq; sobole in Pepli speciem collecta, phæniceo colore purpureoſcē, nitentibus viticulis sesquipalmaribus & folijs minoribus, numerosioribus quā Peplij, Chamæſyce inter & Portulacæ agreſtis (cui quā ſimilima tota) floſculi item pallentes ex luteo, & ſemen tamen maiuſculum, tricoccum, Peplij aut Chamæſyce, Auguſto edit, lacte turgidū acri: Littora Norbonenſia Thyreni & Adriatici maris hanc repticem abundē fundunt, ignotam alioquin Septentrionalibus, niſi hortis.

CHAMÆSYCE.

ET hæc facilē de illis duabus cognatis noſci poteſt, rarior tamen multò, nec vſpam Italiæ aut Germaniæ, ſed duntaxat in Norbonenſis Galliæ oliuetis vine- tiſq; vbi plurima, præſertim aridis ſabuloſis, non procul Monſpellio ad patibulum via, & tractibus maritimis. Pulchella tota & tenera, ramulis & foliolis numeroſis, humi reptātibus, ex pallido virētibus, non diſſimilibus aut diſparibus Herniariæ, ſed lacteſcens, vtī duæ ſupe- riores: & ſimile ſemen, thecam & flores, ſed cuncta mi- nora.



νίχτιον, ῥόδον δάφνη, ἢ ῥόδον λευκόν. NERION, Oleander, Laurus
Roſea, & Rhododendrum purpureum & album.

{ Gal. Roſage.
Ger. & Belg. } Oleander boome.
Ang. Oleander.

Mat. Effi. 1103 NYMPHÆ Nereides fortæſſis huic nomen dederunt: apertius alij Rhododendrum, quaſi arboream roſam, vel Rhododaphnem, id eſt, Lauream Roſam, vocitarunt. Non admodum frequens, niſi tepidioribus ad meridiem mareq; vergentibus fluentorum crepidinibus & littoreis, cuiuſmodi ad Olbiam Galloprovinciæ, Genuam Ligurum, & Lybornam arcem maritimam Thuſci Tyrrheniæ maris, vbi fruticat ſparſis latē ramis ſur- rectis, in alios minores diductis, & denſo ſtipatu foliorum amictis, quæ Laureolæ vel O- leæ anguſtiora, longiora ſunt, Laurinis anguſtioribus, acutioribus. Siliquas biſores & lanu- gine pappoſa quadantenus vicetoxici farctas: ſemine fuſco, longo, leuiore. Flores roſea, diluta, purpuriſſa nitēt Auguſto Amygdalinis aut Mali maiores, quos interdum rubellos, interdum albos memini tum in hortis Italicis, tum in maritimis. Tota aſpecta lata, eoq; in ſeptentrionalium hortis coli ſolita: alioqui vſus aſpernendi, aut mettendi, niſi aduer- ſum venena, ad quæ prodeſſe, authores ſunt, poſt antiquos, recentiorum quidam Præctici, nō ſecus atq; Vicetoxicum, foris etiam poteſt prodeſſe docente Galeno.

ALPIGENA CHAMÆRHODODEN-
DROS, odora.

QVA Oenoponte Tridentū, Veronamq; quis proficiſcitur, videre eſt interdū vniuerſa mōtis deuexa latera, iſto frutice, quaſi tapeto purpureo operta, præſertim Iunio, Iulio: quū flores eminus coccineo emicāt fulgore, cōpaſti racematim, puſilli, foliaq; per- cennia purpuræſcūt rubētq; Xerāpelino cōpluria, rigida, craſſa, deſa, buxea, & Rhododēdri multò

STIRP IV M aduersaria noua.

155

multò minoribus, breuioribus. In sarmentosis, præduris furculis depressis, sesquipedem, & duos altis: sed alicubi penè accubantibus saxo, vel glariæ substratæ. Pinguis est tota, suauis odoratu, suauissimòque aspectu. Alpini illiç Italo-Germani *Alprosen* vocitant. Bacculas Asparagi, vel Taxi pares & concolores, Septembri edit.

ALPINA ALTERA.

CELSI & rigidissimis cautibus huius quadatenus effigie, floribus purpureis, perquã exiguis: Ericæ foliolis perennantibus, nec deciduis protenit: humilis tota, à nobis tantum siccata aridàque visà; eoque minus accuratè descripta.

MONTANA ALLOBROGVM *Lentiscifolia, Chamæcassolia, vel Oleastrifolia, minus odora, CHAMÆRHODODENDRYM.*

PEDem etiam, siue cubitum fruticat, ligno-
fiore, crassioreque multò stipite, & furculo
recuruo, brachiato, rugoso cortice, & intus li-
gneo; Lentiscino, vel *Gagel* Germanici: folia
planè Oleastri, aut Lentisci leuore, colore, mag-
nitudine, rigiditate, crassitie: supernè virentia,
subtus ex pallore ferruginea, ex vno principio
ferè per cacumina exorta, proximè fructuum
corymbaceas umbellæ, eleganter quinque par-
titis apiculis, coronata, Rutæ modo ostentant:
flores perpulchri sunt copiosi, Chamærhododē-
dros odoræ similes. Cunctus frutex est gustu
nonnihil aromatico, plusculum astrictionis, &
aliquid moderatè calefactionis retinet: tempera-
mento Lentisci, & ferè gustu, non-nihil odoris,
attritu non pinguis.



CHAMÆDAPHNE, siue pusilla *Laurus*, an-
Germanicum *Mezereum*, an-nun potius nostrum
Chamærhododendrum.

ET huic pariter Lauri effigiaturam vindicat nomenclatura Chamædaphne, id est, hu-
milis pumilæque *Laurus*, cui duos nouimus affines vultu frutices, alterum Germanicum
vocatum *Mezereon*, alterum nostrum dudum descriptum *Chamærhododendrum*. Sed
vtra alteri præferenda sit, ambigimus, propter nonnulla quæ ipsi nobis obieci-
legendum, quæ de viribus Chamædaphnæ à Dioscoride, Galeno, & Paulo produntur:
alioqui aptior Germanica foret: fruticat siquidem binum ternumque pedum, ramulis
firmis, sequacibus, cortice & foliis obscure viridatibus, & Laureolæ, vel Ligustri, & Oleæ;
secundum quos Persicæ flores subpurpureos, minores, & grana Piperis rugosi, nigri, iam
vietæ maturitatis, per initia tamen viridia; deinde ruber euadit cortex, qui exemptus
detegit medullosum granum Canabino, aut Lythospermo maiori simile: gustu ferui-
dissimo, & fauces, æsophagumque adurente, diu multumque vexante impressione, post-
quam deglutiendū dederint agrytæ nummipetæ forenses, vt assolent, rusticis spectatum
confluentibus, aut potius illustri alicui potori, quem vinum nequeat temulentum face-
re: nam qui vel vnum granulum vorarit, nequit quin & vsque vinum inuergat, quasi in
ventriculi virem, gutturque collunt, donec Baccho temulentiaque desipiat. Proindèque
vocitant Piper Rusticum, & Gnidium Granum Pharmacaria incitia, quam fouit iam-
diu Senensis, decipitque deceptus, qui hæc plantas supina ignauia discendi & inue-
stigandi

stigandi, sibi incognitas, horum prorsum confudit. Plurima hæc cum in Germania, & Heluetia, tum in Allobrogum, & Lygurum, Taurinorum, Delphinatūque montibus & collibus Syluosis, opacis. Martio floret, semenque maturat rubrum Angusto. Non minus hæc per aluum deiecit crassum viscidumque Phlegma, & intestinorum ramēta abradit, quam Laureola, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim vtuntur etiam Medicorum quorūdam præcepta Pharmacopœa, quare facit hæc virium expensio, vt minus quis putet Chamædaphnō legitimam. Quippe quam Dioscorides *καταλγαις*, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis commendat, vt interpretes vertit. At si vlla ratio iniri queat, qua tam feruida planta pro Dioscoridis Chamædaphne agnosci queat, ea interpretatio ne commodiore & veriore videtur sita, namque *καταλγαις καὶ στομάχου ἐνκλασις αἰγυς*, id est, capitis doloribus & stomachi vstionibus accommodat, vertas, non incommodo sensu intelliges, folia tusa admotaque capitis dolori, puta à frigore, vel flatu, mederi: Stomachique vstionibus faciendis adinoueri, ad diuturnas fluxiones sistendas, aque stomacho auertendas: vt Paulus ex antiquis docet faciendū, libro sexto de stomachi vstione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri agarici, frustilla, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque foliis huius vti sunt antiqui. Sic Dioscorides magnum præsidium putat Arabicam vocatam vstionem à Græcis, quæ fieri solita fuit spirillis caprinis Oleo feruenti immersis, & pollicis cauo inultis.

DAPHNOIDES, sine Laureola.

VT nomenclatio, sic natura huius, prorsum pusillam Laurum imitatur, frondibus paulo superius quam à medio caule sursum versus obscure virentibus, nitentibus, crassis, densis, Laureis prorsum, semper virentibus, & Bruma, quemadmodum viscus, flores promētibus densos, multos, quasi oblongis, gracilibus, stellatis, calathis ex herbaceo albos vel luteolos: bacculis media estate virētes, deinde maturitate assequutas, nigras, Lauro eadem, sed minores: ramis flexilibus, pluribus, binum aut ternū cubitorū, cortice obductis perquam tenaci & laceratu difficili: radix longior, & durior, durat etiam in hortis facile perpetuo frondium virore vegetiore quam Laurus, quam adeo tota præ se fert, vt etiam plebecula vix conspectam, pusillam distitet Laurus. Vbiuis ferme Germaniæ, Galliæ, & Angliæ, præsertim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimisquam nota, vt mirum sit, Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse: certo inditio non tam negligentis, aut contemptus, quam ignorationis: quippe figurā, quam nullis floribus dat, quemlibet alicuius arboris (fortè Mizerei Germanici) surculum præcisum refert, quam Laureolam, cuius mutilam descriptionem, vt quam subdit proximam, & plurimas alias, exscripsisse videtur ex istis authoribus meritisimis, quos hic lacerat, & inscitia traducit.

Laureola Pin-
genda.

THYMÆLEA, grani Gnidii.

COGNATA figuræ & naturæ sunt Chamælea, & Thymelia cum inter se, tū illis dudū descriptis: sed frequentior, notiorque Thymælea, quæ non modò in Galloprovincia & toto Norbonensi littoreo tractu, sed etiam Italicis montibus longiusculè à mari Thyrræno disitis, vt sunt Mons Diui Iuliani, & Pisani, Lucensesque colles, vbi nusquam Chamæleam vidimus. Quin etiam in Occiduo Oceano, Galliæ Xantonice, ad Rupellæ Insulam, *des Ratz*, vocatam, id est, murium, (quorum Ostreis & radicibus victitātium est alumna illa angusta Insula) fruticæ Thymælea multat, cuius nomenclatio effigiem naturamque quadantenus adumbrat. Videtur quippe Thithymelia, quasi Thithymali & Olea mixta facie: Est namq; virgis, rectis, multis, sesquicubitalibus, partim ab stipite, partim ab lignosa radice, habitu, sitūque Oleaceis angustis foliis, admodum viscidis, pinguibus, inter Thithymalū, Cyparissiam & Paralion, corticoso amictu tenaci cinereo, à summo ad imum deglubenti sequaci, instar Laureolæ corticis: summis in virgis flores albidī, pusilli, frequentes, lunio stellati: Angusto demum grana, antiquis GNIDI A vocata, nouena,

uena aut dena, primulū viridia, deinde ex flauo rubētia, tenella cuticula, succo aqueo turgida, vñ medulloſū gygartū amiciēte, foris nigrū, intus alba medulla, in qua feruor ille quæſitus in Gnidio grano, vt expendenti verba Dioſc. liquet, ad cuius imitationem perperā edoctus cū Pharmacopœorū plebe Commētator, qui hāc nō nouerat, Mezerei Germanici granū feruidius multò, & planè cruſtas inurēs, tum foris, tum intus, nobis, qua ſolet fiducia, ſugillata tum Dioſc. tum recentiorū omniū doctorū ſententia temerè obtruſit. Nam nō coccū ipſum rubrū dat, aut purgare aſſerit Dioſc. ſed Pericarpio cōcluſa medullæ interiori, cui vñ (albam nuncupat) vim deiſciendī Phlegma & cholera attribuit, & abundè explicat, quādo viginti granorū internā partē, quæ ſanè medulla eſt, Pericarpio gygarti nigro ſēpta, præcipit dare. Vnde nec ipſas plantas, niſi ſuperba animi inductione à Senenſi incertas, & codicis Dioſcoridei nulla niſi truiſi leſione, cuius, tamen admodum accuratum vindicē ſe fore voluit videri initio, aſſertas, magno multorū detrimēto, qui illi freti commentis ad Hydropem ſunt uſi, rati eſſe Dioſc. veras Thymæleas, Chamæleas, Daphnoides & Chamædaphnes, quarū nullā nec legēdo quidē, nedum facie, vel vinibus cognitā habuiſſe tantum hiatore Senēſem, cui libet vel Pharmacopœo iam liquet.

MEZEREON *Arabum, Chamelæa tricoccus.*

FERVIDI etiā ſqualidū; ſoli, ſaxoſi, maritimi, Chamelæa, id eſt, humilis Olea vel Oliuella nuncupata, ab ea quā admodū expreſſa eſt ſortita cum Olea faciē, ſoliſ læuore, habitu, ramis, ſub quibus in Oliuetis cultis prope Frontignanā Norbonē vberè fruticat, nec niſi collibus vicinis, arētibus, ſaxoſis, ſponte enatā, perinde facile eſt reperire: nec quidē in Galloprovincia, vbi tamē naſcitur, multo prodit prouētū. Ramorū bicubitaliū ſobole magis ſarmētola & ruſoſa, lignoſa, intorta, quā Thymelæa. Folia latiora, viridiora, nigriora, lenticulis lōgiora, anguſtiora, propius referūt Oleaſtrum & tenuiſoliam Phylereā. Flores luteoli, pallidi, Laureolæ minores, eſtate æſtūq; ſummo: Auguſto verò promit virētes, demumq; rubētes bacculas tricoccas, Torneſoliſ ſive Heliotropij verrucarii, aut Tithymali ſimiles, niſi quia oſſiculis eſt præduris, lignoſis, guſtātī medullam ſeruidā & præſiccā exhibēt: radix lignoſa, inutilis. Magni tamē ſucci uſus totius plātæ etiā hodie, præſertim Mōſpellij, vbi Pharmacopœi præſſū ſiccātūq; habēt, monēte primū Rōdel. cuius imitatione & nos ſepius deſati ſucci recētis 3. j. & 3. ij. dedimus per ſe, & aliās alijs catharticiſ Hydragogis mixtas, per bono ſanè euentu: ſed nō admodū multū excernit, nec vllō effreni motu, vt ſolēt Laureola Mezereon Germanica, Gratiola, & alia. Quin perparū, aut nihil interdū, mouet Chamelæa ſuccus cōcretus, niſi remixtis quibūſdā lenientibus, aut ſimilibus catharticiſ. cuidā arthritico habitiori, toroſo, procerō homini, tres dragmæ nullū excrementū mouerūt. Pueris etiā datus, nec tormina, nec vomitiones facit ſed aquas educit & ſerū. Admotus pubi & abdomini Hydropico, nō vllū præſtātius ad vrinæ proliciēdas, quo modo lubētius vtebatur Rōdel. Sic etiā Thymelæa ſucco, qui tamen diſſicilius præmitur & elicitur, propter glutinoſū virus: nec niſi tepēte affuſo vino, aut cō ſimili quopīā liquore, vt faciūt dum ſuccū Braſſicæ marinæ educūt, quilibet vti poterit. Tundūtur tenella ſolia, flores, diu & vehemētē, ſepiusq; tātillū tepētis vini affūdatur inter tundendum, tūc prælo ligneo vehemētius vrgētur, dum trās colum expiret: tunc igne lento aliquādiu bullit, dum Loch craſſitiem aſſequitur. Demūq; Soli ſeruīdo obiectum du reſcit, addito ſaccharo, ne muceſcat: ſicq; cōchis recūdebamus nos illic dum ageremus.

O. i.

CHA.



PERQVAM similis gustu, facie, viribus, folijs, & virgultis ligneis, gracilibus, concoloribus, rugoso cortice amictis Mōspelliacæ Chamelææ: facile tamē ab hac discerni potest, fructu nimirū Mezerei Germanici, Oleastri, aut Phylereæ nec tricocco, & folijs summis, non atro virentibus, sed tenui, molliq; incana lanugine obductis: quemadmodum & flores pallentes ē lagenulis argēteis, Stramonij similibus, sed minoribus, conspiciuntur. Commanducata fauces inurunt, non secus ac Mezerei Germanici grana. Ideoq; etiam plebs, Rusticum Piper vocat: Masticata folia lentorem remittunt, vti Soldonella, Thymelæa & Chamelæa Norbonensiu. E Lemanni & Allobrogum vicinis Alpibus solū habuimus.



ALYPVM Montis Ceti Norbonensium.
Herba Terribilis vulgo.

NOMINIS ducta videtur intellectio, contrario quā se habeat planta sensu: Alypum quippe quasi indolens inoffensumq; & expers molestiæ remedium, Sic fella Græcis glycea, siue dulcia, & Holoſtium, quæ herbula est teneriuscula, per antinomasiā dicta fuerunt. Sed malim coniectari ἄλυκον, id est, fassam, vel maritimam, plantam nuncupatam, quia secus mare, vt Dioscorides memorat, oriatur. Tametsi oportunum sit calumniæ, statuere vllam certam plantam hodie pro vero Alypo, propter Arabum & Græcomaurorum scriptorum diuersas, aut planē contrarias opiniones (quarum quæ Actuarij, album Turbith cum Alypo vel Alypia Dioscoridis idem autumat: Mesuæ verò Thapsiam vel ferulæ genus lacteū quoddam, deniq; Serapio Tripolium) tamen cū nullū hodie nostra norit ætas, cui Dioscoridis Alypū assimilari queat, neq; plantā vllam habeamus quæ eque bene, imō vllō modo (præter fæculas) Alypo cōgruat, siue lineamentis, siue efficacia purgandi, atq; hic frutex maritimus: sanē hanc quō minus asseramus genuinum Alypum, vna notula non tam obstreperit, quā deest, foliorum nimirū: quæ non fuerūt expressa à Dioscoride, aut fortassis fuerūt labecula codicis peruersa: mutata nēpē voce μαχατεος in υπερότεος, vt sit nō sub-ruber, sed sceniculaceus frutex. Hincq; Mesuæ suū Turbith ferulaceum fecerit, vel Thapsiam cum nonnullis, qui eius radicibus quotidiano vsu in Gallijs & Hispanijs purgationes pituitæ, crassæq; & Melancholicę blennæ moluunt. Verū, si vti nonnullis eruditissimis persuasum fuit, Arabes vocitarūt Turbith, quodlibet phlegmagogum, paulō vehementius pituitam educens, meritō & istū fruticem, quem pictum damus, possit quis Turbith



vocare, nec enim minus malè ominato nomine quàm Turbatorium Turbith vocat ista^m herbam Terribilem vulgus Norbonensium, vbi impostores valetudinis cauponatores im-
pij, atq; tribades mulierculæ terribiles, vt vocant, illic moliuntur purgationes, istius terri-
bilis fruticuli folijs, floribus, & semine. Siquidem virgultis crebribus lignosis, sesquicubi-
tum & duos altis, cortice tenui, ex fusco purpurascente, densè cingentibus concolori-
bus, numerosis ab imo summo tenus folijs exilibus pusillæ myrthi similimis, minoribus
Thymelex aut Chamelex. Singulis in virgis summis singuli insunt tenuissimorum florum
purpurascantium glomeruli, nonnihil similibus sed exilioribus & breuioribus delicatio-
ribusq; Scabiolex staminibus. Radix digitum crassa, fusca, lignosa. Cuncta planta perquàm
amara, & inamœno Thymelex aut Chamelex gustu, aut vehementiore, etiamnũ dum hæc
commentamur, sexto abhinc anno, auulsa in monte Cæto Frontignanæ & Mafsilæ, saxo-
sis præruptisq; vtrobiq; ad mare & Austrum deuexis natalibus: quam si Senensis prorsum
siluisset, nec pingendo deprauasset, & melius suo honori lectoriq; consuluisset: hanc enim
capite de Tripolio, sibi etiam ignoto, vbi multum ineptit, & Alypum plantam tenui-
bus ferulæ folijs esse dicit, non istam, Dioscoridi imponit, Brassaulæ & alijs doctissimis
conuiciatur & obtrectat, argumentis ab illorum monumentis mutuò sumptis, etiamq;
vestigatore ingenuo, qualem immeritò hætenus sese nobis gloriatus fuit, indigna pro-
sum & recordiæ plena verba illa inseruit: Nō referre cuius plantæ sit radix Turbith Alex-
andrinum, cū eius facultates à Medicis optime sint perspectæ, Sic caprimulgum, scam-
nidicum, vel aratorem, non commentatorem, loqui decet.

ALEXANDRINVM Officinarum Turbith.

PAR fermè controuersia de Turbith atq; de Hermodactylis, quarum plantarum vsu
aut certè possessione non videmur carere, veriora tamen quænam sint, ambigimus,
quia ambigux fuerunt sententiæ antiquæ. Ac de illis suo loco, hic verò pauca de Turbith.
Arabica Semimauræ Orientalium nomenclatio vaga est, vt non pauca illius gentis vo-
ces, signare quamlibet lacteam radicem vehementius pituitam deturbatẽ, voluisse vi-
si sunt, propterea vt quælibet vna magis arrisit, sic eam arripuit.

Est enim Turbith vel Tur- petum vel Terbeth.	{	Serapionis, Tripolii radix Diosc. vt liquet è descriptione.
		Mesue, Herba ferulacea lacte turgentis.
		Actuarij duplex { Album, quod interpretatur auctor Alypum Diosc.
		Alterum, Pityusæ radix.
Officinarum triplex.	{	Venetorum & Alexandreum videtur, Scam- monij antiocheni species.
		Cineritium, à colore, Radix Thapsie vulgaris
		Nigrum, deterioris quidem nota, sed alioquin eiusdem cum Antiocheno speciei.

VLGARE Officinarum Alexandrinum cognominatum diu nos torfit, cū enim
audissemus de Guillaudino Patanum Alexandria reuerso, nihil aliud esse Turbith
Alexandrinum, quàm Myrsinitem Tithymalũ, omnes Tithymali species erutas, siccatasq;
habuimus, inspectione & exploratione expendimus, sed non ita habere depræhēdimus.
Etenim, Tithymali ferrati quæ similior est Turbith Alexadreo, cortice est rugosiore, tristi
ore aspectu, fungosa, læuioreq; concretionem, gustanti virosior & feruidior, minus firma, &
quæ facile non assulatim aut secundum filamenta in longitudinem dehiscit, duraq; non
est, nec perinde purgat vt Turbith, cuius exemplum sumi potest in Benedicta laxatẽ, cui
miscetur Esulæ radix, & tamen blanda benedictaq; habetur.

Porrò sub finem capitis de Scammonio, de Turbith quid & quor coniectemur radicem
Antiocheni Scammonij, dicemus.

Quodq; superius monuimus succis Chamelex, Thymelex, Brassicæ marinæ, & alijs vsu
O. ij. venire,

venire, vt minus, aut fermè, nihil per se purgèt, nisi remisceantur imbecillioribus, sed lenientibus, aut alio modo purgantibus: id idem admodum perspicuum fit in hac radice Turbith. Siquidem non rarò meminimus datis infuso ternis, quaternisue 3. cuidam non admodum aluo arctæ, nihil penitus eduxisse, in aliis excitasse quosdā torminosos murmurillos, aliis aluum semel, bisue citasse. Quin nec in substantia quidem admodum purgat: vti in electuariis Diaturbith, Diaphœnicum, de Citro Solutino.

TARTONRAIRE Gallopro. Mafiliensium.

NOVA nostræ ætati, iuxta ac elegans aspectu hæc etiam maritima Cathartica, eoque vernaculo vocabulo Mafiliensium, Tartonraire vocata, ab exuperanti effreniq; purgandi vi, quæ non rarò dysenterias fluxusq; immoderatos alui accersit. Præsertim si quis minus peritus, huius folia in puluisculū ducta, vel quopiam liquore diluta, propinarit: vt factitabat ille necator Thmiso, qui nobis primum eam, eiusque vires, vt dicebat, arcanas detexit. Circum Mafiliam locis ad mare deuexis, præsertimque collem vulgò Mond-rond vocatū, squalidū, aridū, glareosum, plurima fruticat, tota pulchella, tenui incanæque lanugine obsita, candidis, nitentibus, argenteis foliolis crebribus, ab imo ad summū Chamleæ, & Thymeleæ: prorsum sita & magnitudine Alypo proximè descripto paribus: edit virgas rectas, crassiores, vicienas, tricenarum, aut plures, admodum lentas, & fractu contumaces, nec adeò lignosas, cubito longiores, flosculos in summo pusillos, & (ni labat memoria) pallidulos ex albo, semine pullo, rotundo Arthemise, aut Ambrosie: radix prolixa pedè, simplex cortice albicæte foris, intus candida, lineo aspectu, & fibris dura, lignosa, gustu non admodum calida, nec amara, nec ingrata, nonnihil tamen caloris impressi postremò relinquentis, & quadantenus Turbith Alexandrinum, siue vulgare, referente, inodora, tota laetis expers.



ESULA RARA in Lio Venetorum Insula.

COGNATIONIS cōsequutione sibi hunc vendicat locū hæc superius proximè descriptas, & Esulā, quam vocant maiore, siue Pityusam: cuius est hæc Venetis Medicis, & Pharmacopœis species: eoque hac, vulgatæ communis Esulæ vicem suppleant in Benedictæ confectione, & pilulis Catharticis: purgat etenim non segnius Esula communi, eoque putabatur à quibusdam Alypum Dioscoridis, & alii, quàm bene, viderint ipsi, nigrū Turbith, quæ Pityusam Actuarii autumat, opinantur. At Pityusa non hæc est, sed perquam similis, ideo vtraq; Esula à nobis vocatur. Sesquicubitum duosque longos caules, fungosos, rugosos, fuscios, crassos minimū digitum, ramulis multis diuisos emittit, pedaliibus & foliis situ binis, per interualla maioribus quàm Terribilis Alypi, ad Glycyrrhizā proximis, lentis, pinguibus Thymeleæ: flores pendulos, promëtibus pur-



purascentes

STIRP IV M aduersaria noua. 161

purascētes, & fusco obsoleto aristolochiæ, vicetoxici effigie. Radix foris pulla, intus villosis lineisq; pelliculis, cuiusmodi in Tartonraire, cinereis, sesquicubitum longa, digitum minimū crassa, succo distenta: vniuersa planta lactescit, & prorsum Tythimali parali, cui conuictrix fermē semper visiturā quipatur. Sed non alibi quā litoribus, & Insulis sinus Adriatici facilē reperitur, & in Lio Insula exigua, quæ obex est maris allisionibus.

ἀειζωον. *SEMPERVIVV M* siue *Sedum maius crenatus Myrthifolium.*

Ang. Honfeliike & Sengrene.
Ger. Groß Haußwurtz, & groß Donderbart.
Gal. Ioubarbe grande.
Bel. Donderbaert.
Ital. Semperuuo maggiore.

NITIL vspiam gentiū vulgatius, vsitatus, viuatiūsiue, Sedo siue semperuuo, sic nuncupato, de perenni vegetoq; foliorū virore, quæ hyeme & æstate in parietibus vel imbricamētis, etiam nullis, vti videtur, radicibus nixum, aduersus quaslibet cœli impressiones tuetur: Cessili circinataq; basi & ortu pertinacius hæret subgründijs numerosa folia squammatis digesta, leuore succoq; pellucida, admodum carnosa, mucronata, & linguas pisciū imitata: caulis promitur rectis versibus stipatus, qui flores Iulio & Augusto radiatos, numerosos ex fusco purpurascētes, & rubellos gestat. Huius aquam stillatitiam febribus curandis, præsertim tertianis, & Causionibus propinant muliereculæ, edoctæ aliquis monitu & imitatione: nam non paucos curant.

ΑΛΟΗ. *ALOE.*

Ger. } Bitter Aloes. Gal. Perroquet.
Bel. & } Ital. Aloe.
Ang. }

QUIA in maritimis Aloes sponte nasci proditur, non abs re quis suspicetur nomen illi factū à sale vel salo siue mari, cuius afflatu imprimis gaudet, fortē itidem & nonnihil foris salsedinis continet, vt cætera maritimæ. Peruagatæ cognitionis & vsus, vti antiquis, etiamnum succus, ipsaq; planta: quæ plerisq; Europæ locis in hortis pensilibus scelericiter, non secus ac suis natalibus, in sabuleto depacta adolescit, floretq;: sed quæ in Pisano Hetruriæ vireto, & Massiliæ superioribus annis, proximē Nouum portum in Præfecti horto visebatur, meritō nonnullis differre à communi altera visa est. Nam præterquam folijs multo maioribus, bicubitalibus, vnciam & sesquiunciam crassis constabat, tum mucronem extremo singulo folio ostentabat, magnitudine, rigiditate & colore vnguis Aquilini politi, non adeo adunci. Cætero item ambitu rostellæ multo minora, pari prope intervallo digesta. Caulis bicubitalis, & tricubitalis, digitum crassus, Hastulæ Regiæ, in quo flores carulo purpurei è calycibus oblongis. Folia gustati minimē aut perparū amara: cætera alteri similis, & eadē fortē, vt putamus: Neutri enim insignis amaror, nequidē recentī ex Hispanijs in Flandriam, Angliamq; allatæ, vbi tamen Aloes factitari dicitur. Quia semper virens est Aloe, Aizoon vulgo hodie Græcorum nūcupatur: succus nondum solibus percoctus, vt Brumali tempore, minimum amarus est: quod cæteris succo multo aqueo obrutis euenire videmus, vt ignauius multo per initia sapiant, deinde maturitatem adeptæ, expressiorem saporis formam adipiscantur: sic Lactuca menstrea dulcis est, trimestris florē & semē promens, amara: Portulaca fatua initio, adulta acida. Succorum prima laus Succotrino, quæ Venetijs, si limpidus & lucidus sit, ex rubro fuluescens, emunt ducato, singulis libris: vbiuis Hepaticus infimi precij est.

Iam haud opus est rixari, aperiāt ne ora venarum an claudat: quando innumeris ferē periculis factis certum sit, foris admotum claudere, & sanguinem sistere, intrō verò sumptum succum, illis præsertim qui hemoroidibus vexantur, sanguinem attenuare, calfacere, deducere ad venarum oscula, ipsaq; adeo vasorum extrema referare, non secus atq; alij succi non pauci faciunt, vt Porri, Myrrhæ, & Vrticæ, quæ nihilo secius calida & sicca sunt.

O. iij.

SEDVM

SEDVM MEDIVM teretifoliū, siue minus Semperuiui Officinarum.

Ger. Klein hausz wurt menle, & Klein donderbart.

Ang. Trickmadam.

Gal. Petite Ioubarde, & Triquemadame.

Bel. Kleyn donderbaert.

Ital. Semperuiuo minore, seu Pignola, à folio tereti Pinei.

Eff. Fusch.
Epith. 18.

ETIAM iisdem natalibus admodum frequens & notum prouenit istud: ramulis à radice perquam exili multis, gracilibus, edentibus foliola angustiora, rotundiora, minor, teretia, carnosā, mucronata, acuta, Salicorniæ vel Kali colore & modo: flosculis aureis, stellatis: tota eiusdem figuræ & facultatis atq; maius sedum.

VERMVCVLARIS. CRASSVLA MINOR Officinarum,
siue ILLECEBRA maior.

Ger. Klein hausz wurt weibele.

Ang. Wylde prickmadam.

Belg. Bladeloosen, & Dapecullekens.

Fusc. Epith. 19. SEPISSIME etiam hæc colligentes fallit propter natales eosdem, faciēq; adeo minoris sedi similem, ut mirum magis sit prorsum contraria pollere, nempe calfaciendi & vlcerandi facultate: tamen discernitur foliolis rotundis, teretibus, oblongis, carnosissimis & supernè retusis, mucronatis instar vermium, è totis ramis pendulis: flosculisq; pallidulis, vel albidis: demumq; quia non semper viret, eò ad Illecebram referenda videtur, cuius est facultate. Supina admodum negligentia Commentator noster nobis hanc fortè pro secundo Sedo dedit: nescius, ut vulgus ignarum, facultatum, & immemor verborum Dioscoridis, qui, sicuti monuimus capite de Telephio & Portulaca, quia nec sepe viret nec refrigeraret, non asserit hanc genus Semperuiui, sed tantum cognationis & similitudinis causa proximè subdidit, videriq; speciem dixit.

MINIMVM. ILLECEBRA, Sedi tertium genus non Semper virens.

Ger. Katzentreuble.

Ang. Stone crop, & Stone hore.

Gal. Pain d'oyseau.

Fusch. Effig.
Epith. 20.

ISTAM pusillam reptatricem pulchellā floribus aureis stellatis, vulgò notissimam vbiuis & Illecebram nūcupatam Pharmacopœis, Germanis aut Piper murinum, propter acrem exulcerantemq; gustū, quasi Aronis aut flammulæ, nullus vbiuis Italiæ, Galliæ, Angliæ, & Germaniæ nō nouit: pusillis namq; ramulis parietes saxosasq; moles & colles aridos amplexantibus, gracilibus, reptat sed potissimum gustu cognitu perquam facilis, & quæ inauditam socordiam Commentatoris arguit, inq; re herbaria parū exercitatum, vel mentis, vel oculorum acie, qui hanc tam valde vulgarem (tamen tsi idē ostētat ille frequēs) vbiq; Italiæ, Pisis accersat, Guini præconijs & literis assertionis, & quasi in lucem erutā, acceptā ferat. Quin in Dioscoridis lectione hæc salebra nulla est: ædū enim quamplurimis locis, non pilosum, siue hirsutum, sed densum rigidum vel compactum signare, capite de Britannica, Hypericone, alibiq; non rarò, reperias.

ARBORESCENS Gracum, Illyricum, & Anglicum,
siue maritimum.

MVLTI abhinc annis huius multas plātas Veronæ, Patavii, Venetijs, & in Hetruriæ hortis vidimus, cum admodū exoticasq; putabamus: Postea singularis fidiissimūq; amicus Vallerandus Donrez, passim in maritimis Sclauoniæ siue Illyriæ circa Dirachium virentem collegit. Nosq; demum in Sinus Bristoiensis Anglici Oceani Insulis vocatis HOMs, auulsiſſimus copiosum, sed in saxosis, nec perinde carnosum aut ramosum, tamen stirpitem ramisq; fruticat lignosis, duris, multis, lentis: folijs, paribus, & similibus, vulgare maius Sedum situ & ortu amulantibus, minus crassis: inter vulgare Sedum maius, Laureolam & Tithymalum ambigentibus.

Gracum

Varie
t is ar
boref
cētis.




GRÆCVM verò, quod & Illyri-
um, maius multò & speciosius,
ramis & cortice foliorumq; circi-
nato, per summa positu magis Lau-
reolam imitantibus, crassioribus,
tenerioribus, breuioribus, succu-
ētis, cubitum longis, in scapo pe-
dali & cubitali, lignoso Laureolæ
crassiore.

In Australis Angliæ Insula Port-
landia, pusillam, nò multū diuersā
ab istis forma, ortu, habuimus: sed
quia inter Tithymalos orta & dun-
taxat vna aut altera planta reperta

nobis erat, rati esse ex Tithymalis, aut ex istis prole degenerem, incertāq; stirpem,
nihil certi de ea prodere aui fuimus.

SEDVM PETREVM Montanum.

AVERNÆ Mindenis & D. Ioannis Mauri Allo-
brogum, montium rupibus & conuallibus hanc
pulchellam sæpius collegimus, nomineq; Sedi Petrei
donauimus, quòd saxis sæpius innascatur: folijs pu-
sillis vno exortu circinatim Sedi ritu, vel potius Co-
tyledonis minoris montani, sed multò angustioribus,
rigidis, quasi ligulis mucronatis, è quorum medio cau-
liculi pusilli, binos digitos & palmum alti, exeunt, exi-
guis flosculis luteis Sedi minoris onusti, quibus succe-
dunt clypeoli Thlaspi quadantenus. Cur hanc nò nul-
li Phyllon Dioscoridis statuerint nescimus: quum pro-
prior multò sit facie & ortu Sedi generibus, gustu astrin-
gente, exsiccante.



An CHAMÆPYTHIS maior Diosc. seu altera vermiculata Sedi effigie.

CHAMÆPYTIDES, quas natura si-
miles Aizois fecisset, & Dioscorides
iisdem assimilasset, hic annectendas duxi-
mus. Fruticat maritimis litoribus at-
q; insulis Angliæ & Zelandiæ, nec non in
squalidis campis Aralate inter & D. Aegi-
dij oppidū, non procul à Rhodani fluētis,
vberima perēnans, Vermiculata dicta, nò
nullis Anthyllis altera putata, propter ne-
cessitudinē, quam cum Aizoo habet. Sem-
per viret namq; inibi, virgultaq; promit
cubitū & sesquicubitum æquantia, crebra,
incurua, lignea, colore cinereo, folijs mul-
tis, densis, obscure viridatibus, & inter Se-
dum minorem atq; chamæpithim marem
medijs. Radix multum dura, fibrosa, Flo-
res obliti sumus, puto herbaceos, & meli-
nos, albicātes, muscosos, Oleæ. Salso gustu
& sapore succoq; Kali etiam procul à ma-
ri, nata, yti Aralate. Quam vt nouam, nec
notam, exercitatis ingenijs expendendam
magis proponimus, quàm verā astruimus.



O. iij.

CHA-


QVæreptæ vtilitatis, & tritz cognitionis vbiq; locorū prouenit Aluga vel Abiga, ab Abiete, propter odorē, folia, & flosculos Piceæ, Chamæpythis vocata est, mas seu terra Dioscoridi, nō prima, vt Cōmentator statuit. Sabuleta, arida, lapidosaq; vineta & oliue ta amat Norbonæ, vbi perquā odora, furculis gracilibus, hirsutis, inflexis, numerosis, Pini folijs vel Psyllij, minoribus, incanis, confertis, resinosis: exiguis interlertis secus flosculos melinos, Veronicæ fœminæ: Sed semine oblōgo, tereti, fusco. Germaniæ, Galliæ, & Angliæ ruri spōte peruia, sed paucis in locis: eoq; in hortis colitur, ad Medicos tamen vsus odore & virib⁹ ignauior. Radix fibris duriusculis, lignosis, amaro sapore, medicato, subacri, ne tiquā dulci, sed resinaceo, diuq; faucibus hærēte. Idcircoq; nōnullis Germanis *pergis myn nicht*: id est, ne mei obliuiscare, fortē dicta fuit: quod etymum dū Mathiolus à Germano Pharmacopœo, & Brassauola adductum erroris incusat, immeritō facit: & imperitius multō labitur, cum aliam vocatā *ye lenger ye lieber*, id sonat, quō diutius eo amātius, aut gratius, (quod Amarædulci siue Circeæ meritō quadrat) incitē in hanc transfert.

CHAMÆPYTHIS prima Diosc. odoratior.

MINVS nota hæc, & paucis obuia locis, magis tamen odora, collibus aridis & aruis æditioribus, Nicæ Sabaudæ, & Genuæ Ligusticæ, circum vibem Penem in Italia, fruticat, vt quidā affirmant. Quin etiam eandē vireta nonnulla Belgij sedulō colunt. Radice fibrosa, Sonchi, aut dētis Leonis minore: ramulos palmum altos, humi stratos, & foliolis septos, Semperuiiminoris, aut potius vermicularis, minus carnosus, sed incanis & hirsutis: in quibus flosculi ex melino albidī: Suauiore spirat odorem, interdum vliginosum, vti vsnea muscūsue Quernus, aut Cedrinus.

IVA Moscata Monspelij est, ANTHYLLIS Chamæpytoides.

QVæ in Oliuetis & aridis aruorū marginibus Norbonæ ac Galloprovinciæ fruticat, nec alibi temerē nota, Moschata etiā vulgò vocata fuit, cōtrariæ fragrantia, significatu (ironicē nēpē) est enim odora, sed olfactu minimē grata, nec Pinū redolēte, verē & odorata Chamæpytidi cognata, furculis tamē rigidioribus, sarmētosis, lignosis, sed breuiorib⁹: copiosa folia, latiora, lōgiora, leuiter incisa, Coronopi aut Psyllij modo emittit, pluri lanugine incana, inters flores maiores purpureos, & semē hirsutē stipatū Chamæpytidis. Ligneæ radix, gustu amaro, ingrata tota, & nonnihil stiptico, Absynthiū referente: eaproppter Kali species illa, aut potius Sedi marini fruticantis, de qua inibi dictū fuit, neutiquam ad rem faciet, si conferatur cum hac. Hirsuties, flores, color, odor, sapor, qui hic salsus non petitur, desunt. Adde odoris grauioris, & amaroris aromatici, non salsuginis notam: quam in medicamentis primæ commendationis ad conitiales plerisq; animaduertas, vt sūt Vngulæ Asininæ, Alcæ, & operculū onix dictum, multoq; grauiore odore, Castoreum, & huiusmodi nidore, potu & suffitu excepta, & quarum dotes sibi vindicat multō adhuc certiores.



Κοτυληδών. VMBILICI Cotyledon.

Ital. Cope, triuole, vmbilico di Venere.

Hisp. Scudetes.

Gal. Escuelles.

Effi. Mat. 1122 VVLGARIS iam notitiæ Cotyledon, sic dictum à concauo folio, acetabulum aut vmbilicum in itato, circinato, & nonnihil crenata obtusē, lauore plurimum glauco virente

virente, interim purpurascēte, crasso, carnosō, succulento Telephii, aut Cochleariæ: radix bulbeę Bunii Cyperi rotundior, aut fumarix Plinii, nonnullos pediculos foliorum & cauliculos teneros florum herbaceorum ex caliculis parit, in quibus semē Portulacæ, minus subrufum: gustu tota glutinoso Portulacæ, sed vix acerbo, insipida, frigida: non solum in Italia, Prouincia, Languegothia, sed etiam in Anglia occidua ad Bristoiā, plurima. In Francia tamen & Belgio, rara, nisi sata fuerit: exit autem fenuine, tota hyeme viret, marcescunt æstate folia.

COTILEDON Minus Sedifolio, Montanum.

MERITO hanc Sedifoliā appellamus, tātoperē namque cum Sedo quadrat, vt propiorne illi sit quā vmbilico, ambigat vulgus: eoque apud nonnullas gentes Sedum montanum appellitur. Rarior multo superiore, nec nisi quibusdam Alpinis Allobrogū & Pedemontii, Sabaudæque Ostensi valle vocata, & Minde-nismontibus Auerniæ & Germaniæ nobis visa. Maio & Iunio flores albicantes, minoris Semperuiui, in caule sesquipalmari plurimū vnico, ex radice fibrosa, nigra, tenui, per foliorum, quasi centrum, eunte: foliorum lingulas oblongas, crassiusculas, imitantium, & tantillum ambitu crenatas, albo vel glauco leuore, colore, carnēque Semperuiui, minoris gustu.




AQUATICA Cotyledon acris Septentrionalium.

NVSPIAM Italiæ vel Norbonæ meminimus hunc, in Anglia verò & Belgio & Normania admodum frequentem, riguis depressis pratorum conuallibus, & scrobibus, vbi torpuerunt per hyemem residues aquæ. Fibrias exiguas, multas, capliculósque teneros reptantes, humique fusos habet, folia peltata, ambituque circinato, & leniore incisura & obtusis dentibus: cristato medio centro, nonnihil depresso, vmbilicum imitante, sed teneriora: flosculi albi, penduli subter folia: Iunio & Iulio visuntur, gustu calido, acri, linguamque vellicante, inodoro: quem inscitia etiamq; penuria Cotyledonis indunt indocti Pharmacarii Populeo vnguento.

ANDROSACES Cotyledon Marinum herba foliosum.

QUEMADMODVM nominis etymo Androsaces, vel, vt nos putaremus, Hydrosaces, seri lotiq; in abdomine, quasi vtre, aliisque corporis ductibus, educationem pollicetur: sic videtur hic proximè Nympheas descripta à Dioscoride, propterea quia non nisi in aquis, & prorsus magna cum Nympheæ similitudine, tametsi multum dispari magnitudine crescat. Nec vlli alii, vt genuinæ, Androsace acquiescit animus, præterquam isti, ex Guino summę eruditionis professore Pisano: in Mathioli commentariis quadruplò maior (vti solent, qui imagines, non plantas viuas, viderunt) ipsa planta depicta, nectamen ab eo descripta. Perelegans est, sed perpusilla planta hæc vmbilicata, & videtur è genere earum quas parasiticas festiuè quis dixerit, propterea quia non nisi aliena quadra vescitur, cibo, & disco. Innascitur ferme semper dorsis striatis Chamæ conchæ, quæ humi obuoluta sit



ta sit vacua hospite suo Vesco apud Italos *Cape tondo* vocato: *Pedicellis* cirrissae, glabris, nitidis, exilibus, vncias binas altis, crebribus, surrectis, singulis singulū clypeolum medio centro fulcientibus, circinatum vmbilici, cum ouracis appensis in memoriam reuocantibus, vnde *Monspelliēses* praeceptores *Vmbilicum* marinum vocitarunt: notissima quippe illic *Piscatoribus* stagni *Magalonensis* & *Lateræ* accolis. *Frontignanæ* etiam ressuæ stagnantisq; aquæ salis innumeras plantas obruunt. E fundo quippe inq; aqua, non in aere, crescunt & viuunt vt Mathiolum pinxit. Virent enim primum ex squalido cinereoq; colore: Postea egesti vndis, exceptiq; litore, albescunt, vt conchilia & corralina vocata, quas gustu subfalso & amaro æmulatur: nec dubium quin vrinæ ciat, & materiam articulis impactum digerat. Semen nusquam vllum vmbilicis claudi non putamus, certe nunquam in multis milibus obseruauimus. Ventrem sistere scimus, vt hunc scrupulū eximamus docto & candido *Anguillaræ*, qui nescio qua de re *Senam* & *Cassitham* hariolatur verisimiles quia *emphyla* aut *aphyla* planè contraria nota legatur, potissimum quia alium foliunt, quod hic neq; expetitur, neq; verisimile sit: tota plantula siccora actu & tactu quàm calidior est, & multum diuretica, quare *Galeno* aut eius codice error, qui astruit humidā, ex *Egineta* & *Plinio* recte, ipsa expungendus.

Fuit quando *Tragum* iisdem fere maritimis oriundum, hanc *Androsacem* opinati fuimus, sed nos retinuit *Pliniana* versio, quæ accuratior hic, quàm quæuis alia videtur: delineat quippe sine folijs in cirris folliculos, habentem, & in his semen, albam amaram, in maritimis *Istriae*. Videtur legisse *Θυλάκιον*, non *ἐπὶ τῆς κεφαλῆς*, sed *ἀντὶ τῆς κεφαλῆς*, quasi dicat folliculum, pro capitulo, seu verterit ex *Dioscoride*: seu, vt verisimilius, vterq; ex eodem authore. Caterum Cortusi munus valdè leuidentis fuerit, si Morsum galinae vel Alsinæ, foliolis neutiquam nudam, non ex Syria, sed è veteri quapiam maceria decerptam, quis patefaceret Commentatori, qui proinde non ausus fuit oratione repræsentare.

Ἀνδροάχνη, PORTULACA Domestica.

Ger. Surgel.
Bel. Porcelayne.
Ang. Percehynne.
Gal. Pourpier.

QVAMVIS Ἀνδροάχνη scribatur, tamen Ἀνδροάχνη dicta potius videatur, ortu quod teneritudine quadā lata & carnosa luxurient, ramuli foliaq; albicent, quadā spumosa fuligine siue tenui quapiam aspergine cinerea, quæ in marina euidentius multo cōspicitur, vbi nec colitur, & aura spumosa asilatur quam Ἀχνη dicunt. Tribus autem differentiis, quot nouimus penè eadem facies est, præsertim domestica & sylvestris: quarum tamè contrariæ facultates & effectiones videtur principiis genericis differre, & stabilire nostrū docendi modum, qui figurarum priusquàm facultatū annectit seriem. Etenim quamuis *Dioscoridi* *Satiua* *Portulaca* refrigerat, *Sylvestris* tamen calefaciat, & eadem exulcerat. Nec tamen inficiandum, multas esse plantas, quæ quamuis polleant contrariis affectionibus, tamen eodem generis ambitu censerī debent, vti hæc marina plāta *Portulacæ* folijs, & facie, quam *Crithmum* *Dioscoridis* putarunt: nam nihil videtur illi obesse, aut deesse quò minus *Portulaca* sit. Caterum, non astringit sed refrigerat, legendum esse norit qui attentius caput de *Portulaca* apud *Dioscoridem* à carcere ad calcem iustrarit, ea enim illius prima & summa facultas, ideo *δυναμὴν ἔχει ψυτικὴν καὶ ὑποψυτικὴν* facilis namq; lapsus rerum ignaris amanuensibus. Et quilibet etiam ex illa vi, qua hæmediam dentiumve stuporem aufert, minimè aut minimū certè astringere deprehendere quit in quotidianis acetarijs, quū vulgo esitantur tenellæ *Cymæ*, & folia crassa, carnosa, *Thelephij* & *Scorpioidis* vulgaris: succulenta tota, rotundis teneris viticulis humi reptantibus, flore pusillo Sedi: semine in theculis seminis *Papaueris* nigri plenis cauli hærentibus.

SYLVESTRIS.

QVI

QVI Domesticam norit, Syluestrem non potest non nosse, quæ minor duntaxat tota locisq; squallidioribus, vinetis glareosis, viarumq; interdum stratis reptat: ramulis rubentibus, folio Oleastri, figura cætera duplò minor tota: sed gustu acidior, & non refrigerante, sed potius acri calfaciente, vt in Norbonensi agri vinetis & satis, vbi acrior multò, quàm in Angliæ, aut humetibus frigidis ad Septentrionem: quin etiam exulcerat, si Dioscoridi fides habenda, apud quem interpretandū *φυμάρις δάσεια* siue foliola firma quadam cum hirsutie esse: vt sanè sunt, *ωλατύρεα*, id est, latiora, quàm Domesticæ esse: neutiquam sunt, nisi sibi ipsis comparata, quia sunt breuiora & latiuscula, quasi rotundiora: aut sit fortè immutatio illa apud hunc qualem frequetem & Theophrastum latioris & angustioris folij, in Helenio, Phlomo, & alijs non paucis monuimus.

Τηλεφίου *FABA INVERSA*, siue *CRASSULA*, an
TELEPHIV M?

{ *Ger.* Wundkraut, Knabenkraut, foltz zwang, vnd foltz weyn.
 { *Belg.* wonden Cruyt, & Smeerwortele.
 { *Ital.* Faba grassa,
 { *Gul.* Reprise, Ioubarde des vignes, Feue espeffe.
 { *Ang.* Orpyne.

VA G V M & pluriuocū fuisse Telephij nomē, ex Crateuæ & Dioscoridis geminatis descriptionibus & varijs plantis accommodatis videre est. Crateuæ quippe notæ, vti recentiores doctiores scitè monuerunt, Scorpionidē, quæ Dioscoridis libri 4. calce penultima appingitur, exprimere videntur: nec sanè abs re, nam facultates illi inesse eximias ad *dissepulorica* & inuicta vlcera, non modò lectio, sed & animaduersio facti periculi crebra, testatur. Insuper duobus locis duas plantas Telephio nomine insignit, non parū tamen similes: alteram hoc capite, alteram libro 3. quam Romanis Illecebram nuncupatā dicit, utrāq; facie & viribus vulgò notā: *PRIOR CRASSULA* dicitur, quia folijs crassis, carnosiss, Portulacæ hortensis non abfimilibus, floribus albis, luteis vel purpureis in umbellis Drabæ: cætera prorsum Portulacæ similia, radix alba, carnosā, tuberosā compacta, Dentis Leonis bulbosā, aut Leucacathæ Dioscorideæ, vinetis, cultis, syluosis, marginibus, saxosis, Angliæ, Sabaudie, Galliæ, & passim alibi abundat. Hanc rigidi censores pro Telephio fastidiunt, & inquit calore & abstersione carere: respondent periclitatores, illam multis dotibus pollere, & plura præstare quàm quæ Dioscorides scribit: addimus nos, calorem illi non deesse, neq; siccitatem, quantā Galenus & Aegineta prodiderunt, nempe primi ordinis, id est, gustui vixdum perceptibilem: siccitatem verò cuiusmodi in Semperuiuo: Abstersionem qualē farinæ fabarum & Portulacæ, quæ tamen videntur potius lenire mucoso glutine, cum primo adpulsu linguam tangunt. Sed frustra sæpè monemus, istos defici modestia & peritia. Etenim si calefactione, siccitate, & abstersione, Telephia curarent vulnera, numnā id præstarent presentius, quæ multò tum calidiora, tum magis abstergentia sunt? Sed curata putamus tum potiunculis, tum puliculis, & fomentis ex ista paratis, ad acrimoniam saniei erodentis, & opus naturæ præpedientis retūdendam, ac cacochymiam corrigendam intus & foris.

Alternabatur Dioscorides, vt videtur, vtri esset ascripturus Illecebram Romanis dictam herbulam, Telephij ne generi, propter vsum & nomenclaturā: an semperuiui, propter faciem & figuram: & quia videtur optionem fecisse Lectori, vtrum mallet eligendi, nos Telephio ascribemus. Siquidem non semper viuut & vrit, atq; eadem præstare potest quæ Telephium, aut quæ in Telephijs & Cacoeticis vlceribus sanandis desiderantur: tametsi alio modo, vt exercitati operum exploratione norunt, idem affectus diuersis, & interdum contrarijs, expugnetur. Sic in vulneribus, capitisq; fracturis, vtimur calidis exsicantibus, vt Ifide, & de Minio, vel frigidiusculis, iaterdum humentibus, vt sanguine columbino & Rosaceo, ad mitigandum, digerendum, & expellendum excrementa à parte.

Math. depicta,
non descripta,
pag. 1305. **R**ECENTIORVM verò & Monspelliensium *Portulacæ foliam* Scorpioidem, vulgò sic dictam à siliquosis corniculis Scorponis caudæ instar reflexis, Galegæ semine plenis, doctiores, qui Telphij speciem coniectabant, non infirma ratione nitebantur. Est quippe folio *Portulacæ flore luteo*, non tamen albo, *Medicæ aut Trifolij parui, pratensis lutei*: gustu item & facultatibus non multum diuersis. Monspelliensibus cum satis, tum vinetis, Latrensis portæ admodum familiaris.

Crithmum Dioscoridis, an *Portulaca marina*?
 Empetrum, vulgò *Fœniculum marinum*. *Ang. Sampere, Perchepier.*
Cæpea.
Halimus.
Chrysanthemum marinum, *Math. Crith. tertium, vel secundum.*
Kali.
Salicornia.
Blanchette.

CRITHMUM, seu CRITHAMON, an Portulaca Marina?
Batis Plinij.

PLERÆQUE sunt maritimæ stirpes quæ Crithmi descriptionem quadamtenus designare valent, nulla autem penitus exploræ. Quod quidem non vt nodum in scirpo quæramus, scribemus, sed potius vt hæc tricas expediamus, quæ animum quò minus verum statuatur, irretitum tenent. Et paucis vniuersum negotium componi potest. Si statim lubet antiquis herbarum designationibus, vides hic fruticosam dici plantam à Dioscoride folijs pinguib. longioribus, & latoribus, quàm *Portulacæ*, albicantibus, salis, & cætera. Hæc descriptioni habemus plantam quandam, quæ melius congruit, quàm *Foeniculum*. Marinum, cunctis ferè herbarijs hodie Crithmum putatum, quod nequitiam *Portulacæ*, vt Dioscoridi placet, sed potius facie tota & umbellis *Foeniculo*, vt inspectio ipsa vulgus ignarum vocare docuit. Et folia non albeant, sed virent *Porraceo* colore: nec quia muria conditur & passim esitatur, ideo sit Crithmum habendum: etenim non pauca aliæ sunt maritimæ, quæ in acetarijs expetuntur, & muria seruantur, eisdem *Foeniculo* isto facultatibus pollere creduntur. At illa, quæ à similitudine *PORTULACÆ MARINÆ* dicta fuit, folijs latoribus & longioribus quàm *Portulacæ*, atq; albicantibus, pinguib. In fabuletis, adeoq; saxeis, maritimis, copiosa, cuius flores albi, herbi, Atriplicis: multò propior est vero Crithmo. Caterum, ineptiuscula audacia eius est quæ accumulandi tot species vni incertæ, cum quælibet earum longissimè à descriptione absit: alioqui cur non & tam multas *Kali* species, neq; descriptas, nescio an notas Dioscori non possit quis vnâ accumulare, & pro Crithmo vindicare: nam ferè omnes naucleis in cibum cedunt, nobis etiam in mare *Ligustico* acetarijs mansæ, penuria melioris cibi, non pessimi saporis visæ fuerunt.

Et sciunt exercitati, secundum Crithmum Commentatoris planè *Pastinacæ* aut *Eringij* gustum, odoremq; præ se se ferre, vnde *Arabum* *Secacul* opinionem fecit, vulgus *Pastinacam* marinam vocat. Vtrumq; litus superi inferiq; maris *Italici* hac planta scatet, ne non putet *Senensis* se munus *leuidense* à *Cortusiana* magnificentia accepisse, quod pueriliter solitus est iactare, & inculcare putidiuscula infantia. Tum *tertiæ* & *quartæ* speciei ab illo depictis, quid *negocij* aut *similitudinis* cum *Crithmo*: *tertij*, etiam flores *lutei* sunt, radiati, vt *Chrysanthemj*, quò retulimus: cætera eius delineatio, nihil ad *Crithmum*. Quartum demùm *montanum* est, non *maritimum*, gustu & odore *Eringij*, radice *similes* sunt, *Crithmo* valdè dissimiles. Hinc videre sit ea quæ *meris* assertionibus, non *rationibus*, aut *veris* inspectionibus, asserta ab illo sunt, eadem facilitate dirui, atq; stabilita fuere.

FOENICV-
LVM *marinum*,
sive EMPE-
TRYM *vulgo*
Sampere & D.
Petri Herba.
Math. Crith.
primū, effi. 489.
PORTVLA-
CA *Marina.*
Math.ulo Hali-
mus vulgaris.
Effig. 160.

Montanum E-
ringium recen-
tiorum.

fuere. Hæc si oculis & manibus versasses, vti nos fecimus, non tam futiliter asseuerasses sententias neq; veras, neq; perspicuas, quæ magno detrimento sunt non modò Tyronibus sed doctis quàm pluribus.

Κητώα CΕΡΟΕΑ.

CVM hæc eadem Domesticæ Portulacæ figura, vna aut altera vagula notula radice & coloris additis, quasi satis foret nota, & reddita illi facultates, quæ satiuæ consimiles sunt, mentione etiam incerta, de Asparago Myacanthino, quem proximè Portulacæ caput, apposuit Dioscorides : Videtur & hæc nihil aliud quàm hortensis, vt vox Κητώα testatur, Portulacæ species, quæ illinc huc irrepsit, argumento & methòdo hic non vestigandis. Eoq; Galenus fortè ratus è Portulacis vnam, eam tacitam præterijt. Marinam Portulacam, spurium Halimum, Becabungam, Crithmum secundum Mathioli flore luteo, deniq; medijs speciem huc licuit adducere, sed nihil libuit asserere. Neq; ingenuos dece t tyrones, cuiusmodi sumus, tantù sibi indulgere in Naturæ doctorumq; teatro, quantum sibi arrogat ἔυρος ἐφ' Pythagoras alter Herbariorum Senensis noster, qui vt solitus, hanc pro filio suo Odorico Melchiorio, pro ætate sua non imperito sibi missam, nunc tandem, cognitam asseueret: nec tamen vllam notam addat vel figuræ, vel naturæ, nedum locorum quæ nos certiores faciat, illù Capeam hanc adamusim suam congruentem certam exploratamq; habuisse. Hanc nos superius dedimus inter Portulacas,

ἁλμος HALIMVS.

ANNO 1563. Octobri mense, quidam Botanicus Italus, qui ex Sclauonia onustus raris plantis redibat, quandam locis maritimis lectam fruticem nobis spectandum dedit, Cisti magnitudine & modo, folijs Oleæ albicantibus, Portulacæ maring, siue Halimi vulgaris: sed semine & flore tunc orbus erat ramus, quem adhuc habemus Antuerpiæ. Hanc cuncti Herbariorum Senatus Venetorum Halimum affirmabant: Et Leo ille famosus agryta dicebat, se sæpius quosdam, qui in acetarijs teneriorem esitarint vidisse: cui ne nunc quidem magnoperè refragatur, nam falsa erat, & maritima. Sanè planta videtur esse falsa, vel nominis vel natalium argumento, Halimum.

Quid si negationem eximas, & dicas, Dioscoridem dixisse spinas habere, nam vt quid inter spinosas & vallatorias & finitimas, maritima cum sit, recenseret: nam quæ vesca sūt & holeracea secundo libro differuntur.

KALI magnum Sedi medijs folio, semine cochleato. Soede, Gallis.

QVAMVIS tres plantæ sint inter se congeneres & maritimæ, quæ Crithmum, vt dudum dicebamus, adumbrare possent: tamen nulla videtur antiquis nota fuisse, aut certè descripta, tantum abest, vt ex hisce SAL istud, vocatum apud Arabes KALI, ex istarum vna vsta, & quod mirum, fusa fieri pouerint, vix tacituri si sciuisent. Quare vt nomen, sic & plāta, & modus salis istius parandi, videmur Græcis recentioribus, aut Arabibus Philosophis Chymistis & yalurgis deberi, qui ex ista, quam argutè effigiatā damus, copia, per initia Autumni acervatum super scrobe, cui ligna insunt decussatim instructa, vt accensa meta herbæ Kali dum vritur & liquatur, inq; fundum scobris defluat, cogaturq; in glebam aut saxum pulli nigricantis, vel cinerei coloris, illi vocant Kali, vel SODE ad vitrum conflagandum in Italiam inq; Septentrionem ex Gallia Norbonēsi & Aquitania deferunt. Vrit non secus ac



P.i.


causticum

causticū. Hæc species & notior in maritimis Galliæ Norbonensis, vbi tum sponte, tū sata, cāpos maritimos frequentia, caulū rubentium operit purpura. Fruticat etenim caule cubitali & sesquicubitali, carnosio. Portulacæ concolori. Folijs item densis, angustis, fimbriosis, Sedi medij siue Semperuiui minoris teretifolij duplō longioribus, acutioribus, inter quæ semina Limacem pusillum spiramūe imitantia, colore fusca, folliculis Maluæ seminis ritu occlusa. Minus obuia hæc Septentrionalibus, imò nuspiam fermè.

BLANCHETTE Norbonensium, siue

Kali minus.

EO SDEM ad vltus sedulō colligunt maritimi coloni Norbonenses, ijsdem natalibus, folijs, & caulibus minoribus multō, minusq; carnosiss, angustioribus, nec ita rubentibus, sed ex pallido virentibus, vnde vulgo *Blanchette*, quasi Kali album vocatum. Semen exiguum, nigrum, lucidum, Vrticæ aut Acetosæ. Non solum calidioribus regionibus hæc, sed etiam ad Septentrionem Angliæ, Normaniæ & Belgij familiaris.



SALICORNIA, siue Kali geniculatum vermiculatum.

Ang. See grape.

MVLTQ frequentissima ad quolibet maritimas oras tum Oceani, tum Medirerranei maris: sed effigie multō rarior, & cui folia videntur teneri turiones ramulorum: semen nullum. Sunt enim è radice fibrosiore quā plures cauliculi bicubitales, recti, geniculis multis donati, extremis quasi folijs crassis, pinguibus, carnosiss, teretibus, rubentibus, per crebros geniculos insertis, & pyxidatim, quasi alabastriculi, quadā cum Equiseti similitudine, & cornua recta obtusius mucronata imitantibus: gustu non insulso, nec temperamēto aut vsu dispari à cæteris, verū vbiq; neglecta.

KALI spinosum Capite de Tragano.



LITO-

STIRPVM aduersaria noua.

171

Litoren CHRYSANTHEMV *M* flore Bupthalmi aut Conise, folijs
Kali, aut Iue muscata.

ILLIS accenseri debet hæc, quam putarunt nonnulli Crithmum, quia non nisi maritimis gaudeat, flore pereleganti, radiato aureo Asteris aut Bupthalmi: folijs pluribus per interualla caulem rectum cubitalem & sesquicubitalem ambientibus, stellatum cingentibus, rectis, pinguibus, ex viridi cinereis, vel pallidis: gustu salso, nec alio quam vna Quæpiam superiorum.

Effig. Mat. 492
sub nomine
Crithmi.

Perfoliata duplex.
Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa.
Corinthe Pliny.
Androsenum.
Androsenum Belgarum an Climenon? commodiori loco, proxime Periclimenon.
Ascyrum.
Hypericum.
Centaurium minus.
Centaurium luteum.
Coris Monspeliaca.
Coris Maihioli.
Camphorata Monspeliensium, an Chamæpence Pliny Lavicis folijs?
debuisset recenseri inter Chamaepyridas.

Antirrhinum {
Purpureum.
Album.
Luteolum latifolium.
Minimum, siue Oruntion vel Aruntium.
Plinianum, siue Diosc. Oxyris.

Linaria purpurea.
Belueæ, Scoparia Italarum.
Oxyris rara repens floribus carulo purpureis.
Linum satium vulgare purpureum.
Linum marinum luteum.
Campanula lutea limfolia Montis Lupi, flore volubilis.

PERFOLIATVM vulgatus, flore luteo, folio
umbilicato.

{ Ang. Thoroughwax.
Bel. Duerwas.
Gal. Perfoliata.


IN Burgundiæ, Sabaudia segetibus, & lætis, alibiq; Gallia Germaniæq; hæc occurrit, Effig. Dod.
Epit. 172.
est radice vnica, simplici, fibrosa, multos graciles ramulos promens, quæ folia transmittunt eoq; apud Germanos Durchwach, quasi folifera vel folifida dicuntur Græcè Ἀσπία & Ἀσφίλλα. Sunt enim rotunda, cana, Tithymali ampliora, tenera, exucta, nec pinguis, colore ex glauco virentia, & læuore Pliniana Cerinthes, cui multum similis. Per Augustum flores sunt in summo pusilli, ambitu radiato ex aureo pallentes: semina fusca Saxifragia hircina pratensis: gustu non amara, sed mansu resinosa, hyperici aut Clymeni. Conitur etiam à Chyrurgis ad fracturas, vlcera, & hernias vtenda. Variantem hanc iam pridem & hoc anno vidimus in Morgani horto, floribus speciosiore situ & fertis umbellatis elegantiores.

SILIQVOSA.

QUANDAM item donarūt recentiores *Perfoliatæ* nomine, quæ tamen ambigua naturæ videtur inter *Barbaream Buniadem* & *Perfoliatam*, non minus frequens, sed sæpius in montibus calidiorum regionum, occurrit folijs maioribus, longioribus, asperioribus, habitioribus, rigidioribus, aliquantum sinuatis *Dentillariæ* modo, siliquas angustas *Leucoij prælongas*, exiles, seminis *Brassicæ* plenas aut *Leucoij*. Gusu nequitiam acri.

CERINTHE Pli.

FACULTATE, gustu, & effigie, illis & *Hypericoni*, nō ita absimili, sed hilariore multo aspectu ea est, quā *Cerinthem* apud *Plinium* cōiectarunt recentiorum doctissimi nō pauci, minus tamen incertis admodum indicijs: colore ex vegeto viridi, glauco & cæruleo, oculos oblectante: folia sunt oblonga, non disparia superioribus, nec gustu ingrato, sed tamen medicato, & quasi *Climeni* siue *Androsæmi* *Belgarum* vocati, veluti si quis gustaret ceram nouam molliusculam. Etiamnū hoc mense *Augusti* in horto peritissimi *Pharmacopœi H. Morgani*, floribus luteis *Androsæmi* vel *Hyperici* prægnans visitur, semineq; didimo, foris atro, intus medullosō *Canabini* aut *Raphani*. Eius floribus apes capi & oblectari putarint, sūt enim vt venusti, sic nō insuaues, & gustu subdulci: folia autem cū manduntur, quiddā ceræ notæ, aut *Erithaces* vocatæ, sapiunt, vnde dictam fuisse verisimile est.



HYPERICVM.

- Ger. S. Johans Kraut.
 Belg. S. Jans cruyt.
 Ang. S. Johns Wort.
 Gal. Millepertuis.
 Ita. Hyperico.
 Hisp. Coraioncillo.

NVSPIAM de elegantiorib. iconibus *Hypericum*, *Ascyrum*, & *Androsæmum*, congeneres species, noscitare licet, quàm quæ in *Mathioli* commētarijs affabrè expressæ: historia verò iam trāslatitia & vulgatio, tum quia accuratior *Dioscoridis* descriptio, tum quia plantarum inter se tanta cognatio, vt vna duntaxat nota, ceteræ latere queant, si copia adsit, neminem. Vbiq; vulgatissima & vsu tritissima medico & chyrurgo *Hypericum* dicta, margines satorum, areas desitas, & ruinosas sectans, etiamq; lætiora loca. Tota planta multum ortu, virgultis, solo, & tēpore, sed rotundis, rubentibus floribus & folijs, æmuletur *Centaureū* minus: sed huic nomen *Perforatæ* vel *Milleforæ*, quòd folia obuerfa *Soli*, innumeris ferè poris, acui quasi traiectis, aciem tum nostram, tum *Solis* transmittant radios. Flores odori, pingues, glutinoso contactu hærent, atq; chartas sanguineo *Anchusæ* seu cruore inficiunt. Semen in pericarpis copiosum, odorum, resinaceum, amarum, & ingrati gustanti, ad vulneraria balsama nulli secundum, multo *Chyrurgorum* peritissimorum *Monspelliensium* experimēto, vbi etiam oleum vernaculè de *Trescalan* vocatum, quotannis paratur longè optimum ad hunc modum.

OLEVM HYPERICONIS.

Accipit

Accipit summitatū Hyperici } añ. ℥. ij.
& olei communis.

Myrrhæ
Gummi Elemni } añ. vnc. ij.
Terobinthinæ. vnc. iij.
Aloes. vnc. j.
Thuris
Mastiches. } añ. vnc. f.

Infundantur, bulliantq; in diplomate ex arte. Ad Icterus etiam & Calculum vtilitas conspicua.

ASCITVM.

SECVNDVM Hypericum est Ascyrum notissimum, amnium & riguorū riuulorumq; pratenſium amans valde, quadratos rectos viticulos è radice multum fibris sparſa exiles erigens: alterius folijs paulò maioribus, venosis, punctim poros peruios habetibus, & floribus itidem luteis, coccineum cruorem affricanti illinentibus. Semen odore resinaceo sui indice, nares feriente. Haud disparis, sed infrequentioris vsus.

ANDROSEMVM excellentius dictum seu magnum.

VTexcellentiſſimus, sic rarius, nec nisi opacis & syluosis gaudens, verius Androsemum vocatum, quod non modò floribus, sed etiam folijs tritu & pressu muriceum remittat succum, quo vno præ cæteris Androsemum agnoscas, & discernas, par est: Procerior maiorq; tota, & altero tâto maiora folia, pauciora, quàm Hyperici, cui etiam similis flore & semine: Procerioribus, bicubitalibus, gracilibus, rotundis, rubentibus ramis. In collibus & nemorosis pone Riuoli Pedemontanæ arcem: Norbonensibus etiam Seuenis pascuis & Syluosis, etiamq; in Angliâ æstate superiore prope Bristoiam: In Vincentij præruptis & syluosis trans flumen.

ALTERVM tomentosum.

IN agri Monspelliaci locis natura vdis & substillis, sed feruidioribus Solibus exuſtis, sæpius Hypericū occurrit palmo non maius, & humo pronius, folijs item minoribus ex interuallo rarioribus: flore & semine luteolis pallidioribus, tota cana & hirsuta, minus odora: non alio sapore, sed imbecilliore.

CENTAVREVM paruum.

NVLLE non notissimum Centaurium, Hypericoni omni sui parte simillimum, nisi flore rubro & insigni amarore (vnde Fellis terræ nomē) discerneretur facillè. Accuratioris nimio figurarum aut descriptionū exactores, qui Centaurij minoris notas expressiores desiderant, nodum in scirpo quærunt: vti nam non multò plures deterius insignitas haberemus.

CENTAVREVM Luteum.

QVIBVÈ verò de isto altero luteo sentient, magnòperè scire auemus. Quamplurimis tum Galliæ, tum Angliæ locis, istud luteum nuncupatum: prope Rondelletij & Aſſatij prædia, multa Monspellij: collibus vrbi Bristoia eminentibus, inter segetes itidem. Radice exigua, folia ima proximè humum pusilla & strata, vt in altero. Caulis sesquipalmum altus, ex interuallis bina folia, aut potius vnicum binis apicibus vtrinq; donatum trajicit, non secus atq; Periclimenis videtur huic & superiori contigisse: nam Periclimenon alterum, trajicit folium, præsertim superius, prope flores: Alterū, bina distincta folia, Floribus alterius, sed aureis P. iij. intensè



iatensē luteis, amara est: quid vſu præſtet nobis nondum cōpertum eſt.

CORIS *Monſpelliaça.*

Koçis, aut potius Koçis, virgo, puellæve dici potuit, quia tota pulchella & perquàm hilaris vultu hæc noſtra: verùm Hippocrates & antiqui, Koçis, id eſt, pupillâ, vocarunt, propter ſemen oculi pupillâ, ſeu anteriori humori cryſtallino ambitu ſphærico, haud abſimile, cuiuſmodi in hac cernitur: quàm quia nuſquam niſi Monſpellij & Frontignanæ ad radices Ceti, & prope Magalonem, reperimus, nec alibi notam audiuiſus, ideo cognominem fecimus vrbis, leſtiſſimis nobilitatæ ſtirpibus. Hanc autem perraram niſi huc appoſitiſſimè quadraſſet, Ericâ minimam putaſſemus, aut mediâ cuiuſdâ inter Hypericū propter purpuriſſâ, & Aiugæ propter folium naturæ: iam non aliò, quàm ad Corim referri poſſe arbitramur. Fruticat quippe ramulis multis, deſis, duriuſculis, ſurrectis, rotundis, palmū altis & ſeſquipalmū, lignoſis, cuius etiam foliola denſè ſtipata Ericæ maioris, & condita, florum purpureorū tyſulis conſimilibus, purpurea, cœrulea, nitidiore & amœniore decoris ſpectantur. Semen vtriculoſiusve alabaſtriculis concludit, rotundū thamaris ſci par, glaucum vel pullum, tenuiſſimis tuniceis glumis inuolutū, quaſi ocelli pupilla tutior inde futura foret. Radix multò ſanè maior, longior, & craſſior, quàm pro plantæ modo, Anchufæ minoris par & cōcolor. Tota namque planta rubella viſitur, & ſucco purpureo radicis pannos imbuendo cōmendatur: amaricat guſtu ſubacri, non in odora. Eapropter Corin nō dubitarunt proſiteri Rôdelletius & Aſſatius, doctiſſimi Præceptores, & in Academia ſimpliciū indagatores, quibus frequens aſſentiebatur auditorū corona, Cuius tamen elegantiæ ſi minus capiantur iſti moroſuli plumbei cenſores, quibus nihilpenè à noſtra mediocritate profeſtū placere quit, arrigāt aures attenti, magni Senēſis de Cori hitoriam percepturi, qui ſic inſit, vbi nuda Dioſcoridis verba recitauit, & in Italia (vt millies repetit) naſci dixit: Sed quòd de Cori mentionem fecerit Galenus in ſimplicium cenſu, mihi incompertum eſt. Quæ denique Koçis, Græcè, Coris etiam Latinè, & Cori Italicè vocatur. Hactenus eſt cōmentatus ille maximus Mathiolus, cuius ſanè mirandum cū in cæteris plerique, tum maxime in hac planta cōmentandâ acumen, quo Italis rerum nunquam fortè auditarum, nedū cognitarum nomina eruit noua, & literis mandat. Et porro pictori negotium relinquit figuræ exprimendæ, ſi viuam, nō pictâ vidiffet, melius fortè noſtræ cognitioni & ſuo honori cōſuluiſſet. Cōſulam igitur nos huius figura & natura reſtandâ, illi operoſæ molis, volu nini plerumque muto.



Mathioli Coris.

CAMPHORATA *Monſpel. an CHAMÆPEUCE*
ſue humilis Picea Plinii?

Satis adumbrare videtur CHAMÆPEUCEM Monſpellienſibus Caphorata herba vocata, emittit quippe è radice lignoſiore cauliculos plures, graciles, rectos, pedales, foliolis Laricinis deſe ſtipatos. Guſtu deſiccâte, inſipido, Nemaufis Amphitheatri auguſtæ antiquitatis in hiulcis parietibus, per vetuſtatem rimas agentibus, hæc prouenit, nec non alibi prope Namaſium & Monſpellium, inter pontem Iuuenalem dictū, & Portam Latrenſem: in Gallia verò, & reliqua Italia, raro occurrit.



ANTIR-

STIRPVM aduersaria noua. 175

ΑΝΤΙΡΡΗΝΟΝ ANTIRRHINVM. Vulgo Caput canis & caput vituli.

{ Germ. Drant.
Angl. Calves snout, or snap dragon.
Gal. Moron violet.

NON potuit commodiore, veriore, insignioreve nota prodi hæc planta, quam Antirrhini, siue naris Vituli nuncupatione: nulla nãque stirpiũ seminis inuolucro, caput, vultum, nares, oculos, adeoque hiatum oris vitulini exprimit, atque hæc, quæ in Italiis & Gallis, præsertim Prouincialis & Norbonensis, admodum obuia inter oliueta: floribus conspicua purpureis, ex rubro violaceis, oblongis, vel roseis, vel albidis, calathum effigiantibus, sed supernè buccas flaccidas, rictũque Leonini oris æmulantibus, & conuiuentibus, non patulis, quò sedulæ apes inde mellificaturæ, si fortè irreperint, rursus quasi valuulis occluduntur. Et folia & cauliculi sparsi, fragiles, Leucoii, lutei, siue Keyri, nec radice absimili. Semine nigro, nigri papaueris minore, hortis Belgicis, Anglicis, & Germanicis, florum decoris causa colitur, nec ruri oritur.

Non diuersæ naturæ aut figuræ est luteum floribus Antirrhinum, sed duntaxat foliis latoribus, breuioribus, nec in agris perinde frequens, hortis duntaxat vt peregrinum alitur.

MINIMVM forsan Archigenis ORONTIVM, vel Aurantium
quo auriginem morbum siue Ictericum lenat.

ETHUC Antirrhinã esse docet capitula membranacea vitulina, aut Simiæ caluariæ, prorsũ figuræ: folia, flores purpurei, prorsũ similia, sed minora, & secundũ foliorũ exortus per interualla prodeuntia, minora, vt est ipsa tota planta exilior minũsque fruticosa, vbiuis tum hortorum, tum incultorum marginibus sponte plurima, apud Germanos Orant vocata, nomine, vt videtur, peruerso & deflexo ab Archigenis Orontio. Iam minor, iam maior & latior prodiens, folia angustiora multò lini aut osyridis. Quapropter nonnullis hanc Pliniano Antirrhino eandem esse, visum fuit.

ὄσυρις. OSYRIS aut Linaria, quæ vrinaria, aut Plinii antirrhinum, vel Belvedere Italarum, Scoparia?

{ Ger. Lyntraut, vnser frauwen flasch.
Angl. Tode flax.
Belg. wild blasch.
Gal. Lin fauuage.
Ital. & Hisp. Linaria.

INTERPRÆTATIO nomen claturæ videtur herbã signare diureticã, siue vrinariam, à ferro siue vrina, quæ græcis οὐρός ἢ οὐρεός, & οὐρεός, & οὐρεός, quod est traho: quare cùm Linaria vulgaris sit vrinaria vocata, propter insignè vim trahendi vrinæ, & figuræ etiam quàm quæuis alia concors, nihil est quur exploratissimam fastidiamus, illam incertæ vis & facultatis peregrinam præferamus, quia verrendo sit aptior, quasi non quàm plurimæ sint frutices, quorum è virgultis possunt scopæ concinnari, neque tamen ideo Osyrides fuerint: nec Galeni quicquam suffragatur sententia, quippe videtur ille & Paulus, sequutus nominis significatum, quasi à verrendo aut purgando fuisset conflata appellatio, Osyridem siue Scopariam significasse. Et vbi quis feuerius expendat Scopariam, seu Belvedere Italarum, videbit folia longiora esse, quàm Linariæ, & numerosiora, non amara, qualem tamè Galeus & Paulus volunt, nec vilius certi commodi ad ea quæ efficacissimè & verissimè Ictericis fermè in hydropem deductis præstat Linaria vulgaris, vbi que frequentissima, & Lini similitudine notissima, Esula minorem adeo imitata, vt prudentiores barbari isto versiculo vtramque necessario distinxerint: *Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit*. Flos tamè est Linariæ elegantior, & maior, secundum summos caules infundibulæ

fundibulis, quasi caudicellis Delphinij, aut Regalis consolidæ, fronte verò Antirrhini ritu & aspectu.

LINARIA PURPUREA.

VT fruticosior, sic elegatior multò & rarior, & propior descriptioni, ea Linariæ species, quam primum ad Veganiij Norbonensis montium radices, in castanetis Syluis inuentam, in Flandriam amicis ferendam multis ab hinc annis miseramus: verum, quia vires exploratas non habemus, paucis notis duntaxat oratione pictam damus: non enim nisi foliis paucioribus, floribus purpureis, ramulis gracilioribus, magisque flexilibus, pedalis, & sesquipedalibus, vimineis, etiam verrendo aptis, differt: alioqui primo intuitu Linariam putes.

SCOPARIA, BELVEDER Italarum.

NO N perinde bellula hæc aut speciosa videtur re, atque est Italico isto nomine, flores etenim perexiguos, racemosos, obsoleti viroris alis, iuxta quas nascuntur, còcolores fundunt: virgæ numerosæ, sparsæ, crebribus foliis, Lino duplò longioribus Psyllij, totâ æstatem virentibus: & propter raritatem exoticam apud Italos in hortis & in pensilibus figulinis vasis ali solita, hodie perquam vulgata.



OSTRIS PURPUREO COERULEA repens.

PRORSVM similis hæc flore & folio Linariæ superiori purpureæ, cui annectenda venit, cauliculis tamen gracilioribus sesquipalmaribus, non erectis, sed humi prostratis, Polij, Coris Monspelliacæ, aut Sefamoidis primæ ritu: flores carulopurpura hilariore nitet, Cori concolores. Tota herbula gustu est amaricante, nonnihil acri. Hanc nusquam vidimus, præterquam in vireto nostri H. Morgani.

LINVM SATIVM, vulgare caruleum.

{ Livon.
Germ. Glachs & lein.
Gal. Lin.
Ital. Lino.
Belg. Wlatsch.
Angl. Flax.

Math. offi. 414 PARITER Græcis Latini Linum vocarunt, propter corticis libivæ recta stamina, in filamenta recta diuelli solita, quæ etiam *λινον* dicebântur: vnde Linea & Libella, qua directiones

rectiones angulorum & parietū structurā librabantur. Sic etiamnum hodie filum fabri lignarij directorium Lineam vocant: sic & piscatores, filum, cui annexus est hamulus, lineam. Tam frequētis olim & hodie notitiā planta, vt pręterquā quod de linariis iam descriptis facillimē percipiatur, etiam superuacaneum sit lineamenta depingere: quę hanc suis strāgulat amplexibus inter Cassithas relata fuit. Theophrasto visum fuit, Linum degener factum, in Lolium abire. Nostrates coloni sibi visum pernegant, aut auditum.

LINVM MARINVM Luteum.

I V X T A prata & litora herbida Norbonensis maris, ac inter stagnum & mare fruticat, pedalis & sesquipedalibus ramulis rectis, numerosis, gracilioribus, paucioribusque quā lini folijs, lentis, corticeque ad nendum commodo, flore non dissimili, sed luteo, minore, Iunio, Iulio. Semineque & pericarpis minutoribus multo: non notum reliquę Gallię, Germanię, & Anglię. *Math. effig. 416.*

CAMPANYLA lutea Linifolia Montis Lupi, flore Volubilis.

P E R Q V A M elegans in deuexis Montis Lupi quā ad Septentrionē vergit, Linifolia aut Poligalę, palmaris herbula, flore luteo peramceno, maiore quā pro plantę magnitudine, latione aut Volubilis donata, quā hęc pictam damus, vt studiosis illic innotescat, quia rara est, nec alibi nobis visā, sic vñ minus cognita.



Reponenda hæc proxime Telephium, vbi omissa fuit.

ROSEÆ.

RODIA RADIX.

R O S E A M vocarunt prisci hęc radicem, rimoso cortice & frequenti, sed pusillo tubere insignem, roseoque halitu fragrantem, odoris Rosei prærogatiua, quem mansu aut attritu nullā radicem, ac ne stirpem quidē, spirare (pręter peregrinū illum Aspalathū, cuius meminimus inter frutices) nouimus. Ex Allōbrogum & Delphinatiū saxosis, mōtosus, nec non Taurinis Alpibus Pedemōtium, iam diu in viretis multis Belgicis, Gallicis, Anglicis, & Italicis, Iulio & Iunio umbellas edit, luteis flosculis pallentibus & herbidis, Drabę, aut potius Crassulę, quā tantoperē prę se fert, caulibus pluribus rectis, & foliorū multiplici serie, ortu, positu, situ, diuifura, crassitie, imō & quadantenus radice loco natalitio, saxeo, macilento, corpulento, rugoso, & disparili coalitu, vt cōgeneres sint putandę: minora tamen huius folia dentata minutim, Tithymali ferrati proxima, & radix maior, torulis & vberosis papillis rugosisque insignata, foris fusca, intus albicat virens. Sed vetustior & siccior, cōcolor est adeo Schęnę peregrinę, vt institores interdum fallāt frustra adultioris, quā gustu excessiue vilius qualitatis vix superare videtur, eoque nobis ferē persuadetur, non procul abesse à Rosę aut Crassulę temperamento, quamuis non nesciamus Gale Radix Hippocratis. Onosima Diosco. num, eumque sequutos, secūdi caloris gradu donasse hanc: verū non nusquam labi, humanę esse Mineruę, indicio manifeste est planta Onosima, quā radicem absolutē Hippocrates cum vocasset & descripsisset, magnus ille interpret Pergamenus nec Onosima esse suspicatus est, sed seorsim duobus in locis, quasi duo fuissent; vnā eādem bis, & iisdem planē

Planè verbis, de Hippocrate mutuatis, describit plantam sine caule Anchusæ similem. Fit hodie nulli in vsum vt propter Medicorum ignauiam, & succedaneorum ad Chephalalgias copiam veniat, vt Rosæ, Roseaceum, Nymphaeæ, consimilisq; facultatis simplicia, Quæ huic proximè subdidit Dioscorides, vnde de facultatibus coniectura elicienda lectori.

Glaux.
 Polygala.
 Polygonum.
 Polygonum maritimum.
 Polygonum montanum, sericeum minimum.
 Polygonum montanum alterum pusillo teretifolio.
 Multigrana Herniaria Serpilli facie.
 Serpillum.
 Thymum.
 Saturcia.
 Saturcia altera.
 Saturcia hortensis satina.
 Rosmarinum coronarium.
 Stachas Arabica.
 Laucudula utraque.
 Cassia Monspellensium, an Theophrasti?
 Hyssopum Arabum.
 Hyssopum Græcorum cum Origanis.
 Graciola recentiorum, an Paupauer spumeum Diosc?
 Helianthos, an Panax Chironium? aut Helenium, secundum Diosc.
 Psyllium & eius varietates.
 Coronopus utraque.
 Serpentina.
 Sedi Montani Petrei & Pinastrifolia planta.
 Myosuros.

GLAUX.

EVESCIS & leguminosis fuit etiam Glaux, à colore foliorum, quæ auersa glauca spectatur, vti saligna, quas salices Poeta canit. Galax etiam, glax, & eugalacto, quasi Lactea, vel Lactifica dicta, vt quæ lactis vbertatem esu suggereret. Iam verò cum huius frequentior defitus sit vñus, minus licet statuere, etiam si veram nosces, quænam sit hodie habenda, & è multis, quæ Glaucis emètiuntur, aut referunt naturam, vtra vtri sit præponenda, incertum.

GLAUX EXIGVA.

Dod. esig. 38.

EXIGVA tamen illa herbula maritima, quæ nonnullis Glaux vocatur, non perperam quadrare videtur: flosculos enim promit Tunici, Garyophyllæ aut Leucoij, exiguos, florum calices dilutè purpurascens, inter foliola Tribuli, aut Lentis, vel Herniariæ similia, crassiora: cauliculos complures partim reptantes, partim & surrectos, teneros, holeraceos, Portulacæ aut Sedi, palmum & sesquipalium altos: cespitem summo, radix gracilis fibrosa: Zelandiæ & Angliæ plerisque mari coterminis, salis lacustribus cõuallibus reperitur: Morgani hortus aluit. Alteram Glaucis affinem putamus è Leguminum familia, eodemque reieciimus.

POLYGALA.

Mathioli Polygala.

QUAMVIS ob lactis vberi prouentum, quem spondebat nomenclatio, debuit esse notissima Polygala, tamen nullam dum habet nostra ætas quam asserat. Quam autem plantulam quo argumento Senensis Polygolam legitimam vindicet, piget referre, sunt

STIRPIVM aduersaria noua. 179

sunt enim normæ Læbiæ & plumbeæ illius tãti herois ratiocinationis, quas cuilibet aptes asseri licet adamusim congruent. Sic hîc huius Astragali putati, & alterius huic confimilis, tacitas descriptiones si præterit ille, quiduis libuerit cõminiscatur, & illi sanè per nos fides habeatur: addemus verò nos descriptionem eius, quæ seritur, & pecoris sagina dicitur, nõ item asseueremus audacter incertissimam rem, quod est supinæ ambitionis.

NOSTRA.

LENTICVLÆ foliis & facie crassioribus pusilla & tenera planta in Galloprouinciæ pascuis montosis prouentu multo seritur, flosculi sunt lutei, minores Citysi aut Araci, filiqua & semine minutis, quæ lactis augment prouentum gregi & armentis.

RECENTIORVM Poligala.

QUÆ tamen doctis Poligala, aliis Onobrichis visa fuit, non minus placet, si æquè pabulo cedit: duriusculis tamen est ramulis, non leguminosis, aut holeraceis, sed Genistellæ oblongis aut Hyssopi angustis folij: purpurei, pallidi flores, albidi interdum Fumariæ, Æstatis initio Crucis die emicant, eoquæ Germani Cruysblomen vocant: squalidis Hist. Dod. 38. & senticosis prouenit.

Πολύγονον

POLYGONVM MAS vulgare.
Sanguinaria, Centumnodia.

Angl. knot grasse.
Ger. weggasse.
Belg. wechgras & dupsent knoop.
Gal. Corrigiole.

Dod. effig. 74.

SANGVINARIA centinodiæve, innumeris geniculorum nodulis, & foliis rutaceis, vel Hyperici, nihil cõtemptius aut vulgatius habet compita & rura, secus vias, areas, sepulchreta, inuitis diurna diuturnaquæ proculcatione & neglectione restibili segete lasciuir, totamquæ æstatem humum infernit virore, reptatu serptuquæ ramulorum exilium viticulorum, qui innumeris flexibus se implicant, semenquæ subter foliola in geniculis condunt numerosum, triquetrum, pusillum, Rumicis iam defluxis puniceis, aut purpureis Proserpinacæ flosculis vel albidis. Rubella est radix, prolixiusquæ fibrata, vti planta serpit, vnde Proserpinaca dici potuit.

MARINVM MAXIMVM altum.

NON NVSQUAM in Adriatico, Veneto & Anconensi litoreis sabuletis, sapissimè autem in mediterranea Norbonensi ora, ab usque Marianis aquis, ad Cetum montem aut promontorium dictum, polygonum istud occurrit longè maius, & multò speciosissimum: quippe subter foliola rutacea, candida, glabra, lucida, secundum nodulos & flores candidos condita, partim etiam maiora, longiora viridia, Galegæ aut Portulacæ marinæ habet: radice & viticulis alterius, prolixius reptantibus, humilioribusque instratis arenosis siticulosisquæ sabuletis: tota planta albicantibus. Semen ad geniculos in foliaceis thecis candidis nitentibus. Salfo & astringente gustu. Alibi Galliæ, nec Angliæ, & Belgiæ, nusquam visa nobis.




MONTANVM minimum niueum & Sericum.

SED vsquam toto illo collium amcenissimo procursu comparet quicquam rarius, aspectu, aut attrectatu & obseruatu dignius, ista minima, sed pulcherrima argutæque naturæ foler-

solertia elaborata plantula: vix vnciam & semunciam æquant densi cõfertique ramuli sarmentosi, duriusculi, densissimis geniculis, & foliorũ quasi denticellis, Herniariæ aut Thymi tenuifolij foliolis minoribus, per interstitiola visu vix discernenda. Eximio vellere sericeo & niueo candore lucetibus glomerulis foliaceis, delicatissimis, tenuissimisque membranulis contexti flores vniuersam supernè plantam ornant & oculant: exilis radix lignea quàm & cauliculi longior. In aruo cui subest specus Frontignanensis cõcameratio & fornices hæc non ita à Chameiride dissita, Mirabundus Præceptor Asiaticus & Iaco. Vtenhousius Gandauenfis, commilitones multò doctissimi, iam tum Polygonum rebantur: seminula acerofa Erythrodani marini, vix visu capi queunt præ exilitate.

HERBATURCA. *Herniaria multigrana Serpilli facie.*

SEMINIS feracissimam hanc nõ incitè vocet quis multigranam humi repticem herbulã: innumeris quippe seminulis in furculosis cauliculis, fusè sparsis, densissimis, luxuriantibus, arua oliuetaque Norbonësia scatent ad rus Boutonet, altèro à Mòspellio lapide, & Riouly Pedemontium, secus castrum. foliolis est Serpilli, sed Alsinæ minimæ minoribus, crebribus, creberrimis & seminulis, vt Polygonũ (ideo mille grana dicta) media inter & subter foliola acernata, Atriplicis Centinodiæve minor: flosculi luteoli plurimi. Tribuli terrestris multò minores nec dissimiles: vniuersa ex herbaceo flauet. Herba Turca vocitatur, commendatũque ad viperea maleficia, venenatãque cætera, tum foris tum intus vtenda: ad hernias emplastris fidem superat, stillatitia octiduo hepatis obstructions & Ictericam persanare proditur. Eapropter nonnulli Helleborinem fecerunt, vt fusius illic monuimus.



POLYGONVM alterum pusillo virimiculato, serpilli foliola.

QVIA non ita dissimilis hæc nomine est, etiam eodẽ tradenda videtur, quia rara & indicta hætenus fuit: nobis autem industrii iuuenis Iacobi Reinaudeti Massiliensis Pharmacopœi primũ innotuit. Ramulis & cauliculis furculosis, prolixis, gracilibus Serpilli, humi sparsis: collibus maritimis Galloprovinciæ, non secus ac Herniaria multa luxuriat, è geniculis foliola pusilla, teretia, succulenta Aizoi vel Illecebræ, Thymo paruo nostrati æqualia & similia. Radix prælonga, lignosa, sapore amaricante, calidiusculo.



ἐρπυλος.

SERPILLVM.

{ Ital. Serpillo.

{ Gal. Serpolet.

{ Germ. Quendel, chuenet Koel.

{ Angl. Wild time

{ Hisp. Serpoll'o.

{ Belg. wild Thyme & onser brauwē bedstroo.

ASER

ASERPENDO DICTVM SERPILLIVM, hodie quoddam satium, quod habitius & grandius, quoddam sylvestre, incultis marginibus, sterilibus & collibus gaudens: Facies vtriq; Thymi nostratis vulgaris: flores & folia similia, sed maiora, *In flore varietas* in gracilibus cauliculis duris, lignosis, reptantibus, in capitulis Thymi vulgaris: flosculi *Mat. Effi. 724,* purpura rubentes, nonnunquam & albentes. Vtriq; notior facies quam vsus: vsus nempe medicus, non esculentus: si namq; adeo excafacit & acrimonia siccitateq; torsiones ventris dissipat, qui potest non magno discrimine dari hepati inflammato, aut etiam cerebro admoneri phrenetico? Id innuisse videtur Dioscorides, non inflammato, sed phlegmone ex sanguinea pituita confato hepati profuturum: Initio quidem ipso, aut potius declinante affectu, nequiquam statu summo: ut nec phreneticis, dum furia cerebrum obsidet. Hac methodico Medico responsioni sat erunt, verum non exploratori auidiusculo animum explebunt. Dicet enim ille, se Sinapismos admouisse spleni hepaticiq; inflammatis, sicq; morbum curasse, auersa nempe inflammationis materia a centro, & per venarum ductus ad ambitum transvecta, sicq; digesta: Cuius quidem therapeutices nonnulla exempla etiam apud classicios autores reperias. Hac rationis umbra sese abundant qui oleo Vitrioli inflammationes & vlcerationes renum sanare profitentur. Sic carpis & ceruici caustica admoventur febribus periodicis euellendis. Sed hæc delitæ commentatori Senensis: nos Botanici sumus. Serpillum refrigerare putatur corpora æstu Solis feruida, non secus atq; Allia, Cæpe, cæteraq; acria vesca. Rationis quædam vestigia videre est in diuini Maronis Bucolicis.

Θύμος **THYMVM & EPITHYMVM** Duplex Mauris Albasce

Ang. Tyme.

Gall. Thym.

Ital. Thymo.

Ger. Welsch, vnd Römischer Quendel.

SI Mathiolo magno licuisset vidisse & meminisse illius maioris Thymi, folijs Tymbræ aut Hyssopi, cuius surculi capitulis spicatis, Stachadis ritu, floribus operi ex pallido purpurascens, atq; numerosa cirrorum fibrarumve cæsarie implicantur, viriumq; præstantiorum commendatione, ex Syria Venetias asportantur: deinde Norbonæ maritimis collibus pusillum Thymum vulgatum, folio & flore Serpylli rigidioris, passim itidem Epithymi cincinnis & capilamentis delicatissimis obuolutum: persuasum sanè fuisse vtriq; Thymo innasce Epithymum. Neq; enim (ut Mathiolus scribit) id Dioscorides negat, sed tantum maioris, è quo prodit isthæc fœtura, meminit. Monspellienses Medici isto minori Thymo innascente, frequentius, eoq; lubentius vtuntur, quia ibi recentius & copiosius, quam illud Syriacum, iam diuturna & disitisissima transvectione semiexoletum. Minus quidem mirum, cum vellebeculæ nostratis experimento Thymum vulgatum Melancholiam educat. Et maiore conatu quam emolumento instaurat demortuas concertationes Mathiolus, nostrumne seu Arabum cum Dioscorideo sit vnum: Idem certè est, non quidem quo ille ancipiti argumento asseuerat, alioquin non solum plantæ & staminum flores Epithymum forent: sed etiam omnes plantæ partes, vi purgandi Melancholiam donatæ. Notio ex rerum distinctione perspicua, atq; Dioscoridis lectione. Est enim nihil aliud Dioscoridi, quam capitati flosculi geminative, quibus aptantur caudicellæ, capillamenti instar, coloris fusci, vel rubelli nitentis: flosculi interdum candidi, nonnunquam herbacei: Thymo verò vtroq; purpurascunt, quibus etiamnum Veneti recentiores, Pharmacopœi, vel nominis, vel etiam vsus argumêto, Epithymi loco vtuntur, & suis Theriacis miscēt. Nomen quidem id præfert, & vsus facillè fert: tota namq; planta, nedum flores, purgat. Cur istud Europæum, seu minimum Thymum, non curarit sculpendum Mathiolus, viderint critici, aut potius Crætenses, quorum Thymum Cræticum dictum apposuit.

Θύμαρα. **SATVREIA** sine **THYMBRA**
vera S. Iuliani.

Q. j.

In

IN Thyreni maris asperis & salebrosis S. Iuliani Hertrufci, magno prouentu oritur aspectu perquam elegans Herbula, quam nullus non fatetur Satureiam veram. Pisanis etiam vernaculo idiomate *Tymbra di Santo Iuliano* dicta. Virgultis exilibus, palmum altis, sarmen-
tosis, lignosis; folijs ab imo crebribus Thymi Cratici, sed angustioribus, longiusculis, spicâ teretē sumogerē-
tibus, flosculo copioso intertextâ: Gustu acri & odoro, vniuersa ex obsoleta purpura albicat, Thymo maiore minor, minori fermē par. Hęc Dioscoridis germana videtur: Ceteræ verò duę etsi non spicatę, vñ tamen Satureiæ nomen indeptę fuerunt vulgo: cui in condimen-
tis & lucanicis loco Piperis est: Ea præsertim, quę in montosis & saxosis Narbonensibus & Pedemontanis vbertim griscit.



SATUREIA siue *TYMBRA* altera.

Dod. Effig. epit.
332.

HVIC folia rigidiuscula Thymi maioris, vulgaris Hyssopi æqualia, asperiuscula, nigricant supernè, bina quaternave oriuntur ex interuallis, & indidem flores promuntur purpurei diluti: lignosa radice: gustu est Piperis tota, eoq; vulgo Piperella dicta.

SATUREIA Hortensis.

Ang. Sauorie.
Germ. Rundel, swybel Hyssop.
Ital. Sauoreggia.
Gall. Sarriette, Sauorie.

Mat. Effig. 723

ALTERA rarò ruri, vt plurimùm in hortis visitur, folijs quàm hæc mollioribus, angustioribus, paucioribus, tum folijs, tum floribus. Belgis & Anglis quotannis seritur, & moritur. Fabis cum Selino incisa & infixa edulium gratum illis frequens habetur.

Quam Mathiolus pictam & germanam reliquit, videtur potius Polium forma Recentiorum: nec vlla spica donatur, aut in cibis commendatur: deniq; nullam nisi vagam & incertam est fortita notam.

EPITHYMBRA, EPITHYMVM, &

CASSITHA Plinij.

CÆTERVM, Epithymbra non modò hisce omnibus, sed etiam in Hyssopo Serpillo alijsq; non paucis congeneribus clauiculis innectitur, eoq; meritò ambigitur, suapte-
adoleuerit radice, atq; finitimis plantis surrecta sese implicuerit, vnde alimentum vberius naçta, illi radicula exaruerint. Sed ex simili ratio facillè liquet. Cuscuta enim oriundi & arrendi conditio par. Ortu namq; primulum & amplexata vites Norbonenses, tam multis osculis, per quandam quasi synasthomosin, eorum succum populator, & genium defraudat, vt radices sui muneris minus iam necessarij oblitæ, feruore arefcent, & abrum-
pantur, (non secus atq; auraci exarescunt, sætu excluso, & mutato alimenti ductu) pendulis illis capitulis & staminibus Cassithæ in Vitium aliarumve stirpium amplexibus reli-
ctæ, vbi ideo putatur enatæ. Sic nobis deprehensum in vinetis, & semine collecto & sato non pauci prodijisse sciunt veram Cuscutam.

SAXIFRAGIA, siue Saxifraga antiquorum.

IAM SÆPIVS ET NECESSARIO monuimus, Saxifragæ vocem apud Authores esse multivocam, nec vnus cuiuspiam stirpis indicem esse, sed virium insigniorum efficaciamque qua sunt præditæ, ferè omnes vulgo Saxifragæ vocatæ, quę

Græ-

Græcorum Lithontriba possent dici, vt non pauce cōpositiones, Eoque Betonica Galeno, Paulo, & aliis classicis, Saxifragam vocatam, & Kestrum, cū Meo legimus, quia vtrūque Lithontribū esset, seu tu dicas lapidum terebram, aut, vt Plinius, viriculum. Sed quando opera nostra naturæ ditandæ, & illustrandæ Historiæ studet, nihil attinet anxius sciscitari, irreperit ne huc caput istud, quasi intrusum cuiuspiā Latini amanuensis imperita audacia, vel intempestiua commentatiuncula, fortè ad Codicis marginem, prope Tribulū marinum ascripta, deinde inter Tribulum & Limonium inserta. Sanè non videtur caput istud adulterinum censendum, aut insititium, quia Latina, vti quiritantur, nomenclatura Græculā præierit; quippe illa inuersiuncula facilè fit, nec sine exemplo, præsertim in stirpibus. Quin Paulus & Trallianus, vt videtur ex Dios-



coride & Galeno, non Saxifragam Latinè, sed σαξίφαγος, carnemūe exedens, scribunt Græcè, apud quos etiā legas Sapon, id est, Sapo, Stupā, & alia nomina è Latinis mutuata.

NVLAM verò è tam varia Saxifragarum tribu videmur posse Dioscoridis genuinā profiteri, præterquàm vnā hodie, cuius laus & prærogatiua penes Italos, & Venetos, præsertim Patauios, etiamnum est. Quāplurimū tractus aridi, cretacei, montosi, saxosi, steriles & sabulosi, vbi Polium montanū & Thymū, prouenit: Huius magnā copiam in Italia, Gallia Delphinatu, & Anglia, fundūt: Sparsis pedem altis, multis, crebribus, exilibus geniculis, vt Polygonatū, radice parua, & paucis fibris impacta, colore albicāte, multū gramineā Holoussium referente: foliola bina, longiora, angustiora, Tunicis, aut potius Tymbræ Pisane magnitudine, & similitudine ex geniculis, in viticulis farmetosis, exiguis, capillaribus, rectis & sparsis, singulis singulum flosculum oblongum quadamtenus Tunicis, summa ora fimbriolis, vel apiculis tenuibus crenatum: vbi semen subrubrum, rotundum, exiguum. Hæc vt posterius vsu & nomine Saxifragæ recepta, sic potior & verior, Italis præsertim hodie credita, tum propter sanigeratissimā facultatē, tum etiam propter arctam, quam cum Epithymo videtur habere similitudinē: verū non vsquaque certa isthæc similitudinis coniectura, quam Commentator ex recentioribus exercitissimis arripuit: namque valde varii codices interdum Thymum, interdum Epithymum, & alicubi neutrum habent: Sicuti videre est è castigatiore Græcolatino Lutetiæ excuso anno 1549. pagina. 370. Eapropter minimè oportuit illas, quas idem statuebat binas, alteram Thymo, alteram Epithymo (quæ illius est constantia) improbare, & è saxiæ Hetruscis reuellere, vt iisdem rimis tertiam impingeret noua adducta icone.

ANGLICA SAXIFRAGA.

Hæc eadē operit Iulio & Augusto accliem cretaceum, & aridum montem, arte militari aggestum inter Chipnam & Malburū Angliæ, Bristolienfi à Londino via, sed variat floribus, qui longè minores albidī, muscosi, non secus ac tota planta.



ΛΙΣΑΝΑΤΙΣ ΣΕΦΑΝΟΥΜΑΤΙΚΗ ROSMARINUM CORONARIUM.

Ital. Rosmarino Coronario.

Hisp. Romero.

Ang. Rosemary.

Ger. Rosmarin.

Bel. & Gal. Rosmarin.

Qui.

Vni.

VNIVERSI tractus collesq; aridi, faxei, & steriles, cum Norbonensis, tum etiam Galloprovinciae, coronario Rosmarino ornantur, ubi vbertim gliscit, & totam hyemem vernal, floréq; ex pallido cœruleos alit. Tanta suppetit copia colonis, vt etiam clibanis calfaciendis, focoq; domi alendo succendatur. Verum inibi minor multo quàm plerisq; locis Germaniæ & Angliæ, ubi cultu luxuriat, adultior & procerior multo perennat. Nō tamen vsquam menfas, cytharæve ex illius fruticis rescibus, radicibus, surculisue farmentosis vsquam illis in regionibus concinnatas nobis videre licuit: quin penè Comētatoris fide freti, fabros illic illud sciscitati ludibrio fuimus. Oleū parant distillatione perquàm odorū & vtile ex summis virgultis & floribus Paraclyticis & induratis articulis Schyro detentis. Aqua stomacho amica & cordi.

STÆCHAS.

Gallis & Officinis Stachados.

{ Ang. French Lavender.

Effig. Mat. 698 MAGNA voluptate non semel pedibus & oculis lustrauimus florente Stachade purpurascens colles Norbonæ, asperosq; tractus in Galloprovincia, ipsæ atq; spica Lauendula, Rosmarinus, Thymū tenuifolium, & Satureia, durior natalibus: quibus omnibus tanto prouentu scatet, vt etiam clibanis calfaciendis satis suppetat. Nobiles verò illæ & rarissimarum stirpium alumna Stachades insulæ, huic cognomines, non ex aduerso Mafsileæ, vt perperam ex Dioscoride persuasum est (bidui namque itinere & litore indidem absunt) sed è regione Olbiæ, vulgò Hyeres, vrbecula olim tam lauta, quàm nobili, à qua etiamnum hodie Insulæ Stachades nomē retinent, non Mafsileæ, dicuntur namque Hyeres Insulæ. E radice lignosiore cauliculos emittit cubitales & sesquicubitales, lignosos, in quibus copiosa foliola oblonga, Satureiæ hortensis longiora, albicantia, incana, angustiora, & minora, quàm Lauendulæ, aut Rosmarini coronarij. Capitulis spicatis in summis virgis Thymi Cretenfis, sed maioribus, è quibus flores foliacei cæruleo purpurei exeruntur. Semine subfusco Vrticæ aut Lauendulæ succrescente. Aduersus omnes capitis morbos à frigida causa efficaces, vsus frequens comprobauit.

SPICA. LAVENDULA, ITALIS.

Spigo & Nardus Italica.

{ Ital. Lauanda.
Gal. Lauandæ.
Bel. Lauender.

{ Ang. Lauender.
Ger. Lefander.

Effig. Math. 31 HAD abs re nomen Spicæ Latinum & tritum ad Stachadem allusit, idem enim signat Stachas Græcè, quod Spica Latine; nempe propter similitudinem totius, primum facie, deinde saporis, odoris & loci. Vtriusq; vtriq; simillima, neque specie diuersa. Folio & flore spicato Lyfimachiæ, aut potius Viticis purpureo, alias albo: hoc tantum discriminis interest; Spicæ fragrantia maior, grauior, folia maiora & latiora Stachadis: Lauendulæ, aromatici, & gratiæ plusculum: eoq; affectibus matricis semen & folia commendatiora, tum fomentis & lotionibus, tum pulueribus dilutis intrò sumptis, ad suffocationem & ascensum ex vaporibus putridis, & ad partus accelerandos.

CASIA Poetica Monspellensium an Theophrasti?

POETICAM Casiam, qui cum Casia siue Canella & Cinamomo, nominis sono ducti congerunt, nulla vt id facerent fuerunt ratione illecti: tantò minus stirpium vestigatori sagacissimo Anguillaræ assentiendum, cum Lauendulam & Rosmarinum coronarium Theophrasti Casiam censet. Nec non Guilandinus, indefessi laboris vir, hallucinatur, dum Chamæleam Casiam esse putat. Neuter id dixisset si vidisset, plantam Romano Noro-

Norbonensiq; agro vberè prouentu oriundam, Sparthi caule, striato, colore Polemonia: folijs Thymelæ, aut Stachadis, vel Lauendulæ: Cocco copioso Cneori, vel Asperagi marini æmul o, glutinoso admodum: caule sesquicubitum & cubitum alto: Flosculo multiplici Oleæ, ex viridi flauescente. Hanc Præceptor Rondelletius, Pelliserius Magalonensis & MonsPELLIENSIS Episcopus, perquam eruditus, commilitonesq; nostri, Casia fecerunt, quia in Diosco. deerat & in Theop. supererat. Floret Iunio, semè rubet Augusto, ad ripas Lani prope pontem Castri noui, & alibi passim in Galloprovincia iuxta sepes & oliuetarum margines.



HYSSOPVS ARABVM M. sua & Officinarum.

{Ger. Hyssop.

{Ital. & } Hyssopo.

{Ang. & } Hysope.

VT in Hyssopo Græca diximus, tamen si hæc vera non sit Diosco. tamen iamdiu cõmuni consensu recepta ista Hyssopus fuit, quia valdequàm viribus efficaç est, eoq; in Officinas deducta Mesuæ autoritate, qui Hyssopum ramis Thymi atq; folijs, sed maioribus, facit. Eiq; occasio fortè ex Symphito Petreo hallucinandi fuit, cui Origanu (simile nepè Hyssopo) & Thymu cõparantur. Nec miru iam tũ ita persuasum fuisse hac lectione Arabibus, cum Senensis, extra erroris aleam Cõmentator, eodem impegit: vbi nõ solum de nouo à se reperto, sine probatione, Symphito, sibi plaudit: sed etiam folia Thymi contexit, & Symphito reperto affingit: quæ neq; Græco codice, neq; Latinis versionibus usquã cõparent. Collibus asperis Romanæ & Veronensi tractui, præsertim secus Athesim, ad angustias saxorum & arcem munitissimã, quæ Imperatoriam à Venetorum ditione discriminat, è regione montis Baldi, sponte fruticat hæc, nusquam alioquin nisi in hortis.

Math. effi. 693

HYSSOPVS candidus Anglorum.

Varietas. Eadem hortenſis in Anglia nullo mægionio dimidio sui folijs & ramulis adeo candescit, sine lanugine, vt quamlibet niuem aut calcẽ faciliè prouocet, semisse altera viridi remanere. Horum utrũq; montibus, collibus, & hortis oritur.

GRATIOLA recentiorum, an SPUMEVM PAPAVER?

Math. effi. 697.

HACTENVS non parũ vexauit multorũ ingenia huius plantę assertio: Saponariam quippe alii, Behen album & vulgare quidam, siue Ocimastrũ aruorum, demũ Gratiolam Spumeum Papauer fecerunt. Huic (enim præterquam quod Oleæ vel Struthij folijs, & floribus albis donata est) etiã vis strennuè purgandi supernè & infernè inest: radix multiplici flexu, crassiore propagine, summo sparsa cespite, Pratis montosis oriunda, rarò tamè spumea, sed quãdamtenus albida folijs est herba, amari & ingratisim gustus.

HELIANTHOS, siue flos Solis, an PANAX CHIRONIVM,

& HELENIVM secundum Diosco.

Effi. Mat. 744

HELIANTEM pleriq; putarunt illã plantã quæ locis aridis vberè prouenit, humi serpens, & interdũ surrecta, sarmetosis cauliculis, palmũ altis: Folijs rigidiusculis colore, crassitie, & effigie Cysti parui, sed minoribus multo, quæ Helianthè, siue Solis florè, vocarũt, floris aurei Potentillæ vel Pentaphylli similis cõmendatione. Qui quia similis recensetur Chironio, ideo Chironiũ putarũt. Nos in Helenio mentionẽ huius fecimus. Mõspellij Cisti parui speciem faciebãt: sed crescit hĩc in Anglia & alijs locis passim, vbi nulla Cystus. Astringendi siccandi q; vi pollet: acrimoniã nullã prodit: eoq; minus Chironij opinionẽ facit: sed faciet fortassis magis Centaurũ luteum vocatum, effigie cum sit & viribus haud procul recedentibus, & quod acrimonia non caret, nonnihilq; odorum est.

Q. iij.

PSYL

ΨΥΛΛΙΟΝ *PSYLLIVM, Pulicaris herba.*

Gal. Herbe à puces.

Ital. Psillio.

Belg. Uloy cruyt.

Ger. Psyllien kraut, flohekraut.

Hisp. Zorgetona.

Ang. Fleeworte.

Effi. Mat. 1067
1068.

CONCINNA nomenclatio Psyllio facta, à pullicem einentiente, semine nigro, nitido, intus mucoso admodum & refrigerate, lubricante, quod vniufmodi nec diuersum est in farmentacea stramineaq; planta trifariam variate copiosum habetur. Ea autem sponte Norbonēsia & Galloprovinciæ veruacta profcisq; arua operit & insternit. Quæ autē frequentissima exilioribus ab ima radice exigua, fibrosa, ramulis totum caulē pedale ambietibus crebribus fruticat, folijs angustis longioribus Scopariæ, Beluidere aut Coronopi, incanis, hirsutis: Imbricatum compactis globulis, squamiosis, oblongis, Pimpinellæ vel Stachadis Arabicæ primulum florentis, quos apiculi staminei candicantes ambiunt frequentes Coronopi vel Plantaginis. Hæc etiam inter oliueta fabulosasq; scrobes Monspelij agri prouenit.

Marinum.

Parietas.

QUOD littora fabulosa maritima lubenter sectatur, habitiore, sed non dissimili aspectu, longioribus aliquantò ramis fruticat, & folijs multò prolixioribus magisq; densis & hirsutis, minus incis: cuius etiam non aliud semen, vel flores, vel vsus.

PLINIANVM forte maius, radice perenni.

ISDEM in tractibus, sed marginibus & squallidis oliuetoꝝ incultis collibus, sarmētosius lignosiusq; prolixa folioꝝ & furculorum caudata, comosq; foetura densissima implexa fruticat, & reptando cespitem ornat latiore aspectu, sed hirsutie ex viridi albicāte. Semine haud dissimili, sed maiore fuscoq; siue castaneæ corticis colore: radice lignosa, dura, fibrarum procurfu prolixa. Eidem vsui in medicamentis arteriacis, & bilem siue preparantibus, siue educentibus: nec aliud ab istis innuit Plinius Psyllium, vt nonnulli minus accuratē eius de lacte gummiue sententiam expedientes opinantur, Tithymaliq; quoddā genus Pityusa dictum, interpretatur: neutiquā id scripturi, si illis venisset, in mentem feminis & herbæ muccaginosum & lactei cremoris similem succum, ad purgandam cholera (etiamnum à nostris Medicis hodiernis commendatum) Plinio vocatum fuisse Lac vel Gummi, laxiore interpretatione, vt non raro hic autor solitus est.

ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΣ *CORONOPUS, Cornu Cervinum.*

Gal. Corne de Cerf, Pied de corneille.

Angl. Buckhorne.

Belg. Craeyn doet, & Derts hozen cruyt.

Germ. Kraensuz.

Effi. Dod. 71.

ACoruino pede, quē effigiāt folia, dicta fuit Græcis Coronopus: & hodie eodē nomine utraq; nota, iādiu & recepta Craeyn doet vocatur. Sed quæ Ruellij dicitur, multò melius Coronopi species habetur, quā illa Serpentaria Math. quæ incerta est, & folijs longē dissimilior: tū huius vires exploratiores habētur, quas Medici multi admirātur, dum vident intrò sumptam, aut præcordijs admotam, accessiones febrium, quæ originem ab obstructione duxerunt, quasi fascinio amoliri, præsertim ab imperitijs Curforibus: haud tamen difficilis causæ vestigatio, quæ ab eodem principio pendet, quo cætera plantæ congeneres, similes effectus febrientibus admotæ, edunt. Serpentaria verò potius Holoustii species est, quā eò adduximus. Fol. 17. Quinetiam vulgatiore & magis obuia ē maritimis in hortos Belgarum, Anglorum, & Germanorum, translata ad acetaria, & calculum, folijs Psyllij aut Plantaginis marini, crassis, pinguibus, hirsutis, vtrinq; fissis & laciniatis, cornicum vngues aut ceruinum cornu præferentibus. Vere in thyrsulis gracilib. hirsutis dodrantalibus flores, & spicæ Plātaginis aut Holostij MonsPELLIACI similes, concolores, sed minores.

minores. Radix tenuis, modicum astringens, cum nonnulla calfactione, calculosis hodie expetitur, non secus ac totius herbae stillatitia aqua.

Cornu Cerui alterum vulgi.

Varietate.

CORONOPVS REPEVS Ruellij, echinato seminum involucre, an Theophrasti?

LVBE N s hanc inter Polygonum proculcatis itineribus, sed humentibus oritur, facie, folio cum superiore eodem prorsum, flore albo in cauliculis sessilibus, reptantibus: Semina in folliculis orbiculatis, ambitu nonnihil spinosis, cetera similia, cognitu peruia.

Effig. Dod. 71.

CORONOP I & SEDI montani media planta Mafsiensium.

HAN c nouam antiquis & neotericis indicta, visum fuit subdere, cum propter nonnullam inter se similitudinem, tum propter eosdem natales maritimos. Collibus & cauitibus Mafsiæ vicinis ad maris allisiones, inter Tragacanthum passim luxuriat densissimo sparsoque foliorum stipatu, Sedi minimi faxei montani, vel Pinastru ritu, positu, & rigiditate, innumera etiam sobole caulicorum dotrantium, semen pusillum Plantaginis, aut Serpentinae vulgaris, spicis includentiū. Radix longiuscula, lignosa, crassior, gustu nonnihil calida, aromatica.



SERPENTINA.

SVPERIVS dictū fuit Serpentinae plantam & nomenclaturam recentiorum esse, neque Coronopum esse, sed potius Holoustium: est uivum foliis Gramineis aut Vetonicae sylvestris humi procumbentibus, radice lignosa Vetonicae Garyophylleae, semine & spica Holostij Monspelliaci aut Coronopi vulgaris. Prouenit in montibus Galloprovinciae, Auerniae, & passim in Italia.

Mathioli. effig. 494.

Varietas. Superrori similis tota, nisi habitioribus foliis, flosculis, cauliculis incanis & hirsutis foret: Apeninis montibus & in Delphinatu receptu facilis.

Μυροσμός *CAVDA MYRIS.*

Gal. Queue de Suoris.
Germ. Taufent Korn.
Belg. Duyfen Sterkens.
Angl. Blod strange.

HV c referenda etiam videtur pusilla illa scite *μυροσμός*, a recentioribus vocata, propter seminis spicatum mucronem teretem oblongum muris candicellae non absimilem, flosculis per Maium & Iunium albidis, crebribus, palmaribus breui mareescentibus vestitum, Plantaginis quadam tenus modo, seminae exiguo incluso nigricante: foliola sunt gramminea angusta, pollice & sesquipollice alta, rigida, gustu plantagineo.

Effig. Dod. Epit. 189.

Q. iiii.

Nesrates

Nostrates Caryophylli, an Cantabrica Plinii?
Caryophylli varietates.
Cantabrica Plinij.
Vetonica.
Caryophylli syluestres minores minusq;
odori, siue Armerij, latioribus
foliis.
Armerij varietates.
Superba recentiorum.
Caryophyllus Marinus omnium mini-
mus.
Muscipula siue viscaria duplex.
Draco.
Parmica duplex.

CARYOPHYLLI nostrates an Cantabrica Plin.

Germ. Negelin vnd Grasblumen.
Angl. Carnations, and doble gillifers.
Belg. Sinoften.
Gallis, Gyrofflees, Oilletz.

Effig. Dod. epit.
189.

Varietas.

CANTA-
BERICA Plin.

VETONICA

ANTIQUIS etiam indicti videntur florum elegantia nominatissimi Caryophylli, ob
 eam quam cum Caryophyllis exoticis habent odoris cognationem, ac nonnullam ca-
 liculorum cum Anthophyllis similitudinem, quorum sunt differentia duæ, nempe syl-
 uestris & satina: varietates autè permultæ. Qui namque in hortis colitur, ex intortis ge-
 niculatis cauliculis calices teretes glabros gerit senis foliolis, sed multipli conflatos, per
 extremas oras scitè fimbriatos, odorem Caryophyllorum, aromaticū simulante, è medio
 staminulis exortis geminos apiculos ostentantibus, triplicis varietatis, in pensilibus vasis
 aut torulis hortorum spectantur: nempe aut purpurascunt dilutius, aut intensiore cru-
 ore nitent, non pauci ex albedo, nonnulli punctis quasi aspergine purpurea versicolores
 sunt, cunctis diutissimè florentibus, folia per interualla bina, glauca è geniculis caulium
 teretium & gracilium iunceorum: Semen item minutū, præsertim syluestri, quæ quidem
 si nihil à satina nisi cultu & mangonio differt (quod tamen nonnulli inficiantur) Plinij
 CANTABRICA planè videatur, quamuis ab illo paucis designetur, vbique nasces cau-
 le iunceo pedali, in quo flosculi oblongi, velut calathi, in his semen perquam exiguum:
 quæ quidem descriptio nonnihil videtur quadrare cum VETONICA, inter notha à
 Dioscoride relata delineatione hac: Montosis pratis & cultis nascitur, radice rubente to-
 ta & odorata, foliis porraceis, sed eorum medio puniceo, in recto calamo triangulari,
 & in ipsis floribus purpureis. TYNICEM herbarij putant, qui aduersus pestiferos
 affectus miscent in antidotis: tamen doctissimus Bernardus Montpellienensis Polemonium
 Belgarum siue Ocymastrum imperat, vt cuius radices plurimùm commendantur de ea-
 dem dote.

ARMERIA, minörne Caryophyllus syluestris,
minus odoris, foliis latioribus.

QUAMVIS solo & cultu dumtaxat distare videantur isti spöte nascentes Caryophylli
 à superioribus, tamen etiam dum coluntur in arcis hortorum, distinguuntur ab illis fo-
 liis latioribus, cauliculis humi stratis, in quibus singulis flores confertim numerosi con-
 gesti, Saponariæ in modum sunt calyculi, & flores minores, simplices, vt plurimùm cruore
 coccineo rubentes, nec odore perinde fragrant, atque superiores, nec adeò serò pro-
 deunt, siue in hortis, siue in agro: est enim plurimus hic Caryophyllus vbiuis in petreis
 montosis & syluosis marginibus calidarum & frigidarum regionum Aprili & Maio.

Angl. Pinkes.
Belg. Wijnmken.

HORVM

STIRPVM aduersaria noua. 189

HORVM eadem, quam in superioribus diximus, colorum varietas cernitur, quippe notulis candidis purpureis cruor intermicat interdum, interdum autē niuei asperso diluta purpura nitent flores, qui etiam argutioribus fimbriantur crenulis altioribus, aut laciniolis: angustiora etiam sunt folia, caules pedales & cubitales, odoris suauis: elegantia causa in hortis habetur. Dod. Effig. epist. 191.

ARMORARIA Syl. pratensis.

Ger. Gauchblum. id est, flos Cuculi.
Belg. Trayenblomkens.

SED in vliginosis pratis Angliæ, Belgiæ, & Normaniæ prouenit Syluestris Armeria vocata, inodoro flore, simpliciore, altius crenato, foliis breuioribus, latioribus, Centaurium minus, aut Viscariam similitibus. Venenis commendant, qui putant Tunicem esse: nec prorsum falluntur, quia non frustra opem experiuntur: & nonnullis Practicis Arabibus etiam Tunix vocatur, non secus atque Polemonium Belgarum siue Ocymastrum, quod est Gordonij Tunica. Dod. Effig. epist. 192.

TUNIX.
Tunicis vox videtur truncata & Betonica.

SVPERBA Recentiorum. Ger. Hochmut.

Varietas altera. **Q**UOD iuxta viarum squallidos & editiores margines Germaniæ, & Italiæ, florem ostentaret speciosiorē multo, & Phænicea purpura insigni Centaurio minori concolorem, Superbā quidam vocant, quæ syluestris superioris species est: gracilioribus viticulis, erectis, rigidioribus, pedē & cubitum altis, paucioribus, exilioribus, angustioribus foliis.

IN Agri Norbonensis montosis plantula est non inelegans, quæ huc referenda videtur, nam sesquipalmarem & pedalem erigit cauliculum geniculatum, superioribus consimilem, nec flores dispares gerit, aut calyce ita diuersum: sed semen Scabiosæ, aut Carthami, nigrum, pellucidum, quo facili quilibet plantam rariorem hanc à Caryophyllis discernere potest.

CARYOPHYLLVS MARINVS omnium minimus.

HARVM omnium minima, similis & quadantenus cognata videtur illa, quam Belgæ Herbarij Moly marinum indigitarunt, alij Holostium, vtrique potissimum propter folia graminea. Sunt enim rigidiuscula, quamplurima, sparsa humi, colore glauco, fimbria Caryophyllis. Cauliculi graciles, iuncea, dodrantales, & palmares, in quorum summo umbellæ compressæ Thlaspi Caudicæ, aut Schænoprassi concolores. Radix illi subest prolixa, tenuis, rufescens Serpentinæ aut Caryophyllæ. Hac arearum margines ornant Belgæ & Angli, apud quos in maritimis frequens oritur: Calidis & Mediterranei maris litoribus, non perinde occurrit. Effig. dod. epist. 377.

Moly marinæ.


SED conuallibus Calcaris Seuenæ montis, passimque alibi in Gallia Lugdunensi locisque à mare disitis, prorsum eadem reperitur, nisi plures funderet cauliculos pedales, folia item quadruplo maiora, & reliqua grandiora: quænam sit planta apud antiquos iam non occurrit.

MUSCIPULA, siue VISCARIA,

PRÆTER has, hic geminas damus pictas, quas plebecula Muscarias, Viscarias, siue Muscipulas vocitat, quia glutine quopiam mucosæ adeo viscido sint perlitz, ut non solum

manum

manum, sed etiam muscas & papiliones præteruolantes minimo contactu implicet. Oritur apud Norbonenses in locis squallidis & segetum marginibus, folijs Armeriæ sylvestris, præteritis aliquantò longioribus: flore & caliculo Centaurij minoris, aut Vetonicæ superbæ dictæ: cauliculis plurimis cubitalibus, semine pusillo Lychnidis.

Muscipula.*ALTERA flore muscoso.*

REGIA via qua Monspellio Frontignam itur, caliculis, semine, folio, & cauliculis, oritur non multum diuersa planta, sed perquam exiguo flore racemoso, ex luteo herbaceo, Vtraq; hodie vsu incomperta.

APHYLLANTHOS Monspellensium.

EMINVS hodie notis ea est cui nomē Aphyllanthos fecerunt studiosi Herbarij Monspellenses, non quia nulla folia emittat, sed quòd adeò sint exilia & iuncea, vt vixdum emerfa arefcant, & festucas præferant, paleasve, pallidiusculo colore in imo cespitis è fibrosa Iunci radice: cauliculis sesquipalmaribus plurimis, iunceis, gracilibus, enodibus, glabris, per ætatem flores dentatos cæruleos, Lini aut sylvestris Caryophilleæ minores, in glumoso acere gestantibus: gustus tota planta amaricantis, non nihil calidi: Plurima glariosis strigosisq; Illicetis Norbonæ.

Aphyllanthos.*DRACO, aut potius TARCHON Symeonis Seti & Auicenna.*

Math. effi. 593 NON est de nihilo, quòd pleriq; omnes paulò elegatiores holitores, hæc ex Lini semine cuiuspiam Cepacæ aut tuberosæ radici inserto, emergere affirmant: nam tametsi nõ temerè cuilibet experiendi cedat, rei q; ostentum, & euentus rarior fidem penè abroget, tamè si quis in afflatu maritimo & natalibus Squillæ non auulsæ inserat, optato voto nõ frustra bitur, vt nobis asseriebant quidam Lygures & Hetrusci herbarij non pauci. Idem euenire tradunt, si in Raphano aut Cepe foraminulo facto adigatur Lini semen: & argumento virtutis saporis, què salis & aceti vnà mixti quodammodo præfert: in acetarijs frequentissimè cõstitatur, Nasturtij gustu, & ritu: Nec vsquam nisi in hortis visitur: èq; radice in varias partes diuisa propagatur & plantatur: quia semen, quasi spurium, & non genitabile, exiguum & euandidum est. Folia angusta, cuspidata, crassiuscula, Kali aut Asteris marini, sed longiora

STIRPVM aduersaria noua. 191

giora Ptarmicæ, non tamen crenata Betonice modo, vt quidam decepti similitudine Ptarmicæ tradūt: flosculi lutei, in ramulis sparsi: caules cubitales: radix Scordei aut Gratiolæ, longius vagatur per suum cespitem, exigua.

*PTARMICA folio Taronis, sed crenato, flocello,
umbellato, candido.*

QVAMVIS per plures plantæ, quæ ciere sternutamenta olfactæ valent, Ptarmicæ hodie dici possint: tamen hæc id nominis præ cunctis hodie est apud herbarum peritos assequuta, quam Pyrethrum nuncuparunt, quia esset gustu feruido, diuq; linguam vexante Pyrethri modo: nonnulli Ptarmicem coniectabant, quod odore ingratiusculo & acriore nares feriret, sternutamentaq; cieret, quibus non ægrè accedimus, quando aptiorem Ptarmicam nondum nouimus: Nam quas alias mox subdemus, longius multo à Ptarmicis abesse putamus. Huic siquidem flores in umbellis Anthemidis, Cotulæ minores, aut Stratiotidis millefoliæ, folia longiora Taronis, sed ambitu tantillum crenata, in multis gracilibus cauliculis pedalibus & cubitalibus. Radix fibrosa, repens.

PTARMICA altera Gallorum.

COGNATIOREM multo Thlaspi putabit, qui gustarit aut olfecerit hanc, quam Pyrethro aut Ptarmicæ: Est enim gustu ignauiore, quam vt Pyrethrum æquet: & odore penè nullo, nec sternutamentum ciente: Quare non magis hæc Ptarmica sit, vt quidam coniectabant, quam Terribilis vocata, inq; caput de Alypo relata. Etenim Monspelli enatam habuimus in horto eruditissimi professoris Regij Laurentij Iouberti, folijs, facie, virgultis, & floribus concoloribus Candiæ Thlaspi.

Bupleurum.
Bupleurum alterum latifolium.
Scorpioides Bupleuri folio.
Lithospermum } maius,
} minus.
Lithospermum Plinianum inter miliacea.
Alfine.
Paronochia, Alfinefolia tectorum.
Paronochia altera.
Anagallis.
Anagallis lutea.
Anagallis aquatica.
Anyllis prior maritima Anglica.
Anyllis prior maritima Norbonensiu duplex
Elatine.
Veronica } mas
} femina.
Nummularia.
Bugula.
Symphitum petreum.
Bellides.
Bellis cerulea, siue Globularia Monspel.
Myosotis.

BEUPLEVRVM.

FLIS aliquantum similis est ea herba quæ recentioribus βέπλερυ Hippocratis ex Plinij historia putatur, nec pessimè quadrare nomenclaturæ & effigiaturæ videtur: folijs namq; longis, angustis, quadamtenus Graminis, Lachrymæ, Iobæ, aut Gladioli, multis strijs, lirisve rigidis, quasi costas in folijs singulis effigiantibus, & laterum modo inclu-

sis,

Dod. Epit. 373. *sis*, vt de Heptapleuro loquitur Plinius, per lōgitudinē squabris, in caule sesquicubitali & cubitali admodū geniculato, squabro, rotundo, rigido, inq; ramulos abeunte, quorū summa vmbellis pusillis, sparsis, luteolis Anethi donatur, & semine Anisi aut Anethi oblōgo, longiore, graciliore: lapidosi & strigosi Ilcetis cocciferis Norbonæ passim floret Iulio & Augusto: Radix digitum minimum æquat, nigricans Peucedani figura, gustu, & odore, cuiusmodi & semen: quo etiam magis retinemur in veri Bupleuri persuasione, Nicandri & Plinij auctoritate, si foret planta hæc cibo idonea. qualem Hippocrates commendat: nam in medicamentis, vt placuit Glauconi & Nicandro, non incommodam dicet, qui saporem & odorem quadamtenus Hyperici depræhendet, temperato calore, aliquantum sicciorē.

ALTERA BUPLEURUM congener latifolia, AVRICULA
Leporis dicta, non est ELAPHOBOSCV.

Varietas. *Dod. epit. 374.* *ISDEM* in locis non procul Gramontia sylua, longè frequentior hæc reperitur, quæ planè eadem cum superiore est, natalibus, figura, viribus, vmbellis, & floribus: folio alioqui latiore, rigidiore, latiusculo in medio, & supernè in angustum deficiente, nonnihilq; concauo aut inflexo. Vnde illic studiosi *Auriculam Leporinam* vocitant, alij *Elaphoboscum* fecerūt, quia sit folio aliquantum, vti putant illi, Therebinthi: atqui Dioscoridis collatio exprimit primum folij latitudinem digiti, deinde modum & positum Therebinthi, similitudine plætæ Ferulacæ, qualem dedimus alibi inter Pastinacas: nam de Plinij liquet illuc conferendum, qui Olufatri folium Elaphobosco dat.

SCORPIOIDES repens Bupleurifolio.

Dod. effig. 48. *IN* oliuetis & aridis montosis Monspellio vicinis frequens occurrit hæc, alibi rara planta, nec nisi in hortis visitur, vocaturq; Scorpioides propter seminis inuolucrum, quæ terna hærent hirsutie obducta in se conuoluta, & aliquantum Scorpionis caudam æmulantur. In caule caduco, reptante, sesquipalmari, & interdum pedali, folia è geniculis promente Boupleuri latifoliæ similia, reflexa, minus rigida.

Λιθόσπερμον. LITHOSPERMVM utrunque
Officinis Milium Solis. Ital. Milium Solis.
Belg. Perlecruyt ende steen saet. Ger. Merthirsen.
Gall. Gemil. & herbe aux perles. Ang. Gromell.

Effig. Dod. epit. 317. Mat. epit. 416. *LAPIDEA* duritie & Herculeæ feminis vi nuncuparūt hæc Heracleiam plantā: notitia peruulgatæ omnes differentia, quæ à magnitudine, habitu, & folijs quaruntur. Passim in Gallijs & Anglia locis incultis Lithospermum minus, magisq; obuium fit: ramis & alis duris, rectis, asperis, rotundis, albidis, folia angusta, acuta Phylireæ aut Ligustri, vel Polygonati nigricantia, rudia tactu, squalida, flosculi albescent in alis & summo secus folia. Vniones lucidi, læues, rotundi, albidī, aut pulli prælucci Milio æquales, ideo Milion Soler, id est, montiū, dictū potius quā Solis, Effractum multū siccitatis, absterisionis, nonnihil acrimoniæ habet. Locis strigosis aut quibus coli desitum, semen minus, nitidum, sed rugosum & asperum, vt etiam folia. Maximus huius ubiq; in officinis vsus, æstate colligunt & venum ferunt mulierculæ: in Anglia plurimum sponte.

*melius quā
vide in Si-
Montano.*

Varietas. { Est vbi minimum videas palmum altum, foliolis Lini angustis, secus quæ grænula pusilla, rotunda, polita, & prorsum minora.

LITHOSPERMVM maius.

Dod. epit. 339. *SARMENTOSIS* in stratū humi ramis, gracilibus, hirsutis, porrectioribus, quos æterno fermè situ, ab imo crebra cingūt folia lōgiora, acutiora, latioraq; minoris Lithospermi nigrican-

STIRP IV M aduersaria noua.

193

nigricantibus, asperis, quibus oculuntur hirsuti qasilli, & semen idem, sed durius & maius, defluxus purpurascens flosculis, oblongius, atq; calculo extendo, lotiòq; mouēdo efficacius multò, minus tamē vsurpatum quàm minus, quia minus frequens, minorq; suppetit copia, nec perinde seminis est ferax. Belgio & Germaniæ hortense vtrumq; Mōspellij propter Sellæ nouæ pontem & declinibus, laxosis, vmbrosis, syluosis, spôtè multū.

ALSINE, Hippiæ.

- Ang. Great Chickweede.
- Ital. Centone, Panarina, seu Pizza Gallina.
- Morsus Gallinæ.
- Ger. Vogelstrauch.
- Bel. Quet ende vogelcruyt.

Effig. Dod. epit.

ALSIOSIS non modò sed etiam parietinis, & imbricamentis oblectatur Alsine, quæ Auricula muris vocitata fuit antiquis ob foliorum admodum arctam similitudinem, cum genuina Myosotide, teneriuscula siquidem herbula est, Gallinis & auiculis pabulo grata, eoq; vocata plebi morsus Gallinæ. Plurimos ramulos geniculatos, rotundos, foliosos, Anagallidis vel parietariæ minores minusq; hirsutos flosculos etiam ex capitulis Anagallidis, vel Hollautij explicat, albidos, stellatos. Semine exiguo in pericarpio oblongo, gustu insulso aqueo refrigerante.

56.
Auricula muris
Morsus Gallina

ALSINE Minor recentiorum, siue Hippiæ minor.

- Ang. Middle Chickweede.
- Gall. Morgeline Mouron.

PERSIMILIS superiori, sed minoribus tū foliolis, tū ramulis, humi procumbenti- bus, propiusq; ad Anagallidem, quàm Parietariam estornatis, cetera non dissimilis, neq; oriunda diuersis in locis. Ded. effig. 57.

ALSINE Minima.

Ang. Little Chickweede.

ET hæc proximè descriptam Anagallidem admodum præfert, verum tota tenellis capillaceisq; ramulis, exilibusq; Serpilli lenticulæ vel tenuifolij Thymi, numerosioribus: non dispari loco, situ, aut effectu, notissima. Ded. effig. 58.

ALSINE Myosotis.

- Ang. Small mouse eare.
- Ger. Meuzorlin.
- Gall. Petite oreille de souris.

HANC etiam propter similitudinem foliorum aurem murinam vocitarunt, & Alsinæ, quam valde exprimit, vt Dioscorides innuit: à radice cassiuscula, rotunda, rectis item multis viticulis crescit, semipedem & pedem altis, foliolis auriculas murinas vel centauræ minus imitatis, binis, ab imo multis per intervalla. secundum quæ in capillaceis pedicellis flosculi exigui Gallij vel Aparine cærulei flosculi. Rarior hæc, nisi Italiæ Galloq; provinciæ herbis marginibus & campestribus, nullo excellenti gustu. Ded. Effig. 59.

MYOSOTIS Hirsuta reptans.

ADMODUM familiaris hæc hortis, vinetis, segetibus, & prætensibus, vulgò Pharmacopæorum Auriculæ muris minoris nomine notissima, & aptissimè sic vocata, propter

R. j. hir-

hirsutiem effigiemq; auri murinæ haud absimilem, repit humi tota ramulis palmaribus, hirsutis, mollioribus, Scorpioidem minimam vel Anagallidem referentibus: flosculis albidis, & semine non dispari, radice multis fibrillis sparfa.

ANAGALLIS Phœnicea mas, & Cærulea femina.

Ang. Pimpernell.
Gall. Mouron à fleurs rouges, & Bleues.
Ger. Gauch heyl.
Belg. Duychel heyl.

Effig. Dod.
60.61.

GAMIS dicebatur Græcè Hyacinthus, vnde à colore hyacintheo Anagallis nuncupari potuit. Fortè dixit antiquitas Anagallidem, quia superbula floribus venustis vias passim ornet, colore oculis grato & amico. Antiquorum duas nouit nostra ætas, Phœniceam & Cæruleam, quæ neutiquam effigie diuersæ sunt, sed duntaxat colore atq; effectu. Etenim Phœniceam siue marem illitu sedem euocat, quam prolapsam reprimit Cærulea, ut Dioscorides ex aliorum historijs recenset. Vtraq; autem passim fruticat teneris cauliculis & folijs Alsine, copiosis floribus & semine pusillo in pericarpis Lini.

Cærulea autem, præterquàm quòd non perinde frequens, variat colore & acrimonia, caloréve remissiore est, si antiquorum historiæ standum.

ANAGALLIS LVTEA.

LVTEA quàm visu pulchra & rara transmarinis regionibus uti Lugduni, tam crebra in Angliæ nemoribus, locisq; opacis, Mense Iunio & Iulio. Flores promit luteos, umbrosis gaudet, cætera mari & foemine similis, idcirco harum vnam quamlibet qui norit, primo quoq; intuitu cæteras duas noscitat. Superiore èstate maximam huius copiam nacti fuimus in quadam densa & amœna Sylua Couentriæ proxima: itemq; dum hæc commentaremur, altero à Bristoia lapide, in Northonij Equitis nemorosis pascuis propè deuexum fluminis Danem. Hallucinatos planè suo more queritatur Senensis, qui herbam vocitatam *Panarinam* Barbaris Insulribus, Hetruscè verò *Centone*, Anagallidem tradunt: atqui si sciret vtramq; harum *Pimpernell* plebi Pharmacopœorū & muliercularum hic in Anglia dictari, nã ille multò grauius sibi ferendum putaret? Quasi verò non vulgi sit pervertere nomenclaturas, veteres delere, nouas suo, non nostro arbitrio, cudere & commutare: si seipsum intueatur, iamiam & vulgi decipula captum dicet. Nam morsum Gallinæ, qui est Alsine, Anagallidem hanc vulgi more hallucinatus fecit. Et vtinam non nemo bonus genius illi in mentem non Diaboli Morsum, huic loco prorsus alienum, sed potius errores suos, & supercilium fastu Cerbereo elatum sibi spectanda immisisset. Quin hanc Succisam, tametsi iamdiu Trago & Fuschio monentibus, hic non pauci imperiti Pharmacopœi & plebecula Scabiosam dicant & vtendam præcipiant: Illuc si distulisset, multò consultius fecisset: nam fortè Scabiosæ species est, & saltem ad scabiem multum pollet.

MORSVS GALLINÆ Folio Hederula flore figura & pericarpis Anagallidis.

Belg. Doenderbeet.
Germ. Zunerbiß.

Effig. Dod. Epit.
62. non est E-
latine.

VBIQUE passim iuxta sepem reptat cauliculis hirsutis Alsines Myosotidis, folia pusilla, angulosa, Hederæ aut Hepatici trifolij, flores Cærulei Anagallidis aut Teucrij pratensis. Semen paruum inclusum pericarpis.

AN-

STIRPIVM aduersaria noua.

195

ANAGALLIS AQUATICA,

siue Becabunga Germanorum, non est Cæpea

{ Gallis. Berle.

{ Belgis. waterpunghe.

GALLORVM plebecula hanc Berulam dicit, sed consultius recentiores Herbarii Anagallidum vnam, vt cuius folia & vires non parum imitatur, nec non natales sectatur vdoorū, secus pratenses riuulos in pigris aquis, aut substillis; folia edit leniter ambitu crenata, fruticosis ramulis, teneris, carnosiss Portulacæ & Nummulariæ in humū, deflexis ac ramulis crebribus, foetura diti florum cœruleorum Anagallidis similitum, stipatis: Radix multis sparsa fibris albicat, & Nummulariæ modo subtus serpit, tota gustu acrioris Nasturtii, odore non ingrato, nec min ore ope apud Frisios & Germanos vsurpatur, aduersum indigenam morbum illic Scorbutum nuncupatum, quem iuuat, non secus atque Cochlearia, Cardamine aquatica siue Berula, & alia quas alibi diximus. Porro Cæpeam non videri, inter Portulacas differuimus.

ANTHYLLIS PRIOR Lentifolia

Peplins effigie, maritima.

QVASI floridula, lanugine cana qua pubent Anthyllides dictæ videntur, aut potius à floscellorum exilitate, quales cernuntur gemmei perelegantes, pusilli, in Anthyllide hac Maritima lentifolia dicta à nobis depicta. Ac tametsi per notas minus accuratas ne nactus quidem veram primam Anthyllidem, integrum fuerit certo asseuerare quamam Dioscoridis prima sit, tamen quoad eius fieri quit, vt consulamus rerum Historiæ, non penitendi iudicii coniecturæ aptandæ sunt tum descriptioni, tum plantæ isti, quæ non perperam inter se quadrant. In Angliæ insulis Australibus, ea præsertim quæ Portlandia vocatur, litore Norhtmanniæ obuerso, plurima quam hic damus, pusilla prouenit in sabuletis & arenosis vadis depressis, & apricis: geniculis, & ramulis palmum tresve uncias longis, angulosis, pallentibus & foliis, Lenticulam, Alsinem minorem, vel Peplin referentibus. Flosculi summis insunt ex buxæ herbacei, dentatim stellati, Sedi minoris Iunio & Iulio: Semen Tythymali in perexiguâ Chamæcysæ triquetris thecis alit: prolixiore, exili, geniculata radice, sabulo altè infossa Soldonellæ modo: tota falsa, gustanti amaricat & parum quiddam calfacientis indicat. Nec hesitationi locus iam foret, si quàm certum habemus facultates hanc sortitam esse, quales primæ Dioscorides asserit, tam confidenter discernere auderemus effigiem planè eandem esse: nos monet tamen non parum Alsinæ quæ quia huic, vt sanè est, cum similis admodum foret, eodem nomine Anthyllidis vocata donataque fuit, vt apud Dioscoridem videre est. Et multò aptius congruit huius nouæ maritimæ foliola legumini Lenticulæ, quàm palustris Lenticulæ. Quare comparatio videtur accipienda de Lenticula legumine, non de Musco paludoso quem σευορ οὔδιον φάνα, id est, muscum lenticulæ similem, vocat Dioscorides, non absolutè Lentem.



MARINA INCANA ALSINÆ

folia, Norbonensium, an prima ANTHYLLIS

DIOSCORIDIS?

R ij.

ETIAM

ETIAM maritimis agri Nitiobrigi ad *Perans* & *Lateralas* reptat hæc pascim, vti superior, ramulis compluribus, sesquipalmaribus, foliis *Alsinæ*, aut potius *Lenticulæ*, sed per interualla quædam, quasi circum geniculos exortis, numerosis: copiosissimis item floccellis in summo aggestis, muscosis, albidis, floridum quasi nomen *Anthyllidis* ostentantibus & testantibus, feminis etiam pusilli feracissimis: gustu amaricante, subsalfo, nitroso, calidiufculo.



ANTHYLLIS Marina Norbonensium altera, admodum salso-acida, Chamæsyce facie.

NE aliò debet aut potest referri hæc maritima iisdem locis reptans, quam inter *Anthyllides*, vt quæ aliis multò falsior sit. Foliis & facie est *Herniariæ* aut *Chamæsyce*: flosculis pusillis subter foliola ex albo purpurascētibus; semina in florū calyculis quam *Clinopodij* minoribus multò occluduntur. Tota gustu salso, acidulo, lactei succi expers, & exucta: nec proinde *Chamæsyce* statuenda, vt quidam, qui siccam tantum in suis museolis viderant, prodiderunt.



PARONYCHIA Alsinifolia.

QUI ei vnguium affectui inedetur quem Græci *Paronychiam*, Cicerò autem reduuiam dicit, *Paronychia* dicta fuit: hodie minus sanè nota, propter multas plantas, quæ consimiles sunt, eandemque adumbrant apud Dioscoridem, magis quam pressè delineant: inter quas tamè in tectis & parietinis reperitur vna, vt si quæ alia, *Paronychiam* imitata designationem. Pusilla est plantula tota *Alsinæ* figura, non multis foliis *Alsines* vel *Lenticulæ*, nec dissimilibus donata, sed exorta ad inum cauliculum aut pedicellum dodrantalè, albidum, admodū exilè, quaiis *Callitrici* *Apulei* putati: in quo summo flosculi candidi, & theculæ minimi *Thlaspi* pares, sed compressæ & foliaceæ: gustu aliquantum acri, eoque opinionem fouente eorum qui *Paronychiam* autumant. Nam illa capillacea, quam *Commentator* iactat, non perinde potest *Paronychiis* prodesse: esseque gustu & facultate *Capillarium* cæterarum, monuimus alibi.

PARONYCHIA ALTERA, FOLIO Rutaceo, flore albedo.

CONVICTRIX in parietinis locisq; mucidis, petrosis, vmbrosis, vbiq; cum superiore obuia etiā est hæc; cauliculis dodrantalibus & palmaribus, crassiusculis: foliola *Rutæ* bifida, interdumq; trifida incisura, magnitudine & parilitate quadamtenus cernuntur, colo.

colore pallidula & subrubra, succulenta : floribus albidis, seminula etiam in thecis Scorpioidis Myosotidi non disparibus: vtraque exeunte hyeme Vere primo flosculos edunt: deinde minimo æstu marcescunt, vt nupiam toto anno compareant.

ELATINE DIOSCORI. *Veronica*

fœmina Fusch.

Q V I D hîc carp at aut balbutiat Com-
mentator nescit, neque scire voluit
nos, sibi ignotam fuisse veram Elatinem,
coccinuat tamen effigiem fortè Alsing, fa-
cultates verò reticet, nec quid sibi volu-
erit, hîscere audet: Genuina autem Elati-
ne omnium nuperorum suffragiis, viribus
& facie congruis, est ea quam Germani
Scriptores, Doctissimus præsertim Fusch-
us, Veronicam fœminam dixerat, quan-
quam alius generis à mari Veronica. Plu-
rima in segetibus Norbonæ, Galloprovin-



cig, Delphinatu, Germaniæ & Italiæ quibusdam locis: rarius in Belgio, & Anglia com-
paret. Pedalibus serpit viticulis, tenellis, flexilibus, pluribus, ab exili radice: folia Helxinæ
minora, rotundiora, sed pilosa & incana, ad Nummulariam vulgo dictâ accedentia, pro-
munt: flosculi Hederæ terrestris, aut Anthirrini, sed perpusilli, albidî, & semen exiguum,
nigrum, subrotundum, Anagallidis par ac simile. Astringentiæ non modò hæc facultatis,
merito dissentericis, tumoribusve fernidis prodest: verum etiam tanti fit hodie ad can-
cros, carcinomata, malique humoris vlcera, vt euentus superet, aut temeret fidem: Na-
sum qui decreuerant abscindere perdocti Medici complures, præceperantque eiusdem
sententiæ Chyrurgis valde exercitatis id faciendum, quidam misel lus Barbitonfor, qui
de quopiam suo herô eximio Medico hanc dotem didicisset, dissuasit: huius litu & potu
effecit, vt nec nasus abscindendus foret, & vt reliquo corpori in lepram prono optimè
esset: amaricant folia astringuntque siccitate non exasperante.

VERONICA VERA & maior.

German. Erenbreisz & Grunheyl.

Belgis. Eren prijs, Laudata nobilium,

EST hæc etiam nominatissima, nec vulgaræ commendationis ad vlcera, vulnera, ac ple-
raque virulentorum affectuum. In syluis Septentrionalium passim, sed editis & mō-
tosis Meridionalium collegimus pusillam, ramulis crebribus, villosis, purpurascens, *Betonica Pauli*
gracilibus, pedalibus, stratis: folia nonnihil ad Teucii vel Chamædrios crenis accedunt, *Dodo. 21.*
sed lenioribus, & Berberidis quasi effigiâibus folium, sed hirsuta Pilosellæ: flores dilutè
purpureos summi turiones edunt, Germanicæ Germanidree, seu Teucii pratenfis effigie,
sed minores: in marsupio compresso grana minuta. Fibrosa, nec proluxa radix.

MINOR Serpillifolia VERONICA.

NE c hæc nisi tractibus Septentrionalibus etiam in hortis sponte multa serpit, Alsing
vel potius Serpilli ritu & habitu, eoque nonnullis putabatur Serpilli species. Verum
crassiore multò est folio, nec crenato, aut hirsuto albido, vt Veronica mas, cui nihilò
minùs foliorum ordine & ortu, viticulis, floribus, & seminis viticulis permultum simila-
tur, sed magnitudine inferior. Radix tenella, fibrosa, subtus repit: calida nonnihil & de-
siccans, ad Serpilli gustum insipidiorem accedens.

R. iij.

NVM.

Germa. Phenninck Kraut. Egeltkraut, & klein Waterkraut.
Belgis. Phenninck cruylt & Egeltcruylt.
Angl. Hearbe two pence.

Centimorbia.

OPACIS & riguis gaudet, sed regionum Septentrionarum, & frigidiorum potius quam calidiorum (vbi pauca) indigena est Nummularia, à foliorum circinnata rotunditate numum imitante dicta: bina exeunt hæc, ex aduerso æquis, sed crebribus spaciis viticulorum humi repentiū, Elatinæ longitudine, & ritu: colore & habitu quadatenus Vincæ peruinæ, aut potius Anagallidis, luteo flore, cui etiā floribus luteis, stellatis iuxta foliorum exortus, etiam gemino ordine adeo similis est, vt per initia non facile sit discernere: sed Anagallidis luteæ progressu temporis longiuscula fiunt, & in imo non-nihil sinuantur: nec semen dissimile. Non modo insigni quapiam atringendi & exsic-candi dote in gargarismata recipitur, sed etiam tot ad affectus vtilis tantoperè habetur, vt Centimorbia sit dicta, & appellitetur hodie: Angliæ, Germaniæ, Belgio, & Normaniæ Galliæ vmbrosis vdis, ad sepes familiaris.

STMPHYTVM Petrum.

*Symph. Petreū
Mat. creditum,*

SYMPHYTI Petrei quæ adubrarent delineationē non defuerūt plantæ pleræque: at non similitudinis, aut figuræ causā, sed virium & naturæ, quæ glutinadi vtriq; inesse scirent, vt tranq; tametsi dissimilē Symphytū vocarūt. Συμφύω enim est cōiungo, cōglutino, seu cō-mitto. Sed nos potius ad quāpiam Cunillæ, id est, Origani, Thymi, Serpilli, Satureiæ, vel Coris Monspel. cōgenerē deducebat Dios. lectio: in Petrosis enim lignosum, furculosum totū & odoratū oritur, ramulis Origani, foliis paruis, capitulis Thymi, vt Plinii, vel vt nonnulli, qui cōiungunt λέπτα καὶ φάλλα, capitula tenuia Thymi, nulla foliorum descriptione. Saliuam cit, tum subdulcis est, purpurea radix, longa, digitum æquans: quorum simul subducta notio facit, vt nondum vllam queamus statuere stirpem Symphyto vero ean-dem. Coris verò Monspelliensiu, atq; Sideritis odora pusilla, spicato flore nos poterant adducere ad Symphyti persuasionem: verum morosis non omnia penitus quadrare videbuntur. Et Senensis plausus præproperus, capite de Hyssopo, repertam esse iam persua-ferat: verum eius postea supina negligentia, vel ambitio meticulosa, nos de eadem opi-nione deturbauit: quippe docturus sibi repertum Symphitum Petreū, natales plusquam prolixè enarrat, puchritudinem celebrat, interea nihil addit quæ ad certiore probatio-nem faciat, nō faciei, non viriū, aut vsus quidquam. Quare quid vult sibi, vt assentiamur, si nihil explicat, extricat, aut docet? Vidimus iamdiu plantam, quam putamus ab illo re-presentatā, prope Bernardi celsos Sabaudicos montes, & de Anguillara audiuius, cur nō ausus fuerit, vt in quāplurimis, describere: audere id igitur possunt, qui viderunt. Est ea floribus purpurea confertis, speciosis, Ericæ maioris, spicatis, foliis pusillis Chamæpiteos, breuioribus aliquantū hirsutis Pilosellæ modo, in furculis pedalibus, lignosis: sed inodo-ra, radix lignea, non purpurea, nec dulcis gustu planta, nec saluaria. Quam ille cum se reperisse, Deo secundo, exultabat, foliis Origani & Hyssopi, non animaduertebat Hyssopo Dioscoridis folia esse Origani: & Dioscoridem nō folia, sed caules Symphiti, Origano assimilasse, vt & Plinius: folia verò parua distinctè, & seiunctè dixisse.

BVGVL A, quidam Prunellam.

GALLIS, vt Ruellio & aliis, vires illæ decantatæ à vulnerariis Medicis & Em-piricis, ad foris intusque multos morbos curandos, qui Symphito inesse folia Origa-ni legerant, ansam dederūt opinandi Buglam vulgò vocatā, aut Bugulam, esse Symphytū Petreū: est sanè miræ vis cum Sanicula potionibus vulnerariis: quare vel isto nomine & certi-

certitudine malim, vt Symphito vti, quàm Mathio. incertæ cōiecturæ acquiescere. Consolidam mediam, id est, Symphitum, Chyrurgi vocarunt, seu Solidagine & Bugulam. Sed huius similem Prunellam vocatam, aut Consolidam minorem, eodem nomine donant, propter vultum & vires haud ita dispares, aliōq̄i natales Bugulæ vel mediæ consolidæ sunt vda prata, & syluæ, & horti: sarmentosis ramis, exilibus, flexilibus, humi reptantibus, & foliis Becabungæ vel Anagallidis aquaticæ, & alicubi depactis, vnde alii eriguntur furculi, angulosi, sesquipalmum alti: quibus folia crassa, rotunda, oblonga, leuiter serrata, & auersa parte Hedera Pruniue modo, aut granati colore puniceo, (vnde fortassis vtrauis Gallis Prunella promiscuè dicta) flores iuxta folia à medio summo tenus verticillatis spaciis cœrulei elegantisque prodeunt, interdum niueo candore. Radix fibrosa, tenera, maior quàm Prunellæ.

PRUNELLA SYMPHITVM Petrum.

PRUNELLÆ enim pusilla, sed prolixior subest radix, virgultis item reptantibus, quadratis, hirsutis, palmū & sesquipalmū longis, inflexis: foliis longioribus, supernè acutioribus, Pulegii regii, vel Origani, vel Trifolii, spicatis & purpureis comis longioribus. Oritur hæc pratis & hortis sponte, etiāque locis aridioribus & saxosis Garmuntia Syluæ, & alibi finitimis MonsPELLIaci agri, inter Lados & Ilices Baphicas, vbi flores dilutiores multò, folia ima profundius incisā vtrinque, Valerianæ agrestis modo: vocant vulgò illic Symphitum Petrum, nec parum laudant Aſtatiſ & D. Medici.

CONSOLIDA minor Officinarum, an BELLIDES

Pliniana?

Gallis. Marguerites, Pasquettes.
Ital. Primo flore.
Belgi. Madeliencn, Berlowen, Margrieten.
Ang. Dayſie.

ETſi tacitus Bellides præterit Diſcorides, tamen quæ apud Plinium extant perpauca & vaga, perſuaſerunt poſteritati hoſce flores, qui in pratis abundè primo Vere erumpunt, Bellides eſſe: Nam inquit ille, Bellis in pratis naſcitur, flore albo, aliquatenus rubente: cui coniecturæ fauet nomenclaturæ expenſio: Potuerunt namque funeſtæ illæ Beli Danaï Regis quinquaginta natæ (quæ totidè nuptæ maritis, eos quælibet ſuū iugularunt) nomen dediſſe, vnde fortè poſtea iſtos flores vocarint, quia multi viſuntur gregatim vnà & bellulī, vnde vocantur vulgò Marguerites: ſunt quippe glomerulī multi florū quaſi vniones, ſiue Margaritæ, è pediculis crebribus, palmaribus, teneris, pilofis, erumpentibus è medio foliorum, quæ Pratenſi minori frequentiori inſunt multa, viridia, crebra, craſſiora, Oleæ aut Pilofellæ. Radix puſilla Plantaginīs.

HVIVS autem differentiæ varietas in florum colore & magnitudine: Eſt enim flos frequentius albus, medio luteus Anthemidis. Interdum & purpureus. Nec quæ in hortis coluntur ad coronamenta, differunt, niſi cultu: annua enim & frequenti transplantatione maiores, habitiores, confertiores, duplicati, & triplicati, & elegantiores euadunt flores. Hiſce potiſſimū vtuntur vulnerarii, vnde Conſolidæ minores dictæ fuerunt.

BELLIS MEDIA.

PERPARVM videtur diſſerre quam Mediam recentiores ſtatuūt. Eſt quippe foliis al- terius Pratenſis duplò maioribus, & flore in ſesquipalmari & pedali, pediculo graci- li, nec diuerſo à ſuperiori. Hanc à ſelectam in Syluoſis montibus Germaniæ nobis com- municauit D. Pennius Anglus.

BELLIS Cœrulea, GLOBULARIA
MonsPELLIenſium.

R. iiii.

A Flo.

A FLORVM glomerulis globisue Globularia recēti-
ribus vocata, Monspellienfibus præfertim, apud quos
Gramuntia fyluæ vicinis deuexis pratis oritur, foliolis
Bellidis vulgaris, nigrioribus, sed iuxta pedicellos rigi-
diusculos palmares & sesquipalmares angustioribus. Flo-
res cærulei, pulchelli, in orbē glomerati, Scabiosę mótanę
modo & colore. Radix lignea, fibrosa. Rarior hæc Italia,
Germania, & Francia.



BELLIS MAIOR.
CONSOLIDA Media Vulnerariorum.

{ Germa. Gensblum.
{ Ang. Greate daylie.

QUÆ recentioribus maior Bellis vocatur, caules emittit graciles, lignosos, plures, te-
retes, cubitales & pedales, Iacobææ similes, è fibroso flore & sparsa radice, in quibus flo-
res medio luteos, & ambitu candidos Buphthalmi, aut Pyrethri vulgaris; folia Senecio-
nis, serrata: secus margines agrorum & pratorum familiaris.

PILOSELLA, Auricula muris.

NEC etiam istius vulgarissimæ herbæ vsu, quod sciamus, meminere antiqui, sed
dumtaxat recentiores, qui Pilosellam vocarunt, ab hirsuta Pilosellaque foliorum su-
perficie quadatenus albicante, oblonga Bellidis, sed aliquantum supernè concaua, auricu-
lam murinam effigiente, vnde Myosotidem quidam dixerunt; tametsi alia sit Dioscori-
dis Myosotis: Pedicelli item hirsuti, graciles, palmares, & sesquipalmares sunt: Floresq;
edunt ætate Bellidis, aut Hieracii pallidiusculi concolores: vniuersa astrictoria facultatis
quadam tenuitate calida mixta, cuius ea est vis, vt succo decoctōne acies chalybæ cāden-
tes sæpius mersæ, quamlibet duritiem lapideam, ferreamue prædant & demoliantur,
nec tamen retundantur, aut hebetescant. Vi etiam est præsentissima ad calculum.

{ Gnaphalium } Vulgare.
{ Marinum.
{ Alium montanum.
{ Tertium Anglicum.
{ Leontopodium.
{ Stachas citrina an Chrysocome?
{ Stachas citrina altera minus odora.
{ Inodora altera flore maiore.
{ Apios.

GNAPHALIUM marinum: Cottonaria vulgi.

Bombax hu-
milis.
Petit Coron.

FNA & EIN dicunt Græci vellere carperéve lanas aut pannum, non secus ac *spadelp*,
tergere, concinnare, & interpolare, vnde Strutio & Gnaphalion, quod Romani eodem
significatu Centunculum nuncuparunt, & Tomentariani, ac Plinius Chamæzylon (sic
enim emendamus, quod omnes etiam recentiores legunt Chamæzelon) appositè dixit:
nulla namque planta raritate, elegantia, & vtilitate propius imitatur Gossipium, imò ni-
hil aliud, quanta est, nisi tomentum videtur, si radicē exceperis, & intimam florum super-
ficiem,

ficiem, corymbos enim Abrotani foeminae aureos, numerosos, multifidis caulium furculis, quos stipat lanugo candida, aut cinericia perquam densa, cinguntque folia quoquoersum multa, fungosa, eadem pube obducta, ta-ctuique vniuersa planta valde quam blanditur, holoserici attrectatu, sesquipalmum pedemve alta fruticat, duriusculis virgultis, sarmentosis, tomento crasso incanis: radice lignea, recta palmum longa, inflexa, Aizoi medii vel Paralij Tithymalli similia ortu, situ, & figura, sed minora. Vniuerso litore & sabuletis à Marianis aquis ad Ceti motis radices & lacum plurima, alibi haud temere occurrit Norbonæ. In Adriaticis littoribus non vidimus, & nonnullas plantas primum ostendimus Venetis, & Veronensibus Bellicoco & Caffeoario: Cortusio verò Patanij chartaceum Herbarium spectandum cum dedissemus, huius cum Polyrhizi Aristolochia, Thymalli serrato, floribus Oponitæ, plantulam nobis perisse animaduertimus, nec multo post easdem depictas Mathiolo suo muneri missas fuisse, quo lubentius persuasi fuimus, propterea quia neque descripsit in postremis commentariis, neque quam & vnde oriunda foret, monuit, nec flores apposuit pictor, quia illi nostræ flos semenque tunc defuit: triquetrum enim, pusillum, acerofum, oblongum, albidum. Astringit magnoperè & desiccatur tota planta, nonnihil falsa, nec tamen ingrata, aut amara, aliquantum aromatica odore, quadamtenus citrinæ Stachadis, vel gummi Elemni: Iulio floret. Sæpius vsi sumus furculis pro elichniis, qui viuide alunt flammam, Olei quippe caterique pinguis liquoris potrix est.



GNAPHALIVM vulgare, Filago Centunculus.

VSQUEQUAQUE quidem Gnaphalium istud ubique aridis & sterilibus multum & notum, videtur foliis & cauliculis imitari maritimū, differt tamen cum foliis, floribus, lanugine, odore, cadore, tum speciosaque & hilari aspectu, Gnaphaliū superius, à Filagine, que potius ad Stachadem citrinā referenda sit, aut certè cognitionis vtilitatisque causa, sit cum ista quæ statim subdetur Montana à nobis vocata, medij generis: est enim dysentericis & profluuiis immoderatis non parum accommodata. Herbula filago est plusculis cauliculis, pullis vel cinericiis, lanugine tectis, gracilibus sesquipalmum altis, foliolis crebribus, aduolutis, breuioribus quam Stachadis citrinæ. Floribus glomeratim oriētibus: partim mediis è furculorum diuicationibus, partim etiam extremis furculis, sublateis & pallentibus: molicella tota & pusilla, frequentior hæc hac delineatione occurrit.

Gnaphaliū.

Varietas GERMANICI maioris & secundum folia floridi.

IN TERDVM & aliā vidimus in Germania maiore filagine etiam foliis & caule Stachadis citrinæ: & inodorā, alibi etiam flosculis non in summo, sed inter foliorum intervalla passim secundum longitudinem ortis: quemadmodum oriuntur in ista, quā ut nondum planè notam, hic appinximus.



AN.

ANGLICVM folio longiore perperam
Leontopodium alterum Mat.

Gnaphaliū ter-
reū Anglicum.

RACILIBVS & rectis virgis, nullis fili-
fili alis, proceritateq; æquat Absinthium, colore
etiā & figura refert: folia ab imo cespite, radique
capillacea, duplò longiora & latiora quàm Stæ-
chadis citrinæ, fermè Salignea effigiant, toto re-
liquo caule Psyllo longiora, angustiora, sed pau-
ciora, prope quæ media in pedicellis exiguis
vellicatim terni quaternive flosculi, papposi, è
Buxeo pallidi Senecionis, vel Stæchadis citri-
næ heret astringit: nonnihil amaricat, multū ex-
siccatur. Tertio à Lódino miliari opacæ syluæ cli-
uus multam alit, cis Tamesim.



GNAPHALIUM MONTANVM

Purpureum & Album Pilosella minor Fusch.

Varietas.

MYOSITIDIS vel Pilosellæ minoris effigie oritur
hec in arduis frigidis, iugis, & quo loci Vaccinia ni-
gra, aut Idea Theophrasti vitis putata, foeliciter proue-
niunt: vix sesquipalmum æquat, perexigua radix, rep-
tās fibrillis. Folia incana, mollia, ad imū penè tota, vti in
Bellide, reliquo caule pusillis, perpaucis & exilibus, flos
summo singulus globulus est, Scabiosæ ferè, sed com-
pactis flosculis permixtis, partim purpureis, partim can-
didis, hic rarior, frequētius quippe occurrit flore albo: valde
quàm astringit, & exsiccatur, gustu insulo. Ratisburgi
Germaniæ & ad Calcaris montem Norbonæ prope pa-
gum sæpe collegimus.



LEONTONPODIUM SIVE

Pes Leoninus.

Mathio. 1193.

PEDUM Leoninum propter villosam foliorum & florum effigiem crus pedi annexum
aliquantum referentem, dixerunt, quemadmodum pedem Leonis, Leporis, Vrsi,
Columbæ, Corui, & Gallinæ, tum antiqua, tum nostra ætas. Iam inde à Brunfelsii Ger-
manorumque aliorum de re Herbaria meritisimorum scriptorum temporibus inuen-
ta & descripta herbula montana, quæ non parum foliis Rosam, seu Rorellam imitatur.
Est quippe foliis angustis, oblongis, hirsutis, sed incanis, præsertim in imo, duos pol-
lices longis, Gnaphalii, Stæchadisve Citrinæ latioribus: In caule summo itidem hispido,
ternos, quaternosve digitos alto, gestante flores, nigraçantes ex fusco violaceo, &
capitula latiusculo, sed denso ambitu sparsa, ac nonnihil quibusdam foraminulis im-
pressa, quasi Leonis vestigium, vel soleam imitatis. In Germaniæ arduis, adeoque Italiæ
Alpinis & Baldo Veronensi inuenitur, sed rarius, idcircoque quid possit aut præstet
nondum scitur.

CHRT.

STIRPVM aduersaria noua.

203

CHRYSOCOME aurea^{ne} coma. STÆCHAS CITRINA
nostras, siue Luteus Amaranthus.

Ang. Gold flower.

Ger. Mottenblumen, Rheinblumen.

Belg. Reynbloemen, motten cruyt.

CONSPICUA florum corymbaceorum aurea coma nomen dedit Chrysocomæ, quâ
hactenus nosse non potuit ætas nostra, veri Hyssopi Dioscoridis ignoratione, cuius
corymbaceis comis assimilantur huius flores aurei. Iam cum Hyssopum veram inferius
ostensam & assertam à nobis, corymbis comparamus Stachadis Citriæ dictæ, reliquasq;
descriptionis & virium expendimus notas, persuasum planè habemus, Stachadem istam
veram Chrysocomen, quam etiam *Luteum Amaranthum* vocarant Græci, à colore & ful-
gore penè immarcescibili, cuiusmodi in istius plantæ floribus esse quilibet Pharmacopœus
agnoscet: Perstât namq; diutissimè corymbacæ vnibellæ, rotundæ, multisq; quasi florum
bullatis glomerulis, sparsim tumultuarièq; cõditæ, Origani non absimiles, aut Hyssopi
Dioscoridis à nobis datæ, lucente nitentèq; per maturitatem coma aureo pallore, & mol-
licello vellere, pusillo intus semine Maioranæ, sed exiliori, ruffo, acri, odorato: In cauli-
culis, rectis, albidis, nonnihil incanis palmum & sesquipalmum altis: folijs oblongis, an-
gustis, leui hirsutia incanis, Stachadis, vel Linariæ Osyridis, quam doctiores minus
rectè Chrysocomen antumarunt. Radix fibrosa, gracilis, nigra foris, gummi Elemnium
vel Cyperum rotundum Syriacum, redolens vti flores & tota planta: gustu etiam aro-
matico, medicato, acuto & feriente, non nimio feruore subastringete: cuius amicorum
quorundam doctiorum imitatione experti sumus, admodum insignem vim, ad iecoris
ex glutinosi succis ac vaporibus crasis intra tunicas discursantibus, diuturnos affectus.
Pulmonibus verò inflammatis non impunè dari meminisse par est, sed affluxu pituitæ a-
cidæ, ferosæ vel falsæ calefactis aut erosis: Eoq; tutius vertisset interpretes, pulmonarijs vel
peripneumonicijs, quàm inflammationibus pulmonum. Præstantior hæc & speciosior
Norbonensis Galloprovinciæ, & Hispaniæ aridis & petrosis, vbi odoratissima & pluri-
ma, æstate, radice perenni. In Germania ad Rhenum, reliquaq; Gallia paucior & ines-
ficatior. Eapropter nihil quò minus veram Chrysocomen statuamus obstare videtur, nisi
verbulum vnum aut alterum, quibus subesse quippiam labeculæ Monspelliensēs nostri
præceptores Rondelletius & alij, qui hanc Chrysocomen vocabant, iamdiu subolfecerant
ex Pliniana & codicis calamo exarati coniectura. Sic enim legebāt *σταχίαν λεωσίην*, radicē
rigidam siue firmam & tenuē, nigram vt hellebori, *ὅς ἐστι μελανὰν* nigra sane est foris:
& paulò *μᾶλλον ἀρμολόσσου* vel *οὐμοιζέου* ἐν τῷ γλακί, nempe Cypero respondentem
gustu ex suauī austero, quæ odori & saporī huius quàm quòd maximè congruere illis vi-
sa fuere.

*Amaranthus
Luteus,*

STÆCHAS Citrina Altera.

NEMANSII ET MONSPELLII meminimus
alteram huic similem, sed graciliorem totā, nigri-
orem, squallidiorem, cineritiam, pluribus cauliculis viti
ceis pedalis: Radice exiliore minusq; fibrata, quia ra-
ro nisi in rimosis rudibus & mœniijs vrbium viciat,
fusca foris, minimum odora. Florum corymbi singuli
in singulo caule, nec aggesti, vti superiores. Semen ta-
men simile, exile, fuscum, quod Londini satū nobis flo-
ruit & annuè viguit.



STÆ.

RARIUS hæc multò occurrit Ilcetis Cocciferis *Som-*
mieres inter & Monspellium, tota pulchella, facie Stæ-
chadem Citrinam præferens. Folia tamen sūt latiora inca-
na, vti tota planta: Cauliculis palmaribus, in quibus flo-
res itidem Stæchadis Citrinæ alterius grãdiore s, lógiores,
Laſtucæ agrestis quadamtenus. Radix non magna, ligno-
sa, inodora tota: minus nota, peruia, aut inuétu facilis, ideo
nondum vires agnoscuntur.



APIOS vera, siue Pyriformis radix Dioscoridis.

RADICIS indicio cognitu facilis Apios, quæ rotunda, turbinati coni Pyrum imitan-
tis est, cæteroquin nobis hæc inquilina, primumq; annis abhinc plus minus decem vi-
sa Venetijs, apud eruditum Senem & Doctorem Comatcum, qui istam primum è Cræta
Insula erutam, illiq; Pyriam vernaculè vocatam, studiosis quàm plurimis detexit. Dein-
de nobis atq; peritissimo Pharmacopœo Valerando Donrez visendi attractadiq; copiam
fecit plantulam Cæpacea radice, Pœoniæ breuiorem crassioremq; vnum è bulbis simulan-
te, concolorè, pullamve foris, sed intus albicantem, iam aridam, rugosam, aliquot emergē-
tibus gracilibus cauliculis prominentibus: foliola Lini aut Hyperici minora, breuiora an-
gustiora, flosculis, pallidis, Tithymali minoribus. Hæc quin esset vera Apios non ambi-
gebat ille, vt cuius vis purgatricis periculum non semel se fecisse aiebat, grauis & mini-
mè triualis peitiæ vir: cui eò lubentius assentiebamur, quòd nullà aliam videremus figu-
ra perinde Apio quadrare: & istà iamdiu iactatà leguminis speciè, quàm Fuschius Apiū fe-
cit, tã lógè abesse à legitima Apio, quàm dissidet Cyclamè à Cicerula, cuius est fermè ef-
figies illa Fuschiana: radicibus quidè bulbosis, sed neutiquā purgātibus, imò ab Opilioni-
bus peregrè proficiscentibus esitari solitis, vocariq; *Putz cardz* Anglis, & Germanis, vt in
Astragallo monuim⁹. Multò autem magis mirati fuimus, nò incelebrè Tholosatè Medicū
Augerium Ferrerium, qui libello de Lue venerea, hanc eandem sibi alijsq; adeò veram esse
persuaserit, vt profiteri ausus sit posteritatis theatro se præparatas ministratâsq; istas rapu-
las Venereis ægrotis vidisse, adq; lotiones & fomenta dolorū decoctionē vsurpasse, porrò
Imperat decoctionē harū faciendā vti Guaiaci, Salsæ atq; Chinæ siue officinarū Apij, quā
docendo aliud longè esse ab ista planta, multum diuq; æstuat. Optimum virum monuisse
potuerunt illius primæ qualitates alimentosæ & ignauæ potius quàm medicatæ. Apij au-
tē vox, quia polysima variâq; significationis apud Græcos est præsertim literula vna aut
accentu mutato: eoq; nostri Barbari non tamen indocti, sed magis de re quàm de verbis
anxij, cum hanc radicem & Pyrum propter figuræ similitudinem, atq; *ἁπείον* aut Chi-
nam, propter nullam fermè gustui perceptibilem qualitatem vocassent, (sic enim fo-
nat *ἁπείον* Græcis, qualem vocat cucurbitam Galenus, nonnulli aerem) dederunt im-
peritis ansam putandi Apion Dioscoridis ad Gallicam luem mirum quantum prodesse.
Hincq; errorem geminarunt cum quòd istos bulbillos nulla purgandi vi præditos apium
verum Dioscoridis fecerunt: tum quia autumarunt verum Dioscoridis Apium morbo
Gallico magnum præsidium: cuius facultates non præstatiores quàm Ebuli aut similibus
infernè supernèq; humorem pituitamq; excernentium, Dioscorides tradit. Et quia pru-
dentia huius veræ imperarent quadragenam potationem catharticam futuram? aut si
rectè agerent, cum drachmam, s. purgationis ergo Chinæ decocto addendam præcipi-
unt? Verum nos honoris causâ istorum nomini parcimus, hancq; duntaxat respon-
uncu-

unculam parentamus Præceptorum nostrorum manibus meritisimis, quos illi inscitia ignauiaque traducebant sua inuestiuncula.

ETIAM NVVM in cognatione faciei & coloris geminus obrepserat error superioribus annis, propter duas radices nondum à quoquam descriptas, quarum altera Acori speciem & faciem præferentem auara institorum fex Cynæ suffecerat: alteram articulatam Pyriforma tuberculis prægandibus, Apium ab effigie turbinata mentiebantur, à colore verò & cōcretionē Cynam, nominis & rerum ignoratione persuadentes Cynam & Apii Occidua florida radicem idem esse, quia ytraque eodem vocata esset fortè nomine Apij, vt monuimus in Pyriformis.

Acoro.

ACORVS

Tholosas.

- Polium montanum* { *Marinum flore albo.*
Mediterraneum flore luteo.
Venetum.
Creticum.
Mediterraneum minus.
Polium Lauendule folium, semina dictum.
- Ageratum flore* { *Albo.*
& Luteo.
Ageratum Anglicum.
Eupatorium Mesue.
Teucrion.
Teucrium pratense.
Chamaedris.
Chamaedris maior.
Chamaedris montana, frutescens, durior.
Chamaedris altera minima.
Euphrasia.
Scordium, siue Palustris Trissago.
Scordium alterum Plinii, Mentastro simile.
Origanum { *Heracleoticum.*
Onitis.
Sylvestre origanum, Dioscori, an Syriacum?
Cretense Venetorum.
Tragoriganum { *Alterum.*
- Hyssopus Græcorum folio Origani genuinus.*
Amaracus vulgarior, siue Maiorana nostras, non Dioscoridis Sampsucus.
Amaracus siue Maiorana repens, ex quo Dioscoridis.
De Amaraco Galeni & Pauli in Parthenio.
Marum vulgare, siue Mastice Gallorum.
Marum Syriacum.
Pulegium { *Mas Plinii floribus albis.*
Fœmina.
Cerinum Monspelliensium angustifolium.
Dictamnium Cretense.
Pseudodictamnium, floribus verticillatis.
Pseudodictamnium album Officinarium, Fraxinella & Tragium recentiorum, cum Glycyrrhiza.
Clinopodium.
Clinopodium alterum.

S.I.

Ocimum

- Ocimum* { *Maius Citratum.*
Medium Duplex.
Caryophyllatum pusillum.
- Acinus.*
Erinos. { *Vulgata rotundifolia duplex*
Mentha quadruplex. { *Romana* { *Angustifolia.*
Sylvestrium sylvestre, { *Cardiaca.*
sive Mentha aquatica.
- Mentastum.*
Mentastum nineum Anglorum.
Mentha Græca, inter Lepidia.
Calamintha montana præstantior.
Calamintha montana Palegio similis Nepeta vocata.
Calamintha tertia Mentastro cognata, est Sylvestris, sive Mentastri aqua-
tici species foliis oblongis.
- Cattaria.*
Polycnemum, sive multitibia an Calamintha aquatica Belgarum?
Altera facie Clinopodii an Polycnemum?
Apiastrum sive Melissophyllum.
Melissophyllum Turcicum, sive Moluca duplex.
Melissa Turcica, Sideritidis facie flore cœruleo.
Cardiaca.
Cardiaca eiusque varietas Aspera vocata Melita, sive Moluca.
Marrubium.
Marrubium Craticum.
Balote, sive Marrubium fatidum.
Galiopsis.
Lanium.
- Vrtica* { *Communis maior & scensina flore muscoso.*
Sylvestris Dioscorid. Romana Officinarum semina
Lini.
Minor. Cania Plinii.
Acrior non mordax, sive mortua duplex.
- Sideritides, sive* { *Heraclea, sive Herculeæ, Tetrabit, herba IYDAICA.*
ferruminatrices { *SCORDIOIDES Monspelliaca.*
Montana.
Mentha folia Anglica.
Secunda Mathioli, est Canabis femina.
Prima Mathiol. vulgi est Marrubium aqua-
ticum.
- Reliquæ Sideritides quia facie diuersæ, alibi.*

πόλιον ὀρενόν *POLIVM maritimum Montanum.*
Angl. Dolepe.



INTER LVSTRANDVM CVMCTAS HERBÁ-
 rum gentilitates, & similitudines, nullam tribum videmur
 congruentius posse annectere superioribus quàm hanc: cuius
 figura, habitus, & quasi modus, magnitudóne non longè ab
 illis absunt, & folia dútaxat ambitu dentato, aut crenato, fer-
 ratóne distant. Est autè Polio nomen inuentum à canitie, canís-
 ve capillamentis & tomentacea hirsutie, quæ non modò ca-
 pitula corymbacea (vt ait Dioscorides) sed etiam vniuer-

sam

ſam plantam incanam reddunt, perinde ac Gnaphalium, præſertim locis maritimis, & deuexis collibus, & arenofis litoribus, cuiuſmodi ad Ceti montis inſulam & Magalonom Norbonenſis Galliæ, ubi ſpecioſius & crebrius, quod idem Maritimum & Montanum dici poteſt: ab radice lignoſa, recta, fibroſa, ſtatim numeroſis fruticat cauliculis, rotundis, ſequipalmeis, æque ſpatiis crebribus folia oblonga, Gnaphali leuiuſculis imprefſa crenulis, rigidiuſcula, quæ ex aduerſo vnâ caules cingunt: inque ſummo radiatim circinatimve florum globulos corymbeos effigie Serpilli candidos, effigiant: vti & vniuerſa planta tomentofa lanugine pubet incana. Iſtud præ cæteris odoratius: ſed quiddam acutum & grauiuſculum naribus vnâ cum ſuauitate aſſilat. Semen paruum & teres, oblongum.

VENETVM.

QVOD minus multò crescere meminimus in Inſula Lyo Venetæ ditionis & clientelæ, necita incanum.

CRETICVM.

Nec aliud videtur quod Creticum dono habuimus: nempe huic magnitudine par, lanugine & habitu maritimo Monſpelliaco ſimile.

MINVS & mediterraneum.

PASſIM iſtud etiã locis perquam à mare diſitis Allobrogum, Lugduni, & Valentia, glareofis, & aſperis, ſalebriofis, montofis, & planis fruticat, viticulasque palmares erigit crebras, tenues, foliis crebribus ex interuallis emiſſis, anguſtioribus multò & Iuë moſcata, ſed minimè inciſis, leuiuſculis tantum denticellis in ambitu extantibus: alterius flores pallidi albidius: non diuerſum ſemen eſt, nec odor, ſed ignauiora.

LVTVM.

PROPE Aquifextias quibuſdam ſupercilliis collium & cliuorum luteis occurrit floribus, ſpectatu incundis.

POLIUM Lauendæ folio, ſoſculis pallidis,
Fœmina Recentiorum.

QVI nondum in maritimis verum Polium nouerant, iſtam plantam Polium fecerunt: Siquidem perſimilis etiamque congener Poliis eſt: tametſi odore penè nullo, guſtuque emplaſtico & ignauiore: quam Polium Fœminam ideo quidam dictitant: nec lo- *Cord. 125. ubi* *minus verè que* *dam.* ca maritima amat, vti Polium germanum, ſed montofa, glareoſa, Sabaudia, Delphina- tus, & Galloprouinciæ: Repratq; Serpilli modo, lignoſis ſurculis, dodrantalibus, inflexis, crebro geniculatis: & numeroſis foliis incanis, Stæchadis, aut ſpicæ Lauendulæ: ſoſculis etiam confertim è calyculis Roſmarini: craſſiuſcula & duriore radice.

Αγνεστού, AGERATVM, vel non ſenſcens, MESVÆ,

Eupatorium Officinæ.

Ital. Herba Giulia.

FLORIS aurea gratia, ſenectã nõ ſentientis, vmbellæq; corymbaceæ, Elichryſi æmulæ, ſatis ſuperq; fuerant docendo noſtrate Ageratum eſſe Dioſco. genuinum, quibus de notis etiam notiffimũ vel Pharmacopœorũ calculis vbiuis gentiũ iamdiu fuit: nec proinde opus fuit iſtis Herbariorũ rabulis, & triualibus declamatoribus tam multa aceruare, vt nullius momẽti obiectiones diluerent: potius inter parandum Meſuæ Sirupum de Epithymo guſtaſſent decoctum, aut folia Agerati Norbonenſis & planè ſiluiſſent: eſt enim

enim non modò valde acre & amarum, sed etiam ad ciendum vrinas intrò sumptum, forisq; suffitum, admodum efficax: odor etiam suauis quadamtenus Romanæ Chamæmillæ fragrantia, index certior est facultatù emolliendù vuluæ duritias, vrinasq; nidoze eliciendi, quas Diosco. memorat. Præterea collatio cum Origano hîc valde oportuna est, siue totam fruticem, & umbellas, vt Dioscorides, siue etiam reliquam plantæ faciem perpendas. Sunt enim hæ bullatæ umbellæ, vt Elichrysi, Origani, Hyssopi & Chrysocomæ, quas inter se confert Dioscorides, qui tamen hîc foliorum non meminit: vti neque Chrysocomæ, quam Hyssopo assimilat: Hyssopum autem Origano. Quid si etiam Origano folia assimilasset propterea istud nostrate Ageratum periisset? neque enim adeò procul absunt folia ab Origano: quinimò quibusdam Norbonæ locis & Tuscaniæ squalidis, sed depressis, videas Agerati fruticuli folia multò minora, & tantillum crenata, rigida, dura, pluraq; virgulta, Origanis variis inibi fruticantibus, toto habitu non dissimilia.

*Varietas Can-
dia.*

Agerati visitur interdum etiam illic specioso candore, nitentibus florum bullis, haud tamen de cætero, ab illo diuersum.

*AGERATVM Septentrionalium & Anglicum.
Angli. Mandelem & Mandelein.*

*Balsamila mi-
nor Dodo. Epit.
285.*

*MESVÆ
Eupatorium.
Agrimonium.*

CVLTVM tamen adhibendo humidior, vel celo Septentrionali algidior, valde variat quod colunt vireta Gallica, Germanica, Belgica: latius proceriusq; fruticans, maioribus ramis, latioribus, longioribus foliis, & altius multò crenatis, flaccidis, ad Galli cristam herbâ accedentibus. Sed Angliæ hortis viuacius nihil, isto etiâ Norbonico femine sato, ramis caducis, magisq; ferratum foliis, diu persans, admodum diuersum. Idē contigit etiam Althææ arboreæ Prouincialis, quæ in Maluam abiit trienniò post quàm in Angliæ hortis seueramus, hirsutæ canitiæq; exutis: quasi foret species diuersa. Istud spontē enatum clarissima Monspelliensium schola & collegium Venetorū Medicorū Syrupō Epithymi & Mesustiarum compositionibus, vt legitimū Eupatorium addunt: Græcorum autem medicamentis, nostram Agrimoniam. Quod institutū si cui minus aridet, ista vtatur moderatione, vt vtriusq; nempe Græci & Arabici Eupatorii equas portiones misceat, vt in Antiballomenis monuimus: præsertim vbi vtrius sit gentis compositio, incertum fuerit. Neque arbitrandum Eupatorium Mesuæ esse idem cum nostra Agrimoniam, Dioscoridis Eupatorio recepto, vt non nemo autor minimè malus, nec indoctus Belga nuper persuadere voluit: cui lubenter astipulamur, cum hæc notas à Mesuæ Eupatorio tributas suo, nostrati conciliarit: quæ sic habent: *Herba longitudinis cubiti, amaritudinis multa, cuius folia sunt sicut Centauri minoris, viridia, sed sunt aspera & incisa, & Stipes eius est subtilis, & quando exsiccatur citrinescit, & eleuantur super eum flores, qui sunt sicut subcitrini, longitudinis pauca.* Quæ Arabica simplicitate, exprimunt tum delineationē Centaurio proximā, tum perquam amaram & Absynthio similem, Cholerae purgatricem facultatem (neutiquam Gratiolæ, impendiō effrænæ & visceribus hostis) paulò superius recensitam innuunt, aliæque non pauca indicia, cuius plantæ potius, quàm Agrimonie ascribenda: eapropter satius fuit Agrati speciem retinuisse, ob eas rationes quas adduximus.

Teucriop

TEVCRIVM.

*{ Germ. Groß Bathengel,
{ Gallis. Groſſe Germandree.*

PVTA NT Hemionitidem alii: nos potius Spleniū Teucrii inuentoris cognomine donatum à Plinio, & hanc Dioscoridis præteritam, quæ tamen spleni optimè facere nata est, & nihilo secius ad Teucram inuentorem referri potest, per Plinianā Historiam: cum constet neutri harum proiecta exta adhæsisse, nedum sanguine exinanita fuisse. Ac tametsi Teucrii notio minus certa videtur propterea quòd descriptio aut malè aut mu-
tilè

tilè prodita est. Verùm huius vt & consimilium Chamædris & Germandriæ dictæ deuoluta est ad posteritatem cognitio, adeò vt etiam qui descriptiones nullas norunt vernaculè omnes vno nomine Germandreas vocent. Nec ambigendum quin legitimæ sint. Ac primum Teucrium saxosis multis aridisq; montibus fruticat, virgultis multis, rectis, lignosis, ac proceritate dupla Chamædrin vincunt. Folia verò similia sed crassiora, ali-quantò minus incana, rugosa, & aspera: flores consimiles minori Germandreæ, sed purpurei saturioris ex interuallis & ex auerso Chamædris ritu vti & flores oriuntur.

TEUCRIV M pratense. Offici. Germania & Batania
perperam Chamædrys.

Ger. Etiam Gamander.
Ang. Wilde Germander.

IN nemoribus & pratis subfruticula, cauliculis exilibus, nec duris, sesquipalmum altis, radice lignosa, fibrosa, folia ex aduerso & interuallis bina, quaterna, sena, caulem vestiunt in ambitu serrata, modo & magnitudine Chamædris maioris: spicatis Thyrsis: ramuli caulium summi donantur cæruleis ex purpura floribus Anagallidis concoloribus, Hyacinthi modo. Nondum Chamædri vtrauis nota utebantur Germani Seplasiarij isto, similitudine quidem decepti, sed viribus ducti quibus, ad viscerum obstructions, Cacochymiam, virginumq; scædos colores, miris pollet & certissimis hæc plantula. Et hanc vnâ duntaxat Germandream tum vocitabant illi: quam nomenclaturam vulgus postea impertiuit Chamædri, etiam apud Anglos & Gallos.

CHAMÆDRIS Quercuula minor. Trisago, siue Trisago.

Ital. Querciuola, & Calamandrina.

Gall. Germandree, ou Chesnette.

Ger. Gamander, leysen Bathengel.

Ang. Germander.

ABVNDÈ exprimit huins folium & faciem nomenclatura Chamædrys, siue Quercu-
culæ, vbiuis locorum præsertim apricorum adolescentis. In Burgundiacis verò colli-
bus vniuersos quasi tapetis videas stratos purpureos & viridantes opacè montosos cam-
pos, quantum est inter Chælonas (vulgo Chalons) & Machaonem. Radice exigua, furculo-
sis virgultis, numerosis, pedem altis: folijs in ambitu serratis, binis, numerosis, vt quercus,
sed profundè minus. Floribus purpureis ex iisdem interuallis vt Teucrio.

CHAMÆDRIS MAIOR.

SEd quæ Antuerpiæ hortis visitur folijs est maioribus cædidioribus, & flore cæcio palles-
cente: vbi etiam niues imbrésq; brumales aspernit, illa contrà breui marcescit.

CHAMÆDRIS montana frutescens, durior.

HÆc nobis primùm innotuit Lugduni opera nostri Va-
leradi Donrez, qui è Sabaudis & Delphinatus môtibus
erutam habebat. Eâ Chamædreos Montanû nomine, quia
illi facie tota proxima, donauimus. Est quippe folijs Cha-
mædryos vel Scordij similimis & paribus: sed auersa parte
Potentillæ siue Argentinx dictæ modo, incanis, & inæquali
exortu, nõ verticillatim binis, prodeütibus, Cauliculi verò
duriore, lignosiores multò, maiori Germædreæ siue Cha-
mædryos, pedales, humi sparsi, colore ex fusco rubentes,
Alypo Norbonensi concolores. Radix lignea, Tota nonni-
hil amaricat, Salicis gustu.



CHAMÆDRIS minima.

Fœmina Dodonæi.

S. iij.

Her.

HERBVLAM istam olim Germani herbarij nomenclatores dixerant alteram Chamæpytim, quam floribus & odore quadantenus refert: sesquipalmū alta multiplici cauliculo quadrāgulo, lanuginoso, implexo humiq; incuruo: Fumariæ Plinianæ non Chamæpyteos: folia numerosa, parua, dēta, multū incisa, Absynthij aut Quercus ritu, sed longè minora edēte. E quorum interuallis, flosculi purpurascētes circum emicant. Semen pusilla inclusum capsula, nigrū, Calaminthæ montanæ modo. Radice crassa multis capillamētis.

EUPHRASIA, siue εὐφροσύνη, alia ab Euphrosyne Bugloso.

Ocularis. } Ger. Augentrost.
 Belg. Dogentrost. } Ital. Eufrasia.
 Gall. Eufraise. } Ang. Eyebright.

APUD antiquos Botanicos nulla extat mentio vilius Euphrosynæ, præterquàm Buglosi, quam εὐφροσύνη παρὰ τὸ εὐφραίνει vocarunt, quod in vinum deiecta, vt loquitur Plinius, animi augeat voluptates. Ac tametsi non pauca possunt eadem nomenclatione insigniri, vt Verbenæ (cuius decocto aspersa cænacula lætiores conuiuias reddit,) atq; Melissa, Pimpinella & alia, quibus imbuta pocula animos voluptate demulcent: tamen hæc herbula Græcam originem testata, ducentos & eò plus annos, iam posteritati Euphrasie siue Euphrosynæ nomine innotuit, ad oculorum caligines & morbos pituitosos perueniat commendationis: vnde Germani Augentrost, oculorum solamen: Anglis Eyebright, oculorum lumen, dicta fuit. Nec abs re sanè, vt cuius puluere sæpius ingesto, per se, vel cum Aloe, ex aqua fœniculi aut Verbenæ, mirum quantum opis præstetur oculis, fluxione, aut caligine vexatis. Vno autem cui multa Euphrasia iniecta fuerit, quantumvis magnopere commendetur à multis, non perinde fidendum: vt cuius potu tantum trimestri in Heluetia vsum socium & cõmilitonem nostrum, meminimus penè ambobus orbatū oculis, & fluxionibus modò non oppressum: quum dūtaxat antea leui cataphora & lachrymatiunculis laboraret. Quare puluere, aut decocto, citra vinum, tutius vtetur quis, & ea præfertim, quæ strigoso solo pusilla est, palmaris, hilari aspectu, facie, cauliculis & folijs crispantibus Teucrij parui, aut Veronicæ fœminæ, exilioribus: flosculis item pusillis, ex luteo albicante, & purpurascētib. Pratis strigosis gaudet, sapore amaricante, deficcante, calfaciente.

σκόρδιον. SCORDIUM, Trixago Palustris.

Ger. Wasserbattenig, Lachen Knoblauch.
 Gall. Scordion & Chamaraz.
 Ang. Water Germander.
 Ital. Chalamindrina Palustre.

AB omni memoria celebrem fecēre Scordiū Allij teter odor, & alexiteriacū nomē: sed tamē penè perierat superiori sēculo cūctō ignota plāta: vix enim vigesimus hic est annus cū primū Academia Pharmacopœisq; Monspelliacis innotuit verum Scordium opera Episcopi Monspelliensis Gulielmi Pelissierij, Rondelletio Præceptoris in Piscium stirpiumq; vestigatione Thesæo & riuali. In herbis namq; & amœnis maritimis agri Monspelliaci animi causa dum vnā spatiarētur, inibiq; Allium subodorarentur, illic herbulā vixdum arreptam, & eminus conspicati Scordiū esse deprehenderunt. Indidēq; varijs plātis in Galliā & Italiam missis, amicos verū esse Scordium monuerunt. Illi facies vniuersa prorsū Triflaginis, radices numerosiores, fibris crebribus sumo cespice sparsis: folia crassiora, densiora, succulentiora, nonnihil tomentosa, rugosa, aspera, viridantia, vt Mentastri.

SCORDION alterum Plinij, latioribus folijs, Mentastro simile.

Officinis salvia agrestis & salvia Bosci.
 Ger. Wild Salben.
 Ang. Wood sage.
 Bel. wilde sauie.

Alterum

STIRPVM aduersaria noua. 211

ALTERVM & quidem Plinianum fecerunt illam in syluis Germaniæ & Angliæ frequentem Agrestem vocatam Saluiam, fortè nonnulla de foliorum similitudine. Quippe folia magnitudine & habitudine Saluiam, colore verò atro, virète, superficièq; rugosa Scordium Melissamve referunt: etiamq; odor quiddam Scordij, non tamen prorsum Allium, sapit. Herbacei ex luteo sunt flores Saluiæ, aut syluestris Hormini non absimiles, minores vnaq; serie ad easdemq; partes penduli, uti Digitali, lutei: rotundum & fuscum semè est: facultates Rubiæ, ad sanguinis grumos dissipandum.

ORIGANVM *Heracleoticum, Cunila.*

Ital. Origano.
Ger. Wolgemut, Kottosten, siue Costents.
Hisp. Oreganos.
Ang. Organe, or wilde Margerome.
Gall. Mariolaine bastarde, Origan.

QVASI cliuosos, editos, montososq; natales amaret *ὄργανον* appellata fuit hæc, quam iam haud nobis difficile nosse ex Hyssopo alibi indicato & probato, à quo non variant Origani species tres, nisi magnitudine & umbellarum disparilitate. Heracleoticum autem est illud Hispanicum in Flandriam faccis plenis quotannis deferri solitum, & ab institutoribus distrahi: vtuntur enim vulgò Piperis & Satureiæ vice in obsonijs. Belgæ hanc plantam colunt, pedem altam, folijs & virgultis Maioranæ maioribus, quibus summis non in umbellam circinatam collecti sunt flores, sed in paruis thyrsis, spicatis, ternis, hinc inde dissipatis ut Thymi, odore Maioranam prouocantibus, præsertim in Lusitania & Lucania enatæ.

ORIGANVM ONITIS *Galloprovincia, maius, & minus.*

MONSPELLI circum inq; Galloprovincia, notissima sunt duo Origana, maioris & minoris discrimine duntaxat discrepantia: nisi quia huic Amaraci facies & folia, sed minora & rotundiora Heracleotici fermè: Caules recti, pedales, fruticosi, ramulis & fastigijs breuibus, coactis, spicatis, confertim in umbellam collectis, floridum corymbum imitantibus, & per ætatem purpurascens, admodum glutinosus.

MAIUS.

Est hoc quidem maius, & fruticosius, hirsutius, sed viribus, sapore, & odore contemptius alioqui: perquam simile, & passim occurrens.

STLVESTRE *Origanum Syriacum.*

VENETI Pharmacopœi & Medici è Syria aut Creta Origano vtuntur longè optimo. Cui cauliculi exiles, folijs paruis, capitulis numerosis, collectis, ambitu umbellam imitatis, Onitidi proximis, sed non perinde accumulatis, albis flosculis. Gustanti grata tota & aromatica, Dictamni & Piperis acrimonia. huius fasciculos multos habebat seduli & pro bi Pharmacopœi Martinelli Officina ad Angeli Symbolum. Sed Sepalsarij non pauci illic & alibi in Italia, veras Theriacas ementiuntur & nundinantur istius micella, & veræ precio distrahūt, non tanto errore, quanto flagitio: est quippe efficax & gratum antidotum dissolutis veneno viribus, aut stomachum dolentibus.

CRETENSE *apud Venetos Tragoriganum, siue Hircinum.*

HIRCINVM videtur nuncupatum quasi pabulo gratum foret capris, ut Onitis Afinis, potius quam hircum foeteret: grata enim & mitis Tragorigani potio, Dioscoride teste, cuiusmodi huius, qui furculis dodrantalibus & folijs paulò quàm Thymi Cretensis maioribus, densis & rigidis, floribus per intervalla & verticillos, purpureis, Clinopodij modo fruticat: sapor feruens Piperis, aut Thymi illi, qua & foliorum addita coniectura, Creticum Thymum id vocarunt Origanum recentiores, quod nos Tragoriganum putamus. Cum inter Thymi Cretensis fasciculos & quisquilias istud semè repertum hortis creditum fuisset, feliciter adoleuit Italiæ, & Flandriæ hortis.

ALTERVM TRAGORIGANVM.

HERVLA illa fruticosa, quam iamdudum decerpimus in horto Antonij Cortusij Patauini magni Mathioli præconis & seruitoris, nulla melius videtur genuini Tragorigani effigiem

effigiem & facultates explorare potius quàm Mari, quo nomine isti nomenclatores præproperi illam donauit, nam Fruticulus est sesquipalmum altus, albidus, multis cauliculis tenuibus Serpilli folijs, vel istius Tragorigani proximè descripti: flosculis subter folijs purpurascens, saporis acerrimi, odore fragrantissimo & vrente: tritum namq; digitis eminùs non secus ac Flammula percellit nares & cerebrum ferit. Multas licuisset Tragorigano aptare, sed nullas reperimus istis duabus verius aut commodius quadrare. Non esse Marum, semidescriptum à Mathiolo folijs serpillis, odore Pulegij, suo loco dicemus. Videtur species altera Calaminthæ.

Genuina HYSSOPVS Græcorum folio Origani, umbellato flore.

CLARA & notissima olim Hyssopus, sapientissimi Salomonis nota altera Sermonum Naturalium, qui cuncta disseruisset à Libani Cedro ad vsq; Hyssopum de pariete enascentem: nisi non sit eadem Palæstina, quæ Græca: vbi tamen perinde cognita, & quasi ὁ μὲν ἐπὶ τοῦ ὄρους impluens oculos vel visum, tametsi possit & εἰς τὴν ὄπην quia vocem raucā vnice pulmonesq; iuuat. Ne aperiāmus fores declamatoribus, paucis, & aptis Hyssopi historiam perstringimus: nam non minus vulgaris notitiæ Hyssopus fuit olim quam sunt hodie varia Origani genera in Galloprovincia: & in Romanæ asperis Hyssopus vulgaris hortensis spontè fruticat: sed quia duplicem facit Dioscorides, & notiorē ait quàm vt describatur: nobis hinc inde emendicandæ notæ, quæ Criticis istis declamatoribus claudāt concionandi valuas. Alioquin quod chartis illinent semper habituris. Proximo Stachadis capite isdem viribus Hyssopum dicit, & altero mox Heracleoticum folijs Hyssopi similibus, sed umbellam non Trochoides, id est, circinatam, vel turbinatam qualis Hyssopo: quin potius umbellis velut diuisam, vel disperatam: & in extremis virgis semen non densum. Denuò paulò mox Onitidem candidore folio, & similiorem Hyssopo, quàm Heracleotico. Semen non quidem esse corymbos sed ita coniunctum vt speciem corymborum præbeat. Primum quando ex Philosophiæ præceptis Phroniæ tacito ductu à notioribus vniuersam nostram cognitionē haustam fuisse docemur, nobis quippiam certū statuendum & cognoscendum cuius ope & perspicua notione in cæterorum cognitionem prouehamur. Ea de re cum sit Serpillum non minus frequens quàm certum & notum, eiq; à Dioscoride folijs & ramulis Origani collatū, cui quidem author idem Hyssopum assimilauit folijs & umbella. Nobis minutias istas accuratius perpendentibus, neglectis neutiquam facultatibus, nō magis, videtur iam ambigendum de vera Hyssopo quàm de Serpillo aut Origano. Quin etiam Maioranam hortensem certissimæ cognitionis Botanicus Cratæus, Isaac Serapio, & Mesues similē faciunt Hyssopo. Intuere iam communioris & vbiq; Galliæ, Belgiæ, (vbi Anglicū vocatur, quia in Anglia plurimum latius, & cibus aptū prouenit, præsertim in hortis) umbellam habet circinatam, turbinatamve, densam & congestam ex multis flosculis, purpuream. Eius dum flosculi maturescunt, Semina frequenti pericarpiorum serie ac glomeratione coniunguntur in Corymbi æmulationē, non secus atq; in Maiorana cernere est, nec non in Origano Onitide, & vulgari. Quòd si ad folia, vires, umbellam, totam deniq; effigiem respicias, Hyssopum sanè, nisi foret Origanum, futurū dicas. Est igitur ista planta prorsum congrua tot notis quot possunt & opus est adferri ad geminæ Diosc. Hyssopi cognitionē: odor suavis, Origani Hispanici, Heracleotici putati, acrimonia mitiore. Nec quicquam videtur differre ab illa plāta quàm Doctor Treuisanus Patavinus in horto suo colebat: putabantq; Docti Hyssopum folio Origani vel Origano similē: omnia quippe similis huic, acrior tamen: de floribus & semine nihil prodimus, quia nondum planta, vtpote recens allata, floribus seminēve donata erat. Corymbi autē vox Plinio & posteritati fraudi fuit: nam legenti tria semina Hyssopi mederi Epilepticis, ratus nasci è Corymbis istis baccas hæc seminibus hallucinatus: Siquidem umbellis attribuitur semina, Corymbis Baccæ.

AMARACVS vulgarior suo MAIORANA nostras,
non Dioscoridis SAMPVCVS,

{ Ger. Maioram, Meyeron.
Bel. Marioleynen.
Gal. Mariolaine.
Ital. & Maiorana.
Hisp. }
Ang. Marierom.

Quia

QVI A ex Cypro Amaracus laudatissima & odoratissima ad vnguenta expetita fuit, adulati Poëtæ Cypri Regi Cynaræ, fabulati sunt eius puerum Amaracū vocatum, dum alabastrulū vnguinis suauissimi plenum ferret, lapsum, id fregisse, præque luctu intabuisse, & in Amaracū versum fuisse: vnde Herba vocata fuerit Amaracus, quam & Sāpsucum Ægyptus & Syria dixerē. Hodie notissimam quidem habemus Maioranam, quæ tametsi non sit ea quam Dioscorides, per terrā repentē ramosam multis cāuliculis Calaminthæ foliis describit: tamē tāto perē affinis est ea quam mox ponemus, vt quā sit species vna, minimē harendū: quod idē sapor Thymi, color incanus, odor Mari, suauiorque quā Origani, testantur: perinde vt figura, palmi & sesquipalmi surculosa, alis numerosis, quas cingunt foliola rotunda Origani: vti & summitates spicate, in quibus flosculi purpurantes: radices subsunt exiles. Nuppiam nobis visa nisi in hortis.

Hanc maiorem dictam, tum aliam tenuiorem, delicatiorem, odoratiorem, Origani facie, alioqui non dissimilem, colunt Gentilemque & minutam vocitat plebecula: *Varietas.* fragantior enim est & in holere aptior, cuius oleum stillaticium coagulo leporino remittum & *Mofchi* tantillo, arcanum conceptui felicitando nulli referandum, autuant.

SAMPSCVS Dioscoridis, siue AMARACVS serpentis.

VT non inficiamur vulgatam Maioranam Sampsiuci speciem esse, ita istam rariorem multo & humi serpentem verius Amaracum dici debere asseueramus. Non enim re-
gis erigitur, aut fruticat ramulis, vti superior, sed in cespitem caducis Serpilli modo, cui alioqui persimilis folio, effigie & magnitudine est: cuiusmodi quæ in Belgio Nerui creuerat sedulo Pharmacopœo Ioanni Mouton, & nonnullis in Gallia hortis, etiamq; Antuerpiæ nostro Coldenbergio, stirpium peritissimo.

MARVM, est Mastice Gallorum & Anglorum.

REGI Thraciæ cui nomē Maroni esset, sunt qui Mari herbæ appellationē acceptā tulerint: verum tamen potuit etiam ab Amaraco per apocopen dici; vtpote cum Amaraci species videatur Marum, adeoque tantoperē affine sit, vt multi hodie Maioranā legitimum esse Marum in literis miserint: idēq; ausi sint Marum receptū siue *Mastice* Gallorū decernere Clinopodiū: quæ tamen herba parum Clinopodio congruit, præut quadrant quas nos illic damus: & odor, sapor, color Amaracum & Origanum, aut potius Marum fatentur: eoque Galli vocant *Mastice*, quia odoratior & gratior est quā Origanum, aut Sampsiucum, vti Galenus vult Marum, Lib. de Antidotis. Quare cum tot talesq; quot & quales hactenus desiderabantur, eoque plures, habeanus plantas; neutiquā par est Maioranam nostram Marum asserere: nosque Sampsiuco priuare; quem nullus nescit speciem Maioranæ esse.

MARVM, STIRIACVM, gracilioribus sarmentis, minoribus capitulis & foliis.

SI cui interim superior, siue Mastiche Gallica, minus videatur Maro congruere, saltem hanc nō respuat Syriacam, quæ gratissimo & vegeto est odore, imò & facie tota Maioranam præfert, aut Origanum: sed gracilioribus, non breuioribus, pedalis, & sesquipedalibus viticulis: corymbaceisque aspectu elegantioribus, delicatioribus capitulis, etiā decimum ferme annum, ex quo Venetiis Alepo Syriæ habuimus, odoris fragrantiam retinentibus. Cæterum nisi harum vtravis in Mari veri persuasione nos retinisset, licuisset huc adferre Marum Cortusianum, quod alibi Tragoriganum fecimus, quia vrentior & vehementior est, quā vt Marum deceat, sicuti inibi monuimus.

ΓΛΕΧΩΡ *PVLEGIVM Regium vulgatum.*

Germa.

Germa. Poley.
 Gallis. Pouliot.
 Belgis. Paleye.

Penyriall, Penny Royall.
 Angl. Pulioill royall.
 Poddling grasse.
 Organye.

SIMILI Dictamno facie Pulegiū, sic Latinis dictum à pulcibus, quos nidore fugat & ne-
 scat, acriq; & peramaro gultu, pecori si eo pascatur balatū extorquet, idcircoq; Πύλεγιον
 nomen factum illi, nisi etiam sit quia è pulmonibus pituitam crassam farctamque ex-
 tundat. Hodie regium & vulgatum Pulegium immeritò, sed solito more respuunt pu-
 blici censores, & rationis ne micam quidem addunt. Plinius non nisi vnum genus desi-
 gnat Maris & Fœminæ mentione, quod idem est & Dioscoridis. Est omnibus faculta-
 tibus efficacissimum receptum Pulegium, in hortis quidē floribus purpureū, vt plu-
 rimū in: at Pedemontis planitie itinere medio ad læuam, quā Ryuolio Taurinum itur
 circa margines Pulegio florente obductos, non paucas plantas floribus candidis, vi-
 uidis legimus: ac deinde idem aliis locis repertum, Cortusio & Venetis quibusdam stu-
 diosis ostendimus: foliis utrūq; Syfimbrii, aut Origani, toto caule ex interuallis cum
 floribus verticillos alterius planē modo conflantibus vires, odor, prorsus eadem.

Mas Pūny flo-
 ribus albis.

Angustifolium, sive CERVINVM, Monspellensium, odoratum.

MINIME mirum Ceruinum Linguagoticum nulli dum fuisse descriptum, aut pi-
 ctum. Nam tametsi Norbonæ Monspellii est ubiq; obuium, & nulli non cognitum:
 tamen quia haud temerè facillè occurrit in Italia, Ger-
 mania, aut aliis Galliæ Regionibus, illis ideo videtur
 fuisse ignotum. In luco Gramontio pone cœnobium,
 & in primo aditu ad lutas scrobes multa fruticat
 crebribus furculis, multò quā alterius erectioribus & ri-
 gidioribus, dodrantē altioribus: foliis minoribus, crebri-
 bus, Satureiæ æmulis, & æqualibus: ex interuallis per
 verticillos distinctis, è quibus florū veluti purpurascen-
 tes globuli oriuntur. Radix verò dissimilior alteri Pule-
 gio, summo cespitè sparsa & multiplici flexu multorū
 quasi asparagorū bene adultorū, Gratiolę vocatę mo-
 do. Huius sapor, odor & vires multò quā alterius gra-
 tiora, vehementiora, & probatiora: vtriusq; enim cum
 maxima copia suppeteret nostris præceptoribus Re-
 giis & Monspellensibus professoribus, tamen istud
 præ altero, Pharmacopœis accipiendum imperabant.



DICTAMNVM.

VNi, Cretenfis Idæ montis quasi oculo Dictæo vocato, debentur nomenclatio educa-
 tioque decantatissimi Dictamni, Pulegio adeò affinis, vt nonnullis agreste sit dictum
 pulegium. Huius nō ita magno precio multam copiam emunt non modò Italicæ, sed et-
 iam Belgicæ & Anglicæ Officinæ hodierno die, tametsi non paucis ab hinc annis flo-
 ribus donatum perrarum & charum erat: quippe perpauca olim, idque floribus orba-
 tum adferri solitum fuit: Idcircoque flore cassum esse Diosco. verius quā antiquis, de
 eo prodiditum fuisse, credebatur. Iam planta cognita, lis isthæc reliquēda maleferiatis:
 floribus enim speciosis, purpureis, multis, trans lucidas concolores squammas spicatas,
 emergentibus, Stachadis modo, copiosum ad nos affertur. Quinimò, vt fertur, Pisanæ orę
 & Ligusticæ asperis deuexis satum, creuit, & floruit, exili semine, in plantam paris pul-
 chritudinis, qualem ipsi vidimus: tertio tamen vel quinto post anno, in spurium abire
 audimus.

PSEVDODICTAMNVM floribus verticillatis.

ISTVM

ISTUD quidem Pseudonocatum audiebamus de quibusdam Italis in monte Nigro dicto Pisæ & Liburnæ contermino & aliis locis maritimis nullo fatu oriri : nec verò illic vnquam fata, aut in affinem speciem degener facta videtur; nam caules multiplices cubitales, recti, terni, aut quaterni : folia ex interuallis bina, paria, & vt caulis incana : omnia deinceps similia, nisi quia flores cōsimiles, dissimili modo & situ oriuntur. Sunt enim non ex spicis, sed ex foliorum pediculis.

ὄκινον. OCIMVM medium vulgatius, BASILICVM.

{	Germ. Basilgen.	{	Hisp. Albahaca.
	Gallis. Basilicq.		Belgis. Basilicom.
	Ital. Basilico.		Ang. Basill.

QVAMVIS antiqui excusi, tum calamo exarati codices, vbique Ocimum, non Ocy- *Math. 533.* mum, aut Ozimum habeant; tamen quia herbula hæc eximie odora cerebrum ferret & sternutamenta ciet, eam primulū Ozimum vocitatam, id est, odoram fuisse, naturæ & doctis nos assentiri par est, odore enim mirum quantæ fragrantia esse Ozimum Troglodyticū & syluestre nasci iamdiu notum est. Nec ocys cæteris quāplurimis oriri certum; quare id Ocymo farragini leguminum tribuendum fuit, vt postea dicemus. *MEDIUM*

Ocymi autem vel Ozimi vna species est, varietates tres notissimæ vel mulierculis, quæ *vulgatius.* odoris & oleris gratia in figlinis vasculis colunt, aut in puluillis areolisve viridarium: frequentissimum autem Ocymum vulgare, siue Medium dictum, quod quidem duplex odore habetur : vnum quippe vilius & abiectius, odorem suauem et antilla grauitat mixtum, Apiafri modo spira : radicem & cauliculos pedales & folia Mercurialis Parietaria, vel Agriorigani, sed nigriora mittit: flosculis è calyculis verticillatim caulē ambiētib; semine pusillo nigricante, quadamtenus Thlaspi.

Medium Citratum.

ALTERVM nullatenus distat, præterquàm odore gratiore & cordi amabiliore, quicorticem Citrii mali redolet; idcirco Citratum vocitat vulgus, non à Citri folio, vt falso scribunt quidam.

MAXIMUM Caryophyllatum ac Citratum.

RARIUS istud, & regionum calidarum amantius, cuius folia, cunctaque planta quadruplō maiora, odora, Caryophylli cum Citro confusa iucunditate, semine nec vlla sui parte alioqui diuersa.

MINIMUM Amaraci figura Caryophyllatum.

NON diuersa huius facies, sed minor tota dumtaxat, quæ Caryophylli halat fragrantiam, eapropter vulgus, qui in tessulis & pensilibus figlinis, alit Caryophyllatum vocat, & gentilem, quemadmodum rosam quāpiam Canellatam, à Cinnamomo, & Moscata, à Mosco dicere cōsuevit. Hic aspectu pulchellus, interdū crispantibus, foliis & cōuolutis in glomerum: vitrea phialæ, cui insit aqua, angusti oris, intrusum, viuit augeturque radice aquæ potrici, diu reliqua herbula virente. Complures aliæ vel differentia, vel varietates sponte oriri produntur apud Abyssinos, quas nobis non planè notas hic filemus, fusius alibi dicturi, quæ de Ocimi natura culta, & viribus penè prodigiosis, tum ab aliis prodita, tum à nobis comperta fuere.

ἀκύνον. ACTNVS, siue Sterilis.

NON tantum persimilis, sed & congener Ocimo videtur ἀκύνον, ac per y proferenda, quod sterile infœcundamq; signat plantā: vti etiam Plinius fortè interpretatus fuit, qui hanc herbam coronarum & ciborum causa in Ægypto feri, nunquam florere, alióque nomine Epitreton vocari, aut potius Epipetron (vt Theophrastus habet, qui hanc inter ἀκύνον censet) scribit. Quare cum illi florē non negasset Dioscori, eiusque studiosissimus Ruellius Ocimum, siue minus Basilicum, posse esse Acynon, ni obstaret Theophrasti Pliniique mutila Historia, dixisset: Senensis candor consuetus hæc arripit, & quā-

si sua obtrudit exprobatque doctis, nec interea lectori quidquam commodi molitur: tamen expulso Ocimo illo minimo, Calamentum illud inodorum viarum vbique frequens & contemptum, à Manardo iamdiu adductum profert, illique nulla probatione præfert. Sedenim qui acius menstruisque ciendis aptum Calamentum illud norit, neutiquam assentietur. Et alia sunt planta quæ multò aptius quadrarent, ni aduersarentur vires, nempe sistendi menstrua, & igni sacro medendi; si congerent etiam folia, & rami floribus vidua, ex Theophrasti & Plinii Historia, quod nusquam tradit Dioscorides. Quare fieri potuit, vt quòd Plinio in Bechio, & Dioscoridi in Distamno contigit, idem vsu venerit Theophrasti. nempe vt nullum agnosceret florem in Acyno; quem postea Plinius sequutus sit: apud quem tamen legunt nonnulli Acynon non penitus flore carere: sed in hortis non florere. Et si coronaria fuit, verisimilius est flores habuisse. Sed quemadmodò Bechio, & Petafitidi, quia præproperè florent, & citissimè deflorescunt, deesse florem quidam putarunt: sic fortè isti, quia obscurius & serius flores promit, ac sæpius interdum emerfos amittit, intempesta Autumnii qualibet minima sæuitia: sicuti videre est in nonnullis pusillos & serotinos flores edentibus. Aut aliud fortè sit Theophrasti Acynos, à Dioscoridis, vt vidimus in Teucrio, Tragio, & aliis. Nam illa, quam nouimus huic loco admodum congruam, flosculis purpureis, verticillatis, ramulis quadratis, siccis, & exilibus, foliis hirsutis, lanuginosis Ocimi, multa secus sepes viarum fruticat, nonnihil aut perparum odora, & gustanti multò siccior quàm Ocimū, tantillo calore subastringente, vt Bethonica. Quare posse siltere menses, si à partium imbecillitate fluunt: posseque igni sacro mederi perspicuum est: cum moderatè repellat digerendo, quo pacto Menthā siccā, tametsi calidā, admovent inflammatis partibus nostri tonsores Empirici, & breui discutiendo deprimunt tumores tum calidos, tum frigidos.

Caprificum vel ERINOS Nicandro & Plinio, Galeno autem Echinus, seu vipera, apud Dioscoridem frequentius Erinos, interdum & Echinos.

NOMINIS etymon notiove veriloqua Erini, vel Erinei, satis perspicue insinuat ob lacteum succum, quo plurimo turgere, hanc plantam sic nuncupatam fuisse. Est quippe Erinos ficus præcox fugaxque, lacte turgens primo aut exacto iam Vere, florum vice, quo caret semper ficus seu sylvestris, seu domestica, ornatu: quam sequutus gentilitatem Plinius, proximè Caprificum subdidit. Et inquit, *Palmo altam cauliculis quinis ferè Ocymi similitudine, florem candidum, semen nigrum, paruum: manare lacte multo & dulci.* Que designatio partim ex Dioclis libro Radicario, seu *Περὶ ῥιζῶν*, & Nicandri Theriacariis versibus, partimque de vulgata Dioscoridis litera collecta est. Cui quidem vt nunc aptaremus non in scitè quandam plantam nobis notam, tametsi diu elaborauimus: tamen propter hiulcam codicum lectionem, atque è Galeno notam Erini, in Echino variationem, lubuit nullam certò asserere: sed dumtaxat vnam aut alteram, nec vulgares & præceteris aptiores, in medium adferre exercitatoribus stirpium vestigatoribus. Quædam plantula est in montium depressis decliuius, & conuallibus vdis vel riguis, quam *Dulce Lupinum Lac*, id est, *Suß wolffs milch*, Germanicè dicunt: turget enim succo lacteo, minimè aut minimum acri, eoque Tragus Esulam dulcem vocauit: foliis Ocymi longioribus, radicibus geniculatis implexis, & altius depactis.

Altera ESULA Syl. Tragi, folio similior Ocymi dentato.

Trag. Epit. 101. **S**ED alterius Esulæ sylvestris dictæ, Germanicè *Wolffs milch walden*, id est, *Lac Lupinū sylvestre*, folium proprius accedit ad Ocimum ambitu circinato & crenis latioris folii. Caterum, vtrius vel vires, vel facies magis quadret legitimo Erino, industrii esto lectoris: cuius etiam hic Cōmentatoris impudentiusculum commentum liceat deprehendere & ridere. Is namque quam sibi visam & lectam ad rinulos aquarum adeò lacteo succo manantem, vt eo manus inficeret; palam & audacter asseuerasset, non verbis ausus fuit describere: sed pingendam curauit plausibili in vulgus Pharmacopœorum iconem, quinis

quinis nec pluribus erectis de cespite caulibus: Ocymi folio, bino, non nihil crenato per interualla donata, nulla addita prorsum quæ dubiam vel fidem, vel plantâ fulciret historia: cuius picturæ quum eum puduisset, postremò de vltimis commentariorum interpolationibus curauit expungendam, nullam interea in huius miscellæ subreptitiam locum suffecit, ac ne verbum quidem subdidit, quia id de causa demississet.

POLYCNEMON, quasi multitibia aut multicruria, an CALAMINTHA aquatica Belgarum.

AEQVE nos habuit anxios conquisitio Polycnemonis, quasi tu dicas multitibiâ multifuram, aut geniculatam plantam: fruticat enim multis geniculis intercepto Pulegij caule, folia origani edête, nec umbellas, sed corymbos, odoratos & a cres, Dioscoride auctore. Cui succinctæ delineationi, quâ tum coniectando licet, vnamquampiam aptare oportet mediæ cuiusdam habitudinis & effigiaturæ inter Origanum, Pulegium, & Clinopodium. Quales aliquot adeò similes habebamus, vt quàm cui antiponeremus, aut veram proderemus, ambigeremus. Ea propter vnâ aut alteram exercitandi causa Candidatis proponemus, quæ nulla non nota congruunt: vt est fruticosa quædam non ita magna stirps, exigua radice, caule geniculato, folijs Origani vel Pulegij, vnde Pulegium agreste, propter odorem & folia similia, dicitur, flores Corymbi specie cæsijs, vel Pulegij, tota incana. Caulis multiplex, incatus, geniculatus, quadratûsq; Pulegij, & sarmentosus, præsertim locis aridis decerpit plantæ: Flores verticillos amiciunt, in summòq; visuntur instar corollæ vel Corymbi aggesti ex pluribus flosculis, Pulegij modo. Vniuersa planta suauem spirat odorem: sed quapiam acrimonia nares ferientem. Huius vsi sunt olim Belgæ Pharmacopœi Calamenthi loco: eoq; id nominis adhuc illic retinet. Inter veruacta & sata ripasq; agrorum, pratorum, in Belgio prouenit & in Anglia. Stillicidio & vrinæ difficultati scimus profuisse: Syderiticam esse haud in dubium vertet, qui illam gustarit.

*ALTERA SERPYLLI & CLINOPODII
figura, an Polycnemon?*

QVANDAM etiam Clinopodij & Serpylli facie plantâ videre meminimus superiore anno in Morgani hortis, quam quondam rebamur Polycnemon: furculosis enim ramulis, geniculatisq; Serpylli aut Pulegij crescit, vix sesquipalmo longioribus, serpentinis folijs Origani minoribus, Serpylli odore non ingrato, acri gustu.

Κλινopόδιον CLINOPODIUM aut Lectipes.

MVLTISVRVM siue Polycnemon, consequntione quadâ appellationis & viriû comitantur Clinopodium, siue lectipes, propter lectipedû, quorû furculis delineat effigiaturam notissimam hodie eodem nomîne vel Pharmacopœorum vulgo apud Monspelienfes & Lugdunenses, in qua ad veri Clinopodij expressionem vix est quod optes. Aridos namq; & glareosos occupat tractus, furculis plusculis, sesquipalmû longioribus, radicis exiguæ folijs paruis Serpyllum æquantibus, cui & similia vel Calamenthi montani, vel Ocymi minimi, nonnullis leuiusculis in ambitu crenis apparentibus. Cauliculi complures sarmentosi, præduri, crebribus ab imo sumò tenus geniculâtur verticellis & alabastrulis Lamij quaternis, sed multò minoribus, cruseula totidè exprimētibus, purpureis flosculis Calamethæ. Calida planta, calorem non ita magnû gustanti præbet, sed siccitatem, odorè suauem spirat Serpylli quadatenus. Hanc si propius figurâ intueare, quæ melius Clinopodium exprimat, inuenies nullam. Marum quippe, quam Mastiche plebecula Gallorum vocat, Maro quadrat aptius: nec verticellis aut floribus Marrubij tam concinnè conditis vel digestis, nominis argumentum nempè Lecticæ vel Triclini pedem referat.

Gemina *MENTHA* *Fulgata* serpens roiuantifolia, *Pulegij*
flore, verticillata.

Belg. *Bruynheylige*, seu fusca sacra.

MINIME dicta *Mentha* fuit, quia mentem percellat: quum potius spiritus oblectet, gratia odoris, vnde ὀσμήνιος vocatur. Nec de odore, qui non semper suauis est, vt *Galenus* etiam notauit, aut illius contrario sensu: sed potius quia μίθῃ esset concolor, aut hirsuta, dicta videtur μίθῃ, vel μίθῃς, vt legitur apud *Theophrastum*. Est enim μίθῃς lanugo muscidave pubes humentibus & putrescentibus penè cunctis sub dio apertis obduci solita, qualem cernere est in succis & decoctis herbarum diutulè seruatis & passim in oletis & sterquilinijs: cui hand absimilis tenera illa hirsuties pulla, quæ in *Mentha* agrestis, sed præcipue in *Calamentho* visitur, vnde dicitur *Calamentha*, quasi pulchrior *Mentha*, muscida & pubens, sunt autem species duæ & totidem altrinsecus obuersæ varietates.

Binæ namq; *Menthæ* rotundiores sunt folio & fusco purpurante, minus hirsuto, caule quadrato: Sed vni flos secundum totos ramulos *Sisymbrij* siue *menthæ* aquaticæ modo, per interualla flores insunt purpurei *Pulegij*.

Alteri verò omnia planè eadem, nisi quòd folia ex aduerso bina, rugosa, alterno situ decussatim & deinceps insunt hærentia, quadam crucis imitatione, vnde *Cruciata* *Mentha* dicitur: flore etiam diuerso spicato mentastri, procumbit humi vtraq; & ex agris videtur in hortos translata.

ROMANA *Officinarum* siue præstantior angustifolia.

Ger. *Spitz wuntz*, spicata.

ROMANÆ itidem geminæ non nisi leue discrimen: vtriq; enim folia oblōga, angustiora, albidiora, hirsutiora, odoratiora, efficaciora folia, vnde *Romanæ* nomen & *Balsamæ*: cui flos spicatus *Cruciata* *menthæ* prorsus.

ROMANA angustifolia, flore coronato, siue *Cardiaca* *Mentha*.

Ger. *Hertz wuntz*.

ALTERI flos glomeratim in verticillatis ramulis, purpureis sacre *menthæ* similis, odore & vi peramica cordi ac cerebro: Ideoq; Germanicè *Hertztraut*, siue *Cordis* herbâ vocantur. Omnes vulgate cognitionis, & opis multiplicas: humentia amant, nec semine, sed radice & surculo propagatur.

AQUATICA siue *SISYMBRIA* *Mentha*, rubro folio, & flore nigra *Mentha*. *Balsamine* *Officinarum*.

CVM esset hæc cognatior *menthæ* quàm *Sisymbrio*, rectius huc à nobis dilata fuit. Est siquidem folijs (sed maioribus) facie & odore *menthæ* fuscæ, quam idcirco qui norit, minus mirabitur si legat in *Sisymbrium* abire, vel hoc in illam redire sponte, cultu, aut neglectu. Iuxta & subter aquas leniter labentes passim: radix *menthæ* nigra ritu reptat, non alto solo depacta: caules quadrangulos, ramulos numerosos amiciunt glomeruli florum purpureo um *Pulegij* Regalis, odorem *menthæ*, sed vehemētiorem, non ingratum vibrantes.

MENASTRVM.

Ang. *Horse mynte*.

VT appellatione defluxum à *mentha*, sic etiam asperiore & crassiore habitu odoréq; grauiusculo degener videtur *Mentastrium*, quod vbiuis secus mœnia, vda, & scrobes vrbium scatet, maioribus, crassioribus folijs, rugosis, incanis super & subter, hispidioribus, leniter crenatis, *Menthæ*, cuius consimiles flores spicatos sortitur, caules ambientibus quadratos caducis ramulis, calore & odore ignauo.

Varietas

STIRPVM aduersaria noua.

219

Varietas Anglici cinerei & NIVEI.

CULTIORES horti in Anglia Mentastrum quoddam alunt, vulgato longè minus & odoratius, cuius folia partim sunt viridi colore, partimque niueo candore, & lænore nitidissimo, cuiusmodi in Hyssopo & Salvia euenire notauimus. Balneis & compositionibus Officinarum, vt Pulueribus Diacalaminthæ & Diacymini, hanc vtpote gratiorem, nec minus efficacem, præstaret indere.

CALAMINTHA Montana præstantior.

QVASTI elegantiore aspectu odorèq; delicatiore esset quàm Métha, Calaminthe vocata fuit: certè hilariore nitidiorèq; habitu esse nullus inficiabitur, qui Vincentinam & Veronensem viderit. Et vtinà cætera omnia perinde paucis & scitè expediisset Dios. atque Calaminthæ differentias signauit: nã ille multos scrupulos nobis exemisset. Et quãuis tam perspicuè ostenderit, tamen non diu est cum primùm Officinæ peritiores Calamentum à Cattaria dignouerunt, & vsurparunt, cõnuente adhuc ignara quorundam Pharmacariorũ ignauia, qui sciunt quidem istud verius & efficacius quàm Cattaria, sed labori aut nummo parcutunt. Neque enim obuium istud montanum, nisi Norbonensis Sequenæ umbrosis, saxosis cliuibus, & in Romano atque Patauino agro, vnde meminimus quosdam medicos Taurinenses doctissimos curasse quottannis magna vi accersendum, cuius aqua stillatitia ad menstrua cienda vterentur, sperato successu: est enim gustu & olfactu suauiter acri. Etiam dũ est viride plurimi fit apud Italos: arefacto non aliud ad theriacam illam mysticam præstantius, virgis riget quadratis, nitidis, cubitum altis, & quàm Menthæ gracilioribus: folia edentibus Ocimi, aut Melissophylli, sed minora, speciosiora, hirsutiora; flores item Melissa, sed purpureos, semine Portulacæ minuto, odore Amara-cino, Menthæ suauiore.

CALAMINTHA altera, foliis maculosis odore graui Pulegii: Diosco. Nepeta.

APPRIME sedulus hinc Dioscori. hanc Pulegio similè facit: vt certè est, foliis quippè Regalis Pulegii aliquantò maioribus, albidis, variegatis maculis, minoribus quàm superioris Calaminthe, ex pullo porraceis, odore Pulegium testante. (vnde Syluestre pulegii antiqui dixerant) sed vehementiore ingratioreq; , præsertim feruidioribus tractibus, squallidis, cliuosis Italiæ Norbonæ & Galloprovinciæ, vbi nomine Calaminthe, siue Montanum, Nepetæ Officinis vsurpatur, non secus atque Cattaria alii illic vtuntur: & in reliqua Gallia, Lugdunensi præcipuè, vbi etiam totam æstatem flores purpurantes pallentesque verticillatim virgas cubitales amicientes, fundit.

MENTHASTRIFOLIA aquatica, hirsuta, Calamintha Dios. est Sisymbrii species quadam recentiorum.

FACILIS huius dignotio Mentastrum intuenti: vtraque enim aquosis viret marginibus satorum aut pratorum, huius caulis cubitum & sesquicubitum æquat: foliaque Menthastrii aut Sisymbrii edit, incana: flores Menthæ spicatos purpura obsoleta, odoris grauis Sisymbri, nec gustu minus calfaciente.

CATTARIA, siue Mentha Catti.

{ Germ. Katzen muntz.
Gallis. Herbe au Chat.
Italis. Gattaria, seu herba Gattar.
Belg. Tatten cruyt.
Ang. Catts Mynte.

T.ij.

E Cala.

Non est Nepeta
antiquorum.

E Calamenthae Melissaeque particeps tribu est ista praestans viribus herba, antiquis forte ignorata, quam Cattariam plebecula vocat, peramoeni spectaculi argumento: vixdum enim conspectam ubi olfactarit Cattus, amplexatus & diffusuiatus fuerit, lasciuendoque illi iam accedendo, iam recedendo sese vtrisque pedibus diu & multum affricuerit, colludendo tandem miris gestulationibus vniuersam auidè ligurit, sed auidius si ea ex agris in hortos fuerit transinota: tenerior namque tunc est, odorque non perinde vehemens, alioqui agrestis similis, quadratis, numerosis, rectis culmis, durioribus, stratis: folia iuxta intervalla prominentibus bina, incana, Melissae, aut Marrubii aequalia: flores intra & circum superiorum foliorum exortus ramulos ambientes, & extrema spica caudata decorantes, Menthae aut Mentastris: cuius etiam vdis natalibus gaudet: plurimam nihilominus viarum & cultorum margines dant: Strenua calfaciendi & attenuandi dote, sed eximia praerogativa ad conceptus facilitandos, prolificumque vterum reddendum.

ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ, ἢ ΜΕΛΙΦΥΛΛΟΝ *APIASTRVM, Citrago.*

Germa. Wantzenkraut.

Gallis. Melisse.

Belgis. Confilie de greyn.

Ang. Bayme.

NON multo praestantior aut dissimilior Priscorum Melissa, qua non secus atque Cattus sua mirè capiuntur Apes, quibus aspergebant Coloni diuini praecepto Maronis,

Tu iussos asperge liquores,

Trita Meliphylla, & Cerinthe ignobile gramen.

Citraginè vocauit posteritas quod similiter Citrio suauè spiret, & cordi proffit: tamen non nullis è locis lecta, quiddam praedoris aut cimicū eius gratiae odore ascitū sit, & idcirco dubitatum sit, vera ne esset, an aliū speciei nostrae haec, quae nulli regioni in hortis deest, sed in quibusdam Italicis & Pedemontanis hortis meram suam sibihalat gratiam, Basilici aut Citrii, eximitque quamlibet de odore argutationem, quippe de cetero nulli non cognita: folia Menthae, Ballotae, aut Cattariae, rugosa, aspera, sed viridantia: ramulis quadratis Marrubii, edentibus orbiculatis flores albos, copiosos, in verticillis Ballotae aut Cardiacae: teneros tusos turiones excipiunt mulierculae ouis, saccharo, & rosacea, placentulasque: pinfunt parturientibus, puerperis, & enixis, quibus vires impendio deiectionis fuerint, aut secundinae non probe educatae: stillatitiae ad cardiacas confectiones, multa usio.

MELISSOPHYLLON Turcicum.

TAMEN si ne nares quidem mucosas latere potest huius eximiae plantae odor, qui Melissa Citreumve malum adeo imitatur, imò & superat, ut illico cui sit ascribenda classi moneat, & penè praenimia fragrantia fastidium faciat, illo exuberanti halitu permixto, qui à Cimicū foetore haud longè abesse subolet nonnullis: tamen merita est imprimis vel accuratissimam delineationem, propter visendam venustatem, & vires non contemnendas. In viretis duntaxat fruticat, radice non magna, caule quadrato, sesquicubitali, aut maiori, foliis Chamædris vel Scordii, serratis, in acutū definitibus per intervalla ab imo summoque: tenuis, multarum alarum ramulis ambientibus verticillis septenis octenisve ex spinosis caliculis, radiatis, congestis, in quibus flores purpurei, caesi, Teucrii aut Triflaginis. Semen Augusto aut Septembri nigrum oblongum, Psylli, apicello donatum albo, quā sursum tendit.



CAR.

STIRPVM aduersaria noua. 224

CARDIACA.

Ger. Hertsgesperr, vnd Hertsgespan.
 Rel. Herteghespan.
 Ang. Motherwort.
 Gall. Agripaume.

AD hanc classem spectat genus illud Marrubij, cui recentiores Cardiacę nomen dedē-
 ri eximie dotis & cordis affectibus amicę merito. Radix est multifida, in terram flexi-
 bus sparsa, quadratis caulibus fruticās. Marrubij folijs herbaceis, crebrioribus, longiori-
 bus, & altioribus multo fissuris, quā Acutę spinę vulgaris. Flores item purpurei verti-
 cillis caulem ambiunt, odorę; quadantenus Marrubium præferunt. Vires Melissophyl-
 li, supares.

CARDIACA MELICA siue Moluca Syriaca.

DVA s etiamnum Melissophylli congeneres & inter se persimiles (tametsi peregrinas &
 minus cognitās) virium commendatione & odoris coniectura hæc ætas Cardiacas vo-
 cauit, nomine etiam quadantenus eodem alludente, nam Melicam & Molucam appellāt,
 non ab Oceani trans Tropicum nostrum insulis Molucci: sed nomine cum planta misso ē
 Syria Venetias Martinelli Sequini opera, anno ferē decimo exacto. Harum maior (quam
 Antuerpiam primū doctis amicis dono misimus, deinde Narbonę & Londini seuius)
 duos tresue cubitos alta, multas fundit propagines ē radice lignosa, fibrosa, multifida, al-
 bicante: caules item rotundi, crassiores, culmosi, intusq; caui, non pullis obscuris striarum
 secundum longitudinem vestigijs, & æquis spacijs semigeniculatis porriguntur, vtrinq;
 ex aduerso bini, exiles, sed prolixiores pedicello, totidēmq; folia fulciētes, circinata vt Me-
 lissę, diuisis minus quā Cardiacę no-
 stratis, profundis: Proximē pediculorum
 exortum geniculos amplexę sublant
 spinulę prætenues, quas operiunt patu-
 lę senę octonave campanulę, multian-
 gulę, tenues, membranosę, albidę, & ri-
 gidiusculę, adultę: Summa ora lunatę &
 spinulis horrentes, quarum ē medijs cen-
 tris purpurascens albidusve flos, Lamij, aut
 Cardiacę nostratis non absimilis exit, suc-
 cedente semine anguloso, Pyramidis ef-
 figie, cunei basim apicēmq; constituen-
 tibus, albidis, alterius Cardiacę. Gratio-
 rem hæc quā Melissa odorem spirare vi-
 detur his quos minimē iuuat, ille impen-
 diō fragrantior, & quasi situm putorēmq;
 cimum redolens, Apiastri odor. Hęc nāq;
 Citrij prodit, sed mitiorem.

MELICA vel MOLUCA
 asperior Syriaca.



Ramulus
 MOLVCE
 siue Cardiacę
 minus asperę
 Syriacę.

MOLUCA ASPERIOR.

HVIUS varietatem sæpius aluimus in
 amicorum hortis Monspellij, quam
 nunc asperam Melicam aut Molucā dicti-
 tant: vtpote asperiusculis caliculis tantū
 diuersā, angustioribus infundibulis, sed acu-
 leis infestioribus, rigidioribus, longioribus septenis vel octonis, caule quadrato & leuiter
 caniculato. Sed par cuneiformę triquetru vtriq; semē, infundibulis fuscis, nō ita albis, a-
 sperę

ſpera hæc dicta Cardiaca, cuius vires atq; natales quid differant, nobis incompertum.

MARRVBIVM.

{ Ger. Weiß Lindorn.
Bel. Molrouie, & Malruenic.
Gal. Marrubin & Marochemin.
Ang. Horehounde.
Offiu. Præſio.

VIDETVR Præſinus viror, aut certè viroſus odor, appellationem impertiſſe Marrubio tum nigro foetido, quod & Bulloz dicitur, tum albo odoro: vnde Plinij anſa hallucinandi non vno loco, vertendiq; ἀντὶ τῆς πρᾶσις τῶ τῶ πρᾶσις folia. Verùm viroris porra cei nitor melius quadraret Melyſæ. Duo autè Marrubia, etiam Theoph. volente, eiufdè ſūt nominis, eſſentiæ, & figuræ: duntaxat hoc diſcrepant, quia Ballotæ pluſculum ad atrorem fuſcum porraceum vergit, odoremq; grauem & foetorem vibrat: Marrubio verò ſuauiſ odor, incana & candidiora folia, tum flores, non ita Apiaſtro abſimilia, niſi lurido virore è luteo viuido, & odore longè fragratiore meliſſa donaretur. Omnibus caulis quadratus, verticillis florum per intercapedines diſtinctus, ſeſquicubitalis, flores purpuſcentes, alioquin reliqua duntaxat magnitudine aut exilitate differentia, magis albicat Marrubij flos.

MARRVBIVM Creticum anguſtiore folio, odore gratiore.

MINVS hætenus peregrinum Marrubiū quod Creticum, vt credere etiam libet, nuncuparūt Cretenſes inſtitores, qui Venetijs orāq; Thyrenica negociātur (vbi dono habuimus ab ingenuo & perito myropola Veneto Iohanne Pomello ad Bucin toris inſignij officinā) Fruticat caule contorto, gracili, rotundo, aliquam multis exilibus aliſ donato, Polij montani non diſparibus, & quā Præſij noſtratiſ multò candidioribus, teneriuſcula lanugine obſitiſ: vti & folia anguſtiora, oblongiora, & leuiter ferrata, in anguſtum abeuntia Meliſſæ Turchiæ equalia, ex interualliſ multò argutiores & minores verticelli, Syderitidis aut Tetrahiti non diſpareſ hæret. Floſculi prætenueſ indidem emicant albidī Marrubij, quod quanta quanta eſt, odore & lanugine præfert.



Γαλιόψις

Vrtica, non mordax, mortua, duplex. } Galiopſiſ vulgaris foetens purpurea. Lamium Plinij
ſiue vulgi Archangelica. Flore fabaceo & Luteo.
Milzateſa Italarum.

AFLORVM effigie Galeata, vel potius Muſtellæ faciem & riſtū quadantenus exprimēte, mutuata nomenclaturā fuit: vti videtur etiā innuere τῆς γαλεόψιδος nomen, id eſt, foetida muſtellæ, quo præſius herba quānam ſit notatur: nulla proinde aptior deſcriptioni, quā vulgaris Vrtica mortua foetida vocata, cum quia vſquequaq; vrticam aut foetidum Marrubium præfert folijs & caule, tum etiam quòd floribus purpureiſ, exilibus, oblongiſ galericuliſ, aliquantum muſtellina effigie expreſſiſ viſitur, deinde iuxta ſepes, rudera & vias oritur paſſim, vbi non item vlla alia viſitur quæ nonnullā opinionē Galiopſiſ facere poſſet, niſi Scrophularia, quæ nuſquam niſi in ſyluiſ, aut diſſitiſ multū ab ædificiis & lociſ incoli ſolitiſ, reperitur: minuſq; multò foetet, & minus Vrticæ aſſimilatur quā iſta vrtica mortua, cuius vires præclaras ad ſtrumas & carcinomata, gangrænaſ, non ſolūm antiqui

STIRPVM aduersaria noua.

223

antiqui, sed etiam docti barbari posteriores experti sunt, & literis mandarunt, qui Vrticæq; mortuæ & fœtentis nomen indiderunt, qua nota facile dignoscitur à congenere Lamio & perquam simili.

LAMIVM siue Archangelica, albo flore.

VRticeo etiam generi primo intuitu hanc assignat vulgus: est quippe folijs simillimis Vrticæ, & caulibus quadratis. Galiopsy simillima, multo tamen procerior tota. Floribus oblongioribus, maioribus, fabæ aut matrisiliæ: quæ per intervalla foliorum verticillatim quasi anfractibus inflexæ, & laruatam cuculo adumbrantes Lamiam tribadem, (vnde Lami-um fortè dicta) caules amplexantur, minus graue olentes, albi vel pallentes: Admodum etiam nota hæc: tametsi lubentius senticetis & sepibus, quam domuum ruderibus vicina accolit.

LAMIVM Luteum.

Nec hæc in syluosis & opacis videtur specie variare, nisi proceriore caule, numerosiore, hirsutioribus folijs, flore pereleganti, luteo, & alioqui non dissimili, nec alijs viribus, sed multo efficacioribus ad vulnera, ulcera, & tumores, vnde Sideritis putata, & nostris aus Archangelica vocata.

Ακαλῆφι siue Vrtica Communis, siue maior & fœnina, flore muscoso, Mili semine.

MORDACI, pruriginosa, vridaq; lanugine Vrticæ inuisa & noxia, notiores vbiuis gentium quam vt descriptionis egeant, eoque duntaxat distinguimus à flore, semine magnitudine & vi, species, quas vno duntaxat nomine ακαλῆφι & νῆδαν, Græci vocarunt, quasi non tangendas, quia sanuum punctoriæ visionis dolorem inurerent, cuiusmodi sermone vesparum aut apum aculei: tametsi miranda magis iniuria, cum perquam exilis, mollicella, nec penetrare potis isthæc videatur lanugo.

Maximo importunoq; prouentu cuncta scætet Europa communi siue maiori quam cetera, latioribus folijs, nigrioribus, & interdum purpurantibus, minus altè ferratis, procerioribus: caule & ramis, semine in racemaceis filamentis Milio minore subrusto, cuius in Officinis Borealiū, Penuria Romana vulgò dicta, plurimus vsus.

VRTICA sylvestris, siue Romana Officinarum, semine Lini.

TAMETSI hæc non nisi calidioribus regionibus, vt Hispania, Norbona, Italia, & Romania frequentior & vulgatio: tamen Romana non est dicta ob natales, sed propter seminis maioris maiorem efficaciam, quod mense Augusto & Iulio maturum pilosis villosisve pillulis, Echinum referentibus, è pedicellis, in caule flexuoso, folijs donato, altius quam ceteræ Vrticæ fimbriatis colligitur, ad gluten pituitosum incidendum, extergendum, quum opinionem asthmatis & orthorpnæ verè facit, vtilissimum: non tantum enim præparat viscidum farctum, sed etiam delectu educit clementius, Chartami seminis ritu & Dosi: Rondelletio in magna commendatione,

VRTICA minor siue Cania Plinij acrior.

VULGATISSIMA minima in hortis & satis vbiq; gentium hæc, admodum mordax, si milis planè maiori communi, sed minoribus folijs & caule breuiori, tametsi magis vrida vi: Omnium vtilitas hodie corticis librisq; Vrticarum aqua diu macerati in India Orientali apud Callectios & Goas multa, ad lineos pannos delicatesiores, quos illinc adferunt in Occidentem & Septentrionem, quidem commodo institores precio, eleganti tenuissimæque textura, sed non magnæ durationis.

SIDERITIS, siue ferruminatrix.

VOCABVLO QVOD FERRO SAVCIATIS PARTIBVS o-
pem promitteret, nobilitarunt primi mortales complures plantas, Sideritesq; vocarunt potius virium consimiles effectiones sequuti, quam vultuum affinitates generi-
Tilijs, calve

Ger. Todtnessel.

*Bel. Dood net-
tel.*

*Gal. Ortie
morte.*

*Ang. Dead net-
tel.*

Ger. Nessel.

Bel. Netel.

Gal. Ortie.

Ang. Nessel.

casve differentias, sic et æquitas terra, ars, & lapis Magnes, dicta, quia ferro vel aduersarentur, aut vteretur, vel consentirent. Sic plebs Gallica Carpentaria siue fabrorum vocat, qui bus sæpè vulneratis remedio est: nec alia notione Stratiotides siue militares, vocatæ fuerât. Sed cum huic sæculo diuersi admodum generis, nec minus excellētes, & multò plures innotuerint, quàm quæ huc vel possint vel debeant cōgeri: nostrā cœptam viam insistentes, quālibet hac dote & nomine claram, suæ addemus clāssi: alioqui Helxine à Diosc, Sideritidis dicta, & sexcētæ aliæ tum Sideritides tum Stratiotæ possent huc aceruari. Hanc itaq; Sideritidem Heracliam, siue ferruminatricem Herculeam, Docti Barbari illam multo experimento compertam & vocatā Tetrabil, siue Iudaicam, esse sanxerunt: non modo propter vires efficacissimas & planè Herculeas, sed etiam quia quā proximè delineationem Dioscoridis, si quæ alia, repræsentat. Strigosa enim vel sabulosa, arida perpetuò amat, inq; Autumnum perdurat: Iulio & Iunio floribus purpurantibus, passim in Maritimis & montosis; Italiæ Insubræ, & ad Apenninos mōtes, Venetijs ad Lio, inq; Gallijs Norbonēsi & Lugdunēsi reptat. Virgultis pedalisibus iam surrectis, iam depressis, quadratis, duriusculis, ternis aut quaternis, verticillis crebribus per intervalla donatis, firmis, asperis, pungentibus, planè Marrubij Cretici similitudine, etiāq; floribus albicantibus ex diluta purpura. Iuxta quos & subter folia sunt longiora, angustiora Marrubij itidem Cretici, incana, & vt totus caulis, scabra & crispa, ambitu laciniato vt Chamædris, aliquādo laciniosa diuifura obscurius apparet in quibusdā folijs, quæ puto causa fuit vt Dioscorides iam quernæ frōdi, iam Saluæ & Marrubio cōtulerit. Radix lignosa Marrubij, minus fibrosa: iamdiu valdè magno emolumento cognita practicis quibusdā Iudæis & Maranis cursoribus, qui hac enterocellas & alba menstrua curant. Vehementer exsiccatur nonnihil odorata, astrictione insigni, nec ingrato sapore, ad vulnera nata, & prorsum tanto Herois nomine digna. Quò magis dolet peritis & candidis plantarum arbitris, Commentatorem nostrum eo securitatis ignauæ progressum, vt cum quænam esset vel Italicis Iudæis Iudaica herba, se nescire quereretur, quā scitè, vt semper omnia, Ruellius, & ex eo Fuschius expressisset, tamē in vtrumq; de re herbaria optimè meritum inscitæ calumniam impegerit: & sensu studio planè deprauato plausum è triuio captarit. Huicq; herbæ de sua classe pulsæ, sibi missas, vt semper iactat, nec tamen nisi mutile descriptas, alias suffecerit, scilicet Marrubium aquaticum vulgi. Cuius natalitia, folia maiora, latiora: caules cubitales, nec asperi, multaq; alia refragantur: quin potius Verbenæ aut Marrubij speciem insinuât. Sed cum illum huius prioris fortè pœnituisse, ei alteram multò adhuc confusore facie, quasi subsidiariā dat, herbarijs Canabim scēminā vocatā: quam inter Vrticæ, Lamium & Galyopsum referimus: folijs namq; facie & verticillis Lamij, floribusq; purpureis, nec nisi ad riuiulorum margines fruticat: neutra ad vulnera exploratæ vtilitatis. Alteras duas figuras equidem parum notas, cur idem autor pingendas curarit, & prorsum tacitas præterierit, non iam quærendum: potius ferendum sui malæ conscie ostentationis studium ducimus. Nos alias à viris multæ exercitationis non parum approbatas hîc damus, quò expendantur, & non vt asserantur describimus: nec vilius assensum aucupamur.



Marrubium aquaticum vulgi.

Syderitis 2. Mathioli.

SYDERITIS *Monspelliaca Scordioides,*
siue Scordij folio.


Porro præter hanc Iudaicam, Monspelliensium schola aliam speciem Syderitidis novit, palmum & sesquipalmum altâ, viticulis angulosis, rectis, pluribus, aridis, lignosis, coma

coma & verticillis Hylsopi, foliis & facie & colore Scor-
dei Dioscoridei, sed minoribus, magisque rugosis, rigi-
dis, crispis, pilosisque, quam Tetrahit Iudaicum, nec
minus laciniosis, sed hirsutioribus: flosculi Satureiæ vul-
garis dictæ (quæ tymbra est) ad foliorum articulos & ver-
ticillos, amaricante exsiccantēque gustu, nonnihil a-
romatici suauisq̃ue halant, quod Chamædryn aut Be-
toniam referat. Ad ripas deuexas Patibuli Monspel-
liaci, squalidōsque margines & colles prope urbem, &
nouum Castrum & alibi Norbonæ multā meminimus.



MONTANA.

INDVSTRIVS ille & gnarus materiæ Medicæ cun-
ctæ Valerandus Donnez, ex Sabaudie Alpini hanc sibi
lectam, vnā nobiscum vnā Syderitidum opinabatur:
& quidem sic satis bellè quadraret Heracleæ Syderitidi,
ni folia angustiora multo essent, vique efficaciore care-
rent: est quippe cæteroquin verticillatis circis asperius-
culis, pallidis Marrubii aut Tetrahit, pluribus verticu-
lis, tenuibus, lignosis, nec quadratis, binum palmorum:
radice flexuosa, prolixa, lignosa, pulla, amaricante gu-
stu, præsicca, nec ingrata: vlu nullo explorata.



Cannabis { Mas.
Fœmina infœcunda.

Cannabis erratica paludosa, siue sylu.

Aquaticum Canabinum Mas, Eupatorium dictum Auicennæ.

Canabinum Eupatorium aquaticum dictum Fœminam Septentrionalium,

Crista Galli herbariorum, num ἀλευρογόλον Plin? an num potius

ALLIARIA Recentiorum, & Pes Asini Pandectarij?

Stachys, spicatis circinatis que ambitu cinctis floribus purpureis & luteis.

Stachys Spuria folio Echij, aut Calthæ, Belgarum.

Herba Venti Rondelletij & MonsPELLIENSIS, pamosis, flaccidis sub Hy-
mem folijs, an Othonna Diosco?

De flore Africano, siue Othonna Italarum inferius.

Betonica.

Betonica aquatica Septentrionalium, an Climenon Dioscor?

Climenon Italarum, siue Ciciliana cum Periclimeno.

Scrophularia.

Serratula.

Herba sacra, yecta, altior est Verbena nostras: sed Peristerion, siue Co-
lumbaria dodrantalis, in aquaticis est longè alia, qualem Egineta
memorat: siue Scabiosa minima?

Scabiosa

Scabiosa vulgaris { Maior satorum, sine *Asper* & *Eti?*
Media serrato angustifolio, flore Globularia.

Scabiosa montana { Alpina maxima.
Maior calidarum regionum & eius varietas.
Omnium minima.

Iacea nigra, vulgarior Practicantium.

Iacea maior folio multum laciniato, Dentis Leonis.

Iacea lutea.

Iacea nigra serpens { Maior.
Minor acanthis ferme.

Cyanus { Maior.
Minor.

Sesamoides altera.

Chrysanthemum.

Caltha, sine Calendula.

Tragopogon, & eius varietates.

Scorfonera & varietates.

CANNABIS.

CRACIS *cannabis* fonticuli sunt sparsae scaturigines, quod loci cum lubens Cannabina sponte & sata luxuriat, videtur id nominis indepta: gliscit namque seges Cannabina rectis culmis, quadratis, striatis, horridisq; serratis, nigricantibus foliis, Vrticā, aut Sideritidē quadantenus exprimētibus, sed septenis aut nouenis ē singulo pediculo diuisuris Lupini aut Ricini, multo notior quauis designatione: non disparis vsus, sed in imensum vtilior quā Vrticā Molucā. Cunctis enim populis penuriā Lanæ, Lini, Xyliq; resarcit, ad vestium stragula, velorum, Papyrus, quamlibet denique supellectilem. In marem & foeminam feminis duntaxat foecundo prouentu distinguunt: Nam ex eodem solo pingui, vdo, aut riguo enata, quā molliore culmo, delicatiore cortice, aptioreq; ad nendū & textrinas, foeminā faciunt: cuius florū seminisq; spes in situ muscosum & puluerulentum, quasi filicis, perit. Quae verò robustior, horridior, fruticosior, rudentibus & capistris torquēdis nata, Mas habetur mulierculis, adagio iocantibus foeminā potiorem mari. Huius autem semen est non parū ad multa proficiū: ex eodem Oleum pressum tumoribus & scirris opitulatur, lucernis alit lychnia & lucem. Lac etiam vel pulvis eiusdem macerati, aut iusculis decocti, fluxiones sistit diuturnas, dolores repentinōsque flatuum vortices, & humorum fluctuationem compescit: somnum consiliat. Vfus tamen nimius molesto sopore perfundit. Tritū capiti, vel pedibus imis admotum, haud abs re Icteri humores, vaporesq; tenues à cetro auertere & euocare putatur. Radices podagricis tophis proficiuā. Odorē grauē & nōnihil virosum eructat, & vel capitis in eo decubitu temulentos facit. Succus verò foliorū certa perniciēs insectis interraneis, & vulnere putridorū alumnis: non qua facultate idē foliorum Persicā, aut Iuglandium putaminis succamētum efficit: sed vapidō tetrōque situ, odore, & exsiccandi vi, qua alimentum praeipit illis & populatur, excrementis dissipatis: multum alimoniae suggerit Gallinis, Cortalibusque; sed hyeme foecundiores, postea steriles & quasi pinguedinis mole obrutas reddit. Auiculis etiā cibis est, ac tantū sagine adfert, vt aut enecet, aut cantillandi adimat alacritatem & facultatem, vt Carduellis, Linottis. Lacunis aut serobibus aequē plenīs merguntur vtriusque sexus fasces & manipuli, vbi macerantur eluunturque multum & diu: deinde siccantur Sole, vt tundantur, ac demum cortices staminei tundendo velluntur, vt Lino fit ad filum & telas. Sed lacustris aqua, cui intabuerit, tantoperē virū nocet, vt epota presentissimo sit sitientibus exitio; nullis enim antidotis quantumuis tēpestiuē datis occurrī potuit fato Marquisii Arboii fratris Guisiorū, eiusq; vxori & quā plurimis generosis, qui superioribus annis prope Olbiam in Prouincia ætates feruidas cum transmittērent,

STIRPIVM aduersaria noua. 227

rent, imprudenter fontanam lymphidam, sed occultis mæandris & subterraneis cuniculis indidem in fontem illapsam hausissent.

CANABIS erratica, paludosa Syl.

ALIA non est hæc à Satina, vt etiam de Dioscoride discitur, nisi quia illius proceritate vincitur. Hæc tamen crassior caulem Brismalæ parem indicij assequitur: vmbrosis lacunarum marginibus Cicutæ sociatur, itemq; cænosus, foetidus, secus villas & mœnia. Flaccidiora folia, sed hirsutiora aliquantum & Sideritidis fimbriatis oris: floribus purpurillis & albicantibus. Radix compertissimi commodi ad topchos, & spretas remedia durities.

AQUATICA Canabina, Eupatorium dicta, Mas.

PASSIM iisdem natalibus & Canabina facie oriuntur duæ plantæ similiter discretæ sexu, quas propter amicas hepatis vires, fortè & ob folia, Eupatorium vocarunt, marem & feminam. Ille rotundo subpurpureo caule, intus medulla alba referto exit, duos tresue cubitos æquante, aliquantum hirsuto. vti & folia crenis fimbriata, nigricantia, aspera, Canabinis ortu & situ adeò accedentia, vt permulti Pharmacopœi, Belgæ præsertim, Eupatorium Auicennæ folijs Canabinis proditum, vocitent. Glomerofos villososq; in summo fert flores, ex diluta purpura albicantes, inq; auras papposi abeuntes. Radice sparsa latè fibris. Amaricantis gustus, odoris nõ minus suauis quàm Betonica vel Agrimonia, cui viribus æquiparant Medici & Pharmacopœi illic. ac quoties præscripto vtrumq; eodem præcipiunt Dioscorideum & istud intellectum iri volût. Nec spretui habebit is, qui nouerit nonnullos ad affectus istius decocta non modò nõ cedere Agrimoniæ, sed etiam excellere: in pasta hepatis ac splenis referendo non multa calfactione: etiamq; sanguinem temperando & cunctis partibus concoctioni dicatis tonum, roburq; conciliado. Obesæ nimis naris aut Rinocerotides erant, qui foetere dicabant. Quippe suauiter spirat manifestò: omnium ferè mæregnum ad aquas alumna.

FOEMINA Canabina Septentrionalium, stellato & odoro flore

NON item tot regionibus frequens, sed Borealibus magis, & ipsis in vdis aut medijs riualis cunctantius fluentibus viuit hæc, viuida radice, multis prolixioribus & gracilibus aquaticarum modo fibris, caules prominentibus cubitales & sequicubitales, subpurpureos, rotundos, ramulis multis, distributos ex interuallis, & è regione sibi Canabina folia magis tamè ferrata latiora non perinde hirsuta. In extremis foliola ungules roseos imitata, stellata, luteos umbilicos atris punctis maculatos asteris attici ambiètia, odorè Gumi Elemni aut Resinæ, aut Cedrini ligni quod adoleatur, edunt. Semen Pyrethri longum, compressum, & hirsutæ vestibus hærens. Minoris hæc notitiæ, eòq; minoris vsus: vulneribus introsumpta præsertim plurimum confert. Et eadem quæ superior potis est, In Anglia vbiq; vdorum, præsertim Londini & Auxong.



*CRISTA Galli Herbariorum num Αλεκτορολόφος Plinij:
an nũm potius ALLIARIA Recentiorum?
Galli centrum inferius adducitur.*

Propter

PROPTER folia quæ cristæ Gallinacei equiparantur ἀλεκτορόφοι & Cristam Romani etiam Plinij ætate dicebant, vnde nostri fortè istam pratensem luteorum florum paruorum & foliorum denso amictu fastigiatam in Cristæ modum multiplæ & densæ ferocioris Gallinacei coniectarunt, aut retinuerunt, folijs vtiq; magis suadentibus, quæ ex aduerso bina ambitu diuisuræ prorsum cristatæ sunt, sensimq; à medio latiore in angustius desinunt cristæ ritu. Caulis tenuis, pedalis, sesquipedalis, rectus è radice exili, pratorum præcipuè amantis. Semen in vtriculis foliaceis vel filiquosis, teneriusculis, Pseudomelanthij, fuscum, compressum, rotundum: nullodum tamen experimento oculis prodesse, aut in eos indi compertum habemus: Vulgus etenim non istud, sed Scarleæ læuius & lubricius solet genas inter & tunicam inferere semē, & huc illucq; oculū versādo, ducere, nullo molestiæ sensu. Hanc etiam Centrum Galli dicunt, quibus ad duellum sit incitamentum, & si flores non parum ad cristæ nomenclaturam alludent. Nulli non pratorum & agrorum marginibus multa, gustu subastringente.

*ALLIARIA, Pes Asini Pandectarij, an
Alectorolophos Plin?*

PERINDE vulgaris hæc, itidem Dioscoridi præterita putatur, quod neminem odor illius tediosus Allij latere queat: delineatio autem nō pessimè quadrat Plinij Alectorolopho: quippe folia per initia circinata Hederæ terrestriis lōgiora, altiūsq; serrata euadūt, fimbriatis, acutis in ambitum denticulis, tota planta Vrticam referente, præterquam filiquis, Napi semine plenis, nigricante, vt vult Plinius. Flores multi, albidī Irionis: alba radix, multos caules bicubitales fundens. Tota gustu calidiusculo, humente melioreq; odore & gratiore quàm Allij: Quò fit vt mulierculæ, præsertim Angliæ, folia succulenta, tusa, falfamentis & intinctibus frequenter misceant, multumq; ad incolumitatem annuam tuendam primo Vere comedent. Quare si quis vires consulat, hanc certiore dicit quàm superiorem, cuius vires multum absūt ab Alliaria. Hæc autē Erisianum aut Erucam facultate refert: quare tussientibus magis proderit, vt placet Plinio.

Pedicularis Alectorolophos. Caterum Septentrionalium frigosa macilentaq; prata montosa Norbonensium palmarem pusillam quandā habent, floribus Alectorolophi superioris, plurimum rubris, interdum albis: nos inter Filipédulas dicemus, quorum folia & facies imitatur: Sed facultatibus virosis, pratis infesta, & pediculis hostis, quare quidam Pedicularem vocant.

*STACHYS, spicatis circinatisq; ambitu cinctis floribus
purpuris & luceis.*

DE culmorum florumq; verticillatis spicatis extremis dictam fuisse σάχυν siue Spicam certū est: vnde coniectura non perinde vera vt solerti perdoctus & modestus Anguilara Spicam Lauendulam opinatus fuit: Senensi autem hīc moderatio defuit, qui spernendo meliora tum iudicia, tum plantas, suam intrudit Stachyn, Marrubio quidem non ita dissimilem, sed neutiquam spicatam, nec adeò congruam, vt est ea quam Germani feld Andoren vocant, id est, Syluestre Marrubium. Eius siquidem est persimilis, proceriore caule quadrato, crassiore, candidiore, & hirsutiore: tumq; folijs longioribus, nonnihil ad effigiem & incisuram Betonicæ vel Ballotæ accedentibus, plusculis alarum ramulis quadratis, quos flores purpurei partim verticillato ambitu, Marrubij aut Lamij ritu, distinguūt, partim superiora spicant Hyssopi vulgaris aut Betonicæ modo, quam Dioscorides spicatam summis caulibus Satureiæ similitudine dicit: Hæc passim sponte in Norbonæ asperis, non procul Perans & Magalona occurrit: interdum purpureis, aliàs luteis floribus: odorator, gratior multò illa quam Senensis priorem & Germanam ratus fuit,

Alterafolio Echij, aut Calthæ, apud Flandros STACHYS spuria.

MINVS verò Stachys appellationem tuetur, nedum vt vera sit ea, quam multi Belgarum horti alunt, vocantque Stachyn. Foliis siquidem est proximis Myosotidi, pilosis, vel Echii, non Marrubii, neutiquam candidioribus, sed viridioribus: ac potius flaccidis, quam crassioribus, aut rigidioribus, nuspiam ferrato ambitu: quam potius quispiam alterum Echium luteum meritò putet: minus enim odora est, succoque aqueo pregnat.

ὀθόννη

HERBA VENTI Rondelletij & Mon-

spelliensium, pannosis, flaccidis sub hyemem

folijs, an. OTHONNA?

QUASI Linteariam, pannosamve quis dicat, propter folia erosa, multifora, & squalida, ὀθόννη nomē fuit, eapropter herbæ cuius aptius cōgruit, quam succo illius, vel lapidi Thebaio: sed quæ de hac nutantibus sententiis produnt Diosco. ac Plinius, le-
genti plus quo torqueat, quam vnde animum expleant, suggerunt. Nec enim succum, *De Ocello A-*
aut plantam sibi visam, sed potius quas de incerta vel lectione, vel auditione opinatio-
nes hausissent, scriptas reliquerunt, ex quibus ignotis notis, ne siquidem præ oculis
foret ipsa planta, eam valeat certò quisquam assequi. Quare si illi summi vestigatores
nihil certius voluerunt, aut potuerunt decidere, in re tam controuersa, ne nobis qui-
dem id tentandum. Coniectura tamen indulgendum doctiorum, ne illi nostra causa
frustra operam posuisse videantur. Maximæ exercitationis præceptor eruditissimus
Rondelletius conferre non semel solebat cum Othonna hac, quandam Monspelliensi
Academiæ admodum notam, & vulgo illic Pharmacopœorū Venti herbam vocatam. Ete-
nim solibus estiuis, imbribus & flatu iam marcescentia folia crebrò pertusa, & multifo-
ra, quasi vento peruia, visuntur, Verbasci similia, Saluiæ, aut Menthæ maiora, parum
quid ferrata, caules ramulis diuisos quadratis, cubitales ambientia: quibus indicis
melius hanc, quam virosum illum Africanum florem, literæ Dioscoridis respondere
putabat: Apud quem legebat & restituebat φύλλα ἡδίστα καὶ ἐμφερεῖ, πολὺ τετρα, & αφαρὰ
folia Menthæ, non ἐν ῥαυς seu Erucæ similia, multifora, squalentia. Sed quia huius
fiores purpurei sunt, & Lamii modo, verticillato ambitu ramos stipant, hîc illi aqua
hærebat: reliquumque descriptionis potius deprauatum conquerebatur: Nec de flore in-
dico, sententiæ assentiebatur, vt nos infra ostendemus.

κέστρον BETHONICA.

{ Germæ. Brann Betonie.
Belgis. Betonie.
Angl. Betony.

MVLTA salubritatis tuendæ & restituendæ olim merita præconia apud Latinos Be-
tonica, κέστρον Græcè dicta fuit, à floris emicante spicata, mucronata acutis Cestrò
aut vericulum, vt loquitur Plinius, seu viriculū præferente: indidemque; fortè αἰγίφαγγον
rūpipetra dicta: λυχέτροφα verò seu foli frigidi alūna: quia opacis & umbrosis proueni-
ret, cunctis gentibus notissima. Caulē quadrangulū, rectū, pedale & cubitalem erigēs: fo-
lia ex interuallis Chamædrios, vel Teucriti, crenata, thyrsos florum in summo spica-
tos brunellæ, vel Bistortæ, purpureos elegantes. Radix albicat multis sparsa imple-
xis fibris, & vno supernè nexu ap' is, Ellebori nigri modo. Cuius sanè facultates longè
disparēs à foliorum & florum viribus comperiuntur: sunt enim hæc multum stomacho
oriquē ingrata & nauseam, rugitus, vomitumque cient: folia contrā odora, aromatica &
grato sapore nonnihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica. Vt maior dispari-
litas, quam Afaro videatur illi contingere, cuius radices quidem turbas cient, vomitum
& secessum: folia tametsi sint gratiora & aromatica, non tamen excitos tumultus pa-

V.i.

can

cant, vti Betonica. Itaque verisimile antiquos suum Cestrite quasi Betoniceum dicas vinum floribus & foliis, non item radicibus inditis parasse, eoque sic faciendum hodie illis qui caseos longè saluberrimos & sapidissimos hinc in Anglia & alibi parant, aucthores sumus, non modò enim renibus innoxii sunt tunc futuri, sed etiam profuturi. Quædam enim naturæ maximè eorum esu iuuantur, & mucum pituitosum in lotio mingendo euertunt. Est enim diuretica & Litontriba, vti Galenus libro nono de sanitæ tuenda innuit, qui inibi σαξίφραγος, aut Saxifragam nuncupat. Sic Platearius Cestrum Meum dixit, ob consimiles vires diureticas. Betonicas aut Vetonicas, tum Æginetæ, tū recetiorū, Tunices, seu Garyophylleos vocatos, quia multò diuersæ sunt classis, suis quamque familiis reddemus. Gens enim Vetonum diuersis plantis, vt res & occasio ferebat, nomen suum accommodarunt, vt de Plinio & proximo capite liquet.

κλύμενον. *BETONICA AQUATICA*
Septentrionalium, an. CLYMENVM.

Angli. water Betony.

QUAMVIS inelyto Regi Clymeno illam cognominem decreuerint, Sicilianam seu totam Sanam Gallis vocatam, de qua fufius alibi diximus, tamen & hanc Clymenon putatam, experimentis celeberrimâ Vigoni Chyrurgi, tum opinione percelebre, decuit huc adduci. Eam enim descriptam is autor impensè collaudat, ac eius natales propè Genuâ, cuius ciuis fuit, ad fontem Labrenadore, siue equorum aquatorium dictum, indicat. Amat quippe non secus atque Betonica vmbrosa, frigida, sed magis humentes elices & crepidines fossarū, qui hac scatent, in Northmannia & Angliâ præsertim. Idcirco *Water Betony*, seu Betonicâ aquaticâ vocant Angli. Edit quadratū, fuscum caulem, bicubitalē, geniculatum, canum, & rectum, crassum Betonicæ; folia ex viridi nigricant, ambitu, figura & crenis Betonicæ, aut Scrophulariæ, sed maiora: alæ nonnullæ in summo sunt, floribus nigricantibus purpureis pusillas cassides imitatis; vnde semina pusilla in lagenulis Blattariæ, aut Digitalis purpureæ. Fusca radix, multū fibrosa. Clymenon etiānum hodie propter insignes vires putant, miscentq; vulnerariis & ulceribus prauo humore imbutis, deterrimique humoris & dolore faucis. Vulgus Chyrurgorū sua mundificatiua, quæ ruptica vel absterforia dicuntur, ex eadem parat. Cruribusque cutis erosio admovent folia.

SCROPHULARIA MAIOR Millemorbis,
Ficaria, Ferraria siue Castrangula.

Germa. Braunwurts.
Belgis. Steencruyt.
Gallis. Grande Scrofulaire.

NON potest non nosse Scrophulariam à radice factoque vocatam, qui proximè dictam Betonicâ nouerit, non enim ouo ouum similis: sed radix tuberculis aspera & capitulis papillofis donata Fabariæ, aut Alabastritis corraliæ dictæ: alba, solida, strumosa, incondita, subtus porrecta cespite, obstat quò minus interdum etiam exercitatiores inter legèdum vtramuis pro altera euulsam accipiamus. Huic tamen folia longiuscula natales. syluæ & nemora vda, vmbrosa, montosa. Calidior etiam hac vtrauis Betonica & ulceribus strumosis, cauernosis, cadauerosis, carcinomatis, atque depascentibus sideratis oportunior. Tuberculis insuper ab humore frigido glaciatis, aut schirris carcinomata minantibus, discutiendo & emolliendo opitulatur.

SERRATVLA.

PER-

PERINDE lubens, sed frequentior in nemorosis & decliuibus Pedemontis aut Septentrionali Northmaniæ & Angliæ exit hæc, antiquis item prætermissa, ac de folijs minutim venusta fimbriola ferratis dicta Serratula. Sed ea sunt partim Bethonica virore, lætore, & crenis: partim non serrata, sed laciniata, vt in Scabiosa visitur. Flores autem purpurei, è squammosis capitulis laceæ, gustu fermè Bethonice, aut Virgæ aureæ, à qua per initia erumpens non facile discernitur, & promiscuè proueniunt in iisdem syluosis, iisdemq; facultatibus ad vulnèra & enterocelas commendantur.

Communis VERBENA siue SACRA præcior recta.

AVGVSTAVOCÉ *ῥεῖον* quasi sacrosanctam & lustralē herbā hanc nuncuparunt: ritibus quippe pacis & belli verrēdisq; Iouis aris, Veruenis vtebantur, vnde satius nomen, quā ab herbenis ducere: huic enim suam etiamnum seruat nomenclaturam, prolatione paulū mutata, plebecula Itala, Galla & Angla, Veruenā dictitans, antiquūq; obtinēs, delira quadā persuasione. Quippe ad Veneris illicia, ad diras & clades impēdentes auerrūcandas non parū pollere hodie quidam amētes amātes, & fanaticæ Lamiæ Mulomedicæ profitētur: quas impietates iādū ipsi audiuius & risimus. Nec vel hanc supinā aut aliam rectā dictam, arbitramur præstantiores esse primis, secundis, tertijs aut quartis qualitatibus, quā sint, Bethonica, Euphrasia, Rosmarinum, Stachas & consimiles. Pagorū viarūq; margines & vrbū areas occupat hæc, folijs virentibus, minoribus per interualla lacinijs, obtusis, Quernis, altioribus, Senecionis vel Scabiosæ. Ramulos & caulēs graciles, angulosos, glabros, cubito maiores, promentes flosculos purpura pallentes, Calamenthe minores. Longiore, & fibroso radice,

PERISTERON siue COLUMBARIA dodrantalis, in aquaticis, desiccans & astringens, qualem Aegineta memorat, an sit SCABIOSA Minima?

FAM attentius sacre Verbenæ delineationem, & huius Columbariæ historiam excutiēti, facile patet ipsas inter se figura, viribus, & nomenclatura discerni oportere: quantumvis Plinius breuitatis studio, diuersum videatur innuere, & vtramq; vnā inuoluere. Etenim præterquam quod huic dodrantalis, vnus è singulari radice caulis, ex eoque folia *ὑπολευνὰ* incisa, natalesq; aquosi sunt: viribus diuersis, si non contrarijs pollere traditur, Paulo Dioscoridi suffragante: siccando & astringendo ereispilata reprimere, vlcera putrida coercere, vulnera glutinare, inq; cicatricem ducere: demum doloris immunem præstare vuluam siue *ὑσέριον*: vnde nobis quidam *ὑσέριον*, quasi Matricariam diuinabat cōcinnius dictā, quā à colūbis. Sacra quippe illa nō modò cōdemata antiqua & tumores mitigat, sed & tonsillarum crustas rumpit & exsiccat: nimirum calefaciente vi, qua prodesse capitis affectibus pituitosis, & doloribus chronicis autor Galenus est: nec in humidis oritur hæc Sacra aut expiatrix, sed illa vocata Columbaria, vt cui lubenter aduolent, aut asfideant Columba: neutiquam vulgari Sacra, quæ alia occasione *περισεργὸν* videtur dicta. Quippe nō semel audiuius multæ lectionis & obseruationis Præceptorem Rondelletiū è suggesto Regio monentē (bona Græcæ opinionis venia) non *περισεργὸν* à Colūbis, quæ nec Verbenis visitat, aut oblectantur: sed potius *περισεργὸν*, quasi Colūbariā, quod iunctā Colūbaria in sterquilinijs lubens proueniat. Mirabatur idē triviales semper & negligentiores meditationes Senēsis, qui nō olfecisset hæc Supinā siue stratā & humilē satius dici, Sacrā autē rectius rectā: nec illā distinxisset rectis ramulis, pluribus, cubitalibus, angulosis, Querna subglauca folia edētib. Et tametsi nō nesciret ab alijs alias adductas plātas non paucas, sed æquē omnes incertas, pro Verbena minore, vt est pratēse Teucriū, & quædam apud Italos Colūbina dicta Bugulæ flore, aliæq; cōplures: tamen facie virumq;

coniectura, Verbenam minorem, Columbariam esse opinabatur, nempe ea quæ minima vocatur, propius reliquis Scabiosis, Verbenam istam adumbrat. Est quippe folijs Verbenæ, incisuris per summa altioribus, laciniosis, similibus tamen, & altera superficie albidis, ad terram stratis, latioribus, minus ferratis. Caule plurimum affurgit recto pedem & cubitum alto, gracili, supernè in ramulos rectos sparso: hilari flores, rotundos villososq; ex cæsis cœruleos vel glaucos, Morsus Diaboli: semine compresso, radice pusilla, quantus paruius digitus, parum fibrosa. Propè Monspellij Ægidiam portam ad riuulum, & agrorum margines Norbonæ plurima. Etiam in Apeninis Bononiæ meminimus: eandem Angli & Belgi horti habet. Hac plurimum vtuntur Monspellienfes Pharmacopœi, propter inibi maioris Scabiosæ penuriam, non modò ad sanguineum serum putridum educendum, defecandumq; & Thoracem pulmonesq; congerie pituitosa expediendum: sed etiam ad Morpheas Arabicasq; Elephantiasas, & Græcorum lepras squammulasve, reprimendas item impetigines ex acetò Fumaria incocta, sacri ignis excretiones, pruritus, cutisq; scabies fœdas: quas dotes fermè omnes Dioscorides Columbariæ verbenæ iudicabat, nosq; enarrauimus, ne si minus placerent lectori illius tanti viri coniecturæ, nostraq; commentatiuncula, saltem plantæ huius vtilitas tanta foret accepta.

SCABIOSA maior, Satorum vulgarior, sine

Ætjæ. Etij?

{ Ger. Apostemenkraut, vnd Grindkraut.

{ Bel. Scabiose.

{ Ang. Scabius.

{ Gal. Scabieuse.

{ Ital. Scabiosa.

Vulgarem non
nouit Mathio-
lus: & Iacçam illi
nigram maiorem
laciniosam in-
scius suffecit.

ET quamuis pluribus plantis possit accommodari Scabiosæ nomenclatio, (non secus atq; Pforæ Ætij) vt Iacçæ, Morsui Diaboli, similibus facie & viribus: tamen non est de nihilo quòd vulgus tam diu istis Scabiosis id nominis vindicarit: vnde propensior est animus eò vt augeretur quampiam harum Ætij Pforam esse, quamuis nuspiam extare apud antiquos meminerimus. Sed maior Scabiosa notior est apud omnes, quam vt delineationis egeat, consimili superioris vultu, sed latioribus folijs, pullis, hirsutis, inq; terram repandis & recumbentibus, & altioribus incisuris, nec perinde Verbenam Sacram, vt maiorem Valerianam exprimentibus. Radix simplex, longior, caulem plurimum singularem, cubitum & sesquicubitum altum fundens, & florum cæsiarem villosam Cyaneo purpurâ imitantem, in segetibus, planis, & decliuibus letior degit.

Media SCABIOSA serrato, angustifolia,
flore globularia.

DISSIMILIOR aliquantò hæc maiori Scabiosæ, quam priori, minimæ Verbenæ putatæ: in marginibus agrorum Septentrionaliū lætior multò, & maior adolefcit, quam in calidis. Caulis è radice exiliore, simpliciore, cubitalis, alis diuisus, folia Iberidis aut cristæ Galli, aliquantum ferrata. Flores Globulariæ aut Scabiosæ.

Scabiosa ALPINA Maxima, montis

Iuræ & Saluæ.

Parum

NON parū speciosiore & maiorē hanc ē iugis oriundā Iurē & Salanē nobis impertuit singularis amicus D. Pennius, ea Morgano hac æstate flores perelegantes cæsius velleris instar sericei, staminulis crebris amicitibus globulos echinatos, Dysfaci, rotundiores, minores, aspectu hilares, & Scabiosæ vulgaris duplō maiores: folia itē Scabiosæ, altero tanto ampliora, altius incisa, & Centaurio maiori Belgarū similia, penē paria: angulosos ab imo & numerosos bicubitales & tricubitales caules, multis alis diuisos amplectētia, per æquas intercapedines, iuxta singulos exortus alarum, cauo protuberante & rorem excipiente, Dysfaci more: gustu nihil diuersum à cæteris percipitur.



MOTANA calidarum regionum maior.

COLLES AMAT hęc plagæ temperationis, vt Pedemontis propē Riuoliā, & Norbonæ, vbi montanam vocatam Herbarii folio angustiore, albidiorē, parum hirsuto leniusque laciniato ad inum caulem Verbenacæ, aut vulgaris Scabiosæ: superiora verò in ramulis plusculis, gracilioribus, altius diuisis, & flores per Iunium & Iulium prominentibus purpureos Scabiosæ, paruæ, aut Jaceæ capitulis squammatim compactis, vbi semen trifolij Asphaltitidis, pullū, copiosum, inuolucris membraneis arguta coccinnitate effictis, angustis plicarum fornicum pusillorum cohibentibus.

Iamdiu est quando in hortis Herbariorum Belgarum quandam multo maiora fundere folia, teneriora, crassiora, succulenta præsina caulibus & floribus, duplō maioribus, nec iam essētne diuersa species ab illa, succurrit. *Varietas.*

MONTANA omnium minima.

HARVM omnium minimā hanc animus fuisset verbenā paruam facere, nisi in montibus cretaceis & incultis obuia foret. Nam sesquipalmm pedalesve paucos edit cauliculos, folijs in imo sapius donatos angustioribus, inter Sesamoidē & Scabiosam minimam, floribus dilutæ purpuræ, ē squamosis capitulis alterutris non diuersis.



V. iij.

LA.

IACEA NIGRA vulgatio Prædicantium:
Alba Monspelliensium in Ocymode dicta fuit.

HYOSCIRIS
Plin.

SVBENDÆ Scabiosis Iacæ, quas à Ianthino florum colore vocauit fortè quis recentiorum Græcorum : tametsi Barbaris Prædicis duntaxat notæ fuisse videntur, qui nihil præstantius ad hernias inuenisse Iacæ nigra narrant. Errat oppidò Senensis, qui huius facultates Violæ flammæ asserit, & à Scabiosis discernere nesciuit, à quibus non minus distat quàm Morsus Diaboli ab illis : & Iacæ sapor non perinde ingratus, subdulcis astrictio, siccitas efficacior multò, calor prope nullus : sed decepit illum nomenclatura Iacæ vtriq; communis : illam tamen tricolore Iacæ malim dictam & πὸ τῆς à Viola, vt etiamnum vocatur, quàm quòd plurimum humi iaceat, vt quidam autumant. Cæterum, qui hanc Plinii Hyosciridem diuinant, ferendi sunt : tametsi pluris ducant virium quàm effigiei coniecturam, cum vtraque consentiète sit opus. Intubo dicit Plinius similem, minorem, tactu asperiorē : vulneribus contusam præclare mederi. Quæ vt nihil certi de figura afferrent, tamen quandam plantam similem opis istiusmodi, indicant : neque enim Serides sunt tantæ ad vulnera laudis, quantæ ista Io v i a Seris Pliniana, aut Iacæ nostra est : quam duplicè, nimirum albam & nigram Prædici vsurpant, frequentior multò nigra, notiorq; pratis & incultis multa fruticans, foliis nigricantibus, hirsutis, rigidis, à radice multis, sed in caulibus cubitalibus, & sesquicubitalibus obtusioribus laciniis dissectis. Flores ex purpureo nigricant, in ventriosis poculis squammulis compactis, semini Cyanci, aut Cartami.

*IACEA maior folio multum laciniato, Dentis Leonis, masculi
vasculis, floris purpurei, & lutei.*

SEGETVM hæc potius quàm pratorum est, in Gallia & Anglia plurima altiores cubito & sesquicubito caules edens, circum quem folia multa multumq; laciniata Hieracii modo sunt ; globulos duplò maiores, communiore, turbinatos, squamulis loricatos gerit, apicibus florum purpureorum obductos Cyani maioris. Radix digitum æquat, lignosa. Semen item Cnici, minus : horti Belgici hanc vt præstantiorem ad vsum Medicum colunt : tametsi in Angliæ segetibus Couentriæ conterminis abundè proueniat.

IACEA maior lutea.

Varietm.

INTERDVMEandè videre est in segetibus Mōspelliacis, floribus luteis, venustis : Carthami syluestris nullatenus diuersam, capitulis, foliis, aut caulibus : Nisi quia tota asperiuscula ; quam qui malit Plinii HYOSCIRIDEM, nobis secundis, liceat.



*CAPITVLIS SPINOSIS
IACEA.*

Varietm.

AD Cellam nouam & vicinis vinetis Monspellii minor sponte visitur alia, nigra eadem prorsum radice & effigie : duntaxat tristiore aspectu, florem edit purpureum interdum album, in squammoso & spinulis horrido capitulo, Calcitræ haud absimili.

υάανθ

STIRPVM aduersaria noua.

235

IACE *A* pumilla, humilis, serpens, acaulis ferme, flora
Cyaneo & albo.

RARIUS occurrit hæc, & ferè Norbonensium est: marginibus satorum ad Pontem *Monspellio* miliare dissitum, via qua *Frontignan*am itur, obuia eodè in aruo, vbi studiosi solebant *Phallarides* colligere, foliis est paruis, laciniis *Hieracii*, retusioribus, minoribus, vnà cum cauliculis dodrantalibus humi stratis: flores & capitula *Cyani* prorsum, cerula minus obsoleta purpurantes, vel albidis: radix crassior, & semen ceteris non absimile.



Incana altera CYANI aut IACEÆ, capitulis & flore.

PROPIOR hæc *Cyano* quàm *Iacæ*: vtrique tamen haud absimilis, quam quidam *Ptarmicam*, siue sternutariam arbitrati sunt, propter saporem acriorem, amarum, halitumq; tetrum, cerebro sternutamenta interdum extorquentè. Non ita multi sunt anni, quum primum in *Linguagotiz* vinetis, & cis *Cellæ nouæ Monspelliacæ* Pontem plurimam, iamq; in hortis plerisque *Angliæ* vberè propagatam videmus, ab vna radice du riore, plures caules emittente, totam hirsutie pilosam, incanā, *Gnaphalii* foliis triplo maioribus, crebribus, leniter serratis, ab imo multis ad vsque summa, oblongiora, acutiora, graciliora, squamulis albidis compacta capitula *Cyani*, aut *Iacæ* apicibus villosis, ex purpurante paleo colore in pallidum languentibus.



MORSVS DIABOLI.

{ *Germa.* Teuffels bisz.
{ *Gallis.* Mors de Diable.
{ *Ang.* Dewelles bit.

NON video quid negotii sit hanc non esse è *Scabiosis* vnā probare; quod quidam contendunt: verum adeò *Scabiosis* est similis, vt plerunq; pro iisdem accipiat: euidens tamen discriminè in radice, à qua tota *Teuffels bisz*, id est, *Diaboli morsus* dicitur, quod nomen *Herbarii* retinent, nam antiquis non debetur. Cum itaque sit multis crassis fibris sparsis, depacta, præcisa apparet quā crassiores coeunt fibræ plures, quasi pramorsa foret à quopiā cacademone: tametsi idè ferè cernatur in *plātagine*, quare malunt alii dictā ab vrida vi qua mordicat bubones & carbunculos pestilentes, quibus magno leuamento admoventur. In pratis & viis quibuscumq; occurrit multa, cubitalis & bipedalis: foliis *Scabiosæ* vulgaris, sed rigidioribus, nigrioribus, hirsutioribus in imo, in summo autem caule aliquantum serratis (non profundè incisis, vt *scabiosæ*): floribus item prorsum *Scabiosæ*, sed purpura fusca, tristiore aspectu.

V. iiii.

Cam.

υβερ. CYANVS VVLGARIS.

Baptifecula Officinarum.

Germa. Cornblumen.
Gallis. Blauetz & Bluetz.
Ital. Fior Campese.

Belgis. Coerebloecken.
Angl. Blew Bottell.

Vtraque propin-
quior Scabiosis
& Iaceis, quam
Intybis.

CÆLESTIS cœrule æmulus color flori inest Cyaneò, sic vocato etiam apud Pliniũ. Blaptifecula vulgo, *Bluetz* & *Blauetz* dicta Gallis eodẽ à colore: etiãq; Germanis *Cornblumen*, siue segetũ flos: quia importuno luxu segetes vbiq; præter cæteras Secalis passim propemodũ enecet, præsertim frigidiusculis terris. Huius diuersitates insigniores Erratici & Hortensis. Ille in caule anguloso cæsia albicantiãue folia, angusta, in arcum desinẽtia, acutis laciniis sinuata Scabiosæ, aut Dentis Leonis more gerit, capitulãque oblonga calycis effigie squãmatim foris cõpacta, ex acerosis tefsilis nitidis, è quorum medio cœrulei erumpunt flores senis plurimũ foliolis, semen sub messẽ relinquentibus, angulosum, acutum, oblongum, & hirsutic obductum glauca.

CYANVS Maior hortensis.

QVEM alterum Cyanum alunt horti quidam in Gallia & Germania, non ita diuersis est foliis, sed maioribus, latioribus, flaccidis, minũsq; laciniosis, ad Lychnidem, aut Floman parua hirsutic & mollitie accedentibus. Nec flores diuersi, sed maiores, speciosiores, saturiorẽque in purpureum vergenti cœruleo: radix longior, & viuacior, quàm superioris.

CYANVS minimus viticulis Sparteis striatis, copiosis, perpusillis caliculis, flore purpureo obsoleto.

NORBONENSIS item opulentia videtur hic Cyanus, nec perinde obuius, nisi strigosus, aridis, propè MonsPELLIACUM patibulum & Castrum nouum. E radice lignosa ramosos valde emittit & vimineos graciles sparteos pedales, duriores, lignosos, multis alijs diuisos, pilosos, incanos, vti & folia pusilla Cyani, aut Iberidis, aut Scabiosæ parua montana diuisura: flores aspectu tristiore in cornulis pellicula squammatim confertis quadruplo minoribus, numerosioribus. Calycibus Stachadis citrina altera paribus. Cyaneogustu, non perinde, vti superior, amara. Semina non dissimilia.

CYANVS peramarus, repens, capitulis squarosis Sesamoidis parui.

MINVS obseruata hæc: non aliò quàm ad Cyaneũ aut Iaceã referenda, sed habitu ipso & aspectu superficiei proximè superioris similior occurrit (nec nisi quærenti) subterque Sefeli pratense ramulos ad Sellam nouam & alibi agri MonsPELLIACI reptando latitat: foliolis oblongis, angustis, Lauendulæ rigidis illius plantæ, quam incanis, albidis Cyani & Iaceæ mediam, vna interiecta planta, proximè descripsimus, similibus in cauliculis gracilibus, viticosis, palmaribus, pedalis, & sesquipedalibus: quorũ singulis summis staminei flores singuli Iaceæ, obsoleta purpura, è poculis squammosa infertione conflatis prodeunt. Radix digitum paruum æquat. Tota planta gustu perquàm amaro & ingrato.

Σησαμοειδὲς τὸ μικρὸν SESAMOIDES parua Dioscoridis
squammosis lucidis capitulis Cyaneis, flore cœruleo.

Aliud & primi Dioscoridis rutaceis folijs, cum Harmala & Rutis.

EXACTE potest æquiparari Cyaneis Sesamoides, à seminis Sefami similitudine, adeoque vsu, vt nos putamus dictum. Tamque multi sunt anni quum verum minus notum fuit

STIRPVM aduersaria noua. 237

fuit scholæ Monspelliacæ professoribus eximijs Rondelletio & Assatio. Siquidem lineamenta perpendas, folia sunt Cyani parui prorsû, incisura & ortu Coronopi, hirsutiora, maiora (tametsi fortè *μακροτέρα* legendum, vt alibi crebrius monuimus) flores radiati prorsum Cichorij concolores & similes supernè, subtus capitula squamulis compacta Chamælei leuis Theoph. Cyani aut Iacæa modo habentes. Semine intus Sefami aut Cardui minoris : radice Tragopogi, exiliore. Commentator noster cum suis *Belle astipulantibus omnibus ex imagine*, aut potius ignauis, notis, huic Phalaridis flores & capitula commentus est, & affingit, suo ne, an sui Thesei errore, nescio : fortè quia qui illi pictam miserat à nobis Patauij siccā habuerat : Tametsi in Italia Longobarda non infrequentior quàm Norbonēsi agro plurima squalidis collibus, & etiam herbidis ad Lanum.



CHRYSANTHEMVM segetum folio multifido.

CONSPICVVM aureum florem isthec fateatur Chrysanthemi appellatio, eiusmodi est sanè ille, quò segetes frigidiorum tractuum Gallia, Germania, & Angliæ scatent, flauam per menses Cererem ornate, ac vnà cum Cyanei & Papaueris Rheadis floribus insternente, magna spectantis voluptate, quasi tricolori tapeto. Regionibus æstuosis rarius. Caules illi teneri, glabri, virentes, pluculi, rotundi, sesquicubitales. Folia crebra ab imo semunciam lata, toto ambitu Arthemisiæ modo & crebrò incisa, pallentia, tenera, viridatia. In summo aureæ orbitæ nonnihil fulgentes, latiores, compressiores, Anthemidis, bollidis maioris, & calendulæ similes. Oleracea est gustu & nonnihil caloris indicante, ei tamen parcit pecus in Anglia, nec item olere manditur : ac illis signis deficitur, quæ in Calendula graphicè Dioscoridis Bupthalmum exprimunt.

CALTHA Poetarum & CHRYSANTHEMON
oculatum verius Dioscoridis,
Calendula Offici.

QUI PRÆ nostras *Kalendula* quin sit Poetica *Caltha* nullus neget, qui in Georgicis Lute- Ang. *Marygold*
olam *Caltham*, & in Plinio grauiter odoratam leget : Columella autè Bupthalmum Ger. *Kingebium*
hanc innuere videtur, vbi fauētia lumina *Calthæ* canit, nempe aureum rutilumq; flauo- men.
rem, & orbè circinnatum vmboneq; in centro extante cōspicuo, luminis, siue oculi, in spe Bel. *Bou*
ciem. Vnde Cachlan, id est, hiantulam & apertam dixerunt : sicq; *Caltham* putet quis de- bloemen.
cisam à Calathō (vt Melyphyllō à Melissophyllo) qui quasillus Latinis, Seruio teste, pocu- Ital. *Fior d'ogni*
lum & calyx est, cuiusmodi ostendant singulis fermè Calendis *Calendulæ* florum pocula mese.
flaua : cuius & nos sumus sententiæ, à quo hisce salebris permultis perplexi, discendi cau-
sa Monspelliensem Episcopum Gulielmum Pellisserium, Dioscoridæ Plinianæq; lectio-
nis mirum quantum audum & peritum, Magalonæ audire meminimus (inter complura
loca partim hiulca, partimq; luxata, quæ ille interpolabat) distinctius legentem, hunc in
modum e codice calamo exarato, capite de Chrysanthemo, χρυσάνθεμον ἢ κάλθα, τριφύλλου
ποα ταμνάδης πλείους δὲ (non λείους, nempe plures, non læues legendum) ἀναφύσσον καὶ
λὰς καὶ φύλλα : deinde πολυχιθὴν ἀνθὴν μιλινὰ ἰσχυρῶς ὑλβοντα, reliquū autè vt in vulgata
editione Lutetiana constabat. Id est : Chrysanthemum seu *Caltham*, tenera herba fruti-
cosa, plures (in vulgatis læues) ferens caules & folia : tum multifidos, id est, crebrò, aut
minu-

minutim fissos flores luteos, admodum splendidos vel rutilos, magnos oculos (non bo-
uis) exprimentes: circaq; oppida eandem nasci, & olere mandi. Quam hac cęsura literam
Calendulę seu Calthę vulgatę componētes, tam plenę & exactę vtramq; vtrius indicari,
vt nec herba alterius descriptionis, nec descriptio alterius plantę egere visa fuerit. Ete-
nim fruticat Caltha Galloprovinciæ & Norbonę cum multis in aruis & incultis prop-
ter segetes & oppidorum rudera, tum MonsPELLIJ, paulo vterius Egidio fonte aruis vbi
conterminis. Caules ē radice parua, fibrosa, complures, sparsi, teneri, laues: foliāq; Leu-
coij flores eximio fulgore nitentes edūt, vel etiā rutilos (sic enim σάλας Cicero, rutilum
Martis fulgorem vertit) oculi amplum orbem effigiantes, argutis minutissimisq; crenulis
multis scissos, quod est ἀνθη πολυσχιδῆ: nulli nō horto decora & inquilina, culta autē alte-
ro & tertio tāto plenioribus & habitioribus floribus paucis coronariorum speciositate
secunda. In cibum etiam cedit & iusculis inditur, gustu & odore nō ingrato: acetarijs etiā
miscēt multā mulierculę, tū cordis affectibus tum iſteritię & foedis coloribus indūt vir-
gunculę, respirandi; difficultate vexatę. Ius & tenerę cymę luteo ouorum in placētam
exceptę & manſę, nimis menses fluentes sistere, cunctantes autē impellere compertū est.

Salvia { Maior ἐλελίσφανος
Minor Σφάκελος
Baccifera Cretenſis
Candida, ninca.
Crispa.

Horminum.

Horminum Sylvestre.

Scarlea

Colus Iouis quorundam, & Galioſis Lutea.

Sylvestre Saluifolium verticillatum, angustifolium, MonsPELLI-
ensium, an Phlomos Lychnitis, siue Lucernaria Dioſc.
Sylvestre Saluifolium, latifolium lignosum, fruticosum, verti-
cillatum luteum.

Verbascum { Saluifolium purpureum.

Mas.

Fœmina.

Maximum odoratum.

Nigrum odoratum Luteo flore.

Purpureum Ericæfolium.

Æthyopis.

Blattaria Plin. an Chrysogonum.

Primula Veris an antiquorum Phlomidis siue Verbasculi?

Primula Veris pratensis

& odora lutea

eiusq; gemina in flore varietas.

Primula Sylvarum.

eius triplex varietas.

Sanicula altera Alpina siue Auricula Vrsi flore purpureo albo & luteo.

Baccharis.

Digitalis { Purpurea.
Lutea. }

Helenium.

Helenium secundum alibi.

Buglossum Dioſc. siue Borrago recentiorum.

Buglossum vulgare angustifolium.

Borrago semper virens.

Buglossum peregrinum radice multifida Pulmonaria.

Buglossum erraticum, Echioides asperum.

Onocloides.

Anchusa { Lutea,
Tertia,
Quarta, est Lycopsis.

Lycopsis

STIRPIVM aduersaria noua. 239

Lycopsis, siue Lycapsis degener Anchusa Egineta, Commentatoris Cynoglossum, siue caule, siue flore.

Echium.

Onosma.

Cynoglossum.

Cynoglossum pusillum.

Cyrion, utrumque.

Symphytum.

Pulmonaria.

Nicotiana.

Petum, ulceraria ferruginaria & Herba Sancta.

Arctium.

Personata.

Xanthion.

Petasites.

Cacalia.

Tussilago.

SALVIA Maior scabrior Dioscor. ελελίσφακος.

German. Groß Salbey, Breit Salbey. Belg. Broue & groote Sauie.

Gallis. Grosse Sauge. Hysp. Saua siue Salvia.

Ital. Salvia Maggiore. Ang. Great Sage.

FOLIORVM squalor cinereus, decolor, pallensque facies, arenti & marcescenti similis, qualis in torridis collibus enatae Salviae est, occasio fuit ελελίσφακος vocitandi, quasi dicas Sole afflatam, tabefactam, aut fideratam: tametsi potuit æquè scire à medendis sphacelo penè demortuis partibus, quibus calorem natium, roburque insitum reuocaret, qua pollet familiari facultate nostræ vitæ primordiis benefica. Vnde Salvia Latinis dicta, quia saluos & incolumes præstet innumeros, eapropter Rithmicus versificator quem in admirationem rapuissent tam diuinæ vires, sciscitatur; *Cur morietur homo, cum Salvia crescat in horto?* Antiphona, *Contra vim mortis non est medicamen in hortis.*

Conspicuas duas differentias in Elelispacu & Sphacelum è Theophrasto etiamnum licet obseruare. Vnam nempe Saluiam maiorem in vinetis Aquitanicis, Linguagothicis & Pedemontanis, vbi fruticat multa, squabrior, rugosior, maiore, magisque squalente aspectu; quæ eadem in hortos transfusa fuit & vocata maior Salvia. Eius sunt plures varietates, cunctæ Menthae, folioq; nõ Cotoneæ, vt mēdosè Græca, extāt, Pliniū legenti manifestum fiet, qui tamen germanitate nominum deceptus, Saluiam in Mentham demutauit.

SALVIA Coccifera, siue Baccata, Cretensis.

QUAS inter perquam pulchra ea est Cretensis baccata nostrati prorsus similis figura, odore, ac sapore, lignosis furculis. Sed hi instar Gallarum rotūdis excrementis Pistachiorum magnitudine & forma, sapore minus calido, magis astringente, non insuauiter donantur, multiplici lignosi furculi, quibus nos impertiuit apprimè sedulus & peritus vestigator stirpium Iacobus Reinaudetus Pharmedæus Malsiliensis.



Varietas.

Valde

Valde variat etiam in Anglia, vbi sarmenta quædam & palmites eiusdē plantæ partim spadiceo colore, partim candore plusquam niueo visuntur, & folia quasi pellucida. Quæ nonnullis etiam rugantur, & fimbriis multis in ambitum crispæ cernuntur, non sine voluptate.

SALVIA MINOR pinnata, Theoph. Σάβυλλον.

Germa. Klein Salbey, edel Salbey.

Ital. Salvia minore.

Belgis. Cruys saue & Orkens saue.

Ang. Little Sage.

ALTERA verò differentia, quæ auritis, aut pinnatis est ad imum, Circeæ modo, foliis, minus squarosis & coriaceis, minoribus multò: eoque nobilem dictam, & Sphacelum putamus, nec ullam eius varietatem nouimus: nullum enim discrimen in sapore, aut odore est.

ἑρμινν. *HORMINVM.*

TVM Satiuum tum sylvestre notius hodie, quam vt pluribus asserendum sit: nedum in hæsitacionem reuocandum: vtrunq; medicatum est: sed vehementius Sylvestre ad Venerea illicia, vnde nomen acceptum: ἑρμινν quippe est impetu cæco agi instinctuq; ferri & cieri intestino, vti quos in Venerem vrget libido: idè ὡς ἑρμινν ὡς τὴν συννοίαν, in Venerem laceßere dicit hîc. Nusquam autem nisi in hortis, cultu Herbariorum visitur Satiuum, foliis Pseudodictâni vel Marrubii ex interuallo binis & in summo purpurascens, collectis vt in Dictamno: iuxta quæ tota circum caules quadratos, pedales & cubitales, flores sunt verticillatis pyxidulis purpureis ad caruleû vergētibus: quæ hiantes per maturitatem deorsum nuunt pendulæ: semine papauereo maiore, nigro, ablongo, mucaginem aquæ merlo, vt Psylidium, emittente: estate floret.

SYLVESTRE HORMINVM.

RVERA & prætata macilenta sectatur sylvestre dictum: foliis maioribus & aliquantulum laciniatis oris Blattariæ similitudine & colore: quadratis & paucioribus virgultis, sesquicubitum altis: per internalla flores verticillati in spicas longiores abeunt, deorsum inclinatas, ceruleas purpurascens: nigro, nec absimili priori, semine glutinoso. Vtrique radix lignea: Sed illius odor nullus, huius verò Scarleam redolent flores.

SCARLEA, Centrum Galli, Officinis Gallitricum.

Germa. Scharlach.

Belgis. Scarlece.

Gal'is. Oruale, Toubonne.

Ital. Schiaria.

Ang. Clarye.

EST autem quam vulgus Gallicum Oruale, conspicua ad Horminum allusione, & cōsimili de dote vocitat, notissima: Germanicè & Belgicè Scarley quasi dicas, oculum clarificans, mixtis Latina & Germanica voculis. Semen quippe palpebram inter & oculum insertum, atque diutulè retentum, quantum est sordium illic, illico euerrit & rapit, quotidiano etiam vulgi experimento. Seritur, & oritur anno post, Iulio & Iunio: flores edit ceruleos & albicantes Saluiæ vel Dictamni: in quadratis caulibus folia pregrandia Verbasci, aspera, admodum hirta, rugis & veluti verrucis non nihil hirsuta, Æthiopidis aut Verbasci pube, & sylvestris Hormini similitudine: sed minor radix, dura & sublutea. Semē in calycibus nigrum ὡς ἑρμινν, capitisve grauitatem facit, odore, quē vniuersa spirat, non tamen ingrato: eoque magni vsus quibusdam septentrionalium ad Zyti Biereque confectiōnem: Lupuli namque vel penuria, vel vegetioris potionis faciendæ causa, cortinis feruenti-

uentibus addunt; fitque temetum, quo non multis depletis poculis temulenti fiunt, hilaritate propemodum infana: in nonnullis tamen, risu quam miseratione magis digna. Menstrua & secundinas ducit, & Venerem ciet, quare minus, quin sit Hormini species, refragandum.

COLVS IOVIS folio Vrticæ, aut Hormini, Galiepsis

Lutea recentiorum.

HIS merito accensenda videtur ea, quam nescio qui rei Herbariæ nomenclatores, Galiosim luteam dixere, & Colum Iouis: summo caulis fastigio colum flauo penso inuolutam, nonnihil effigiantes: facie quippe Hormino propiore quam Vrticæ, aut Ballotæ. E radice Lamii simili, caules edit non multos, cubitales & sesquicubitales, quadratos, hirsutos, quibus folia Vrticæ, aut Trachelii albida, ad basim sinuata, latiora, læuia, Gallitrici minora: flores in verticillis lutei, Saluicæ aut Scarleæ. Scaturigines vdosque sylvarum margines amat, Galliæ, Germaniæ, & Italiæ. Gustu nonnihil calido, exsiccante.

VERBASCVM Syluestre Saluifolium Norbonensium,

an PHLOMOS LYCHNITIS Dios?

MULTIPLICIS differentia ite φλόμος, vel φλόγμος, deductus è flammis, aut Elychniis, quæ huius tomento bomibaceo concinnatur & alutur, Tapsum potius maius dicunt, aut Taxū practici, quia toxicis aduersetur: tamen si cognati cuncti saluiis facultate & facie adeo sunt, vt syluestrem saluia plebs vocitet minores species montosas, inter quas frequentissima plerisque omnibus agri Norbonensis collibus glariosis, Mospellio vicinis, fruticat hic quæ Phlomis Lychnitidē videtur innuere Dios. rarus alibi Galliæ, vel Italiæ. Peramceno aspectu florum luteorum Fabæ vel Marrubii, in verticillatis circinationibus secundum foliorum exortus hinc inde porrectis, pallidulis villis staminum, folia scabra, crassa sunt, densa lanugine cana, asperaq; tactu & crispata, Saluicæ Angustifoliæ angustiora, sed longiora, & ad Elychnia valde accommoda: vnde videtur Dioscor. Lychnis dicta.



SYLVESTRE Saluifolium fruticosum, lignosum.

PLANTÆ proprior ceteris hic Marrubium & Saluiam imitatus: eoque vocant quidam horti Angliæ, Italiæ, Belgiæ & Galliæ, agrestem Saluiam: foliis scabris, albidis, aliquantum hirsutis, quadrangulis, in virgis lignosis, breuibus, bicubitalibus, per interualla foliorum flores prominentibus luteos, Marrubii vel Archangelicæ modo, verticillatim herentes, visu per incundos.

VERBASCVM Nigrum Saluifolium, purpureo flore.

PLANTÆ fabulosis familiaris hic Saluifolius, præsertim non procul Taurino Pedemontium: pariter Germaniæ, Galliæ, Angliæ, saxosis pratis herbidis & ruderibus. Folia quam maximè Saluiam agrestem, siue Scordeum Plinii, aut Horminū æmulantur, secundumque caulem & ramos ab imo quadratos pedales & sesquipedales numerosi flosculi, verticillati, purpurei, vel carulei, per fœnicetia.

PVRPVRVM Erucæ foliū Angliæ & Galliæ etiam obuia hæc tum pratis, tū ruderibus, quam horti quidam alunt in Belgio, cognitu & destinctu facillim, foliorū laciniosa ora Erucæ, aut potius cornuti papaueris diuisura, & colore nigriore, ramosos caules & cauliculos ambiunt: flores per interualla Saluæ aut Hormini modo & colore, tota viridante & hirsuta superficie. In mole templi diruti Bathoniæ Anglæ prope Thermas, videre erat superiore anno.

φλόμος. VERBASCVM MAST, *Thlapsus Barbatu.*

Germa. Mollkraut.
Gallis. Bouillon blanc Maste,
Belgis. mollcrupt.
Ang. Mulleyn the male.

QUI obseruarunt mustellas conflixisse cum serpente, peneque enectas & victas, pastas isto Thlapso, & factas denuò alacres, duellū instaurasse, Taxū vocarūt: alioqui luculenta foliorū magnitudine, & videndi ubiq; consuetudine, nulli nō cognitū. Folio prægrandi, simili, & pari, Enulæ, pube obductum multa & leni & incana, quali in Gnaphalio & Æthiopide. Caulē admodum procerum, trium cubitorum, à sui medio summo tenus floribus luteis stipatum, thyrsūque, siue funalem exprimentem, visendum, vnde vulgo *Torches* & Græcis φλόμι à flamma, quam alunt funales, aut Phlomi folia & caules in lucernis. Radix pollicem crassa.

FOEMINA.

HANC si albidis exeat floribus, & senis foliolis diuisis, fœminam vocant, alioqui folio consimili & pari.

MAXIMVS odoratus meridionalium, Thlapsus barbatu.

EXCELLIT hic vt magnitudine foliorum, sic etiam odore suauis, omnibus Verbascis: tametsi varietas tantum videtur descripti communis Phlomi fœminæ, vel maris: floribus quippe luteis & interdum albis exit, senis foliolis: quæ arantur rubris lineolis, odore suauissimo, folio longiore, latiore: radice crassa, nec aliubi dissimilis tota planta. In Belgicis, & Gallicis Northmannis hortis alitur. Pedimontani verò agri, Norbonæ, Angliæ, & Italiæ, occurrit passim in campestribus.

NIGRVM Latifolium Luteum.

ET huius omnia penè similia, foliis namque Enulæ inter & Digitalem vel Symphitum nigricatibus obsidetur, paribus, scabris grauius olētibus, nec incanis, flosculis ex herbaceo luteolis, stellatis, minoribus: semine item Papaueris minore, Digitalis ritu incluso: è radice æque cæteris magna, caulis gracilior Blattariæ cubitalis. Pratis Brabanticis, fabulosisque & herbidis, atque in Francia, & Anglia, Iulio & Iunio sponte prouenit.

ÆTHIOPIS φλομάς, siue Phlomis.

HVC nomenclaturam Magica futilisque mendaciorum magistra superstitio commēta videtur, quod iniecta flumini folia quantū esset aquæ exhauriri crederetur: tametsi verisimilius, quia optima ex Æthiopia adueheretur: nisi sit dicta, quasi fuliginosa cinerē facta, cinerēve aspersa, αἰδοῖ, namque Græcè fulligo est, siue fauilla adusta. Inquilina hæc hortis Germaniæ, Angliæ, Galliæ, & Italiæ: ubi primum vidimus ex Græcis & Illyricis montibus maritimis allatā, iamq; satis vulgatā esse, & cognitu facillē, Thlapsi barbati admodū similē, cōstat, Magis tamē incanis, mollioribus: carptaq; delatiore longiore lanugine, cuiusmodi Cretensis Dictamni, & laciniosa undulatq; crispante ora, circum inum caulem accu-

accubantibus, & ambientibus quadratum, hirsutum, binum pedum, & sesquicubiti, multas in alas sparsum, quæ secundum longitudinem verticillatim flores ambiunt Scarleæ aut Homini: sed albidæ, & semen non dissimile. Radix cognatâ Verbasci naturam testatur.

CHRYSO GONVM, an, potius BLATTARIA Plinii,
quàm recentiorum TORMENTILLA?

AB aurea florum fœtura dictum Chrysogonum credere par est: Eapropter si Blattaria Plinii Chrysogonum Dioscoridis non est, nulla iam planta in memoria est, quæ nou longius multo absit à Chrysogono, quàm hæc Blattaria. Quippe densè fruticat, multisq; firmis ramis, & rigidis sesquicubitalibus, & duos cubitos altis, rectis: foliis Quercus, aut Verbenæ: flores ad eò Verbasco, foliorumque quinario numero, & colore accedunt, vt vtrâlibet pro vtrâlis accipere facile sit, etiâ monente Plinio. Verùm Blattariæ flauo satiore, & magis rutilo, initio præsertim, folia non perinde incana, aut hirsuta, sed obscure viridantia. Semen pullum, inclusum pericarpis Lini, aut potius Digitalis purpureæ. Radix Napi aut Raphani syluestris, alba, digitum crassa; sed æstate exeunte per Autumni initia, ex atro foris intusque rufescere quidam amici affirmabant; nempe ex cocto ab æstu alimento: quemadmodum Carduo Benedicto vsu venire videmus, & quidem minus de hac miramur, vt cuius flores interdum purpurei, punicei & carulei conspiciantur, non modo in Belgii & Galliæ Herbariis hortis, sed etiâ in Taurini & Rioli marginibus campestribus herbis. Amara admodum, calidæque & sicca gustanti; quare qua allicitat blattas & tineas dote arcana malim scire, quàm non potius (quemadmodum Absynthio, Abrotano, & aliis amaris arcentur) ab actum iri idem animalculum suspicari; factus viscerum meseraicarum; expedire certum: incertum verò quid ad morsus venenatq; possit: Eapropter qui præ hac Tormentillam septifoliam, inter Pentaphylla memoratam, mauult Chrysogonum facere, ob radicem (tamen si perparum rufescant) effigiem flores & folia, ac denique vires ad venenata plurimi faciendas: sanè per nos optionem habeat, dummodò hæc nostras coniectationes sic accipiat, vt eas, quæ sunt lubenter cessura potioribus vestigatoribus, non ignauis obtrectatoribus.

Græcè similem
rapo, non aqua-
lem, aut extu-
berantē radicem
ουθίαυ γογγύλη

TORMENTIL.

Φλωιδες, PRIMVLÆ varifloræ, an, Antiquorum PHLOMIDES;
sive Verbasculi?

AVernâ germinatione, florumque quasi rediuiua vernatione, vulgus Primulas veris, quia primulum tum erumperent & florerent, vocitauit. Huius plures varietates, præsertim in Angliâ, lautitiæ & florum deliciæ amantissima, quàm alibi conspiciuntur: quarum quæ vnâ duntaxat nouerit, cunctas cognitas habebit: distant quippe floribus duntaxat satiore colore, rugosiorque folio.

PRATENSES Dux, Pallida, Lutea odora, quæ culta sit maior
& flore multiplo apud Anglos.

{ Germia. Himmel schluffel, & S. Peters kraut. & Schluffelbluom;
Gallis. Prime vere & braves de Cocu.
Itali. Brachediculo, & fior di prima vera;
Belgis. S. Peters cruyt.
Ang. Coweslyppe.

VBIVÈ IN pratis viginosis & riguis, præsertim regionum minus calidarum, vt Sabaudia, Flandriæ, Galliæ, Northmanniæ, & Angliæ, primo veris tepore florent; & radice albidâ, fibrosa caulem nudum, rotundum, aliquantum hirsutum, palmarem & sesquipalmarem, quem summum & nutantem umbellæ instar, florum calyculi copiosi ornant, non dispares pulmonariæ, sed lutei, ceræ nouæ odorem & colorem æmulantes. Folia

X.ij.

maiora

maiora Betonica, neutiquam ambitu incisa, Digitalis purpurea quadantenus, rugosa, ad imum strata, aut parum surrecta: gustu non ingrato, in olere, placentulis, & acetariis: admodum utilis capiti, neruis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, eoque vulneraria habetur.

ISDEM ferè locis hæc, nec diuersis floribus, sed pallentibus, & foliis grandioribus paulò, odoris verò nullius.

*Varietas florum,
gemina.*

SED quæ in hortis Anglicis & Northmannicis colitur, florum maiorum, prouentu & fœtu multiplici, triplò aut quadruplò omnium Primularum magnitudine & elegantia prima.

SYLVARVM PRIMVLA.

HANC non potest non nosse qui vllam superiorum viderit: differt enim flore duntaxat, qui singulus languido pallore, pusillus, palmo breuior, quasi cauli summo inest. Folia, sapor, odor, vsus, non disparia, sed lubentius hæc nemorosa vmbrosasque conualles sectatur: vti in Anglia, Delphinatu, & Sabaudia. Flandris & Gallis hortensis.

VARIAT hæc in Angliæ hortis speciosa florum duplicatione & incremento, Lychnidem coronariam duplicatam æquante: coloris etiam diluti lutei.

Varietas

INTERDVM & albi peramœni, sed simplici floris, venum ferunt mulierculæ in vicum Mercatorium Londini.

ETIAM fimbriatis floribus, rugosisque, plicis, & coloris obscure virentis, Primula quædam Londini hortis frequens, alioqui assimilis cæteris: quam studiosi Herbarum Antuerpiani, vt nonnullas superiorum indidem habuerunt, & nos monuerunt quæpiam Primulam in Anglia extare floribus purpureis: sed nobis frustra quæsitæ, & Pulmonaria putata, vt doctissimus Turnerus dicebat.

Harum omnium cum sint folia ambitu rotundiore quam maioris Verbasci, & caulis nonnullarum foliaque sint hirsuta, cur neget commentator non esse Phlomidem? nullam nisi ostentationis futilis habet rationem: vires quippè & tota facies planè Thlapsi, contra suadent, consensusque experimenti apud omnes regiones, quæ modò vnam quampiam harum habeant, Paralysis herbam vocant, quo nomine propter insignes facultates fuit etiam Phlomis donatus: igitur & hæ Phlomidem.

PARALYTICA Alpina SANICVLA, Vrsi auricula
recentiorum, figura Primula, sed floribus purpureis.

VISENDÆ venustatis vt si quæ alia Alpinarum, istam herbulam, satius fuit Arthriticam vel Paralyticam nominasse, quam Saniculam, tum propter peculiarem expressionem affectus Arthritici, quem admolitur, tum maximè quia Primulis annumeranda videtur: tametsi amat hæc summa item montium præcella, & præruptarum supercilia petrosa, qualia sunt in Claudii cautibus, Clauene, & Oenipontis finitimis, vbi ferè tota æstatè perennat nix, qua inuita exacto Vere hæc Primula pratenses singulari cauliculo, quasi flores in pediculo molliore & inflexo punicantes, aut ex roseo albicantes, visum exhilarantes dant, suauiterque spirantes: folia autem albida, virentia, crassiuscula, carnosæ, & leuiora, quam Primula Veris, nonnihil repanda, & limbo crassiore. tantillum fimbriata & circinata: radice multum fibrosa & cognata Primulæ: gustu pariter multum exsiccante & astringente, vulnerariis potionibus quæsitæ, & foris vulnera glutinante, vnde Sanicula.



STIRPVM aduersaria noua. 245

Varietas. { Alibi montium interdum frequentiore & maiorem vidimus folijs, cauliculo & flore, qui tamen nō purpureus, sed luteus, aut albus, & fuscedine pulchus est.

DIGITALIS PURPUREA.

{ *Ger.* Singerhut & fingerkraut.
 { *Belg.* Uinger hoet cruyt.
 { *Gall.* Gant nostre dame, doigtier.
Ang. Foxe gloue.

REGIONES quæ ad Aquilonem sunt, feracissimæ sunt Digitalis purpureæ, quæ Meridianis calidiusculis ferè deest. Sed in Francia, Belgio, & Anglia, nulli non nota, vbi id nominis vernaculè assequuta fuit, nec enim antiquis memorata, quorū calathi oblōgi, picti, celsatīve apparent, in Digitalis siue digiti ad suendū munimenti speciem, elegantī serie cauli bicubitali hærent vno ex latere, penduli, folij paris, cōcoloris, & similis, Cynoglossi vel Symphiti maioris: fibrosa radice, viscida, nigricante, semen in pericarpis pusillum, Verbasci, odore putidiusculo, & qui Bacharim dicebant, opinionē refellēte gustū ingrato, exsiccante, aliquantum calido, & vulnerario: quare plurimi fit ad omnia vulnera sananda.

DIGITALIS Lutea.

MINOR hæc, minorisq; elegantia, minus fert cælum Angliæ, vbi non vidimus, alioqui passim in Pedemontani Taurinis & Sabaudijs collibus, folio nigriore, angusto, Blattariæ aut Plantaginis, læui, nec hirsuto, non perinde hilari aspectu florum, qui palliduli luteo squallent, angustiore nola, nec perinde punctulis impressa.

ΒΑΧΧΑΡΙΣ ΠΑΥΧΑΡΙΣ BACCHARIS.

EX TAT apud clāsicos Græcos βαχχαρις, aut potius παυχαρις, plantæ cuiusdam nomenclatura, sic, vt lubenter credimus, indita, propter eximiam fragrantia gratiam Cinamomeæ radice, ex qua cū multa alia, tum vnguen confiebat, item παυχαρις apud Athenæum dictum, fertaq; concinnabantur, quibus tempora cingebantur, ne Vati noceret mala lingua futuro, vt canit diuinus Maro. Eam ob rem licentius abutuntur lectoris patientia, qui istud caput è Dioscoride quasi spurium expunctū volunt, frustra que probare satagunt, vtramq; plantam, Baccharim nempe & Asarum, & vtriusvis descriptionē (paucis quæ irrepserē demptis) eadem esse, cū quilibet iam cernat legendo non propius abesse Hederam à Saluia, quā Asarum à Bacchare. Alstringit hæc, inflammationibus & ignibus sacris proficit, somnifero est odore, fronde inter violam puta albam & verbascum. Illa contrā impendiō calfaciens, discutiens, hederaceo folio, Nō parum itaq; diserepant Plinio autore: qui quod coronis nō addatur, dictum tradit Asarum. Labes hæc profecta è fragmentis Crateuæ, vbi Baccharis Dioscoridis Asarum vocatur & describitur. Quod qui dem nos monet, sedulam appellationum perpenſionem ne utiquam neglectui habendam esse accuratis viris, veri fidis venatoribus. Iam verò de multis, si optio detur, nullā perinde congruā videmus, ac illa, quā olim barbarorū doctissimi genuinā putabant: multò enim propius, quā illa Mathioli species verbasci odorati, ad Baccharē accedere certū est. Hæc quippe fruticosa, appendicibus donata, folijsq; asperis, nigricantibus, Primulæ veris, vel Saluæ latifoliæ magnitudine, caule bicubitali, floribus purpura obsoleta glomeratis, in pappos defluentibus, Cardui modo. Radix summo cespite sparsa, diffusis fibris, garyophyllatæ modo, cuius odorem præsentissimum halat, vel cinamomi: cui contulerunt antiqui Baccharis radicem, qui Garyophillos non noſſent. Planta valde frequens, valdeq; isto nomine nota Monſpellij circum, & alibi non paucis locis. Qui quatuor Coniæ species nouerit, (earum namque inter se non parua similitudo, flore, Luteis omnibus, odor grauis, gluten dum attrectantur) cur Mathiolus istam Baccharem odore & flore

X.iiij.

nobi.

nobilem Conisam maiorē fecerit, & Verbascum ei suffecerit, haud faciliē dicet. Verbasco quippe est odoratum, cui interdum flores lutei, interdum purpurei, vt Blattaria maioriq; Verbasco interdum contingit mutari. Romæ cum valde auidi, vt semper soliti fuimus, & freti fide Mathioli complures quos sciscitabamur herbariæ rei peritos, nihil aliud quàm Verbascum putabant: idemq; in Flandria alijsq; non paucis locis ortum, non chartæ agglutinatam plantam istam Mathioli, quæ potius figuræ, quàm odoris, colorisve notas retinet. Sed istud consuetum illius dignitati, res verbis aut chartis assertas, non item inspectione exploratas literis mandare.

ἑλένιον *HELENION.*

{ *Ang. Elecampane.*
Ger. Alantwurtz.
Bel. Alantworte, ende Salantworte.
Gal. Enula Campani, herbe d'Elaune.
Ital. Enola, l'Elia.


HELENÆ luctu aut satū clarius & notius posteritati factum est Elenion, quàm vt fuisse delineatione sit opus, tametsi & ab insula Helena dici putatur, vbi longè optimum luxuriat numerosa & pregrandi fronde Digitalis aut Verbasci Platiphylli (non angustifolij Verbasci, vt mendosè codex Græcus) florem Bupthalmi aut mediæ Conizæ aureū stellatū Iunio & Iulio fundēte scapo sumo, recto, tres aut quatuor cubitos procero: radicis amplæ, crassioris, carpum ferè æquātis, perquàm odore: in pratis villarum & prædi-
 orum Angliæ, Germaniæ & Galliæ, erui primo Vere solitæ. Qua quidem vtendum intrò humenti & recēti ad animi paranda commoda lætitiāq; inuehendam, & mœstitiā necādā: de qua dote plurimi fecerūt eam antiqui, & nepenthe illud Ægyptium ex ea vna confectum opinati sunt: sicca verò benè facit foris: sin intrò sumas, humenti atq; recenti vtendum, præsertim in pulmonis affectibus cronicis. Istud tamen Pharmacopœi non est, sed periti Medici.

Βούλωσσον *BUGLOSSVM sine BORRAGO.*
BUGLOSSVM vulgare angustifolium.
Euphrosynon.

{ *Ger. Bureisch.*
Bel. Bernagie.
Hisp. Borraïenes, Borraïes.
Ang. Borage.
Gal. Borraches.

BORRAGINEM quasi Bouaginem vulgus dixisse putatur, versa & deinde peruerfa ē Buglossa voce, quod tam verum, videtur, quàm nulli in dubium iam vertitur, nostram Borraginem esse genuinum Dioscoridis Buglossum, ἐνπρωσίην, seu exhilarantem herbam: cuius postea ætas recentior nomen confudit & commune fecit, viribus & nonnulla ducta similitudine, angustioribus folijs, & aliquantum diuersæ plætæ, non Borriginis, vt nūc, sed Buglossæ tunc dictæ. Iam verò notior vtraq; etiam plebeculæ quouis olusculo: sed minus vera, verum retinuit nomen. Latifolia & germana, non Buglossa, sed Borrago tantum dicitur. Vtraq; fecunditate importuna in hortis luxuriat. Genuinum & latifolium folijs in cespite stratis, latis, subrotundis, asperis, hirsutis, rimosa viridi in atrum declinante, superficie Symphiti maioris potius quàm Verbasci. Huius radix extima albicat, minor & breuior nec perennis. Alterius contrā foris nigra, perennis, prolixior. Vtraq; tamē glutinosa, edēdo medendq; nata: genuinæ flores stellati quinque foliolis, eximia purpura, cœruleoq; nitentibus, interdum candidis, medio quasi centro coronidem circinatam, fuscā, exilem cohibentibus. Semine nigro Anchusæ aut Lycopsis: Sed alteri flores concolores, Primulæ Veris modo aut Anchusæ: Semē maius, minus nigrum, folia lōgiora, angustiora, Echio aut Lycopsi toto habitu tam propè accedentia, vt ni defuisset rubellus radici color, Lycopsim domesticam facturi fuisset, qui quia nigricat, potius Echium indicat, aut vtriusq; anceps naturæ.

EX duabus dudum recensitis videtur natura Dedala ludibunda vnam concinnasse multò elegantissimam, ac semper virentem, etiam frigidi-
 ssimis Angliæ, Antuerpiæ, Belgiæ; reliqua aduecta, vbi plurima & peropportunè viget in hortis ad vsus medicos, vtræq; Brumæ rigoribus deleta. Folia subrotunda, latifolia Borraginis, vti etiam caulis: radix situ, habitu & mucagine Cōsolidæ maioris: Flores verò secus alas & folia prorsum angustifoliæ: eiusdem saporis & vtilitatis ad cordis & ex melancholia affectus,

BVGLOSSVM *peregrinum radice multifida Pulmonariæ.*

IN nostris stirpium sportulis quedā arida adhuc est Buglossi facie planta, quam ex hortis Bononiensibus habuimus: in pilis densis, horrida & aspera sunt, angustius desinunt folia qua hærent radici, fibrosa, fusca, non Buglossi, sed Pulmonariæ: caules & flores per temporis angustiam expendere non licuit.

Erraticum BVGLOSSVM *asperum Echiioides.*

EST & hæc perquam similis qualibet sui parte superiori, & penè par, macilentis & fabuletis Antuerpiæ vicinijs passim sponte, etiam in hortis locum faciunt, vtunturq; Buglossi penuria Pharmacopœi, quibus Sylvestre Buglossum creditur. Admodum horrent hispidaq; sunt folia, setaceis, pilis rigidis, & bullis prominulis, tantumq; & simili differt modo à superiore, quantum Labrum Veneris à Dipsaco hortensi, Radix gracilior, lignosa.

BVGLOSSVM *Echiioides Luteum.*

VALDE cognatum huic est facie, natalibus, vsuq;. Pluris faciunt hæc mulierculæ Angliæ, quam Buglossum, vocantq; linguam Bouinam luteā, propter luteos flores Sonchi similes, in asperis caliculis collectos. Folium item Dipsaci Sylvestris, nec minus spinosum, angustius aliquantum. Radix alba, viscida, oleracea, vt Buglossi, cuius est species.

ἄγκυρα ANCHUSA.

Offi. Alcanæ radices.
 Ger. Koot ochsen zung.
 Gal. Orcanette.
 Ang. Alkanet.

FVCO pigmentisve illinere, Græcis ἄγκυραι erat, vnde Anchusa dicta à radice illustri cruore, coloréve florido, cui plantæ totius cognitionem debemus: vix enim alioqui innotuissent, tum propter cum Echii, Lycopside, & Buglossis similitudinem, tum etiam ob versionem minus perspicuam: confert quippe hanc lactucæ τῆ ὀζυφυλλῶ angustifoliæ,
 X. iij. vel

vel acutæ, & vti videtur agresti, quæ hirsutior & horridior. Quatuor animaduertimus differētias ex floribus, folijs, & magnitudine. Quæ Calys seu Onocleia vocatur, maxima, frequentissima Galliæ & Angliæ, aruis lætis, sed glareosis, vel argillaceis. Radix intus ligneo corculo, libro corticæque crassiore amicta, sanguineo succo sâdalinôve digitos inficiente: digitum æquat, sesquipalmum longa, gustu Buglossæ. Folia copiosa Echij aut Buglossi angustifolij, lanugine spinosa, incana, cespiti incumbētia: caulis plurimum singularis, rotundus, squaber, cubitalis, tirsulis florum cæruleis ad punicem vergentibus, Echij non dissimilibus: semen exiguum, oblongum, pullum.

Lutea ANCHVSA.

RARIOR & elegantior multò qui luteis floribus, sed ramulis minoribus & magis collectis in summo: folijs item numerosioribus, lanuginosis, albidis magis: caulis pedē aut cubitū æquat, & semen alterius. Radix tamen viuidiore multòq; delicatiore nitet purpurissâ, succulentior priore, Norbonæ ad aquæ Marianas, vmbroso & pingui solo. Etiam in asperis, non procul Athesi flumine, & Baldo Veronensi, collegimus,



MINOR seu Alcibiadion vel Onochiles.



NOTISSIMA hæc & copiosissima in Nitiobrigum agro, vnde Pharmacopœi MonsPELLIENSIS & LUGDUNENSIS Lugdunū ad nūdinas quotānis acserunt: nos ē vinetis & sabulosis aridisq; collibus Grāmuntia Syluæ, propē doctois Assutij prædiū, eruendā curabamus. Prolixior namq; & carnosiore pleniorq; est radice cæteris. Cætera tota minor, angustiora folia, multò numerosiora, viridantia Buglossi. Complures fundit cauliculos teneros, graciles, floribus minoribus, Buglossi minoris angustifolij, puniceis. Semen cinereum, oblongum, paruum. Sapor Buglossi, nō ingratus, acrior tamen & siccior.

Anchusa lignosior.

ANCHVSA LIGNOSIOR angustifolia.

VLTIMA hæc & minima omniū, tametsi vix Anchusa habenda sit, vt cuius sit parum aut nihil purpurea radix lignea, ruffofusca, fundēsq; cauliculos sesquipalmes lignosos Satureiæ: foliolis oblōgis, Alcibiadæ Anchusæ minoribus, minúsq; hirsutis: flores item nō multum absimiles, pusilli, cærulei. Radix lignea ex fusco ruffescens, parū aut nihil inficiens, Marginibus agri Frontignani & Valeriæ Syluæ hæc interdum occurrit. Alibi nobis nusquam visa.



LYCOPSIS, vel Lycapsis degener Anchusæ, Egineta.
Mathioli Cynoglossum.

Nihil habet hæc Anchusæ, præterquam radicis fuscum ex purpureo colorem; à quo Lycopsis deriuata fuit, id est, fuscado obscuritasve, qualē ante lucanum vulgus inter Canem & Lupū crepusculū vocat: nisi sit ab hispida caulis foliorū & florum inpexaque hirsutie, pædem imitata Lupinum: qualem non procul à littoribus Frontignanæ & Doctoris Griffii rure nobis primū ostensa fuit à Professore D. Assatio, præceptore exercitatisimo; & de Medica materia benè merito. Satam postea habuimus Londini in Angliā: folia dum per initia erumpūt, cespite instrata numerosa, bullis & villis asperata, Echii, palmum longa, pollicem lata iacent, neq; toto anno assurgunt, aut caulem florē inue edunt; sed vno & interdū altero anno post, æstate caulem sesquicubitalē, rotundum, hirsutis alis multis diuisum. Iuxta quas & folia erumpūt ex interuallis: florēsque Echii fimbriati, diluta purpura, exili stamine. Semen Borriginis, minus nigrū: radix crassior digito, rufescit; lignosa: parum aut nihil attrēctantem inficiens.

Hæc ab ea quæ hīc in Angliā via quæ Bathonia & Bristolīa Londium ducit per messēs lata & multa hilari visitur aspectu, floribus tantū differt: quos non secūs foliorum & alarum interstitia, sed in summis caulibus saturiore purpureo, Anchusæ maioris. Vt prior subrubra linet & nonnihil rubelli affricat digitis.

ΕΧΙΟΥ ECHIVM, Buglossum agreste.

Germa. Wild ochsen zung.
Gallis. Buglosse Sauvage.
Belgis. wilde Osse tonghe.
Ang. Wyld Bugloss the lesser.

SEIPSA prodit seminis indice, quo à Borragine discerni videtur: ab Anchusis autem radicis colore, siquidem Echio multumque ad syluestrem Buglossum accedunt, folia per interualla circum teneros rotundos quaternosve caules rectos sesquicubitales, alterno situ plurima hirsuta, ternas, quaternasve vncias longa, pollicem lata, subnigra, crassa, è quorum sinu emergunt per interualla flores copiosi, ex puniceo cærulei, in pusillis vtrinque incuruis aristis digesti, plumatas summitates effigiatibus: hisce asperiusculis & spinosis tegumentis euolutum clauditur semen, viperinum caput argutis, sed exilibus oris, luminumque vestigia efformat.

ONOSMA, sine Ononis.

NVLVS est paulò exercitator, qui illico percepta Onosmatis ex Dioscoride delineatione; nō opinetur eam esse è censu Anchusarum, Lycopsidi nimirum cognatam, anchusamve, degenerem, quam secruūt Diosc. nomine & familia: vt suo obsequutus instituto frugiperdis abortum faciētibus infereret, cuiusmodi sunt Securidica, Nymphaea, Asplenium, Hemionitis. Eoque bis foliorum similitudinem ad Anchusam inculcat. Res verò ipsa indicat esse, quemadmodum arbores non pauca, quæ foetæ fuerunt primū, postea exhaustis viribus biennio aut triennio florem fructumque edunt nullum. Sic duo aut tria genera Echii putata meminimus, triennio primū nō nisi folia, postea caulem & semen promere: quibus per frigora amissis, nō nisi biennio aut triennio interiecto, rursum incaulem & flores erumpere: alias anno floruisse primo, aut altero, bienniumque interdum totum quasi effetas & steriles, caule orbatas fuisse, suspicionemque fecisse seminis, florum, caulisque sua natura expertes esse: cū tamen denuò rediuiuas reparatis caule flore atque seminibus Lycopsides animaduertissemus: quod potuit itidem inde istis euenisse, & id vulgo persuasisse, quia infelix, atque foetus certa perniciēs, nō secus atque filix aliāque haberetur. Huc exempla Bechii & Dictamni studiosi arcestant. Cynoglossum autem iam hīc nobiscum perpendant.

Κυνόγλωσσον. CYNOGLOSSVM.

Germ. Hundzunge.
 Gall. Langue de chien.
 Belgis. Hondts tonghe.
 Ang. Howndes tunge.

HAVD dispar de lingua Canina hæsitatio, sed quæ minoris egere videatur disquisitionis & probationis, æquis arbitris attentius rem ipsam expendentibus. Etenim nisi nullidum cognita est Cynoglossa, aut certè ea est planta nominis interpretatione, vsu, & caninæ linguæ assimilatione, consensui vulgato adeò probata & recepta, vt nullus sit ex istis malè feriatis nouatoribus, qui æquè bonam & congruam, nedum potiorem, indagare quierit. Est namque ea foliis mollicellis, lenibus, lanugine pauca, ad tactum minimè aspera, mollicie & effigie linguæ caninæ vel Glasti, nonnihil venosa, albicantia, Plantagine latifolia arctiora, præsertim aridis & sabulosis Linguagorticis, vbi pusilla vix sesquipalmū

CYNOGLOSSUM
 Pusillum
 Norbonense.



& pedem excedens: caulis rotundus, incanus: in alas diuisus, quibus flores punicei angustifolii Buglosi: paruum semē lappulis, hirsutisve clypeolis contentū, vestibus, vt Agrimonie vel Caulicidis pertinacius hæres. Pinguibus tamē & humetibus aruis Ferrariensibus & Patuinis maximum glastum superat, eò proceritatis progressa, vt vix sui similis sit: viridiora namque folia ima & latè humū operiētia: dilutiores flores, obsoletioresq; quos fert nullos nullumque caulem nonnullis annis, præcipuè umbra saligna aut sepibus vicinis opacata. Qui in Herbariæ cognitione cōsenuerat peritior quàm iactantior Barallis, Dioscorides Monspelliensis vocatus, asserbat Rondelletio nobis audientibus sibi non semel in Lemouicibus & Auernis obseruatas non paucas triennio & quadriennio quotānis bellè reuiriuisse, cæterò nullum caulē promississe. Quin si vires spectes, magis ar-

Plinii. Cynoglo.

rideat tum planta, tum sententia nostra, quæ doctiori lubenter cedit, quum potiorem indicarit Cynoglossum. Ambustis siquidem opitulari, vel mulierculæ sciunt, refrigerandi scilicet manifesta qualitate, exsiccante, doloremq; leniente, & maiore affluxū prohibente; præsertim exungia alliquefacta feruidæ instillata: itē Allopecidis de acri & erodente humore capillis defluētibus, cōfert. Nec nō emolliet aluū eius vis malactica & mucaginea vino incocta & frigore retuso. Radix Symphiti est magnitudine, mucore & colore, odore penè soporifero, maximi hodie vsus ad acres & tenues fluxiones: magis tamen incrasat quàm refrigerat. Hæc Plinii lappulas ferens videtur: non enim Echii, aut Anchusæ, aut Lycopside ferunt. Quare, si, vt pleraque omnia, è quopiam Herbario vertit Plinius, caulē ferre & semen, vt qui obseruaret fortè eadē quæ nos scripsimus: inscitè simul atq; perfidè erroris fœdi traducitur, & Ruellio pererudito calumnia impingitur non ferenda ab illo eius perpetuo plagiaro præsertim: qui nisi hīc tantus fuisset, nunquam ille cōmentatoris opinionem sustinuisset. Porro eum nisi tumultuari gloriolamque aucupari satis perspicuum, cum nihil interim doctiores nos vsipiam relinquat. Cur nō docebat, qua de re Tral- lianus eximius Græcus addiderit radicis cortices pilulis, quas de Cynoglossō inscripsit? quæ apprimè pollicitationi stant, nec vllus Medicorum hodie aliam vel addit, vel nouit. Etenim Mathioli hanc, cui natales Romæ ad molem Adriani facit, nusquam non locorū paulò calidiorum Norbonæ & Hetruriæ multa, nec alio quàm diximus modo in Lycopside & Onosmate, illic caule vidua cernitur. Proinde, qui nec hanc quidem probè notam de facie haberet Senensis, paucas & confusas notas posuit: vires verò, quod minimè deceit, suo more reticuit, & tamen legitimum asseruit.

CIR.

CIRSIVM.

CIRCTÆ varices Hippocrati, Ixiæ Aristoteli sunt: venæ humore flatuque melancholico prominentes & tuberosæ, dolore interdum sæuo partem vexantes, quibus quia hæc planta medetur, id nominis assequuta fuit. Genuinam autem plurimam propè pistinum oliuarum, & ponè molas farinarias, in locis vadosis Lani amnis MonsPELLIACI, & pratensibus lacustribusque littoreis à Grammutio luco in meridiem deuenis, quæ maris alluionibus & solibus feruidis longè latèque patentes planicies sale niueo opertas pedibus terebamus Iunio 1566. Radix & ima folia Dyssaci modo & ortu, Buglosi angustifolii acutiora, & leuibus hirsutis spinisq; asperiora, longiora, virida. Caulis vt plurimum singularis, binos, ternos, aut quaternos cubitos æquat, angulosus, rectus, incanus, tener, Sonchi modo. In quo extremo flores, rotundis, oblongis capitulis, Senecionis, aut Cardui, purpureis densis cõflati staminibus, vnâ numerosi & cõditi. In pappos defluentibus Iulio, relicto exiguo oblongo cardui semine fuluo. Notissima hæc illic studiosis, alibi Italiæ aut Galliæ parū nota, aut frequens. Quā eandē cum Guini Cirsio in Mathioli cõmentariis eleganter depictam, intuitu, quoad licet, coniectamur: propterea quia idem Senensis vtique sui similis, nullam descriptionem apposuit: Ruellio alijsque doctis, qui putarint hanc Buglosum angustifolium esse, neutiquam parsurus: si virentem, florētemq; vt nos, vidisset. Sanè vix vlla in Dioscoride plenius descriptioni respondet & facultatibus, quàm hæc, floribus non quidem Buglosi, sed papposis & lanuginosis, euanidis, caducis.

ALTERVM.

Hic Londini in horto Morgani, etiamnum ineunte hyeme, huic aliud Cirsium creditum creuit, cognatum foliis, floribus, & radice, facie tamē Cicerbitæ, foliorumque positu in cauliculis teneris, canis, minus hirsutis, vt etiam folia paulò breuiora: sed flos purpureus, & singulæ cymæ singulus papposus: ea annum ferè vegeta viruit.

SYMPHYTVM Alum, seu Alus.

Gallis. Confrey, Oreille d'Asne.
Ang. Comfrey.
Consolida maior. Hisp. Suelda maior. Ita. Consolida maggiore.

PERAPPOSITE istud Symphytum cõtulit Buglossus, id est, nostræ Borragini Dioscorides: quandoquidem tractus amat lætos, riuos, interdum & hortenses istud, non fecus ac Borrago: cui foliis similibus, maioribus, longioribus, itemque caule cauo, hirsuto, anguloso est: radix nigra foris, intus alba, mollis, & ferè omnium quas nouimus maximè viscida: sapore oleraceo, vel insulso, quæ carniū frustra, si illi incoquantur, ferruminare, glutinareū meritò credūtur. Quàm plurimos ad affectus certissima ope cõdiūtur, ad vnguenta spissantur, tota namq; folio & radice vulneraria est: Buglosi gustu & muccagine, sed multò pluri & efficaciore ad vlcera ferruminanda, eoque Consolida maior vocatur: & quæ mas vulgò dicitur, floribus purpureis, efficacior habetur: quæ verò albidis floribus, fœmina. Luteis etiam floribus obseruauimus quandam, quæ foliis putaretur Borrago, vbi defloruit, nisi radix subesset tuberosa nigricansque: quare minus verè quidam opinati sunt, Indicam occidentalem sanctam herbam, Symphyt *ῥευλον* apud Dioscori, esse, vt innox ostendetur.

Quod sonat ipse
nomenclatura.

Indorum Sana SANCTA, siue NICOTIANA Gallorum.

IMPVIDENTIVSVLVIS Herbariæ obrectatoribus, ignauiam hæc, si loquatur, exprobrat, ingenuis autem vestigatoribus sedulitatem gratuletur, qua factum est vt non multis ab hinc annis ex Hesperie Indiæ nouo orbe Portugaliæ, Galliæ, Belgiæ, & Angliæ facta fuerit inquilina: maiorēne an certiore commodo; incertum. Siquidem non modò Symphyti

Symphyti de figura & habitu ipso conferenda est, sed etiam effectibus ad interna & externa incommoda, eidem & cuilibet Pannaci decantatissima præferenda. Non est tamē Symphyti species, tantò minus πένθος Dioscori. sit, licet visum fuit quibusdam: at illud est nostrum Symphytum vulgi magnū, tametsi iisdem riguis, nempe pinguibus & apricis gaudeat, proueniatq; foliis prægrandibus, oblongis, hirsutis, Symphyto magno, latioribus, rotundiorib⁹, Bardanę Hyoschyamo luteo concoloribus, multis è radice exili Lactuca, multum fibrosa: scapus exit trium cubitorum in Fræcia, Belgio, & Anglia: sæpissimè quatuor & quinque proceritate, quum maturè satum fermen in calidioribus tractibus Aquitanie & Linguagotie: florum calatos Augusto fert, herbaceo pallore nonnihil

punicantes, vnciales: semenque maturat in calyculis exilibus admodum, & similibus Hyoschyamo luteo, vnde nonnulli putant Hyoschyamum luteum huius speciem esse: & sanè vtrique plusculum caloris inest. Quare nec Hyoschyamus esse potest; quòd illis persuasum fuit, quia vidissent non paucos huius fumo hausto temulentos fieri. Videas enim naucleros plerosque omnes qui isthinc rediunt gestare pusilla infundibula ex folio Palmæ aut storea confecta, quorum lateri extremo inserta sunt conuoluta folia & comminuta siccata huius plantæ: istud illi accendunt igne, atque hianti ore quantum plurimum possunt, inspirando fumum sugunt, vnde sibi famen sitimque sedari, vires instaurari, spiritus exhilarari asserunt: sopiri que iucunda ebrietate cerebrum, distitant: incredibilem pituitæ copiam plerumque educi: Quod ipsi dum hauriremus, experti sumus: non tamen citò inebriat, nec frigore dementat, vt Hyoschyamus, sed quadam aromaticitate vapida, ventriculos cerebri imbuit. Hyoschyami illius lutei nullū factum à nobis certum periculum, Istius verò Sanctæ herbæ vocatæ iam vbique increbuit fama: sanè ad vlcera, vulnera, thoracis affectus, tabemq; pulmonū, ea nihil noui nouit ex nouo Orbe nostra ætas præsentius, aut efficacius, quemadmodum inter remedia dicetur.

*PULMONARIA, maculosa folio Borrag. floribus Primulae
Veris, purpureis.*

*Gallis. Herbe aux Pulmons.
Belgis. Onser vrouwen melckcruyt.
Ang. Sage of Ierusalem.*

CONSULTIVS huc hæc fuit dilata, non enim magis dicta Plinii Pulmonaria ob effigiem foliorum, quam propter vires pulmonibus non secus laudatæ atque Symphitū, cui congener est, nec parum similis, hirsutis calyculis florum Primulæ, prima vernatione eleganter purpurantibus, in cauliculis mollioribus, seliquipalmaribus: foliis item super-



*Nicotiana
inserta in-
fundibulo
ex quo hau-
riunt fumū
Indi & nau-
cleri.*

STIRPVM aduersaria noua. 253

item superficie & hirsutie Symphiti aut Buglossi, maculis lacteis & nigris aspersis, semina nigra relinquentibus Borriginis, ab imo erupentibus, superne acutis, radice quam Primulæ crassiore, fusca, viscida: gustu nõ ingrato totius plantæ Holeraceo. Iusculis miscet folia mulierculæ, aut tusa ex ouis in placentas ducunt, adq; pulmonis affectus, & cordis vires conferre predicant, eoq; in hortis habent ex umbrosis montosis. Quibusdam regionibus visuntur sine maculis.

PVLMONARIA Gallorum, flore Hieracij.

QVAMVIS sit hæc Pulmonariæ maculosis folijs & nomine donata, propior tamen videtur Intubaceo generi: flore nempe luteo Hveracij, in parietinis & dirutis, musco obstitis, Lugduni, & MonsPELLIJ Gramütia syluæ, emicat tenello cauliculo, Intubaceo, pal mari & sesquipal. nari, gracili, è radice exiliore Betonica, nonnihil fibrosa. Incerto adhuc vsu, uti planta parum nota est: quidã tamẽ cõferre paronochijs & pulmonibus predicant.

MONTANVM Arction an Persolata Plinij?

TAMETSI nullus dum scriptor ARCTION, siue Vrsam, vel Arcturum Dioscoridis nouit (neq; enim Ruellij vndequa; doctissimi manes, aut sententiã de Xanthio, insectari, animus est, aut fas ducimus) tamen id putamus factum ignoratione, non tam plantæ ipsius, quam Cumini Syluestris siue parui, cui confert Dioscorides Arctij semen: alioqui folia ampla Phlomo rotundiora, caulicq; teneros & longos promit hæc, quæ ut nomine & ordine apud Dioscoridem, sic facie magnoperè cognata est Personatæ siue Αρνεῖα vulgari, quam Vrsam interpretamur dictã, vtrãq; à semine, uti videtur, hispido, villosis echinis, qui huius Arctij sunt molliores, propiusq; Cuminum paruum siue Syluestre simulant: semine etiam non absimili. Quare nec absimili verò ratione videmur asseruisse hanc Arction veram. Hæc nuspiam nobis visa, nisi cellis & Syluosis montium opacis, ut Veganij lugis Norbonæ & Saleuæ môtis, alijsq; Pedemontis & Sabaudia finitimis. Radix longa, tenera, candidaq; foris & intus, edendo non ingrata. Folia, subtus præsertim, admodum incana, uti vngulæ caballinæ vel Petafitidis. Plinius hanc Persolatam nuncupasse videtur: sed descriptione confudisse (ut sæpè facit) cum Personata, non levis suspicio est: tum quia folia vtriusq; comparat Cucurbitæ, & tamen singulari distinguit Persolatam à Personata capite & radice. At Dioscorides Verbascò comparauit, & hæc tres, nempe Arcion, Arction, & Petafitidem, admodum inter se similes, serie coniunxit, nec tamen aliam alij assimilauit, cum tamen Petafitidi simillima Personata sit.

Ἀρνέιον. PERSONATA, Lappa maior, Bardana.

- { Ang. Great Burre.
- { Ger. Großkletten.
- { Belg. Groote clissen.
- { Gall. Glouteron ou Gletteron.
- { Ital. Lappola maggiore.
- { Hisp. Bardana.

PROPTER eandem quam cum villosis hirtisq; vrsorum capitibus glomerationes echinosæq; lappæ haberent similitudinem, nomenclaturã cõsimilem accepit Arcion & Arction. Personatæ autem fortè, quòd folia pregrandia vultui, laruæ, aut personæ obtendi facie solita essent. Et Persolata, quia galeri vice Solis æstum à capite arceret: vnde etiam Petafitidi nomen factum.

Nimis quàm frequens & vulgaris lappa magna vbiq; gentium secus vias & vrbium pomeria, luculentæ magnitudinis, Cucurbitæ emulis folijs, & Echinis, mordaci hæsu vestes canesq; arripientibus, puerorum frequenti lusu nulli non notissima. Radix grandis, carnosa Arctij siue Persolatæ, sed foris nigra: conditur saccharo, & cum grata tum vtilissima ad calculum & dysenteriam habetur, Veneris etiam incentiua. Idem semen pollet, sed multò efficacius calculosis.

Y.j.

XAN=

Ξάνθιον καὶ Φρυγανίον, *XANTHIVM* siue *Strumaria*.

{ Offi. Lappa minor.

{ Ang. Löffel burre, or lesser burre.

{ Ger. Beiler fleiß; vnd Spitz Kletten.

{ Bel. Clepne clissen.

{ Gal. Petit Gloutteron.

{ Ital. Lappula minore.

COLORIS cognomine sic dicta, quia ruffat capillos, quemadmodum hodie vulgus tinctorum luteam & Kermes, siue *Kermesinum* dicit, cuilibet regioni fermè æquè nota ac maior lappa, sed non perinde feraci inuisoq; prouentu abūdat, locis & scrobibus arefactis, quādo imbres aruerint, gaudet, ortu & fructu echinato lapposoq; Platani aut potius Glycyrrhizæ alterius filiquosæ, folia gerentibus caulibus sesquipedalibus & pedalis, incisura, figura, & colore Attriplicis vel Tornesolis, Bardanæ etiam aliquantum adūbrante: vnde Bardana minor dicta, radice non profunda, fibrosa, meritò, vti semen ipsum, laudata ad tumorum strumarumq; pertinaciam delendum frequenti admotu, vnde χροφαδολαερον, siue struminecam vocarunt antiquitus.

Βήχλον. *TVSSILAGO*, *Farfara* & *ungula cabalina* Offi.

{ Ger. Kofshub & Brantlattich.

{ Bel. Dofbladeren.

{ Ang. Fole foote, Coltes foote.

{ Gal. Pas d'asne, patte de cheual.

ACOMMODO compertissimo, quod præstat anhelosis & tussi afflicis, dicta fuit *Bechium* Græcis, *Tussilago* Latinis, vel *ungula cabalina* recentioribus. Folia quippe promit ab imo in pediculis sesquipalmum altis, rotunda, sed lateribus senis, septenisve angulos acutos claudētibus, auersa tomentosa incana, aduersa virentia carnosæ, Petasitidi adeò accedentia, vt per initia nisi odor (qui huic grauis) discerneret, eādem putares, Flos illi aureo pallore, radiatus, denti Leonis æmulus, qui Februario & Martio nondum egressis folijs repentè floret: parumper perstat, & celerrimè in pappos dehiscens. Radice tenera, candida, carnosæ, geniculatæ, humi sparsæ, cuius cum folijs est vsus notior, quàm vt longiori egeat oratione. Vda sata, crepidinèq; fluminum amat.

Πετασίτης *Petasites*.

{ Ger. Pestilentz wurtz.

{ Bel. Pestilence wortelen.

{ Ang. Butter Burre.

SED & vtiq; similes sui negotium ex negotio serunt studiosis, qui Tussilaginem asserunt, Petasitem negant, plantam illam in pratis palustribusq; primo Vere crescentem, atq; nondum folijs ortis caulem erigentem tenerum, carnosum, concauum, sesquipalmum altum, Orobranchæ similem, floribus in summo densis, pusillis, multis, mucosis, racemosis, oleæ, in purpureum conum compactis, spectatu amœnum: nullo semine prægnantem, sed flore marcescente & defluète, spè etiā seminis perdentem. Folia pediculo cubitali, crasso, carnosæ, quasi appensa medio sui centro, pendula instar Petasi inuerfi visuntur, maximā Personatiam superantia: sed rotunda, subter parum incana, singulis pediculis singula, medio fermè totius puncto hærentia, vbi sinus definit profundus ad vsq; folij centrum actus, quæ si prorsum clausuris, fungi penduli modo fulciri dixeris: simulq; Commentatori silentium indixeris, qui dum nihil habet quod illinat paginis, in minutis istis obstrepat bonis viris, nec quid quòve modo scribat, de facultatibus notisve certioribus, quicquam pensi habet. Grauis enim & prorsum ingrati est odoris hæc, gustanti verò perquam amara, & ingrata: desiccata item magnoperè, quapropter morbis epidimicis vtilissima habetur & comperta Medicis Germanis etiamq; plebi, quæ ea de dote vocat *Pestilentie wortele*, id est, pestis radicem: quæ valdè crassa, foris pulla, intus cādida, & plurimum vermiculis prægnans & exesa, quòd mirum foret pabulum adeò amarum amare, nisi illius essent proles & alumni: vt in absynthio, & in vesiculis, quibus condita & reposita aloes asportatur, cernitur, quam interdum etiam mures liguriunt. Radices complures cortice exutas &

STIRPIVM aduersaria noua. 253

& exenteratas aceto indunt quoad viribus imbutum fuerit, exque illo cum Rutæ succo & Theriaca propinant, præsidiumque nulli secundum affirmant. Leuiusculo argumento deceptus fuit, qui rebatur propter communia natalitia & florum ante foliorum egressum, esse easdem, quasi non idem contingat Trifolio Hederaceo, Croco Syluestri, Ephemero, & aliis.

CACALIA.

Hæc multum Petasitidi affimi-
latur, foliis præsertim: an verò
sit Cacalia ambiguum, nec tamen
vlla alia vllâ opinionē veræ nobis
fecit, nedū vt animum expleret,
præterquàm ista. Alpinis iugis o-
paciſq; supercilis prope fagos &
aquarum scaturigines velfluenta
plurima, alibi rara. Ternos cubi-
tos æquat caulis: ramulis quibus-
dā diuisus, flosculis albicantibus &
aliquantum obsoleta purpura as-
persis, incoditè cōgestis & pāosis
muscosisve, vt in Eupatorio Ca-
nabino, aut Virga aurea, radix albi-
da, fibrosa, crassa Garyophyllatæ,
vnde pediculi surgunt foliis per-
magnis leniter laciniosis donati
Petasitidis: quàm etiā odore qua-
dantenus imitantur. Galliæ Nor-
bonensis cello monte Calcaris
nūcupato primū vidimus, pro-
pe illius montis verticē qui Dei
Paradisus à plebe vocitatur. In
Delphinatū vel Allobrogum fi-
nibus Montes qui Pilati monu-
mento è regione visuntur, istam
habent, vnde quidam amici Lugdunenses peritissimi habuerunt.



ALYSSON.

FVT hæc Thlapis & Lunariæ Græcæ socianda: sed operarum properatione huc intrusa
est, licet non absimilia sint folia Echiis: in hortis cultioribus habetur, & nonnullis Lu-
naria vocatur: sed nulla melius Alyſſo Dioſ. quadrare videtur: est cubitum alta tota, in-
cana, asperiuscula, ac nonnihil tomentosa; radice exili, foliis in imo Conizæ, vel albæ violæ;
plurimum vnicaulis, rotundus, hirsutus, pusillis alis diuisus, in quibus alternatim flos-
culi latei oriuntur Irionis, & folliculi oblongi clypeoli compressi, qualis Lunariæ Græcæ,
quem duplicatum facit membranula dissipans vtrinque seminum seriem duplicem, quæ
sunt Leucoii similia, sed maiora. In Belgio vidimus, in Italia dono habuimus, Mōspelliq;
satam & enatam gustauimus, sapore longè Porro aliud est Galeni Alyſſon putatum à re-
centioribus, Bugula nempe siue media Conſolida, iamdiu superius adducta.

Dotterbloemen Germanorum, an Plinij Chamæence & Malococysſus?
Chelidonium minus.
Nymphaea { Alba maior.
 { Minima.
Nymphaea { Lutea.
 { Minor.

Morsus Ranae.

Tribulus aquaticus.

Faba Egyptia.

Arum Egyptium.

Dracunculus maior Math.

Dracuncellus aquaticus.

Arum.

Arum minus.

Arisarum utrumque.

Arisarum Norbonense.

Asarum.

Asarina.

Brassica marina, siue Seldonella.

Seldonella montana.

Gramen Parnasi.

Thora.

Cyclamen utrumque.

Rotunda.

Aristolochia } Longa vera.

Aristolochia } Polyrhizon Pl. Aristolochia tenuis efficacior Galeni incognita, (Mathi.

Clematidis, falsò longa. Math.

Viola Martia, eiusque varietates.

Viola flammea, coloria, calida.

Saxifragia } Alba, strumosa, Chelidonioides.

Aurea.

Caryophyllata Alpina.

Χελιδόνιον μινέρν. CHELIDONIUM minus, siue Hirundinaria minor;

Scrophularia minor.

Germania. Klein Scholwortz, Klein feigwartzenkraut & Meyenkraut.

Gallis. Couillons de prestre, Itali. Fauscello.

Petite Esclere.

Angl. Pyle woorte or Fygwoorte.

NIMIS quàm morosi sunt, qui Chelidonium minus ob ignauā acrimoniam reiciunt, cum notæ ceteræ suffragentur apprimè descriptioni: nam oritur primo Vere cunctæ Europæ Chelidoniis ad nos remeantibus, & granula triticea multa appenduntur radiculis, unde triticum, siue τῖτρον vulgò Diosco. 2^{uo} dictitatum fuit: à nostris autem Scrophularia etiamnū vocatur. Quare facilè futilis obiectio de acrimonia refutatur, aliorum multorum simplicium exemplo. Apud Diosc. Arum, Asphodelus ex Hefidio, vbique corpæ fidem facient, quorum acrior aut mitior sapor, agri sequitur conditionem. Folio Hederaceo Asari exit, florumque elegantem sobolem in pediculis tollit, foliolis aureis radiatis, stellatis.

CALTHA Palustris recentiorum, non est Chamælence Pl. folio Populi, siue humilis incana. Dotterbloemē Belgarum, & Farfrugū recetiorū.

MALOCOCIS-
siue Cassani Bas-
si.

LOCIS item lacustribus & vdis huic perquàm similis & frequens quæ Germanicè Belgicè Dotterbloemen vocatur, Chamælencè quidam ex Plinio, ex Geoponicis Malococyssum maiorem: Mathiolus ex suo cerebro Tusilaginem alteram facit: nam coniecturas triuales, quas & descriptionem de recentioribus scriptoribus, peritissimo Dodo. & aliis, emendicauit, inculcat, suppressis nominibus & mutatis clasibus, quasi scopas dissolutas: hæc enim multò magis Chelidoniū ipso toto vultu præfert, nisi quòd vniuersa maior: Flores neutiquam papposi sunt, quinimò diu admodum & particulatim floret aureis Raunculi, aut Chelidoni minoris: neque folia ortu, vt Tusilago, anteuertunt, & Nymphaeæ luteæ colore, vel Chelidoni minoris nitore fulgent, & similes sunt adeò, vt in Angliæ vuidis, vbi vberissima, sæpè pro Nymphaeæ minore Pharmacopœi & Clinicæ mulierculæ

mulierculæ nobis attulerint & ostentarint. Folia non subter incana, non angulosa, non caulis tomentosus, sed potius atro-vire polito, vti Asarum, Nymphaea. Radix fibrata capillamentis, acris gustu est, sed moderatè: nondum tamen vsu exploratæ facultates: quod magno pudori est istis audaculis assertoribus, sed maiori detrimento Medicinæ tyronibus, maximo verò nocumento ægrotis, quos perdit inscitia, & scelerata gloriæ fames.

Νυμφαία NTMPHEA LVTEA, Papauer palustre.
Nenuphar Officinarum.

{ Ger. Wasser gilgen, haarwurtz, 3ee bluomen.
Belg. Blompen.
Hisp. Escudetes del Rio, & Higos del Rio.
Ang. Water lily.
Gall. Blanc d'eau, & Lis d'estang.

AQVA Lymphæ seu Nymphæ antiquitus vocatæ, natales & nomen suppeditarunt Nymphæ, quæ nuspiam nisi in aquis leniter labentibus emergunt, parum extante folio peramplo, Bechij aut *Dotterbloemen*, circumatæ rotunditatis, laeueris, densitatis, & magnitudinis, in caule glabro, quasi pediculo, quaternum quinumve cubitorum, flore specioso, luteo micante aspectu, & ambitu obtusiore, quàm albæ Nymphæ.

NTMPHEA alba.

ALTERAM speciem, quæ maior vocatur, vix quisquam discernat, nisi floris emaculato cādore Liliū prouocante: radix vtriusq; crassitie cruris humani, nodoso & strumoso corio clauam imitatur, gustanti insipida quā adhuc humens, siccata nonnihil sapit alimētosi. Luteæ albus est, Candidæ autem nigricat cortex, vtriusq; amaricat: semen & flores nonnihil odori albæ: Flagrantissimi lutei, & gustanti nonnihil acrimoniæ preferunt, glutiniq; quippiam habent, quem, nisi condiantur, arefacti amittunt, sicciq; efficiuntur, atq; nullo aut pusillo calore digerunt: quæ perperensione faciliè quis componat tumultuarias Arabum & Neotericorum inter se perorationes. Atq; quum attoniti mirantur Arabas quandam speciem Nymphæ calidam tenuantemq; putasse: non est sanè quod conuiciantur, aut ineptè e capite de Sedo accersant subsidium: nam si Nymphæ inde sit dicta, quia Lymphis Nymphisue est conuictrix & accola, potuerunt Serapione antiquiores Caltham nobis dudum Palustrem dictam congenerem fecisse: natales quippe, folia & flores affinitate haud vulgari, etiamnum persuadet idē quibusdam Pharmacopœis, qui nostris medicamētis non semel subdiderunt hanc, illarum vtriusuis loco vocabantq; Nymphæam luteam. Quin ni nobis forent notæ Nymphæ, certè hanc legitimam Nymphæam agnosceremus, vti fortè pleraq; alias arbitramur pleriq; omnes humanæ Mineræ cōiectores, quoties potiores vel rationes, vel plantæ accommodatiores nos deficiant.

ALBA Minor.

SUNT insuper antiquis prætermisæ Nymphæ duæ; potrices quidem, & aquarum alumnæ: verum regionum duntaxat (aut certè plurimum) Septentrionalium, præsertim Angliæ, via quæ Londino Oxoniam & Bristoiam ducit, secus & trans aquas viarum pigriores minúsque profundas, numerosū exierit hæc in tenuioribus pediculis & non dissimilibus folium, ferè magnitudine Chelidonij minoris, aut Palustris Calthæ, *Dotterbloemen* vocatæ: defluente flore candido Papaueris, Rhœadis, aut Melampyri, capitula & semina supersunt, crassiusculo cortice obducta, nullius dum vsus.

NTMPHEA LVTEA minor Septentrionalium.

X.ij.

Minus

MINVS frequens Lutea minor, è limolo item fundo, traicit lymphas iunceis pediculis, ternū & quaternū cubitorum crassiusculis Portulacæ, singulare folium in summo gestantibus, duplò maius quàm superioris: quare hæc differentiæ sibi ita ex aduerso altrinsecus opponuntur, vt hæc maiuscula lutea, albæ Nymphææ Dioscoridis respondeat, superior verò minima conueniat cū maiore lutea. Floribus ex vno quasi iunceo exortu Primulæ, minoris chelidonijs stellatis, iuxta amœnissima Thamefis fluente, in vdis scrobibus & lacustris pratensibus: gustu plusculum caloris videtur habere, & siccior esse quàm superiores.



MORSVS RANÆ.

IGNOMPERTAM & hanc Græcis, Septentrionales, apud quos (rarius in calidis) prouenit, *Wasschen Beer*, aut Ranæ morsum vocitant, & *cley plompen*, id est, parnā Nymphæam: & certè magis Nymphæis, quàm Potamogetoni accedit, præsertim figura & natalibus, nempe torpentibus aquis foliola plurima innatant, in Lenticulæ palustris quâdam effigiem, aut potius pusillæ Nymphææ albæ, circinato pariter ambitu, sed minore Capparis, vnguem maioris digiti æquante: in pedicellis flosculi intermicat luteoli, alibi lactei aut Melini sūt, tribus foliolis cōstantes minimæ albæ Nymphææ, crebribus radicum staminibus, longius se porrigentibus in fundum lacustrum, stagnantiumq; aquarum, vbi ranæ lubentius stabulantur, vnde nomen: ad arcem Londini regiam & mœnia, plurima Iulio & Iunio, gustu Nymphææ aut Lenticulæ palustris.

Τριβύλος **TRIBVLVS** Aquaticus.

Offi. Tribulus marinus.
 Ger. Wasser nusz, weihernusz, Stachelnusz, vnd Spitznütz.
 Belg. water noten. Hisp. Abroyos & Abrollos.
 Gal. Escharbotz, Saligotz, Chastaignes d'eau, ou Truffles d'au.

BOREALIBVS, vt Belgicæ, Germaniæ, fossis, & pigris fluentis, prope Nymphæas aquaticus Tribulus, qui etiam aduerso flumine è Francolino Ferrariam versus naviganti, non semel occurrit, adque ipsius vrbis Ferrariæ mœnia lateritia in altè depressis valibus & scrobibus. Paucis hæc similis effigie, eoque nullū latere quit, qui muricatas uces castaneasve triquetras, duras, ternis plurimum aut quaternis mucronibus figetes, norit: nudeo albido, Castaneæ sapore, quo plebecula lubetèr visitat, Castaneasq; aquaticas appellat. Semirotunda, cristato leniter ambitu, folia Soldonellæ & Umbilici similia, sed

STIRPVM aduersaria noua. 259

crassiora, è pediculo longiore, superiore sui parte nonnihil protuberante, carnosio, succulento, è caule breui Portulaceo sensim definete in radices, comis vdis, & albicantibus capilla mentis, prolixis, fibratas, continenter in aquis partim natantibus, partim in fundo repantibus & mersis. Quare videndum merito cur Agrippe vnguento addantur nuclei, quibus etiam emplastica, obstruendiq; vis, aluum constipante.

*COLOCASSIA, siue ÆGYPTIA FABAE,
an sit ARON Ægyptium putatum, Italia
nuper inquilinum?*

SI Quidam ad fructuum varietatem respiciat, latius hodie multò patet ambitus generis fabacei, quàm quum Dioscorides Græcam fabam & Ægyptiam duntaxat memorabat: nam & nostras vulgaris neutra illarum est, & complures ex India tum Orientali, tum noua Occidentali consequuti sumus, quorum fructus aliquantum fabæ æquiparantur, frondem autem & reliquam faciem, si ille absit, nullus agnoscat fabæ. Eapropter illa cum primis egregia Ægyptia huc pertinere videtur, vt quæ palustris soli humentis glebæ sit soboles, vnde aptè Dioscorides Cibotij siue Aruile eruit ethymon, quod immerito quidam carpunt, vti dicetur postea. Et frondes isti sunt quantæ arborum (malim verti Petasitidis, vt è Græco potest elici, equè Theophrasti & Galenilectione.) Radix harundinacea, crassa, cruda vel cocta estur. Quare apprimè olim innotuisse Theophrasto & Dioscoridi, certum est. An verò sit ista, quam Commètor sibi, aliisq; persuasit, fides sit penes Bizantium picturam: quam istam critici audaculi subannat, ac mussant Dracontio Aconito, aliisq; nonnullis, ita nescio quid talis euenisse. Certè multis annis ab hinc per multas credebamus plantas nobis visas istius in plerisq; Italiæ locis (nam nullus erat hortus paulò celebrior illic cui deesset) verum postea monuerunt nos flores & bulbi, tametsi complures vnà adnati, Aronis speciem esse. Sunt enim multæ confertæ & quasi appendicibus aliorum bulborum auctæ, tuberosæ, oblongæ: radices effigie quidem Ari, sed triplo aut quadruplo maiores, similes, & còcolores illi radici, quâ Apium falsum esse monuimus: sed succulentæ, teneræ, intus forisq; fuscè rubiginosa: folia nobis creuerunt Nymphææ maximæ magnitudine & ferè similitudine, crassitie, colore, sed liræ, venulæ, nervuliq; & superficies fuerunt Aronis, vti & gustus: florem nullis blanditijs potuimus prolicere, neq; diligentiores cultores, Pisis, Bononiæ, Patauij, vbi Triuisianus Medicus habuit: nec Lio ille forensis Philosophus Venetijs parum studij huic impendit: in Belgicæ fatam hyemis sæuitia deleuit.

*ARON ÆGYPTIVM qui è Theophrasti, num
sit recentiorum Colocassia?*

SI igitur, vt non nolentes assentimur, sit Arum Ægyptium ista planta, quam dudum delineauimus, non Colocassia siue Ægyptia faba, cognitionis notis quibusdam potuit imposuisse cum recentioribus, tum antiquis authoribus: nam Palladius, vbi bulbos Colocassie ferendos præcipit, videtur sequutus opinionem & nomenclaturam Cypriorum, qui Colocassiam appellationem huic impertiunt, vt est apud Dioscoridem. Et vtinam otium non defuisset Mathiolo, quum illi ostendebatur Tridenti vera Colocassia, nã ille accuratius tam visendâ stirpem, eiusq; natales, conditiones, magnis, vt par est, votibus herbariorum expetitam, nec citra laborem & sumptum aduectam, verbis expressisset: Sed non rarò instituti oblitum magnum virum transuersum agit perorandi libido in quolibet, qui nequeunt fauere linguis & silere, cuiusmodi hic doctissimus Guilandinus, modestissimus Anguillara, Matthiolo matix Vercellensis Apollo. Itaq; ob similitudinem caulis & foliorum Nymphææ Ægyptiæ fabæ contulit Dioscorides, & rursus istum Aronem peregrinum Colocassie compararunt Palladius & recentiores, cuius nostrum Aronem speciem esse, certum habemus. Quin si è Græco non sit ἄρον ἰερον quasi Sarum, vt in Iride factum, plebecula, quæ Barbam Aronis vocitat, videtur agnoscere, ex Palæstino vernaculo

& ornamēto Aaronis Pontificis. Et alij scædus, sed signatius, eodē ferē alludentes, Sacerdotis veretrum, aut mentulam vocant, in conum mucronatum racemum illum purpura punicante miniatulum acinulifq; stipatum, ad milij Indici fastigiata spicæ effigiem: vbiq; viarum marginibus & pratorum ripis vdis obuiū, vixdū hyeme exacta folia pediculo edēte bipennis effigie, quale sagittariæ aut Boni Henrici, virore lurida & pallentia, maculis nonnullis nigricantia, vnde etiam Dracontium vocant: radice hermodactyli ferē oblongiore Satyrij Erithronij Geneuensis.

ARISARVM Veronensium. Plinij ARIS.

VOcis argumento, non tantū effigie & viribus perspicuum Aro congenerem esse Arisarum, quem vocat Galenus & Plinius Arim: quæ vox Hippocrati, instrumentum Chirurgicum ostendit, vnde fortē accommodatum nomen: aut potius à vigetiore acrimonia quæ huic inest, quā Aro, & qua discernuntur: alioqui non nisi magnitudine discrepantes & in Ægypto nascentes à Plinio traduntur. Nobis tamen quæ notæ sunt species duæ, non solum minores multo sunt, sed etiam rotundius folium vni est, cuius virentis magna copia nos donauit Franciscus Calceolarius Veronensis in primis peritus Pharmacopœus. Eā putamus alicūdē ex vicinis vrbi mōtibus aduectū fuisse, nā & alibi non procul Thermis Lucensibus habuimus: & idē bulbi, quos vna in capsula cum Moly & Colocasia afferendos curassēmus, in Belgio sati ipsa Bruma in foliū erupere, paulō antē Ari exortum: in pedicellis loreis Cyclaminis modo, folia singula Hederacea, multo minora, Ari molliora, & delictiora. Flos fuit etiā singulis vnus, vno foliolo conuoluto, oblongus aspectu Aristolochiæ, è lateris rimula emicante fibra staminea. Radix quanta Fumariæ Plinianæ, sed foris fusca, albida intus, tantoperē feruens, vt ista Agyrta: ridiculum quidem, sed non perinde iucūdum, excitent plebi spectaculum. Quippe alicui ē turba ostendunt nuculam auellanam, persuadentq; saltem in os inferat, si deglutire non lubet: tum impostor, celeritate manus, qua valet, inferit hianti rustico vnum ex istis bulbillis, moxq; illi eomprimit fauces, quæ acutum inultæ bulbi impressione, contractis fibris, & tunica palati, conuelluntur. Manetq; misellus rictu diducto, ore hianti, ridenti similis: Sed *κλαυθήγεον* Homericum edente.




ARISARVM Norbonense.

HOMUNCIO quidam Stephanus Barallius vocatus, nobis per familiaris, propter suam stirpium Norbonensium peritiam, in qua consenuerat, & nomen in Academia indeptus erat Dioscoridis Monspelliensis, non semel duxit nos ad riuium quēdam ponē cœnobium Funecinctorum, vbi in salicetis & herbis vdis eruebat radices huius, interdum vnā aut alterā simul, interdum plures adnatas, maiores quā Chelidonij minoris: folia emittentes longiora, angustiora Afaro, rigidiuscula, coq; cuncta plantula adeo arida, vt frustra sæpius cupierimus flores & fructum videre, maturius marcescentes præ solibus feruidis. Nam illic quibusdam annis, humidioribus præsertim, nonnullæ se producit plantæ, quæ aliàs aliquā multis annis continuò æstate recurrente præficca, nuspian cōparent: vt est legumen illud *Ferro Canallo* Italicē vocatum, nec non aliæ multæ,

ARISARVM angustifolium, Ortibinogali lutei facie.

NE QUIDEM illius angustifoliae Arisari, quod in hortis Belgicis, Gallicis, & Anglis colitur, nobis florem vllum aut semen haecenus visum. Quod quidem eo magis optabamus, quia suspicabamur Orithogali lutei congenerem. Est enim in ericetis & filicetis, Liguria praesertim, angusto folio, porraceo, aut Ornithogali lutei, palmari, in angustum quasi pediculum, prolixum, ad imum deficiente, e ceruice bulbi Auellanæ nuculae paris, aut Serpentariae maioris.



ANGVINA DRACUNTIA.

SERPENTARIAM istam maiorem, quam cuncti horti norunt, & ager Monspellienfis sponte dat, quin sit Dioscorid. Dracontium maiorem, maculis albidis, folia Hederacea prominentem, nullus inficias ibit, nisi maleferiatus temporis prodigus rixator quispiam. Rectus quippe caulis, glaber & politus, extrema cute anguinum serpentisve exuvium, maculis, fuscis, viperis, pullis, puniceis, giluisque, transuersis, obliquis, & fortuitis, adeo exprimens, vt eminus repente intuenti horrorem incutiat: sesquicubitali bicubitalique in summo e vaginula emicat, congestus in cono racentus, planè Ari, cui radicem etiam non absimilem, rotundam, maiorem, seque lateratim propagantem. Qui igitur foliorum comparisonem negant veram, quod non sint hederacea, actum agunt, nempe monent, propter consequentem & arctam similitudinem, folia Dracontii dicta fuisse hederacea, cum potius debuerant hederacea illa Ari dici, quia huius postea conferuntur cum foliis Dracontuli & radice. Vbi Dioscorides, aut si quis alius Crateuarius fuit, ad indolem & vniuersum habitum plantae respexit, foliorumque leuorem, virorem, colorem nitidum superficiei contulit; quia essent perquam affines plantae, vt vides in collatione etiam radicis: vbi singularis numeri, nulla expressione maioris, aut minoris Dracontii, bis repetit collationem. Nec vniuerso tractu Graeciae, à nostris amicis iamdiu lustrata, vlla alia vspiciam Serpentaria, quam ista, quae etià non procul moenibus Mospelliis inter segetes, Gladiolos & Hyacinthos lata exit, alibi que in pinguibus aruis, non diuersa nisi aetate, quando de cussis seminibus & summitatibus effractis à praetereuntibus, frequenter repullulant novellae, quae potuerint Plinio persuadere, plures vt constitueret species Dracontuli, miscereturque Ari, Arisari cognatas differentias, vt in Bechio, aliisque locis illi contigit. Nec alterius DRACONTIUM plantae videtur geminata descriptio apud Dioscoridem, sed ab alio quopiam, paulum di- Mathioli. uersè, vt ferè fit, descripta. Lubenter nos & grati illam à Senesi Rapi effigie adductam, nec tamen descriptam, spectatum iuissimus quod loci ille dicit, vbi saepius frustra sciscitati sumus: negant enim Patavini, Veneti, Veronenses Pharmacopoei, & doctissimi complures, vquam sibi visam: negabant item Cortusius & Anguillara nobis anxie sciscitantibus.

AQVATICA ANGVINA, siue Dracontulum.

IVXTA riuiolos & labentes aquas frigidarum ac calidarum regionum, vt in Belgio, Northmannia, Apulia & Hispania Granata, sponte istum emergere asserabant nobis, qui in hortos suos indidem transplantarunt: cauliculis folia hederacea gerit, maiora Ophioglossi, supernè acuta: in caule humili subpurpureo vix palmari florem rubellum, odororum, non absimilem Serpentariae, e radice fibrosa, geniculata, latius serpente, & multis fibris humi depacta, nullo bulbo appenso aut annexo, vrente gustu & crustas excitante,

Ἰσάριον. ASARVM Baccaris, siue Baccatus diuersus à BACCARE, Nardus Rustica.

German.

Germ. Haselwurtz.
 Gallis. Cabaret, oreille d'homme.
 Belgis. Haselwoirtel, ende Gantdooren.

NON video quid negotii fuit quænam Asarum esset, quidve à Bacchari distaret dignoscere. Sed ambitiosa huius æui declamandi licentia mauult rixari, quàm docere, aut doceri. Qui enim Baccharum videt, etiamnum apud Italos & Hispanos, apud Gallos item *Cabaret* hanc dici, leuiuscula Metathesi, voluerunt Baccharim fuisse Dioscoridis: illud autem caput, aut idem cum isto, aut reiectaneum esse. Atqui discrimen vtriusque satis perspicuum cum nos illic ostendimus, tum hic addimus: nominis confusionē neuti quā fraudi esse debere nostræ cognitioni. Baccharim hanc fortè vocatā dicimus, quòd Bacculis similes, aut Vacciniis ferat lagenulas similes, illam alterā *ωωχαρι*, siue Baccharim, propter odoris cōmendationem. Quare quando Plinius negat Asarū Coronis addi, eoque sic vocari, putamus voluisse dicere, ex hac aptari nullas scopas lustrales verendis Deorum aris, quales colligebantur ex Verbenis, Verbascis, & similibus comosis firmioribus. Nam hic Dioscorides *σεφωνοχρινόν* asseuerat; & ipsa planta id confirmat semper virentis foliū leuore cum sit, ramulis viticosis, & pediculis flectilibus in corollas aptis, floribus purpureis, odore Nardi, radice exili, fibrosa, admodum viuaci, non solum domi, sed & ruri sponte enata, in montium conuallibus humentibus, syluosis, Allobrogū, Sabaudorum, Galloprouinciæ, & Pyrenæorum.

ASARINA, aut Saxatilis Hederula.

ASARINAM verò rarò nisi locis montosis & faxeis vidimus, in Galloprouinciæ, Delphinatu, & Norbonæ môtosis, cuius quidē per plures notæ sunt, quæ Hedera terrestri conueniunt, proindeque nonnullis Hedera saxatilis dicitur: hanc vrinas eiere scimus, an alium ducat compertum haud habemus: nec tamen id inficias imus: nam huic fortè vsu venit quod de Asaro asserunt. Si tenuissimè teratur potu, lotium: sin negligentius, aluum & vomitum ducere. Sanè putarim, quia tenuissimarum partium, decoctum celerrimè ventriculi fundum & duodenum transiectum illicò hepatis vi vterius mœseraicas rapi vix dum collutis ductibus, aut leuiuscula impressione inibi relicta: at subest ratio argutior, hydropotè non pauci, præsertim splenetici, etiam referto cibus ventriculo, moxquàm frigidam hauserunt, rugitum, grauitatemque in splene præsentunt, nullo ventriculi aut hepatis percepto fastidio. Nempe venæ, quæ superiores mediaeque stomachi partes à liene traiciunt, suis ramis hauriunt illicò maximam liquoris copiā, rapiuntq; in splenis maiores venas, vnde flatus, grauitas, murmurilli.

SOLDANELLA Montana.

QUÆ arduis montibus oritur & periclitatoribus Germanis montana Soldanella nuncupatur, celsis Alpibus quæ Inspurgū & Rauispurgū ambiūt, nobis collecta fuit, cum quidā ex illis Theophastinis æruscatoribus folia decerpta, cuticulāq; summa deglubita ascitico abdomini admoueret, & aquas se educiturū citra vllam calfactionem aut tractionem assereret: vulneribus etiam illicò mirificè carnem claudebat, & cicatricem obducebat. Folium crassiusculum & subastringens, amaricante sapore Soldanellæ planè simillimū, vnde nomen, illi autem flos Gentianellæ minoris cæruleus. Audio quibusdā montibus, Auinione non disitis, magna gliscere copia.



STIRPVM aduersaria noua.

263

Κράμβη θαλασσία. SOLDANELLA. Brassica marina.

Ger. Meerwinde.
Ital. Cauolo marino.
Gal. Chou de mer.
Ang. Sea cò'le.


VULGATISSIMA hæc non modò meridionalibus litoribus maritimis, sed etiam ad Septentrionem Angliæ, Belgiæ, & Nortmaniæ, abundè prouenit folio Asari minore, crassiore, in viticulis pedalis & cubitalibus, humi sparsis: flore pulchello, purpurante, Volubilis, nolæ instar. Semine nigro, duriusculo, anguloso, Pæoniæ minore. Tota mucagineo succo prægnat, qui densatus Hydropicis, cum intrò sumptus, tum abdomini admodum, multum commodi præstat, notiore quàm tutiore experimento.

GRAMEN PARNASSI hederaceum recentiorum.

PERPVLCRA herbula, floribus candidis, Ranunculi, venulis fuscis, pallentibus depictis, in viticulis dodrantalibus, semipedem & pedem longis, infernè rubellis, & à medio ad radicem, folia Cochleariæ adolescentis, vel Chelidoniij minoris aut Hederæ, sed multò minoribus, nitidis, virentibus: radice crassa, tenera, multis fibris rectè depacta, in pratis & vdis pascuis Angliæ ad Oxoniam, Pedemontium, Belgij & Northmaniæ: semen in viticulis, subruffum, exile, legebamus per caniculares dies dictos: sapor subdulcis, gramineus, tantillum acrimoniæ prodit: magis congrua descriptioni facie, quàm vfu còperto, gramen Parnassium sanxit hanc herbariorum Germanorum Senatus, Bras von Parnassius vocans.

Φθόξα PHTORA Valdensium & Thora.

NON incitè quis inferet huc illam istis persimilem herbulam, quæ passim mótium Alpiuq; accolis vocatur Thora, interdum nulla adiectione, interdum Valdensium. Etenim multum diuq; venatores illius Alpinae gentis vti sunt, vti etiamnum multi alij, ad ferarum capturam, quibus solo succo expresso, & spiculis illito certam citamq; parant perniciem, qua namq; hæserit telum, aut vulnus fecerit, subire repentè virus, quo illicò ora vulneris (nisi præcisione antevertant) corrumpuntur, putrescunt: unde Phtora nuncupata, vestigio manifesto de Græcis relicto: quippe φθόξα corruptio, nex, venenum, aut mors. At hi quibus multis periculis notæ sunt vires earum omnium herbarum, quæ vulgo nuncupantur Sagittariæ, cuiusmodi cum multis Aconitis, etiam Hellebori sunt, Hispanis vocati *hierua de los abalestrieros*, præut ista est, ceteras propè elumbes & incertas ducunt. Huius verò ineunte Vere ius premitur, atq; vesiculis, aut potius vngulis & cornibus bouillis reconditum emitur mittiturq; venū ad emporia finitima, vbi ad vsum annuos venationum sibi comparant ferarum insidiatores, quos vicini Delphinates, Allobrogi, & Prouinciales vocant, *Bessiers vel Lobatiers*. Qui quidem mouere potuissent istum Pseudocommentatorem, ne Pseudoaconitum astrueret, vt quæ funesta dote superet quoduis Aconitum & toxicum. Hanc nos ex montibus Geneuæ conterminis primum Italici plerisq; ostendimus: Cardanòq; qui tum primum suo de venenis libro, multam illius mentionem fecerat, neq; dum nouerat, dono tulimus, cū huius antagonista seu hostica anthidoto, Antithora etiam vulgò sic dicta. Sesquipalmum vix superat caulis, glaber & iunceus, cuius è medio & summo saepe vnum, rarò bina, rarissimè toto caule terna aut quaterna folia oræ circinata, & tantillum cristatæ: superficie gla-



glabra & rigidiuscula non hirsuta, leuore & colore viridante, nonnihil ad Cyclamen accedunt, floribus luteis Pentaphylli, Tormentilleve. Radicellis aliquam multis quasi torulis oblongis, in imo exilioribus & acutis: supernè autem quasi nodulo collecti, Alphodeli aut Leucacanthæ nostræ similitudine & candore cespitem amplexæ, quasi Cancræ forcipulæ, quod Theophrastus vocat *εὐκαμπύς* ἢ, ab cancrorum pertinacis amplexus imitatione. Cuiusmodi ea quam è celsioribus Sabaudia Alpina val d' Engroigne, vocant, hic damus. Nam in hortis Mechliniæ cauliculo singulari singulum florem Ranunculi dedit, amico stirpium perquam studioso Georgio Rienti.

Κυκλάμιος CYCLAMEN folio Hedera.

Offi. Panis Porcinus.

Ger. Erdt appfel, Seumbrot.

Bel. Erdt appel.

Gal. Pain de Pourceau.

Ang. Sowbrede.

INSINUAT Cyclamini vox tum folij ambitum circinatum & circulare, tum etiam orbiculatum radice bulbum, unde facilis dignotio vulgarioris Officinarum: Nam ex montibus Alpina Rheticis in Italiam proficiscentibus, locis vdis & faxeis itineribus obuia passim alia, quæ non folio circinato vt Afari aut vulgati Cyclaminis est, sed potius triplici mucrone distincto, herbe Trinitatis aut Hederae Helicis modo. Eadem etiã Norbonæ riguis montibus & hortis crebra. Eius radices quæ vetustiores magnitudine alterius sunt: quæ nouellæ aded exigua, vt Auellanae magnitudinem vix superent. Adultioribus caulis promitur exilis, teneriusculus, & in humum pronus, è quo prælongis pediculis folia surrecta fastigium versus, vbi sunt flores purpurei communis Cyclaminis prorsum similes, purpurei: nonnunquam & luteos Verno tempore exortos nondum folijs emerfis meminimus nobis attulisse commilitones: Florent enim Vere & Autumno interdum odorati, alias non. Huius vires communi pares, & vsus frequens Norbonensibus ad Hispanicam luem. Doctor Senensis vbi ex Mesua maiorem & minorem facit, tandem dixit se minorem vidisse solum vno tractu: eam tamen neq; verbo aut icone docuit. Decuit tamen illum finire nos scire quænam ista esset radix, & an ab hac nostra differret, quando multa minus vtilia varijs locis inferit.

Aristolochia

Longa.

Rotunda.

Polyrizon Pl. & Gal.

Clematidis.

LONGA vera.

COMPLURES iam sunt anni cum Academia & Pharmacopœi Monspelienses quatuor Aristolochias notissimas, & vsu receptas habuerunt: quas hic propter ardeliones, qui temerè res sibi nec visas, nec auditu cognitatas peruertunt, potius quàm produnt, operæ precium fuerit oratione & icone perspicuis notiores facere. Ac primū animū huc aduertat vestigator, tantam esse trium, Rotundæ, Longæ & Polyrizæ Plinianæ, folijs, caule & flore similitudinē & parilitatem, vt ne perspicaciori quidē, & exercitatori interdum liceat nō decipi: nā foliū cūctis circinatæ rotunditatis, magnitudo ferè mēpar, è caule lento flexili: florib⁹ color partim ex luteo nigricat, forma omnib⁹ eadē, unde discriminē vel attentius intuenti vix patet inter ipsas tres Aristolochias: ac nisi radix certiolem faceret, nullū nō fallere posset. Id tamē interesse deprēhendes, si quando loca vbi omnes magna copia nascūtur, vt toto Narbonensi tractu, lustraris, Pistolochia toto habitu aliquantō minor, neq; folij, neq; florum



florum aut pomorum differentia nulla, uti neq; feminis, radice tantum differunt, quæ Longæ, forma digiti, cum pusilla, qualè videtur describere Dioscorides, cum verò prouecta, quadruplò maior, foris colore fusco vel atro, intus flauet Centaurei magni colore.

POLYRHIZO gratior odor multò & aromaticitas; radix multis fibrosa capillamentis Hellebori modo; prolixioribus tamen, & flauentibus ex atro. Rotunda vtriuis perquam similis; verum folia aliquid rotundiora, & nigriora Longæ Aristolochiæ, non Pistolochiæ, ut plurimum, nam situ nutari possunt & solent: flores itidè, ut folia, obscuriores, & per menses turgent lagenulæ, nucis moschata pares, semine fusco prægnantes, ad basim compresso, & apice donato; ea eadem planè quæ inter marem Myristicam & sceminam nucs intercedit discrepantiâ. Rotundæ autem radix iam valde nota, Italiæ & Galliæ Norbonensis; sed non perinde in usum deducta, ac potius Chirurgis, quam Medicis, magno sanè dedecore artis, & incommodo egrorum: Quibus commendamus Indicas merces, plerumque tempore vietas, aut cariolas: hæc autè nostratia recentissima ignorare non pudet. Tam efficaces quippe sunt Lōgæ, & Polyrhizon præsertim, ut radices vtriusque pari momento, partim intro dato, partim in pessario admoto, elicuerint foetum, iam sesquidiem frustra erumpere conatum, foetusque inuolucra lacerata, enixam puerperam, tridui cruciatibus penè enecatam: eoque multus omnium vsus apud Monspellenses. Polyrhizæ quidem Aristolochiæ, indictæ Diosco. & incognitæ Commentatori, radices, in usum Rondeletius reuocarat, propter plantæ ignarationem iamdiu desitum, & tamen præferendum reliquis duabus, tum suauis aromaticitate, tum medicata efficacie facultate; cuius merito Andromach. & Gale. Theriacis aptiorem præ Rotunda & Longa præceperant: at vtranc; de odore & sapore exploranti, multò ignauior comperitur Clematidis, quam falsò tenuem apud antiquos Theriacæ scriptores vocatâ putabant Itali: est enim istâ implexa multis viticulis tenuioribus quàm Asparagi, aut Clematidis alterius cæruleæ; sed non dissimilibus, qualem in Oliuetis, segetibus siccioribus, nos, comilitonè, que nostri toties videbamus & eruebamus, quoties Mòspellio Botonetū versus & Castrū nouum prodeambulatum ibamus. Inibi etiam locis pratensisbus & vdis Rotunda luxuriat. Longa verò prope rudera cœnobiorum, via quæ Frontignanâ ducit plurima. Procœmiscuè adeò vtrauis, item Rotunda & Lōga in pratis ad oppidum Villæ nouæ, ut vix discernere queas.

CLEMATIDIS.

Non parum notiorè & frequentiorè Clematidem; tum vineæ plurimam, tum & arua frigidiora dant in reliqua Gallia, cuncta Italia; deinceps Germania, & Flandria sponte habent: multò proceriore fruticat viticeo sarmento, cubitali; flore luteo, caule cubitali, fructu oblongo, magnitudine parui oui: semine intus lato, radix exilis, odorata. Huic vires ignauiores ceteris, & vsu obsoletior, præterquam apud omnes Appollinem & Mathiolum, secutos facere Pharmacopœorum; qui cum Longam & Polyrhizon nunquam vidissent, & Italiæ nihil vspiciam plantarū deesse à Mathiolo persuasi essent, illi facile & falsò persuaserunt, Clematidem esse genuinam Longam. Hincque tot morosæ Laureati Appolinis disquisitiones, qui cum hanc in Biblioteca pictam ex authoribus frustra quæsisset, & Mathiolo scribenti, prope fossas emergere, fidem habuisset, illuc illum sequutus, dum venatur, vnâ suo more, in fossas lapsus est. Res ipsas
Z. i. qui

Aristolochia Polyrhizon, sive Pistolochia Plini.



ROTUNDA.

qui inspectione notas habuerit, & tum mente, tum manu concinnè digerere nouerit, facile ex oculis perperam ascriptis, sese & lectorem extricabit, & perplexas acernationes istorum declamatorum aut ridebit, aut declinabit, nec se rebus, sed sibi res subijciat. Pistolochia Fuschij, quam Plinij Capnò esse, nullus iam ambigit, plurimū aberat à Polyrhizo: hincq; licet documentū videre humanę imbecillitatis & fatagentiæ, quæ etiam optimum quemq; & veri amantissimum, vt fuit Fuschius & Dodonęus, non rarò tranfuersum agit: modestia horum tamen potius gratiam, quàm censuram merita est: Alioqui vides Pistolochiam à crebra radicum propagine proluxa sic nuncupatā, & descriptā. Contra Capno vtriq; rotunda vel glomerosa radix: maioris, quanta Castaneæ nux magna, infernè concaua: minoris, nuci auellane par. Fumariæ folia latiora, caules, flores, sapor & odor, cætera similia, vnde Capnos: & vides quid profuerit error: etiamnum hodie clinicæ & Chirurghi Bataui isto errore imbuti, ad vermes necandos, & vulnera vtuntur, non infœlici tamen successu.

Ἰορ πορφυρεῖν. *VIO LA* purpurea.

{ *Ger.* Blauw Veiel oder Mertzzen violen. *Ang.* Violet.
 { *Bel.* Violetten. *Gall.* Violettes de Mars.

*V*T ferè prima ortu, sic in prima cōmédatione vtilitatis & delitijs inter vernos flores Viola purpurea, sic Græcis vocata ab Io vacca fabulosa, cui pabulo hæc fuerit. Nihil frequentius & vsitatus vbiuis gentiū, tum officinis, tum plebeis cōmodis, toto vertète anno, foliorum virentium, & florum recentium, Vere præsertim. Eximia namque fragrantia blandiuntur quæ saturiore purpura nigra lucent (flores albæ quippe vbiq; etiam vulgatiore, nullo aut sanè languido, placent odore) ad Cordiales condituras, Syruposq; & cathartica decerpuntur, vsurpantur, aut siccati vmbra seruantur. Nullibi Europæ cultu luculentiores, magnitudine, fragratiā, colore, & prouētū visuntur, quàm Antuerpiæ officinis, quibus parant cæruleum violaceum Syrupum ex pluribus infusis, saccharo addito, Soli 20. aut 30. dies expositis. Angliæ horti delitijs, ædiumq; ornamento & olfactoriolis alūt. Sed semine cassam orbāmve fecit hanc duplicè vocatam Violam, florum luxur, fraudato feminis genio. Etenim si rursus negligatur, nec frequentius transplantetur, ad ingenium redit, siliquosa, fecundaq; seminis albi, rotundi, pusilli, miliacei, mollioris, medullosi, ad purgandum vtilis, sed calculosis vtilissimi.

VARIETAS.

*Q*UAM AD MODVM loci & frequentis transmotionis occasione, flores maiores, coloratiores, & semina nulla edit: sic in nemorosis, vmbrosis, frigidarum regionum, qualis Anglia, Belgia, vel calidiōrū mōtibus arduis, sicuti Vegani & alii Norbonenses mōtes, ramosos cauliculos emittit, sesquipalmares, teneros: & ex interuallis folia oblongiora, altius ferrata; siliqua; in tres fissuras dehiscētes, longiores: flores concolores, inodoros: nonnihil tota ortu & positu Violam flammeam imitata. Neq; tamen specie, aut natura diuersa à Martia, ne tantoperè sibi plaudent Cōmentator, qui inuenta Labrusca, insultare videtur Baccho.

VIO LA FLAMMEA, coloria, calida.

{ *German.* Greyscamkraut. { *Belgis.* Penscen. { *ces.*
 { *Gallis.* Pensces, aut menues pensces. { *An.* Hartys ease, Loue in yde pan-

Varietas. *S*ICCIOREBVSHortis pratissique siticulosis hæc admodum similis violæ fruticosa, sed angustioribus, longioribus, laciniosisq; foliis, caulibus quadratis, tenellis, succulentis, reptantibus: florum tricolori variegati elegantia & magnitudine violæ Martiæ æmula. Sedula etiam culturæ opera, nitidiore bicolore purpura, cādore immixto, intermicant flammis violaceisq; foliolis quinis & quaternis, gustu subacris tota est.

SAXIFRAGIA ALBA Chelidonioides.

STIRPVM aduersaria noua. 267

¶ Ferenda huc est hæc, magis figuræ merito quam temperamento, aut vi calfaciendi & incidendi sua, vnde radicem ad calculum laudant, & Saxifragum dictitant, illius enim albæ Strumosa & grandinosa nigra filamentis & fibrillis hærent pendula exigua quasi granula, qualia Chelidonii minoris, fusca & obscure purpurea, acria, amara; à vulgo semina falso putata, propterea quia obseruavit sese propagare ex aliis atque aliis bulbillis, noua sobole succrescente: folia nonnullis ima erumpunt è pallore virentia, in pedicello pilloso, rotunda, cristata, mollia, minora, similia Asarina aut terrestris Hederæ. Caules etiam villosos, pedales, & sesquipedales, quibus foliola florû nonnulla summatim habent albicantia, Nasturcii quadantenus colore, effigie, aut Eracæ. Magna copia & magni nominis hæc in sterilibus, & fodinis lapidei carbonis, via Bathonensi in Anglia, Belgio etiâ & Northmannia, acceruant mulierculæ gradinosam nondum florētis plantæ radicem, vocantque Saxifragiæ semen: peroptimum ex vino vel polline ad calculum pellendum, fæctusque renum, vterum & viscæ extergendos.

SAXIFRAGIA AVREA Lichomifacie & natali.

¶ Huius videtur species illa herbula palmaris & perquam similis foliis: sunt enim rotunda, & similiter circumata, crassiuscula, nigriora: sed radix tenella prolixioribus & comosis fibris, multos hinc inde cauliculos emittens, in quorum summo flosculi emicant aurei, vnde vtriculi semina per maturitatem pandunt hiantes, rotunda, parua, rubella, sapore herbaceo, frigido, insipido, & prorsum eiusdē tum figure, tum naturæ, quæ Hepaticæ aquaticæ: qua cum Martio & Maio bellula in Angliæ Northmāniæ & Belgii humentibus aut Lichenis faxeis & parietinis substillijs & manatibus floret. Vsum putarim non alium quam Hepaticæ aquaticæ, aut Lichenis.

GARTOPHYLLAT A, siue GEVM Alpinum Recentiorum folio Hederaceo.

¶ NOSTRIS herbariis hanc Alpinam Geum quoddam facientibus, non aduersamur, quia nescimus, sitne potius ad Saxifragas superiores referenda. Folia quippe in imo plura, Hederacea, nonnihil cristata, circinnatione Asarina, aut Saxifragiæ albæ, sed maiora sunt. Caulis è radice geniculata, ex fusco rufcove albicâte, rectus, gracilis, cubitalis, summo ramulis diuisus, & flosculis albis, stellatis onustus: tota nonnihil calefacit, exticcacque gustu Caryophyllatæ, aut Sanniculæ.



Hedera terrestris, an Chamæcyssos Diosco?
Chamæleuce, siue Populus pumilla, an Populago, Dotterbloem, siue
Farfrugum?
Hedera { Nigra corymbosa communis,
 { Lutea.
 { Alba.
 { Hedera Helix.
Cymbalaria Italica hederae folio.
Smilax aspera, non est Sarsaparilla.
Sarsaparilla.
Smilax lenis.

Scammoneum { *Antiochenum*,
Monspeliacum.
Dragredium.
Helxine Cyssampelos.
Volubilis minima.
Campanula Lasura. *Asureus* siue *ceruleus conuoluulus Hederaceus*.
Bryonia { *Alba*.
Nigra.
Viorna.
{ *Clematis altera*.
Clematidis altera Varietates.
Flammula.
Lupus salictarius, *Vitis Septentrionalium*.
Vitis vinifera.
Labrusca.
Apocynon.
Periploca repens.
Chymenon, siue *Ciciliana It alorum*.
Periclimenon.
Seseli Ethiopicum Diosc. folio hederaceo ad *Peryclimenon* accedens.
Lybanotis Theoph. non est *Ethiopicum Seseli*.
Capparis.
Vinca peruinca, siue *Clematis Daphnoides*.
Asclepias.
Viscum.
Polygonatum.
Ruscus.
Hippoglosson.
Laurus Alexandrina.

HVMILIS HEDERA, *Hederula*, siue *Chamacissus*.

EFFIGIEM, vires, atque nomenclaturam plebeiam vulgaris hederæ terrestris ex-
 pendentis, vix vlla se offert planta quæ æquè scitè quadret Dioscorideæ Chamæcisso-
 sic dictæ (vt verisimile fit) sicut Chamæpeuce, Chamædris, Chamæciparissus, & Chamæpi-
 tis, quia hederam præ se ferret, specie tamè differret, vt facit terrestris Officinarum He-
 dera, quæ amarore & viribus Dioscoridi memoratis, ad obstructions disculsiu perdiffi-
 ciles, nec nò arthriticos affectus valere, Barbaræ praxis crebrum experimentū testatur.
 Verum qui malunt litigare quàm inuenire, obiciunt folia Macrotera, vbi nos Microte-
 ra (quæ transmotiuncula vnius literulæ frequentissima est) legendum suspicamur. Re-
 spuunt etiam flores Leucoii minores: atqui respuerent potius in Anthirrhino, quem
 Violæ Leucoii assimilat Dioscori. sunt & huius purpurei caliculi filaceis flosculis non ita
 dissimilibus. Reliquæq; notæ adeò suffraguntur, vt qui hanc hoc locò excludunt, dum
 nullam siue potiore, siue deteriore sufficiunt herbam, parum gratiæ ineant à rei
 Medicæ candidatis, & à nostris Practicis meritò ambitionis præcipitis in suspicionem ve-
 niunt, Passim abundè hæc prouenit, & noscitur ab omnibus, iuxta fossas & culta, vt Diof-
 cori. monet. Qui etiam flores candidiores quàm Albæ violæ desiderant, minus accura-
 tè vulgatos legissè videntur codices, qui non habent album florem. Nec si Plinius Spi-
 ratum tritici florem habet, illicò idcirco sequendus, quando Dioscorides nullam facit
 mentionem, & Plinius solitus est non paucis in locis permiscere notas, vel audacius Lati-
 nè vertere, vt proximo facit capite de Chamæleuce: quem tamen nos lubentius excu-
 samus, quàm incusamus, hoc sæculo alienæ famæ vorandæ auidissimo.

CHAMÆLEUCE, siue *Populus pumilla*,
 an. *Populago*?

HANC

HAnc etiam quænam sit, vix nisi de nomine coniectari licet, adeò ignotis notis prodidit Dioscorides: verum si quæ sit vsipiam nostris in terris Populum proximè imitata foliis planta, ea erit, quam vulgus Germanorum *Dotterbloem* vocitat, Latini autem, Farfrugum: qua pratis nihil notius aut frequentius est, vicina, amula, & coniuictrix Chelidonii minoris, prope quam collocauimus. Ad renum lumborumque dolores epota mulcere posse, si quidem crasis & flatulentis mucoribus sint oppleta, facile credet, qui gustarit, & nouerit partim urinas ciere, partim etiam in alimentum adeò multum & laudatum abire, vt vaccæ primo Vere pastæ, lac per bonum efficiant, & inficiant butyrû luteo colore.

Κισσός. *CORTIMBOSA HEDERA Communis.*

German. Epheu. Gallis. Lierre.

Belgis. Cleyl. Arig. Iwi.

MALIMUSON dictum à textura porosa & spiraculis innumeris ferè peruiâ, quæ vinum transmittit, quale Catoni & Varroni Cissymbion poculû est: quàm à pusionis Citti saltâtis in Hederâ Poëtica deformatione à Baccho versi, vt fabulant Græci. Κισσός item pumexve, siue porosus lapis, indidem videtur deductû, & vtrumque, ἀπὸ τῆς κλοῆς, siue Curculione, qui cuspidula, aut acu, potius quàm ore triticum hordeumque, terebrat Latini ab edendò Hederâ dixerunt: Etenim arborû importuna amasia, & veluti assentatrix, eortice rimoso impacta, maceries vetustiores demolitur, & radicatis propagationibus arbores amplexa, enecat & exedit; præsertim illa species quæ maior & arborea vocatur: non item quæ Helix. Nec plures duabus nouit nostra ætas differentias genericas: tamen si quamlibet multas dixerit species Dioscorid. quæ fortè melius decernentur varietates; quales agnoscit quaternas quinasve è duplici specie vulgaris arboreæ, quæ cunctæ genti notissima, virere etiam inuita Bruma solita est: Fronde in imo per initia arcuatis, & semilunatis angulis triquetra, vt sunt Trinitatis herbæ dictæ: Vetustiora autem in editioribus viticulis circinata, qualia Cyclaminis: floribus congerie muscarii glomerosi & state defluxis, corymbos botrôsve glomerosos ineunte hyeme maturescètes, Ligustro similes, cernere vbique viarum est: itè circa vda, & ripas humentium regionum frigidarû ac temperatorum; nam & calidissimarum impatiens est. Huius multæ varietates sunt, quæ antiquis persuadere potuerunt, vt plures differentias, siue species statuerint: tamen si discrimen è Baccis duntaxat Dioscorides accersat, vti in Malis, Nucibus, & aliis fructibus vulgò fit.

Arborea Hedera recta.

Quinetiam arborefcit quædam, suapteque stat stipite, nulli innixâ pedamento, qualem in syluosis quibusdam Angliæ meminimus, Orthocissum antiqui dicunt. Interdum etiâ quibusdam locis xerampelino colore folia nitent. Pisif nobis ostendebant herbarii corymbos cæsi & albicantis coloris. Melinos subfuscis corymbos plerique plantæ satæ in hortis Italicis & Germanicis ex Campania & Apulia, hodie maturant.

Varietas.

HELIX, siue prouoluta, sterilis Hedera.

HVMILIS planè hæc minor & infrequetior cōcinne vocata Helix fuit, quia secundû sarmentosos funes exerat clauiculas capreolôsve viticeos, qui humi panguntur, & propagatione quadam quasi in spicas & anfractus prouoluuntur: interdum etiam serpendo muscidis truncis & caudicibus aduoluitur gracilioribus sarmentis; folia minora altius triquetra segmèto sinuata, edentibus, planè superioris, sed minora minorisque; vsus: nec enim vel folia huius decerpuntur, vel Gummi vllû officinæ ex hac colligunt: Quin nec fructus quidem vllus in ea obseruatur, vnde sterilis putatur. Verius autem hæc nūcuparetur terrestris Hedera, quàm illa Barbarorum, nobis paulò ante asserta Chamæcissos Diosco.

CTMBALARIA Italica, Hederaceo folio.

VENETIIS, Patavii, & vicinis pagis passim in ædium parietinis Hedera, aut Alsines modo dependet istæ, folio sinuato, Hederaceo, mollicello, leui, in flexilibus, exilibus & tenerimis, capillaceis, pedalis & sesquipedalis Casisæ cauliculis. Flosculi luteo-

Z. iij.

Iuteouirentes Elatines, siue Veronicæ fœminæ pares & similes. Illic Pharmacopœi, penuria & ignoratione Cotyledonis veri, miscent Populneo vnguento.


SMILACIS ASPERÆ, & SALSÆPARILLÆ

figura & natura discrimin.

SMILAX ASPERA.

DIFFERT hæc à læui vuis foliis, spinis, radice, floribus, viticulis, atque viribus, denique natalibus. Quippe non nisi montosis & collibus feruidiorum tractuum, Romanæ, Hispaniæ, Linguagotiæ, vbi plurima, horridis aduncisque crebribus spinis, Rubi ritu, implicat mordicus proxima quæque; affurgitque vltra supraque; parietes & sepes vicinos. Folia Hederacea, longiora, Bryoniæ nigre ambitu & superficie: non incisa, sed læua, & in medio, secundum strias neruulorum, spinulas habentia atroüirentia, acinosque rubros, racematim copiosos, Ribes magnitudine & modo: nec flores dissimiles Ribes vtriusvis racemosi, sed albi. Radices tametsi longius excurrât subter humum, ternis aut quaternis vlnis longiores, non tantæ tamen cum Salsæparilla similitudinis sortitas scimus, quantum hætenus persuasum doctis quibusdam fuit: qui scriptis mandarunt Salsæparillæ eandem planè esse: cuius tamen conspicuæ intuenti patent, à Smilacis radicibus, differentiæ. Siquidem Smilacis geniculatæ, articulatis segmentis radices, candidæ, foris nitentes, Graminis carmini, aut Harundinis valatori,

SALSA-PALLA.



At Parillæ crebris loris prolixissimis, ab vno trunco radicis magno, prædure, strumoso rugosisque capitibus, hinc inde subtus, vt in Asparago, vel Rusco, oriuntur numerosi concolores lori, æquabiles & sine geniculis vel nodis; recti, flexiles, cortice duriusculo, pullo, rugis striato in longitudine, quam vicenum pedum interdum metiti sumus. Intus farinacea medulla, non ita ingrata, sed viscida, nonnihil emplastica, amari-cante, nec tamen calorem prædente. Eapropter perspicuum est, non magis esse Smilacis, Rubi, aut Clematidis alteræ Viorna dictæ, quàm sint Cinnamomi, & nonnullæ arbores, tum

tum Indicæ Orientalis, tum Perunianæ nostra Laurus. Tametsi hæc possit nonnulla eadem: quæ illa præstare. Neq; si Colutea simillima est Senæ, idèò continuò eadem astruenda. Sed stipites quos habemus Salsæ, ex eodem radice prægrandi & capitato nodo lignoso, intus flauescente, Aristolochiæ rotundæ tuberosæ magnitudine, & colore, exeuntes, pollicè, aut maximum Rubû crassitie superant: sed præduri lignosique, crebros nodos admodum extantes circa articulatas cômiffuras crebriorum vncialium, frequentiumque interuallorû, atq; aculeos aducos deorsum versus nōnihil depressos, rigidos habent, & valdequàm Rubû imitantur aspectu, potius quàm Smilacè: verùm gustu neutiquam astringente, sed fermè insipido, nec vt radice emplastico: eoque, vt certò scimus, minus efficaci: Folia tamen quidam amici, qui viderant, asserébāt non admodum abesse ab Smilaceis. Optima habetur quæ plenis medullosisq; est flagellis, solida, cādida intus & habitior, quæque facilius in æquas tota sui longitudine partes diuellitur: huius namque libram semissem plus virium habere experiuntur, quàm alterius strigosæ & gracilioris, nigrioris, decè aut duodecim vncias. Debent tamē institui decoctiones non minoris quantitatis, quàm 10. aquæ librarum, ad vncias duas, tres, vel quatuor radice: non, vt quidam Medici nostrates scripto imperant, aquæ libra 3. ad vnciā vnā radicem. Citius namq; diffusetur aqua (nisi in diplomate id præceperint) quàm radicem vires bulliendo educatæ fuerint. Radicis namque medius torulus vel corculus, qui lori instar est, durior est, quàm vt tantò vires deponat. Vnde quilibet facillè percipiet, quàm parum comperta sibi ex alienis paginis in suas transferat & posteritati offerat Cômentator, qui eximii ingenii & Itolorû superioribus annis doctissimum Medicum Fallopiū mendacii in simulet, atque istius de Salsæ Parillæ, atq; eiusdem sententiæ, admodum incertæ, authorem faciat Guinum suum præceptorē, quem virū auditione, dum Pisis essemus, accepimus tãtopere flagrasse rei plantariæ cognitione, vt etiam nihil nō lustrasse montium, nemorum, præruptarumve rupium Hetruscarum, & Tyreno vicinarum insularum, quò minimas quasque herbulas indidè aduectas, nec dum sibi notas, in chartas ipse conderet, & affabrè pingendas curaret. Quare si fuit illa pluribus abhinc annis Tuscorum Principi allata planta vera Salsa, (ac nō potius, quod periti nonnulli subolfecerunt, Hispanica Smilax aspera) mirū videtur Philosophici & nobilis animi Principis, principes Medicos Guinum & alios istā non curasse repræsentandam; saltē illas satis cōpertas, & valde varias notas, quas superius ostendimus.

CONVOLVVLVS maior Plin. Smilax lauis vel lenis.

Volubilis maior vulgi.

VALE quàm laxis Smilacis significatus, qui quasdam cognatas, vel similes alias, tamē admodum discrepantes, & viribus penè cōtrariis pollentes, designat, vt Smilacè, Taxum virosam, asperam Smilacem venenifugam, fraxinum ambiguā; demum hanc non valdè certam, vt cuius vtilitatem nullam, sed duntaxat incommodum turbulenti infomniū parere Dios. autumat: eapropter hanc hīc nostrō more discussimus confusam significationem, ne vt Plinio, imponat nobis. Quod autem ad Leuē Smilacem istā, vulgò receptam attinet, quia nihil omnino reclamationis: præterquàm collatio seminis huius angulosis, cum Lupini rotundo, compresso: quæ sanè ineptior est, quàm vt Dioscoridis sit putanda: coniectamur nos voculam *degus* quippiam deprauationis perpeßam, quæ genuinam comparationem viciarit. Vt si amanuensis quispiam *ævri degus*, id est, pro Lupino, è Latino Græcum *ἔγβυ* faciat: Sic extrito primo elemento, & medio mutato, facillè potuit *ἔγβς* legi: quam suspiciōne augent verba quæ proximè addita sunt, quæ neutiquā scitè cohererent; hæc nempe. *Semen veluti Lupini paruum & nigrum*. At Lupinū non est paruum: nec nigrum. Saltē quæpiam subest labecula, cuiusmodi myriades plures expunctæ sunt in authoribus Græcis Theoph. Atheneo, & aliis: & in Galeno nonnullæ: in Paulo & Tralliano complures voces Latinæ. Eapropter hanc eandem maiorem *Connollunum* retinendam arbitramur. Est quippe non modò sarmentis viticeis, mollioribus, longissimis, & aptissimis ad fornicatas opacationes: Foliis itē leuibus, hederaceis, aut alterius Cōuolui Cissampeli maioribus, mollibus: cetera tū flore, semine, sarmento prorsum Cissampeli nostri, sed maiora radice item longa, sparsa, flexuosa, sed paucioris lactis, nec comperti cōmodi.

Iasone Theop.

ET hic fatorum alumnus conuoluulus, non socia segetis, aut sepum: est enim caduca, vite multò minus proluxa, nec proximis adminiculis sese applicante, ternum & quaternum pedum, reliquis conuoluulis tenuitate, flexilitate, radice, foliis, semine iisdem, sed purpureo flore dilutiore: totus multò minor, neglectus, aut potius inuisus rusticis: tam notus quàm passim obuius.

SCAMMONIUM SYRIACVM, Antiochenum,

et Norbornense.

TURBITH.

Scammonii de-
scriptio.

PAUCÆ sunt plantæ, quas de facie & facultatibus penitus notas habere, magis inter sit boni Medici, aut Pharmacopœi, quàm Scammonium, tam enim commoda hæc lactaria scansoriâq; voluula, (vnde fortè nomen Voluulo fuit) cathartici medicamenti, & necessaria, vt tametsi nonnulla infamia flagraret, tamen nulladum sit inuenta, cuius vlla pars, succus, vel excrementum, tam pusilla mole tantum còmodi præstet, aut vt vicaria huic suffici queat. Quò magis nostra ignauia incusanda est, quibus licuisset hanc plantam alere, succumque illius exprimere, si non multum ad vtendum, saltem quantum sat ad cognoscendum, impostorumque fraudes detegendum: sicque cautior & felicior foret Medici opera. At vix hodie millesimus quisque Medicorum plantam vidit, nisi fortè pictam, cuius pluries quàm sæpius millies succo vel lachryma se vsum proficitur. Quare quò dehinc cuilibet sit in procinctu veram & nosse, & alere, orationis ambitu pingenda, quam solo penicillo Còmentatoris pictor expresit. Anno sexagesimo primo aut secundo supra sesquimillesimum, indefessus ille herbarum nouarum vestigator Venetus Pharmacopœus Sequinus Martinellus, ex Syriaco Alepo miserat plusquam centum libras glebæ Scammonii Antiocheni succi concreti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas Lachryma plenas, seu Diagredio antiquorum, cum seminibus angulosis Volubilis. Hæc semina tum Patauini & Venetii primo Vere madata, in luculentam Volubilem, seu Voluulū abiēre, adeò sinuosos Smilaceis foliis, triquetris, vel potius Cissampeli, foliis, floribus, & facie, vt planè nostræ Cissampelo eandē dixisses: verum radice insigni fuit, & mole grandem Bryoniæ radicem æquante atq; teneritudine simulante: foris tamen pulla, aut cinericia, intus albida carne: cuius fissæ totulus siue cor mediū exemptum, planè idem est, aut simile radici communis & probatoris TURBITH officinarum: verum facilius aliquantò frangitur hæc, tametsi perinde gòmofa succoq; lacteo pregnet, atq; Turbith. Hanc eandē postea Antuerpiæ, quò semen miseramus ferendo meminimus, speciosam factam, floribus & viticulis quinum & senum cubitorum, prorsum nihil diuersam, cuius Guilielmus Dries, non minus peritus Pharmacopœus, quàm probus ciuis Antuerpianus, adnata radicemque pullulationes excisas, exsiccatasque ostentabat, adeò Turbith Alexandrinum ementita, vt discriminis perparum, aut nihil percipi posset.

Quæ lachryma fuit apud Albertum Martinellum Sequini fratrem, ad Symbolum Angeli, Venetias in Syriacis conchis allata, nò fuit aspectu tristiore, squallidior & cineritio, vt vulgatum Scammonii visitur, sed Colophonix concolor, còcretionem similis ex fusco ceruleus erat. Quare non secus differunt quàm Meconium, siue succus expressus, ab Opio, quæ fuit manans liquor, seu lachryma. Sed Scammonii lachryma cinereū habet colorē: Opium flauum & limpidiorem: vtpote è capite, vbi defecator, non è radice fluens. Verum quia pauca lachryma aut mera, aut hodie vsurpata Europæis vānit, nò enim posset tanto vsui tam paucifatis esse: opera ponēda, vt succi probè teneamus exquisitas notas, & varietates, quò minore mortaliū detrimēto, longè maiore emolumēto eo vtamur purissimo, vel saltē quàm optimè correcto. Nò paucos enim sepe fallit multum, pusillū delectus discrimen. Videas namq; non rarò idem corpus, eadem de morbi causa, & planè eodē modo affectum, aliquot granis sumptis sæpius facili ductu, nulloq; cruciatu bile, pituitosamq; colluuiem excludere, tum ex eadem prorsum gleba effracto frustillo, multò plura grana

data

data minus educere, multum tamen cruciatum ciere; nãpè dispar molis concretio alicubi plus, alibi minus, alterius cuiusdã lactis Tithymali, aut Cataputiã accipit: vnde disparilis vacuatio tam sæpè consequitur: si namq; foret purus & merus succus vniufmodi, nequaquam tantæ dose essent discrepantiã, quantas cùm antiqui tum hodierni Scammonii animaduertimus: quandoquidẽ etiã hodie quidã nihil aut parũ excernũt scrupulo vel 3. .s. quã plurimi verò minore portiuncula, quia vt plurimum remissũ est Scammonium, quæ miscella neutiquam improbãda videtur, vt vociferantur humoristæ Galenici; namq; si est pro eo ac debet, equabilis atq; correctã, valdequã est vtilis, dũ minore & mole & mora educit, anteuertiq; inpressione caloris, quæ fieri solita est à medicamẽti cunctatione: maximã enim nouimus vtilitatẽ in huius cathartici celeri motũ cũ delectu: nam sufflõnum Agyrtarũq; vitrũ, flores, siue farinẽ sibiẽ, impetu & nõ discretu humores quoslibet obuios præcipites dant. Tametsi vinũ purgans ex radicibus Scammonii Dios. parat; & si homini Græco istud demensum solitũ, sanẽ plus purgat aliis additum: sic videmus additum Diaphanici Catholici & aliis, vt succo Rosarũ, plus mouere, vt Brassica mãrina Thymalli. Ac nullum Scammonium hodiernum affertur non adulteratũ, & tamen fortassis commodius, quã Dioscorideũ sincerũ, cuius quo si fuit dosis recepta, par est putare alicuius vehementioris succi additione, tantillã quantitã tantum efficere nunc, etiã nonnulla portione farinæ, colophomẽ Resinæ addita: nimirum resinã ad pelluciditatem coloremq; taurini glutinis ementiendum: farina verò, vt cuius interuentu resina cum Scammonii lacte aqueo societatem coalitumq; inire queat: lento tum igne rudicula versando quantum plurimum possunt optimẽ agitant, donec induruerint, coaluerintq; in commodã mixtionis glebam. Cuius dignotio hæc, si non admodum ferueat ore, nõ multum virus redoleat, nec nimĩ tenax sit terẽdo; nam leuitatis albescentis atq; taurini glutinis pelluciditatis hodiẽ vagæ, nec certæ notæ sunt: nullũ fermẽ hodiernũ videas Taurino glutini aut Bdellio trãsparens & nitidũ, nec lacteæ albedinis, sed liuentis & ad caruleum dilutum quadantenus vergẽtis. Pharmacopœi è Mesue & Græcis cytonii cauo inditũ coquere in clybanõ addereq; mastichem soliti sunt: minulq; prudẽter cytonia abiciunt, quibus trãsmisã vis & potior & delicatior scammonii remanet: Quare dehinc sciant miscendam esse carnem cythonii compositioni, vel isto Venetorum modo parandum, ne maior iustõ moles medicamenti instituto officiat. Pulueratũ scammonij Lib 1. succo cytoniorũ depurato operiunt, leniterq; & blandẽ, non secus atque Mesues suũ de succo rosarũ Elest. excoquit, dum induruerit, vbi cautio, ne nimio obruãt succo, quò vires scammonii nimis repri mãtur, obtusæve penẽ langueãt, plerũq; plus nocituræ quã profuturæ. Nam Mesue meritõ multum succi rosarũ Scammonii incoquit, vt quo retundatur quidem impetus & acuties, sed non deantur vires à succo Rosæ roborantis & purgatricis.

Monspelliense SCAMMONIVM.

COMMVNIS Pharmacopœorum consensu Scammonium etiam facit illam Mariam volubilem, copiosissimam toto illo litore & sabuleto, ab vique Rhodani ostio ad Aquas Marianas & Sinum Agathensem, cuius succo lacteo concreto; (quo multo tota turget) purgationes moliebãtur, sed maiore do si, minore effectu: quippe succo nihil additũ erat, sed coctione coactus, niger vel fuscus erat. A volubiliũ omnium floribus differt flos huius, multos namq; pusillos, stellatos, candidos, confertos fert Iunio & Iulio: folia rotũdiora, Asari, breuiora, crassiora, firmitiora, latiora, superius albida, acuta, & basi falcata, nec angulosa Apocyni, aut Aristolochiæ similitudine & magnitudine; ex pediculis & loris reptantibus & stratis humi viticulis vel piscatorum attegiis & Tamariscis



aduolutis quaternum quinumve cubitorum: semen angulosum in vtriculo minore quam Aristolochiæ: radix digitum æquat minimum, longo reptatu multum fibrosa, alba, succulenta, veluti reliqua planta.

CONVOLVVLVS minimus Spica folius, vel Stachadis
citrina, aut Linaria.

RARIUS inuentu hic aliis regionibus quam Galloprovincia, Allobrogum, & Norbonæ, ad margines aridos satorum, & oliuetorum: vbi Iunio, & Iulio florem delatiorē superiore, sed consimilem, vnifoliū, angulosum, diluto colore purpurascētem; semenque haud dissimile, angulosum, compressum, promit exilibus in viticulis, rectis, crebribus, à radice lignosa, sesquipalmum longa, albida, à qua partim folia, partim à cauliculis sesquipalmum altis, exeruntur, angusta, longa ad Linariam, aut Stachadem citrinam Phiteumave Norbonense, etiamq; colore & canitie accedentia: gustu exsiccante, nonnihil calfaciente.



ASPREVS, sine caruleus Conuulvulus Hederaceus, vel
similaceus, exoticus.

HÆc omniū huius classis rarissima & pulcherrima, nec nisi hortis Italiæ, Galliæ, & Belgicæ nota, vbi amœna purpura porrectis attextisq; secus parietes & perticas funibus viticis, gracilibus, vmbracula coccinant, atq; fornices, visu pericūda: visenda quippe floribus, è pediculorū calyce exeuntibus, Ismini, aut Vincæ peruinca similibus, sed ora quinis stellatim prominentibus angulis, nolę caruleæ vel asuræ effigie: vnde Campana Læsura Italica. Folia ternis angulis singula, in teneriusculis pediculis, Ciclamen, Hederamve anno sam imitata, nonnihil hirsuta: longa & gracilis radix, nulla sui parte in Medicorum commercia venit.

HELVINE CISSAMPELOS.

SIMVL Cissampeli nomen, simulque collatio & soluendi effectio, testantur abundè Helxinem esse vnum quempiam Voluulorum lactariorū, passim propter sepēs, inter segetes & vites oriundum: vox siquidem ἐλκιν, trahere, hærere, vel arripere consignificat, viticeam, voluulosamque propaginem, præsertim in Cissampelo, & Hederæ mixta significatio, folia satis representat: Verum cum Voluulorum, plebi Volubilium dictarum, quatuor sint differentiæ, mox subdendæ, quæ vixdum effigie, viribus, verò neutiquam distinctæ hæcenus fuerūt, nobis eam sciendā Cissampelō, quæ cum eo, quod notis & natalibus magis quadrat, tum etiam præ cæteris euidentius purgat, quam vnam duntaxat facultatem illi reddidit Dioscorides, cui potius assentiendum quam posteris illius duntaxat amanuensibus, & exscriptoribus, quos modestiæ causa nō nominamus. Scimus igitur Volubilem illam, quæ inter vineta Muschatelina, maritimaque sepēs, Thamariscos, prope segetes ad Frontignanā Norbonæ & Lio Venetorum, inter mare & hortos, alibi que passim viticularum proluxissimis flexilibus sese aduoluit, aluum soluere succo & diluto. Est hæc non diuersa à Volubili vulgari maiore: sed folia aliquantū angustiora, crassiora, dilutè virentia, in exilibus pedicellis & prælongis viticulorum loris, quibus etiam intricat sepēs, pendentia: prope quæ, ex iisdem interuallis, sed in aliis pediculis, flores infundibuli, nolæve effigie, à latiore labro ad mucronē ductis leuibus striis, latera nōnihil intrò inflexa, finientibus, candidos, tenues: è cuius imo cætro prodit vtriculus angulosi seminis plenus, Aristolochiæ rotundæ similis, sed dimidio minoris, Scammoneæ Antiochenę paris. Succo etiam tota, tum radix, tum folia turgent lacteo. Candida radix, proluxa, fragilis, huc illic reptans, minimum digitum æquat, Hac plerique impostores Phamacarii, præsertim regionibus

gionibus maritimis, vbi hæc adultior, admixta succo Tithymali Paralii & resinæ Colophoniz, quæ nigricat, ementiuntur Scammonium.

CISSAMPELOS, ALTERA, *Atriplicis effigie.*

HANC iamdiu à doctis persuasi, huic tamen aliquantum dissimilem, putaramus legitimam Helxinem: frequens namque amplexibus multis vites arripit, nec secus aut arctat, aut enecat, vel iisdem pabulum surripit, atq; Calsytha. Foliis est hederaceis, oblongis, in angustum Atriplicis facie & modo desinentibus: Flores item Atriplicis albicant racemati: semine triquetro, nigro, Sefami Theoph. sed minore; radice exigua; vbiuis magno prouentu vinetis, frugibus, ac sepibus adnata. Sed de succo vel facultate subducendi aluum, nobis ignota, nisi quis Atriplicem putet, eoque lubricare posse aluum statuat, multo tamen imbecilliores illa maritima certum.

VITIS ALBA, BRYONIA.

Germ. Stachelwurtz. Gallis Couleure. Ang. Bryonie, Wilde wyne & Wilde hoppes.

HANC nullus dum in dubium vertit, quippe quæ comodi plebei & cognitionis semper fuit. Radix luculentæ magnitudinis est, quam auulsam, qui quotannis, vel alternis, deorsum versa basi pangunt, altero tanto crassiores efficiunt, teneram, Raphani colore & concretionem: In viticulis prælongis, teneriusculis, clauiculis multis, obuia quæque præhendentibus, folia vitis, aut Balsamini, incana, flores palliduli, stellati: acini sparsi, rubentes, magnitudinè Asparagorum ferme æquant, succulenti, acriores, vti tota planta: cuius turiones & asparagi pullulantes etiamnum hodie quidam in acetariis esitant. Ischiadicis cataplasmatibus radix peroptima, & Psilotris immixta & cõtusa taurino sanguini, ad Scirros & carcinomata mirum quantum prodest.

VITIS, vel BRYONIA nigra, *Sigillum Mariae.*
an Ciclamini altera?

VEL tacitus plebeius consensus istam vitem esse sciuit, vocauitque nigram Bryoniam, vti ex Dioscoride Galenus & Paulus, cuius tametsi quiddam leuioris momenti, vt color rubens in acinis, ac buxeus internus vitibus desit: tamen hederacea folia, Smilacis asperè quàm similissima sunt, citra, & sentes flexuosi gyri, viticularum multiplici capreolo, & clauicella proxima quæque amplectente: racemi multis aggesti acinulis, virentibus primulùm, deinde rubellis, demùm vterius maturitatis quasi viæ progressi, ex fusco rubore in fuscèdinem atram vergunt: cætera, vti radix (quæ Bryoniæ magnitudine, figura efficacitate & teneritudine imitatur, foris nigra, intus alba) planè tam vera, quàm vulgo notissima sunt: vbiq; siquidè in Gallia & Germania Syluosis & asperis dumetis, arbores, sepèsque scandit, & ruis, speciosis, oblongis, floribusque muscosis Labruscæ, vel Oleæ pallentibus conuestit. Compertum est, vel mulierculis, vehementius vrinam, renumque sabulum, & mensium saburram, impellere potu: verùm Veneris tantoperè incentiuam esse, non perinde assentiuntur quidam Commentatori; quin potius experti eidem conuiciabantur, conquesti lumbos eneruare, sanguinem, renèsque inflammare, plurisque esse sibi vnam aut alteram Cynaram, quàm incertam & periculosam suam Bryoniam: quam si propter calorem, Venerem accendere vult, haberet sibi vni, aut Flammula vesceretur, ad sui Satyrii Erithronii vires enerues supplendas.

VIORNA VVLGI, *fortè Vitis syluest. Dioscor. & Theoph. Atragene.*

NVLLO loco aptior Viorna vocata Gallis, quæ nusquam non frequens & nota (fortè quia viarum sepes ornat) quàm huic: Sarmenta quippe cæteris Clematidibus prolixiora, duriora, crassiora, rugosiora, vitiq; Labruscæ vel Viniferæ Vitis coloris similia: folia etiã sunt Solani hortensis & maiora, atq; singulis clauiculis quina, quibus lubens obrepit arboribus, atque Hederæ emulatione editiora fulcra scandit, sed interdum ambitu supernè

*Atragine Theo-
phra. vitis Syl.
Diosc. Dalesc.*

supernè ferrato ternis aut quaternis dentibus, vt in Solano nonnunquam visuntur, quæ laciniata pedem Anserinū vocatum, Atriplicis speciem, tam bellè referunt, vix vt discernatur, sintne Solani an Atriplicis: flores radiati, pusilli, conferti, numerosi, albidi, muscoli, & stamineis apiculis ornati, odori, Maio & Iunio: capillaceo tomento cinguntur carptæ lanuginis albide, leuis, quæ etiam in multam hyemem perdurat, foliis amissis: acini autem complures confertim stipantur ab vno pediculo, apti, rotundi, rubentes ex fusco, compressi tamen: quare nonnulli docti, vbi περιφραγες σχῆμα legitur, id est, spherica figura acinorum vel granorum, πλατυφραγες leuiuscula immutatione & commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam compressam figuram. Ac tamen si coniectura hæc nobis non satis animum explet, tamen multo minus respondebunt, amara Dulcis vocata, aut Bryonia nigra quas suis locis commodius & necessariò aptauimus, notis. Alteram scilicet neutiquam viticeam, sarmentosanve, rugosam, lignosam, rimosam: illam verò communem, ipsam nigram Bryoniam.

CLEMATIS peregrina Cærulea purpurea.

NON absimilis est hæc cærulea peregrina nostrati Flammulæ clematidi, ortu & flexu, porrectuque viticularum atque foliorum habitu: sunt tamen maiora, flaccidiora, firmioribus sarmentis, prolixioribusque anfractibus, Viornæ non disparibus. Flores alias cæruli, alias purpurei, ab illius & multorum foliorum figura situque multum diuersi, expansis quaternis altrinfecus & ex auerso sitis foliis, Pusatillæ effigie & colore, minoribus tamē. Semē & radix Flammulæ. Nuspiam nos vidisse meminimus, nisi in hortorum delitiis: Quin superiore tantum anno Angliæ inquilina fuit, floruitque in Morgani horto: vt malè sit istis bambalionibus rizotomis, qui doctissimo Dodonæo hanc passim viarum & agrorum in Anglia luxuriare persuaferunt.

CLEMATIS altera, vrens, vulgi Flammula.

EClematidum viticearumve generi affinis plantis, nulla est, quæ perinde quadret facie, vel viribus, atque Flammula, plebi sic vocata, quia non secus ac flammeus feruor curti adpressa, vesicas, cruſtas, vlceraque inurat: Quin eius est tenuitatis calor, præter multa quæ vrunt, vt spiritum vridum dum digitis fricantur folia, eminus in nares præsertim iaculetur. Cerebrumque & sensus repente magnoperè percellat, quod experiendo notius, quam gratius nobis fuit, tamen si idcirco ad facultatem noscendam adiumento fuit. Quippe feruor ille non in centro, intimisque terreis partibus, sed in leuioribus extimis, indicium faciunt sues Norbonæ, & alibi, qui hac innoxia, tum viridi, tum siccata, vescuntur etiam æstate, saginarique creduntur mulierculis. Quin & succus, & stillatitius liquor primus, quasi è vino flammeus est. Folia multum colore & leuore Peruincæ Clematidæ præferunt: flores item stellati, sed minores, albidi, & pusillis in medio staminibus, vt in Hypericone. Radix ab vno principio multas spargit fibras Hellebori modo: nescio an etiam purgent, vt de semine prodidit Dioscorides. Est autem subfuluum, vel fuscum, rotundum, compressum, in angustum desinens, copiosum, serie quadam & corolla coniunctum. Norbonæ & Galloprovinciæ sponte & in pratis maritimis humi sparsa, tenera, & humilis visitur, aut foenicis falce cadit, deficitur quippe fulcris, quibus innitatur: etiâque plurima fruticibus & sepibus innixa, aliisque pedamentis, si quæ nacta sit. Belgii & Germani cultiores scita textura huius, Campanicæ lasuræ, & peregrinæ Clematidis cæruleæ, depactas stirpes frondosasque vites porrigunt, ad parietum fornicumque vmbracula, variegato implexu, reticulatoque, tricoloria. Nec enim minus scandit, nec dissimiles vites habet Ialemno: ne tantilla anicularum ratiuncula à Comætatore tanto adducta, quispiam deinceps audeat inficiari veram alteram Clematidem esse hanc, cui prætulit Senensis idem Viornam vix æcrem, nedum vrentem, aut vlcérantem.

LUPULVS SALICTARIVS, Spontanea.

Lupus salictarius & vitis Septentrionalium.

Germania.

STIRPVM aduersaria noua. 277

Ger. Hopffen.
Gal. Houblen.
Ang. Hoppes.

QVAMVIS IN antiquorum monumentis non extet hæc, quam coniectamur, nec asserimus à Plinio dictum Lupulum salictarium: tamen quia in Græcia etiamnum hodie vernaculè *Σκυώβιον* vocari audimus, non abs re hæc saltem de facie Bryoniæ comparamus, nec enim Volubili aut Conuoluulis, vt Commentatori visum est. Cunctis gentibus hæc spontè, ad sepes & margines pratorum humentium educat longa, prolixa sarmenta, hirsuta, tactu aspera, albida, multis clauiculis virgulta & frutices intexentia: fronde multa Bryoniæ squabriorè, aut viti nigræ modo triangula: floribus albidis in oblonga caudata congerie foliaceis, instar glumarum structuli ferie connexarum: semine compresso, pullo, Genistæ, sed minore, contento in illis cellulis, florum membranis, quas colligunt Augusto & Septembri Septentrionales ad Bieram (portionem omnibus familijs consuetâ) parandam, quæ alia longè est à Dioscoridis & veterum Zytho: cui perperam pauca lectionis & peregrinationis quidam Medici, quos sequutus est Commentator, nomen Biere accommodant, & æquè inscitè Anglicæ Ale. Quæ vtravis potio suavis & salubris, tam longè abest à Curmi & Zytho vocata, Dioscoridis nocuis temetis, quàm illa acidula potiuncula plebeculæ vtilissima in Hannonia & Picardia, *Brašin & Bullon*, distat ab aceto: vt tempestiuus alibi excutiemus.

SATIVA Vrbanâ.

MVNIFICA Phronga miserta algidiores regiones, eis largita est hanc quasi vitem alterâ, qua quasi vita quapiam suas potiones animarent, & salubriores efficerent. Quare sedulo colunt hanc vulgò vitem, depactamq; è syluestri Vrbanam fecerunt, iam tot in locis, vt etiam tractus patentissimos vinetorum superent, depactis multis pedamentis & ridicis, quæ tenella clauicula & capreolos fulciant atq; maritèt: hæc autè fulcra, quia saligna vt plurimum essent, ideò fortè salictarium vocarant Lupulum: solo humentiore, lætiore, pinguiore, radicum fibras inserit hodie Germania, superior præsertim, atque Flandri, Anglia & Northmania, vnde vno aut altero anno se porrigunt viticæ propagines multis anfractibus prolixa, post amplexates obuia quæque arborum & arbuistorum, lucosque efficiunt fornicata pulchritudine visendos: quippe lætior multò tota planta culta euadit, florūque thyrsis foliaceis & squammosis adultioribus, semine item multò maiore. Veluti forent viridimia, quo tempore vua, decerpitur, & in saccos coguntur ad Bieræ siue Cereuiæ confectionem. Constat hæc hordeo & boni tritici farina: sed longè alio pacto paratis & subactis, quàm Dioscoridis Zython aut Curmi, quibus ex hordeo in aqua tubefacto, nihil Lupuli additur, cuius tamen permixtio plurimum iuuant neruorum & articulorum imbecillitates: tantū absunt ab improbitate Zythi & Curmi Dioscoridei hæc Cereales potiones. Turiones etiam primulū erumpentes primo Vere, tum sponte nascentes, tum satiuos, plebecula acetarijs indit: Cichorij sapore, non ingratos, calore temperatos.

VITIS VINIFERA, Syluestris spontaneâve Oenanthe Labrusca.

Ger. Welneb.
Bel. royngaert.
Gall. Vigne.
Ang. Vynde.

FRVCTVVM FACILE principem vtilitate, speciositate, & suauitate, dat vitis à vino dicta, eademque originatione *νεκταρ* siue crapula Latinis è Græco manauit, veluti *ἐμπικλος*, aut *ἐμπικλος*, quod *δίνειν* fuit, id est, vinea, aut vinifuda vocabatur.

Aa. j.

Nam

Nam *οἴλος* vinum olim fuit. Eius autem diuerſitates proſequi nullum operæ precium: quando varietatem accipit multiplicem à ſoli cōditione, more, & Solis ab æquatoris inclinatione. Neq; enim Aquilonium cœlum fert, aut certè fructum profert immaturum, ſerotinum, minimum ſuauem.

Spontanea nec culta profundit vires inſana laſciua, & in ſarmentofam, arboreamq; penè ſobolem luxuriat, prolixitate anfractuū, vnde ſterileſcit, aut minores minusq; ſapidas & maturas vuas fert: Qualis in Prouinciæ & Norbonæ maritimis, Gallia Lugdunenſi, Italiæque plurima, ſquallidis agrorum marginibus. Sarmento duriore, cutèq; integitur rimofa & villoſa, Viornæ, aut ſatiuæ vitis modo.

DOMESTICA.

DOMESTICA autem viti, amputatione & interlucatione ſarmentorum præſtatur ne ſuccus ſarmentis & palmitibus impendatur. Eòq; mitiores, maiores, & elegantiores botri ſūt, ſuauiores acini, vberioresq; latice manant. Palmitum decora magis fronde, habitiore, latiore, diuiſura Platani aut Aceris.

CORINTHIA ſive *απνερα vna.*

CORINTHIA quæ vocatur vua, nomen patrium teſtata, effigie nihil planè differt à communi: Sed algidioris cœli impatiens, gracilitate tantum racemorū & exilitate acinorum ſuperatur, qui gygartis carèt, ſuntq; *απνερα*, vt quædam mala Granata arillis vacua. Botri enim, ſiue racemuli ipſi, conflantur acinulis, Piperina aut Sâbucina grana æquâtibus. Ad topiariorum pergulas & fornices deducūtur hodie in Italicis & Pedemontanis hortis vites huius.

ASCLEPIAS *Vicetoxicum.*

QVANDO iſti moroſuli Critici, potius quàm Commentatores, nullum modum carpèdi, immutandi, improbandoque aliena placita, faciunt, noſtrâq; expectatione & æquanimitate abutuntur, exerceamus dehinc nos met conferendis plantis nobis plenè cognitis, cum antiquorum deſcriptionibus: inuitis illis rigidis cenſuris, ad quas ſi vniuerſum opus herbariū ſeucrius exigas, vix cēteſimam quamq; plantam legitimam dicas. Minus verè negant Vicetoxico noſtrati deeſſe Hedera folia, eaque lōgiora: floremq; graueolentem: quos potuit docere vel inſpectio meræ picturæ, quæ folia hederacea præfert: vel Dioſcoridis etiam lectio, qui Periclymenum & Ethiopicum Seſeli Hedera folijs committit: additq; quantitatis dementionem, nempe longam, Periclymeni modo: & idem hic Hedera cea facit, ſed lōgiora. Stirpi aut pictæ, aut chartis affixæ, ſi odorem negāt, fortè aſſentior, ſin florenti in montibus, dicam eſſe illi narem obſeam, aut nunquam virentem viſam. Tametiſi tædet tot repetitionū de odoris incremētis & amiſſione variis in locis & plantis. Infirmum enim argumentū, quādo multa apertiora & potiora ſuppetūt. Quippe Vicetoxico vulgus præſtantiū nomen feciſſe à dote qua aduerſum deleteria pollet, veriſimile: vti & Aſclepias nomine tanti Medici nobilitata propter conſimilè facultatem videtur. Radix porro huius innumeris fermè capillamentis fibrata, caules flexiles, vimineos, leues, ſeſquicubitum prolixos, edit. Folia quidē Hedera rigida, ex atro virentia, ſed aliquātō longiora, & quaſi ſuper nè mucronata: florem exiguum candicantem, odoris grauis, ingrati, quibus ſuccreſcūt ob-lōgæ, teretes, Rhododédri aut Apocyni perſimiles ſiliquæ, ſemen ſubſoluum, Seſami aut Apocyni, lanugine obuolutum cohibentes, Apocyni ritu. Huius radice uſi primū periclitatores, cum aduerſus venena, tum ad vlcera, magnū ſibi & plantæ nomen pepererunt. Neq; poſteri potuerunt poſtea adduci, quin pro Aſclepiade agnoſcerent & vterentur. Siquidem illis etiam natalitijs, nempe montibus aut aridis collibus, præſertim Narbonæ & ad Ligures Taurinos propè fruticat.

*Sitne Dioſco. APOCYNVM, Periploca Græca,
foliis latioribus hederaceis.*

QVOD canes interimeret eſu, & πόνου, voce concifa, quaſi canicidam, dixerunt. Cuius deſcriptioni ſtudioſi poterunt conferre duas non minus raras, quàm elegantes & apprimè quadrantes plantas, quas Patavi iamdiù etiamquè non multis ab hinc annis in Piſano publico vireto videre meminimus, & adhuc dono ſeruamus à Medico longè peritiſſimo Andrea Acroaria Ciſalpino. Earum vtrique nomen Periploca erat. Altera fuit flexilibus ſurculis vimineis, gracilibus, leuibus, pediculos vtrinque habentibus, longiſculos & exiles, in quibus folia Hederacea, molliora, viridantia, læuia, renidentia, & quàm Vicetoxici rotundiora, nonnihil in ſummò acuminata: flores tenues candidi muſcoſi Valerianæ, aut Drabæ inter folia exeruntur: ſuccedentibus Auguſto menſe ſiliquis corniculatis, mucronatis, rectis, Aſclepiadis maioribus, claudentibus ſemen nigrius depreſſum, pappoſa lanugine obductum. Succus ſaueſcit, ingratus, & vti tota planta, viroſus videtur. Hæc ſi cani nex ſit deuorata, Apocynum eſſe (& huius fore antidotum Vicetoxicum) valde probabile eſt. Certum nos exploratumquè habemus iam diù, ſaltem aliis venenis à cane deuoratis antipharmaçū fuiſſe: vti Thoræ Anthora, & Paridiſ herba Pardalianchis, ſunt.

PERIPLOCA ſerpens, anguſtiore Periclymeni folio.

ALTERA verò Periploca repens vocata, prolixioribus & lenioribus viminibus ſerpit, variisquè flexibus arripit & amplectitur obuioſ caudices, Periclymeni modo. Folia vtrinque ex aduerſo bina, Periclymeni potiùs, quàm Hederæ æmula, ſed apice vt Vicetoxicū don. Flores in horto Piſano dudum defluerant, dum inibi ſiliquas intueremur: quæ ſolertiore connexionè mutuis erant coniunctæ quaſi roſtris, vna è floris baſi, ſeu calathò, vtrinque repandæ, ſummis & imis inſertæ mucronibus, Rhododendri quadantenus in morem.

CLYMENO Italorum, ſive Siciliana, non eſt Androſemum.

{ Gallis. Toute ſaine.
{ Ang. Tuſſan,

AMBIGVI animi & ſententiæ in Clymeno videntur fuiſſe antiqui nonnulli celebriores, Galenus, Aegineta, & alii: qui eius hiftoriam & mentionem quaſi nullam, aut incertam, taciti præterièrunt. Ac iam tum Plinii æuò variabat deſcriptio & confuſa ex Clymeno & Periclymeno, alia Græcis, aliaque Latinis erat. Quò minus nobis lubitum fuit prorfus aquaticam Betonicam, eiùſve affinem Scrophulariam, verum Clymenū aſſeuerare, tametſi vtriùſ nec facies ita diſpar, & vires neutiquam ſint appellatione Clymeni indigne. Quippe ſunt hæ non minus vulgatis Chirurgorum præconiis nobilitatæ, atque planta Clymenum, Regis Clymeni cognomine. Verum non minus inclito nomine fuit donanda ea, quam vulgi Gallici conſenſus *Toute ſaine* (quaſi Panaces omnibus remedia ferens affectibus) vocat. Sèpervirens hæc, virgis exit vimineis, ſanguineis, nitentibus, rectis, flexilibus, nonnihil anguloſis, aut ſecundum longitudinem ſtriatis, Periclymeno, ſeu Matrifyluæ concoloribus, & perquàm ſimilibus. Etiamquè folia bina ex interuallis, auerſa, cæſia, ſuperne ſaturato virore, multum ſimilia, niſi quia è geniculis emicant, nec, vti illa, virgis traiciuntur, eoquè puſillis interuallis, binis per eadem ſpatia foliolis, Androſemum referunt: verum non perinde ſanguineum cruorem vel fundunt, vel alinunt affricta chartæ, vti dictū in Androſemo verò: flores lutei nō diſſimiles ſunt, & bacculè primū rubræ, deinde nigre, cruore nitente, purpureo, & ſeminibus minutis, fuſcis, turgidè. Radix foris fuſca, intus alba, lignoſa, fragilis, pedem & ſesquipedem longa: guſtanti reſinoſa, lentoris expers, nec tota planta ingrata, nonnihil gummi Elemni, aut trifoliū odorati ſapit: moderatè aſtringit digerendo, & deſiccatur, pauxilla, aut nulla calfactione. Vulnerariis remediis, Baſſamis, adeoque potionibus & oleis nata, vſu

Aa. ij.

mul.

multò laudatissima & plurima Angliæ syluis, lucis, & nemoribus, præsertim Bristoliæ & Glocestriæ conterminis. Flandris hortensis est tantum, & Androsimum nuncupatur, falsoque proditur foliis cruorē fundere, vel resudare cōpressu sanguineū succum. Patauii etiā in vireto Senatorio alebatur studiose: vbi non nemo ardēlio ambitiosior persuadere frustra nobis conabatur, hanc folius Siciliæ indigenam alunnamque esse: eoque Itali plerique omnes Sicilianam vocitant.

Περικλόμενον. PERICLYMENON.
Offici. Caprifolium, Matersylua, Lilium inter spinas, Volucrum maius.

Germa. Geyssblat vnde speck gilgen.
Belgis. Gheyten bladt ende Geynwickens.
Gallis. Cheure fueille.
Itali. Vinci bosco. Ang. Wood bynde.

AMBIGANT quamdiu volent, qui Matrifylum in dubium reuocant, negantque esse Periclymenon, quia radice non sit rotunda, & crassa: frustra enim inquirunt & exquirunt, quod iamdiu habent: non enim στερόγγυλον εἶχον dixit, siue orbiculatam, vel tuberosam Disc. sed περιφερῆ, id est, rotundam, non angulosam. Quin etiam hodie qui ex Cratæa & Oribasio παχέαν καὶ μακράν, id est, radicem crassam, & longam siffecerunt, aut restituerunt, prorsum anam quamlibet rixandi præciderunt. Videtur autem Apocynis vel Periplocis descriptis congener, & etiamnum Græcis hodiernis περιπλόκωδα vocatur. Cuius duplex obseruatur varietas ex folio. Quod folium Italica & Norbonensi vulgariori furculis sarmentisve, vnum cum sit & continuum, gemini tamen speciem præbet, quasi vmbilico medio traiectum, vt in luteo Centaurio & Tithymallo serrato: eoque Perfoliatum dictum, quasi pertusum, perforatum, aut perfusum, vt Cicero loquitur. Extremis verò flexibus capreolatis, folium acetabuli forma, vel vmbilici circinatum, florum delicias continet, ex purpura niueo candore nitentes, & alicubi luteo aspersas, sensim in longitudinem porrectas, quasi promuscides elephantium, aut lagenulas, floribus fabaceis multum similes, sed fragrantia maiore, & apiculis luteis ornatas. Semine rotundo, coccineo, Bryoniæ, succulento.

PERICLYMENON non-perfoliatum-Septentrionalium.

TSRV autem in Belgio & Anglia frequentius vsitatusque, folium vtrinque ex interual-
lis habet seorsum non continuum, nec sarmento peruium & perfusum, neque cupulo foliæteo erumpentes flores. Alioqui prorsus idem.

ALLOBROGVN Periclymenum alterum, Cornus femina effigie.

SVNT qui fruticem quandam, vel arbusculam in Allobrogū syluosis crescentem, Cornus fœminæ facie, & baccas in pediculis binas testiculorum situ, & nonnihil oblongas, ferentē, Periclymenis iungunt. Cuius acinos Heluetii, vbi plurima hæc, hunden kirschen, id est, cerasa canina vocitant, nec desunt qui eadem Matrifylum autument: quippe folia huic perquam similia, bina, & similiter parū cæsia, aut glauca, binisq; in exilibus petiolis flosculis, oblongis, nec ita absimilibus, sed minoribus; candidis, multa staminea exerentibus. Qualis Belgiæ hortis colebatur à Guil. Dries optimo viro & Pharmacopœo Antuerp. sed suo hæc caudice fulcitur, non (vt altera) indiga adminiculi vllius, & habitu fusaginis fruticat, aut Cornus fœminæ, quatuor quinqueve cubitos alta. Facultatū incerti sumus.

SESELI ÆTHIOPICVN.

QVO T genera Sefeli à Dioscor. recensentur, tot eademque collegimus in Galloprovincia Ma'siliæ circum, atque prope Ceti montem ora Norbonensis maris, non procul Monspellio. Indidemque nonnulli studiosi stirpes quasdam deferendas curarunt Lutetiam, Antuerpiā, adeoque in Italiā, vbi nondum innotuerant vel doctis. Quin ne nunc quidem notasse Senensi Commentatori, in istis postremis Imaginum recensis & mutatis sententiis, magna iniuria facta Pharmacopœorū plebi, videtur, Medicisque ignauis. Et sanè multò maiore suæ dignitatis detrimento, id contigisse magis dolendum, quam
riden-

ridendum moderatis ingenijs. Qui norint non vulgari moderatione & certa prudentia illum quantum licuit lapsibus vno loco tam multis occurrere conatum: Cum enim per opinionem tum fiducia, tum etiam emuncta cognitionis, quam illis de se iamdiu excitarat, licuisset (illi si lubuisset) nō solū picturis mendosis, sed etiā verbis subdolis persuadere, picturis tamē cōtentus fuit, & silentio suæ dignitati consuluit. Si qua tamen vsus est vasfricula inuersiuncula, est illa leuius ferenda: Non enim nouerat aptiores: aut si norat, se tantoperē deceptum fateri, eius dignitatis non erat. Igitur quas potuit, dono puta emendicatas, ideo nec recens animaduersas, aut descriptas, in paginas congeisset eius pictor, perperā quidē illas omnes censitas, sed tamen earum vnam fermē correctam istam, quæ est Sefeli Æthiopici verum: cuius effigiem mutuatus fuit à Dodonæo Medico multum exercitato.

Ea Saxeis illis deuexis Mafsileæ

& maritimis, tum etiā ad Cœ-

ti montis celsi radices, qua in

Lacū vergit, fruticat vberi pro-

uētū Iulio & Augusto valde quā

speciatu elegans, multis proue-

nit virgultis rectis, ligneis, ni-

gricantibus, rigidis, binos ter-

nōsve cubitos altis, in varios sur-

culos diductis, folia crassa, rigi-

da, & leuore viridatā, vt Hede-

ra, figura oblōga, propior Peri-

climeno promētibus. Luculētas

in sūmis gerit umbellas, luteis

florib⁹ anethi, quas semē stipat

fuscum, oblongum, copiosum,

fœniculī maius: non solū semē,

sed etiam vniuersus frutex

gustanti aromatis saporem a-

crem, medicatum, & subamarū,

sed gratum imprimit, suauemq;

odorem spirat à summo ad imā

vsq; radicem, quæ lignosa est.

Eximia vis est huius semen, cu-

ius copiam misimus amicis Ve-

netis & Lugdunensibus ad The-

riacem, quod etiā, vt Dioscori

des innuit Mafsiliēsi multo odo-

ratius & efficacius est. Quod

Sefeli, si vt pictum in Dodonæo, ita viuum in agro vidisset Cōmentator, lubens & volens

suffecisset in locum illius plantæ, cui videtur postposuisse: est enim illa non frutex, sed her-

ba, quam Recentiores Libanotidem Theophrasti prodiderunt, viribus & figura aliena ab

hoc Æthopico, quem fruticem, adeoq; magnum, Dioscoridis correctior codex statuit esse.

CAPPAES.

Ger. Kappren.

Hisp. Alcapparas.

Ang. Kapper.

Gall. Cappres.

FRUTICAT ruri in ora Thyrrhenici maris, Norbonēsi, & Hispanica Capparis vberi pro-

uentu. Eadē hortis iamdiu innotuit, & fœtus priusquā in florem se pandat, aut per-

dat, decerptus, & muria conditus magno semper vsu fuit. Flos ei candidus inest, Rosæ aut

Mali Cotoneæ: & semen in filiqua oblonga ruffum Milij Panici, medicamentis vtile. Ma-

Aa. iij.

iores

iores & minores Emporijs varijs vaneunt, sed minores in prima sunt cōmendatione, sex-
tiſq; plaris emuntur, quā maiores: vulgo namq; habentur meliores, quia palato gra-
tiores parū. Sic palati ſtūdium fallit ingenium, valetudinis diſpendio: nam qui ſapor il-
lis percipitur, aſcititiuſ eſt à muria, vel ab aceto: alioqui vtrq; acerrimi & teterrimi guſtus
eſt, ſeu viridis, ſeu matura. Proindeq; minor, per pauca carnis & ſucci, facilius & penitius
imbuitur conditura, quā maior: quā melioris ſucci & aptioris alendæ carni eſt. Culinæ
proinde error eſt, minores maioribus perferre. Sed hic cōſuetus inoleuit, moſ. Nam, vt ſci-
tè dicebat Philoſophus, nihil magis aduerſatur valetudini, aut Medico, quā bonus co-
quus. Itaq; voluptati coquus emat minores magno precio, frugi œconomus emet (ſi nos
audiat) maiores minoris multò, bonæ tuendæ valetudini. Radices eſſe adulterinas quidam
imperiti Medici ridiculè non minus quiritantur, quā ille qui conquerebatur, perperam
fieri hodie, quòd Santalum citrinum adulteraretur ligno aloë: nam hac radice nihil vulga-
tius aut vilius, etiam in Hiſpania.

κλήματις ἀφροειδὲς VINCA Pervinca, ſive Clematis Daphnoides.

Ang. Perwinckle
Bel. Vincoſte
& macchde
palmen.
Ger. Singruen.
Gal. Peruë che

VIN ſint dictæ omnes κλήματιδες à viticulatorum ſobole ſarmentofa nullus negat:
Iſtā autē vbiuis Germaniæ, Galliæ, & Italiæ, nemoreis, vmbroſiſq; tractibus, & ſentice-
tis, marginibus gaudentem, veram primam Clematidem, tum facies, tum vires iamdiu, &
ſepius compertæ teſtantur: tametiſ pauci meminerint, huic ineſſe quēdam calorem, quo ab-
ſtergat educatq; foetidā mēſtruorū alborum illuuiē: ac rurfum aſtrictione inibi relicta, &
robore parti reſtituto, eandē ſupprimat. Ac mirū ſanè magnū ſit, ſi dūtata corolla ex hac
cōtexta, capiti, aptata ſanguinem ē naribus fluentē ſiſtet, aut inguinis regioni appreſſa, mē-
ſtrua cohibet, abortumq; inhibet, vt author eſt Mathiolus commentator. Cæterū cuiſlibet
hæc nota eſt, fronde laurea ſempervirenti. Ignoſce, colore, magnitudine, & facie Liguſtri, ex
interuallis bina ex aduerſo, in virgis viticulofiſ, flexilibus, virentibus, ſparſis humi, & ca-
ducis, nec obuias plantas irretientibus: numeroſis, guſtu amariſ, nonnihil calidiſ, aſtringē-
tiſ. Flores calyculiſ conſtāt quiniſ, folioliſ Iaſemini, paulò maioris, minus aut nihil odo-
riſ. Fibroſa radice, ſlauyente.

PERVINCA maior.

MAIOREM multò, nec niſi Norbonæ, non modò vmbroſiſ, ſed etiam apriciſ & æſtuo-
ſiſ, oliuetiſ, oriundam meminimus eandem, quæ tamen non niſi lætiore habitu pro-
ceritateq; diſtāt.

ἰζο VISCUM.

Ang. Miſſelto.
Ger. Miſſel.
Gal. Guy.
Ital. Viſchio.

EVOCΕ ἰζο deſlexum Latinis Viſcum ſive gluten, quod optimum ex hac paratur, ſatiſ
conſtat: cuius ſatius fuiſſet poſt Quercus reſenſitam hiſtoriam, quaſi ſoboliſ aut appē-
diciſ meminifſe. Nec tam rarum, quā mirum citra vllas radiceſ paſſim in arborum cau-
dicibus totum vertentē annum, adeoq; Brumali tempore Viſcum Fronde vireſcere noua, quem non
ſua ſeminat arbor, vt canit Maro. Quò minus veriſimile ſit, acinulo illo pallido & pellucido
feri hūc, ſed potiuſ ex ſucco elaboratiore aggeſto, ad corticeſ librōſq; brachiorum exha-
lātē, & vapido, vnde ſit vt alimentum nunquam deſiciat copioſum, nec ſolium deſſuat: &
oriri multa ſeminio nullo, nulli mirantur, qui iſſdem natalibus Polypodium, Dryopterim,
Lychē, & Moſchum prouenire meminerūt. Quercinū autē Viſcū laudatiſſimū eſt, ſed adeò
rarū vt vix milleſimē Quercui inherere cōperiatur. Quin hīc in angliā innumeraſ quercuſ
nobis intuentibuſ, vix vna aut altera comparuit, vbi per pauca & magno ſtudio ſeruatiū in
erat. Cuiſ tamē ſapor, color, & odor, nihil proſuſ variare videntur. Verū non abs re anti-
qui Hyphear ab Ixia & Stelite, (quæ cætero-qui natalibuſ tantūm diſſerre videntur) diſ-
creuēre. Purgat ſanè viſcum quernum, melancholicū & pituitoſum ſuccū, vnde vertigino-
ſiſ cerebriſq; epilepticiſ piamentum quaſi inuentū fuit, & celebratum olim, ceu ſacrum a-
muletum, à Gallorū myſtiſ Druidibuſ, qui ē quercu viſcōq; querno vaticinati fuēre. Nec
minus Chymiſtiſ eiſ qui vocatur Soliſ Aucupium ſeu Illicium expetituſ ſpirituſ: quæ
myſteria prophanis neutiſquam referanda. Quaſi topici medicamenti, nec introſumendi
men-

STIRPVM aduersaria noua. 283

mentionem fecit Dioscorides: vsus tamen, tum potiunculis, tum catapotijs valdè tutus: foris verò exploratè vtilitatis adeò nouimus, vt è penitioribus sinubus collectum pus, trans spatia muscutorum & densas cartilagine eliciat. Est namq; epipasticum nulli secundū, vt quis experiri potest, què iuuabit vires nosce Emplastri vicini, ab Scribonio Largo laudati.

πολυδωντορ. *POLYGONVM maius.*

Ang. White roote, or cely scala. *Bel. Salomons segel.*
Off. Sigillum Salomonis. *Gall. Signet de Salomon.*
Ger. Weiß wurtz. *Ital. Ginochietto.*

NOMINIS argumentū radix, geniculis cōpluribus pyxidatim cōsertis, Rusci modo protuberās, digitū minimū crassitie æquās, innuit: quæ vagatur cespite summo, multum fibrosa, cādore pellucido, marmoreo, Alabastritis radicis aspectu, gustu insuauī dulcedine, subaltringente. Caules emittit rectos, rotundos, cubitales, virides, quos folia ambiunt Lilij conuallij, vel Bisfolij, vel Lauri Alexandrinæ, Ellebori albi modo, liris vel rugis re-ctis venosa: è quorum emissu pedicelli prodeūt: flores Vnedonis, seu Arbuti dicti, ex candore herbidi, Lilij conuallium longiores: quibus excussis, Maio & Iunio, bacce virides, deinde nigre subnascuntur, Corrudæ aut Ligustri.

μυρσίνη ἀγρία *Myrtacantha RVSCVS.*

Murina spina, siue Myrtus sylvestris. *Ital. Pongitopi.*
Ger. Bruosch, aut Meuszdorn. *Gal. Bruc.*
Hisp. Iufbarba, & Gilbarbera. *Ang. Bochers Browme.*

TAMETSI Myrthum humilem, syluestrem, & achleatam vocarunt Ruscum antiqui, quasi eiusdem naturæ, vt figuræ erat prorsum simillimæ: tamen differre inter se indole & natalibus certum est, cum ad Septentrionem populis nulla sponte nascatur Myrthus: Ruscus autem calidis & frigidis peræquè multa scateat, facie folijsq; planè Myrtheis, sed rigidioribus, mucronatisq; supernè, quibus medijs ritu Cocci baphicæ harèt singulis bac-cæ singulæ, ruberrimæ, duriores, maioresq; quàm Asparagi, nucleo ossea planè duritia, vix-q; vlli frangenti ictui cedente. Floribus pusillis, in fruticantibus multa soboles virgis, præduris, bicubitalibus, & tricubitalibus, rectis, striatis, viuacissimis, vt & radices, quæ quàm plurimos annos perennant, succrescente quotānis noua Asparagorum simillima turionū propagine: aromatica, aliquantum amara, viscerum & ductuum sacchari vtitatissima, nec secus ac in officinis Asparagi vsurpari solita, vel Bonifaciæ, cui nō parum similis. Semen etiam miscetur eodem scopo Benedictæ laxatiuæ & Litontribis.

LAVRI ALEXANDRÆ Dioscor. (quæ Theophrasto Ruscifolia

ἐπιφύλλοι καὶ πύλλοι, siue superfolio baccifera, vocatur) cum HIPPO-

GLOSSO siue LIGVLATA discrimen.

ALIAM esse Alexandrinam Laurum ab Hippoglossō, cuius in promptu est de Theo-phrasto & Dioscoride noscē: quippe fructum siue baccam coccineam medijs in folijs harere, nullius ligulæ facta mentione, vterq; asserit: foliaq; molliora, maiora, & albidiora quàm Rusci inesse Lauro huic, Dioscorides subdit, vireq; diuersas reddit, & radicē maio-rem, molliorem, odoratam.

HIPPOGLOSSVM.

AT Hippoglossi siue Linguatæ radix minor, gracilior, breuior: folium tenue, parvū, cui medio quasi cauo aliud foliolum, lingulæ instar, insitum: aculeo rigido, infesto, mucro-natum vtrūque, inter quæ baccula etiā rubra Rusci visitur, suspiciendo naturæ, propter ra-ritatem, opere. Quare versionem Plinianam legenti, satis liquet diuersas esse plantas, le-ctiōemq; Hippoglossi luxatam fuisse. Namq; sic Plinius:

HIPPOGLOSSA folia habet sylvestris Myrthi, concava, spinosa, & in his, seu linguas, folio paruo quasi exente de folijs. Vbi videtur legisse non κομμη, sed κελῆ, id est, non co-mosa, sed caua folia, siue inflexa cuiusmodi planè sūt omnia nostratis Bislinguæ siue Bonifa-cie: hortis iādiu satis notæ, & viribus ad calculū dyfluriāsq; eximijis celebris: præsertim spōte

Aa. iij.

nas-

Ger. zapffliedrant
Sanckblad,
und zungen
blatt.
Bel. Tongen
blatt.
Ang. Double
tonge.

Math. Laurus
Alexan. com-
mentitia.

nascentis, montosis, saxosisq; & asperis, incultis, Genuæ, portus Lunæ, Sauonæ, Nicæ, alijsq; Alpibus sterilibus calidiorum tractuum.
Senēsis noster, qua ingenij est opulētia & liberalitate, vbi cæteri scriptores putarāt descrip-
tionem, nomēclaturamq; geminam esse, duntaxat vnius & eiusdem plantæ, non solum de-
dit, vt par fuit, Bonifaciam pro Hippoglossō, sed insuper duas scitissimè equidem cōmen-
tus fuit. Alteri datis in petiolis longis baccis, quam Sigillum Salomonis meritò suspican-
tur, in illumq; quasi impostorem ignarum debacchantur morosuli isti critici, quòd toties,
totq; annos, cum versarit hæc quisquiliæ, tandem non animaduertit Theophrasto &
Dioscor. Lauro medijs in folijs fructum, non in petiolis inesse: sed illam demptam, quasi
foret à se fictam commentarijs penultimis, commodiorem multò fuisse: quippe cui simi-
lior est ea, quam quidam herbarum peritissimi in hortos colunt, & veram affirmant Alex-
andrinani Laurum.

Cucurbitæ.

Cucumis satiuus esculentus.

Cucumis flexuosus siue Anguinus.

Melo siue Cucumis antiquorum, Dioscor. Melo pepo.

eius varietates.

Citrullus officinarum, Anguria, siue Batecha, semine nigro Auicenna, an

Pepones oblongi, ouales vulgatissimi.

(MELOPEPO)

eiusdem varietates.

Cucurbitæ varietates. { lagenaria maior.
minor.

eiusq; varietates.

Colocynthis.

Cucumis Elaterij sylvestris.

Momordica, Balsamina.

Doronici, quorū nullus est ACONITVM Pardalianches.

Doronici varietates.

Xylon.

Malua.

eius varietates.

Bamia.

Syda Theoph.

Abutylon.

Althea.

Althea arbor.

Alcea.

Alcea Veneta.

Gerania.

Pes Leonis, siue Alchimilla.

Sanicula.

Epipactis.

Ranunculi.

Ranunculus flore albo.

Ranunculus gramineus.

Flammula.

Aconita. { Luteum.

Napelli. { Lycoteronum.

Musca Napelli.

Anthora.

CVCVRBITÆ *Sychia. Succha. Σίχης.*

TANTA est Cucurbitarum, Cucumerum, & Poponum inter se cognatio, vt antiqui Græci & Latini, nedum recentiores, minus accuratè nomenclaturas discreuerint. Euthydemus siquidem in oleraceo libro Syciam Indicam nominat Colocyntidem: puta post Hippocratem: cui vt etiam Theophrasto videtur, quamlibet varietatem & differentiam genericam horum fructuum *σικυδάρι* vox signare, *σίχη* namq; bullire est, vnde *σίχης*, quæ vas, ollam, & pyxidem significat, & sanguisugum vitreum, aut cornu instrumentū: indeq; fortè Latinis Cucurbita, tametsi Varroni à curuando dicta putetur. Aristoteles etiam Sicyas pepones appellat: & Galenus Pepocucumerem. Quare quò facilius percipiantur & discernantur ab inuicem, quæ hodie in vsum culinariū & medicatum venerunt, genera cuncta non incommode *σικυδᾶς*, vel Cucumeres, vocamus: quarum duò summa fastigia sint Cucurbitæ & Melo pepones, varia nomina adepta, propter fructuum, foliorumq; varietatem.

CVCVMERES SATIVI & Esculentī.

German. Cucumerem.
Gallis. Concombre.
Belgis. Concommeren.
Angl. Cucumbres.

NOTISSIMI sunt, tum Meridionalium, tum Septentrionalium hortis Cucumeres, qui & suauissimi esu & frequentissimi, præsertim crudi, aut muria conditi, dum adhuc sunt tenelli, merito habentur. Foliis hispidis, scabris, viridatibus, similibus Brionis, aut Vitis: maioribus, minoribus Bardanæ & Petasitidis: flores ex luteo pallent liliacei, conuiuēt-que noctu, aut marcescunt. Volubilis ritu: reptantibus multis vitibus & clauiculis, proxima quæque implicantibus, fructumq; dant teretem, semipedalē, oblongū, cortice teneriore, maculoso, ex obscuro virore in flauum maturescēte, interdum spinulis molliusculis, asperato, & leuiter secundum longitudinem canaliculato, vel sulcato. semine referto albo, Melonis adēdō simili, vt neutiquam, nisi quia angustius, & pusillo apiculo sub- tus protenso donatus est, discrepet: medulla lactescente, admodum suauis, & multi vsus Officinis, non item Culinis.

CVCVMIS flexuosus; siue ANGVINVS.

RARIOR hic, & nisi in hortis herbariorum infrequens, prorsum simillimus superiori Cucumeri, flagellis, flore, foliis, & clauiculis, fructu autem faciliè discernitur, & agnoscitur, qui incuruā gracilitate anguinum flexum, & longitudinem & crassitiem æquat, vnde nomen: tenera cute, nitore herbido.

MELO vulgi, siue Cucumis Antiquorum, Dioscoridis MELOPEPO.

German. & Belg. { Melonen. } *Gallis & Angli. { Melons. }*

ILLIS affinitate foliorum, florum, & fructus proximus hic, simillimo etiam, vt diximus, semine, incluso tamen in globosum fructum, magisque ventriosum, & secundum longitudinem altioribus liris, & torulis sulcatū. Cortice duriore, nonihil hirsuto, rugoso, pullo, vel cinereo. Carne fulua, sapore & odore mellito, vel saccharato, cuiusmodi in gulæ delitiis crudos suauissimos habet vniuersa Italia, Galloprovincia, Norbonensisque & Vasconica, Gallia, Hispania: esitantur cum pauco sale & pane Iulio & Augusto. Cæteris regionibus ad Boream, vt Francia, Belgio, & Angliæ, ægrè aut insipidiores proueniunt, nec plerumque maturitatem assequuntur, præ imbrium copia, & caloris inopia. Semen etiam vnum officinarum habetur, inter quatuor maiora vocata, primæ commendationis, & frequentioris vsus.

Varietas

Varietas peponum, magnitudinis, coloris, & odoris.

Est quippe species quædam Moschatelina, quæ vix Colocynthidem, aut Aratium superat, odore Moschi, sapore delicatissimo.

Est & altera cortice carnèque alba : sapore etiam perliucundo.

VE I hoc vno argumento quilibet asseruerit Melones nostros, siue vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) domesticum Cucumerem, siue Sicyam satiuam, quia odore eximia fragrantis, & cytonii mali, aut pomorum redolentium, æmulo, restauret vires languidas & reficiat, spiritusque dissipatos reuocet animo lapsis: vt idẽ Dioscorides author est: eoque Melones, quasi Pomosi, meritò vocati fuerunt à recentioribus Græcis, quòd ori ac stomacho cibus sint gratissimus, omnium huius generis.

CITRULLVS *Officinarum, Anguria* } an. *Melopepo.*
siue Batecha Auicenna semine nigro

IMITATVR etiã Citrullus maiore aliquẽ Melonẽ effigie & carne solidiore, fragili: sed sapore vescendoque magis Pepones vulgares refert: vnde Melopeponẽ istũ nomenclatura, vt ancipitis nature, dictũ de vtroque mixta putamus, nèpe Mali, siue Melonis circinnata rotunditate, non tamẽ torulis sulcata, & sapore magis Peponem, quàm Melonis dulcedinẽ melleam referente: quibus etiã, monente Galeno, discernitur à Melone. Semẽ verò vnum è quatuor vocatis maioribus est; maius Melonis, minus Peponis, durior cortice septum, nigro, omnium durissimo: alioqui tota planta similis Peponum plantæ, sed foliis altioribus, laciniis Colocynthidi prioribus. Seritur etiam & manditur caro cocta vel cruda, & plerisque Pedemontis Italiæque hortis enascitur.

σινδόπες πορεις. CVCVMERES *Peponesve oblongi, siue ouales, vulgatissimi.*

HORTORVM ruraliũ nullus Pepone isto notissimo vacat, eosdẽ vocatque cuncta Germania & Anglia Pepones magnos, admodum Meloni, vel Citrullo similes: flexuoso flagellorum, sed proceriore reptatu, foliis latioribus, profunda Citrulli laciniis; diuisura, flore maiore, fructu tereti, oblongo, oui struthii similis, maiore multò, flauo interdum, interdum & albicante cortice obducẽte. Semen Citrullo latius immersum carni luteæ, quæ hyeme super aut subtus camino fumoque arescunt, iisceque tenuis fortis plebecula vescitur.

COMPRESSI *rotundi, Melonis effigie.*

VARIANT verò folio minori minúsque inciso, alioqui simili, nec dispari flore, aut fructu, rotundo, compresso, Melonis effigie, nonnihil itẽ orbiculatim striato. Cortice delicatior, glauco, vel albedo, nitente. Semine albo Citrulli.

Varietas

LATIORES *Clypeiformes.*

NIHI L prorsum dissimilem in ramis & foliis alterum horti alunt fructum latiore, rotundo Galeri specie, aut Clypei vmbilicati, & ambitu rimoso, atque plicis fimbriisque rugoso cortice: delicato & concolori superiori, nec diuersi saporis à superiore. Vtrumque in taleolas scissos, frictosque in sartagine, & farina asperfos, suaues admodum mandunt, in Belgio, Gallia, & alibi.

STRYMOSVS.

PERELEGANS hic & rarus, foliis alioquin ficulneis proximis, fructu Melonem magnum æquante, sed Limunia mala exprimente, tuberosoque cortice, papillatim variegato: speciosa item tricolori strumarum bullatione. Semine non dissimili.

ADMODVM verisimile fit, Zucchæ nomē (sic enim Italicè vocant Cucurbitam deprauatis elementis) *συρία*, aut *συρία* (vtrōq; enim modo scribunt nonnulli Græci) designare: nam *συρία*, vnde etiā ficus Latinis deriuatur, generalissima fuit appellatio Cucurbitarum, Cucumerum, & Melopepopum, vt superius monuimus.

Quare Cucumerinæ familiæ maximæ vocari possunt Cucurbitæ, & commodiore etymo à curuando deduci, quasi curbando, vt loquuntur Vascones & Pyrenæi. Notissima & condituris aptissima, quæ anguina vocatur, omnium maxima, in arcum flexa, ternum seminumq; pedum longitudinis, cute polita, albida ex viridi, testaq; duriore quam arida fuerit. Carne alba, elixa non ingrata. Semine longo, lato, nonnihil quadrato. Folio Cucumeris rotundiore, minore, flore albo, in flexilibus caducisq; humi loris & capreolis, topiarias ridicas & pedamenta implicantibus. Hæc maxima copia in taleolas longas dissectâ, saccharoq; conditam, Lusitani Hispaniq; adferunt venum in Septentrionem, vocantq; Carbafade. Siticulosi & æstu febrili vexatis gratissimæ offulæ sunt.

LAGENARIA.

LAGENARIAM vocamus, vt qua peregrè proficiscentes lagenæ vtuntur, præsertim in Gallijs, Hispanijs & Italia: commodius namq; gestatur vinum quam vitreo aut figlino vase, quæ oneri sunt & facilius franguntur. Semen illi minus quam superioris: folium alioquin, flores, & reliqua non disparia.

Varietas.

LAGENARIA maior.

AB illa tantum differt fructu minore, lagenulamq; concinniore exprimente, eoque; lubentius commodiusq; gestatur itinerantibus, Semine, folio, & flore, delicatiore, non diuerso.

COLOCYNTHIS, sine Cucurbitula amara, Cathartica.

{ Ger. Coloquint Orfflein.

{ Bel. Quint appel.

{ Ang. Coloquintida.

QUIA consimili esset facie, sed multò minor tota, Cucurbitulam & *συρία* siue Cucumerulum vocarunt Hippocrates & Egineta, ducti potius foliorum aspectu, quam planè contrarijs facultatibus, qui bus insigniter pollet: & documento est, sub ijsdem foliorum florūq; lineamentis, cognatarum specierum plerumq; esse perquam dissimiles vires: quæ quò melius innotescant, plantæ ipsæ sunt iuxta se ponendæ, & describendæ, vt frequenti intuenti in eas consuetudine & experiendi, periti earum euadamus. Idcircoq; vti superius semper, sic & hæc nos hunc Cucumerè, & aliū agrestem vocatū, suis gentilibus subdemus. Hanc serūt Herbariæ voluptatis studiosi Vere, in Gallia, Germania, & Angliā, fructūq; decerpunt Septembri, sed subflauum, virentem, virosūq; nec purgationibus perindè aptum, vt ea quæ ex Græcia Hispanijsque deferuntur Poma siue Cucurbitæ, excepto cortice flauescente candidè & fungosè, læuique concretionem, amarore viroso & exuperanti, & horrendo, fauces viscera intestināq; lædente. Ortu & natalitijs humentibus penè Cucumeris satui par, sed folio minore magisque laciniato, ad Citrullum accedēte, luteolis nec diuersis floribus. Semen item simile, sed minus, durius, peneque lignum est, nō tanta virulētia ad purgandū, quam caro ipsa siue medulla: dedimus namque multò maiorem dosim quam medulla, maiore commodo, nullo aut longè minore tumultu.

Satæ Colocynthidis in hortis Batavis, Gallicis, & Italis, vidimus triplicis aut quadruplicis varietatis: fructum nempè pusillæ Cucurbitæ aut Pyri & lagenulæ effigie, ex fusco viridante: cortice nonnihil maculis variegato, reliqua foliorum facie Cucumerem syluestre referente: teterrimi etiam saporis tota hæc est: videturque Sylvestris spontēve nascentis ea species, quam mortem, siue exitium in cacabo, vocabant quæribundi Propheta illi, qui apud

pud Eliseum fame pressi, cum multi degerent, & cibum caperent, iussusque esset quidam incoquere pulmento olera, collectam magnam huius copiam, ratus esse Cucurbitam esculentam, ollæ indidit: Illi verò ut esitare cœperunt, amarorem iustum, quasi mortē detestati sunt: nec porro vorare potuerunt, tū ad Prophetam protinus exclamare, & *Mors*, inquit, *Diuine, est in cacabo, nec possumus vesci*. Vates autem Eliseus miraculis potens, fretusque multis, farina adiecta pulmentum Colocynthidæque; syluestres dulcerauit, edendoque comēdas reddidit: quare oportuit esse amarissimas.

Meminimus etiam exacte sphericas, maximum Arancium aut Citrium, vocatum Adami Pomum, æquiparantes, etiam nonnihil variegato cortice.

Videas & nonnulquam compressæ rotunditatis, subflauī corticis, quarum omnium eadem vires, & dirus amaror.

Sæpissime pusilli, Peponis oblongi effigie, ouum anserinū aut olorum equantes, corticis durioris, ex viridi in atro & cinereo maculati sunt.

CUCUMER Elaterij syl.

Ger. Wilder Cucumer.

Gal. Concombre sauuage.

Ang. Noli me tangere, & Wilde Cucumber.

NOⁿ immeritò Cucumerem agrestem vocarunt hunc, potius quàm Asininum aut syluestre: quia omniū huius generis plātarum, suapte spontē importunòq; admodū prouentu oriatur circa vrbium mœnia, areas, & stabulorum fimeta, in Italia, & Norbonensi, Prouincialiūque Gallia, vbi vel puerulis notissimus, qui fructum turgentem vixdum tactū digitis ludibundi in faciem inuicē elidunt semina, succoque peramaro & viroso os oculòsque perfundunt. Repens & humilis, non topiaria est, tota Cucumeris satui effigie, minoribus folijs, magisque scabris, & crassioribus, cineritijs, ab imo densè fruticantium caulium teneriorum, succulentorum: quibus exeunte estate, post flores luteos, pallescentes, Cucumeruli in pediculis per interualla insunt, pruni instar oblongi, hispidi, cinerei, coloris quādamtenus Papaueris gemmantis glomerulos imitantes. Semine pullo colore, vel cinereo, nigricante, Colocynthidis non dissimili, sed minore: radice crassā, Raphani aut Bryoniæ, aliquid fibrosa. Medulla candida minus quàm fructus, aut folia, ingrata: quæ præsertim Sole siccata, flammis admota, tota deflagrat vrendo. Vnde primū nobis coniectura fuit ex Plinio, monente etiam Præceptore accuratissimi iudicij Rondelletio, ELATERIUM verum ex hac plurima, & pauca ei hærente muccagine medullosa, non ex ipsis Cucumerulis parandum esse. Perquā celebre fuit antiquis Catharticum, ut de Hippocrate & Theophrasto liquet, Elaterium, quasi dicas exagitans turbāsveciens medicamentum: vehementer namque supernè, infernèq; aluū citabat, pusilla dosi, nempe oboli, vel scrupulo, semisse, per se, vel adiecto salis altero tanto, & Stibij, quod colorando satis esset. Probatissimum fuit, læue, non asperum, nec ponderosum, sed album, nec aridum, vel exutum, vehementer amarum, & lucernæ obiectum facile flagrans. Quæ notæ lectori plantarū consulto, non rixandi, sed cognoscendi cupido, facile retegunt planè peruiam huius loci in Theophrasto & Dioscoride salebrofi intellectionem: cum namq; ex Cucumerulis istis succus effluat admodū tenuis, viridis, aqueus, igneq; densatus inæqualis, nigricās, ac obiectus lumini neutiūquam flammam alēs, paucisq; annis mucidus putrisq; futurus, verisimile nobis fuit, vel Theophrasti, vel Dioscoridis Elateriū dici nō posse, tū propter illas omnes iam quos diximus, reprobū inditia, tum quia nec durat, nec flagrat. Quare ipsi superioribus annis cum in Gallia Norbonensi parassetur Dioscoridis & Theophrasti instituto, curasse musq; parādum multis modis: tandē maximā Cucumerulū copiam colligendā curauimus, e quibus super cribro incisis, seminis tuis, & crebrò manibus pressi, medullam siue muccaginem Psilij similē subter cribrum transmissam excepimus, Cucumerulorum eorūdem succo affuso, & aquæ fontanæ nonnihil, quò facilius gluten remitteret trans cribrū: istud partim Soli sub dio expositū nigricans habuimus, partim verò igne aut sub cineribus exsiccatū, albidū, & pullū. Vtrumq; tamen lucernæ admotū acutum flammam dabat & aliebat sua pinguedine: quin etiam, quale nobis adhuc in muscolo longè aridum superest, facilius

lius vret, cuiusmodi nunquam poterit parari ex sola Cucumerulorum aqua, mucosave carne, vt probè norunt qui sæpius periculum fecerunt. Eapropter Plinius videtur ceteris melius & verius ex Theophrasto, aut quopiam alio classico authore, ad Dioscoridis sententiam accessisse; quum ex fructu & semine faciendum censet: nimirum vt obiectum flammæ flagret, quale optimum tradit Dioscorides: quem suum ducem ignauè hic deserit Senensis commentator, & insulsè suggillare videtur, dum contentiosas texit ambages autoritatum farragine. Sanè par est, quo diximus modo, commodius tutiusque purgare, adeoque diutius non putre durare quia acris virulentusque succus medulla pingui feminis retunditur & mitescit, nec perinde (quà oleaginosum pingue) putrescit: *Mitior* etiam vis in semine, & par ratio, quæ in Colocynthide. Radice huius multum vtuntur practici Monspellienses, cuius efficacitatem deprehendas ex vnguento Agrippæ, Ciclamini, & aliis etiam internis, vt Anasarca & Alcite.

BALSAMINA Cucumerina, Punicea.

COGNATA facie Cucumerino generi est peregrinæ venustatis Balsamina vocata Herbariis, qui eam in hortis colunt, vnde voluptatem & vtilitatem capiant ad vulnera glutinanda: dolorisque vlcum prauum humoris mulcendos Balsamo artificioso, ex pomis Charantiis confusis vel oleo bullitis parato, indidemque ipsa tota planta Balsamina & Charantia fortè dicta, propter gratiam elegantis effigiatæ & coloris pomorum, quæ magnitudine & effigie vtrinque in conum fastigiata, medio ventriosa, Limoniū paruum imitantur, sed superficie carneque nitentis purpure phœniceæ: pusillis, & crebribus spinosis bullis, quadantennis Opontii, siue, Ficus Indicæ dictæ. Semine Citrulli, nigro, minore. Folia, sarmenta, facies, & clauiculæ topiariis ornamenti aptissima, Bryoniam & Cucumerem imitantur; sed aspectu hilariore, folioque Vitis altioribus incisuris. Floribus pusillis, minoribus Melonis, ex luteo in pallidum languentibus. Hortis calidiorum regionum adultior multo, & fructu maturiore frequentiorque est.

*DORONICI variis frates, quorum nullus est ACONITVM
PARDALIANCHES.*

MVLTARVM Stirpium (fortè & Pharmacorum) nomen vnum fuit Aconitum: vt cuius succo, vel radice, quasi cote, spicula à venatoribus affricta, & subacta, celerius & subirent & perniciem adferrent. Aptior enim hæc nomenclaturæ interpretatio venit, quam si è cautibus, aut è pago cognomine deducas: tamen si non nescii sumus posse etiam ἀπὸ τῆ ἀκοντίτσει deduci: quemadmodum τοῦ μὲν ἀπὸ τῆ τοῦ βίου, non à Taxo dictum putamus. Sic enim in Cyri Pædia Xenophon: ὅδ' ἔστι γὰρ τοῦ βίου, ὅδ' ἀκοντίτσει ἀποτρέπομεν ἡμᾶς. Non enim, inquit, iaculari, aut in hominem collimare vobis integrum facimus, quippe nefas: ἀλλὰ δὲ, quasi diceret, εὐεργ, feram, puta cernam, aut damam. Cum itaque inter multas lethales, essent compertæ hæc celeritæ & certissimæ internecionis, Theophrasto, Diosco. & aliis proditæ seorsim & distinctæ à cæteris sunt, tamen si minus plenè, aut perspicuè: etenim, qui mos fuit sæculo illi, flores tacuere & alia multa, quæ non viderant, sed fortè legerant: idcirco stirpibus ipsis in aspectum iudiciumque adductis, nobis aliquid certi statuendum. Quales radices in Pharmacariis tabernis proflare vides Doronici nomine, nos non rarò easdem meminimus erutas integra planta in montibus etiamque collibus Pedemontanis. Eæ triplici in differētia sunt, tamen si non ita disita: nonnullis enim Franciæ collibus cæteris minores, minusque fibrosas radices hæc inuenias, nec appendiculis vtrinque, quasi brachiis seu Cancelli forcipiculis donatas, sed crebribus. Est itè duodecim ferme annus, cum quidā Rifotomi Lutetiam indeque Antuerpiam quasdam plantas Doronici iam tum creditas, ex quibusdam Francicis collibus erutas in hortos aduexerunt. Pusillæ erant totæ, caules teneri, folia mollicella, oblonga, vti Plâtagnis: non nihil ex viridi flauentia cōspicue, hirsuta, Pilosellæ modo, vel Cucumeris agrestis, sed attrēctanti læuia, ambitu rotundo, sed

nónihil laciniōso & superne angusto, Cucumeri agresti, quàm Cyclaminis similiore, ter-
na vel, quaterna, pediculis innatis radici exigue, tereti, orbiculatę, sed infernè in angustū
sensim adductę, subtū & transuersis quasi squamularum torulis articulatę, apprimè scor-
pionis cadauerulum & caudicellam exprimenti, plusculis donatę fibris: color candidus,
sapor dulcis, amaricat, & lentorem multum pauxillę coniunctū astrictioni præfert: ses-
qui palmum altus caulis, floribus in summo donatur luteolis, aut pallidis, radiatis, Buph-
thalmi, aut Medię consolidę. Frequens hæc nunc in hortis Belgicis & Anglis, ac
prorsus eadem Doronico vulgatori & minori Pharmacopœis dicto, apud quos cum
aliās sepe, tum præsertim cum hæc meditaremur, inter hæc radices duas alias Doro-
nici differentias obseruabamus. Alteram hac maiorem longioremque multo, pluri-
bus corticeis squamulis, nitentibus, candidis, marmoreis, transuersim cinctam,
cui ala vtrinque apta vna est, Squillę marinę, Cancellive, aut Scorpii forcipulis non
ab similibus, dulcicula gustanti, Folia, floręque, & caulis, maiora paulo & rotundiora. Um-
brosis hæc montibus oblectatur, non solum Alpinis ad Meridiem, sed etiam rigidissi-
mis Anglię ad Septentriones, vbi sibi visam & lectam in Northombrię arduis asse-
ruit nobis amicus multę lectionis & peregrinationis pereruditus Medicus Pennius
Anglus.

*Varietas tertia
Doronici.*

PRIORI propior tertia est, si prorsus eadem sit etiam suffragio Herbariorū, qui ma-
gnitudine duntaxat distare aiunt: nam hic multus collibus nemorosis Taurini &
Allobrogum, tum ruri, tum domi oriundus, est folio hirsutior: flore & radice maior:
caulis sesquicubitalis: alioqui similes inter se sunt; adeo hæ tres, vt Cyperorum ritu
discrepent, magnitudine tantum, situ, & numerosa sobolis propagine. Iam neutiquam
opus sit multa disquisitione ad statuendum, ecquid sit discriminis inter Theophrasti,
Dioscoridis, Plinii, & aliorum, Pardalianchen, Theliphonium, aut Cāmorum: quæ nomi-
na vnus huius plantę diuersa putamus: nec videmus vlla insigni distinctione mere-
ri genericam differentiam: facies enim, sapor, odor, omnibus idem, itemque fermè nata-
les. Sed tamè paulum quid variat Diosc. de radice delineatio, quippe caudę hic, Theo-
phrastus verò cadaueri toti cōfert. Id nō continuò alius generis stirpem astruit: sed ean-
dem brachiorum aut alarum expertē, vt sæpius orbata, quàm eisde donata visitur. Nec
dubium quin mutuatus sit ex Theophrasto, vel vterque de alio quopiam scriptore:
nani quæ de nocumentis & effectionibus prodita essent, vt lecta, non explorata, sub-
dunt. Plinianum non esse idem inficiari eius interest, qui non meminit, pleraque
omnia in Stirpium historia illum accepta ferre Theophrasto. Ecquid loci sit isti com-
mento Pardalianche relictum, dicent consultissimū & stirpium exploratores indefesti I-
talorum doctissimi, qui nullum vsquam sibi visum, vel auditione cognitum pleri-
que omnes nobis asserbant, querebanturque ea spe frustra se lustrasse penè quantum est
Alpium & cautium, nemorum, & montium, perpetuo illo dorso à Lemano Clauenam,
indēq; ad Veronę Baldi; deuexa, nusquam tamen cōparuisse. Nostratis interim Doro-
nici plurimum diuersis locis obuium habuisse: eoque nobis tametsi inuitis suadebant
istum Senensem commentatorem, cui imposuisset hæc leuiuscula, quam supra agno-
uimus, differentia, quasi vnā quampiam nouā & sui generis sanxisse. Indicio ef-
se, quoties curauit recudenda illa commenta, toties variatam Iconem: nec nisi v-
nam misellam, caule floręque mutilam, semel carthę mancipatam, tot vbique gen-
tium vestigatoribus sedulis repertam fuisse, Historiæ fidem item temeratam audacia, vt
qui nullo periculo facto (nec enim potuit) illicò decreuerit Pardalianchen. Quo vero
factu, actu, & palpo magni nominis eruditus inculcet illud, *Palpate & videte*, quoniam
Mathiolus non scribit mendacia, se ridere & mirari: fore tamen iam, vt senior eoque
moderator factus, fateatur se lapsum, lugeatq; Doronici, sibi ignotū antea, quod scelestę
nefas, illi Æsculapio Cortusio primum innotuerit, & per illum mortalium generi sit re-
tectum. Quod maleficium cum nostrę memorię plerisque notum esse sciuissemus, &
Cortusio in hortulo suo Patauī inter colloquendū respondiissemus, id verū quidē esse,
ceterum minime mirum: vt qui experimento certum haberemus, Aloe saluberrima in-
terfici vulpes, easdemque enectas amygdalis amarisex Plutarcho meminissimus, annuit
ille

*Pictum Parda-
lianche somniū.*

ille Italicè cuidam compatri suo Pharmacopœo, qui vulgatum exemplum de nuce vomica subdidit, ea nempe feles, canes, auēsque; interim, quæ tamen tuto & magno commodo aduersus lethifera & Epidimicos morbos in Electuarijs Liberatis, datur homini. Immeritò proinde Doronicum verbo diro dum infame facit, quàm multum sciret, & parum sciret, *Dica Mathioli.* perspicuum facit: Dæmones quippe felices vocari, vel monachi norunt, qui Cacodæmones haud atrociore conuicio incessunt, quàm ille Doronicum è republica Medicorum exigere nititur. Tantillam rem, tam valde vulgatam, captum superasse tanti Commentatoris, stupet vulgus, qui Philomelis, Alaudis, Hirudinibus, alijsque; delicatioribus auiculis non solum nō noceat, sed interdum cibis, sapissimè remedium vnicum & pacherston sit. Quā multis tu Principibus, nos pauperibus, Doronici ignoratione, exitio fuissēmus: quantam stragem plus quingentis abhinc annis dedissent Medici, freti electuarijs de Gemmis & aromatibus & alijs Cordi amicis, quibus frequentissimè vsi sunt, tēque; monere possunt, Doronico ne tantoperè conuiteris, sed potius dosim metiaris: alioqui Croci, Moschi, similitumque dato quaternum drachmarum demensum homini, & comperies Dæmonium tuum. Quin thus etiā, multò quibusdā minore mole, meminimus perniciē attulisse. Tantæ expectationis Commētatoris intererat, saltē hac postrema Commētatorum manu & mole, an Pardaliache eodē necaret modo, quo cætera Aconita, exquirere: quippe si nominis etymō & seriem Symptomatum perpendas, videtur, aut sola (aut certē comite veneno) stragulatione, id patrare: quemadmodum fungi, papposque; excrementa Typhæ & Cannarum, quæ belluis, præsertim siccis & angustis meatibus, nec ruminantibus, si cum esca pauca multum confertim vorant, mortē moliuntur suffocādo. Quin non semel audiuimus venatores affirmātes, se frustra dedisse Napellum, Helleborum, & alia toxica, à feris statim vomitu reiecta: at vbi pauxillū Taxi addidissent, prorsum nullū animal euadere, quippe nauseare, sed euomere nihil. Pereunt igitur partim veneno, partim occluso spiritu, puta ad fauces, tracheam, & diaphragma: plerumque; etiam euomere bilem, mucum, cibum, veneni autē nihil, nisi ob siccitatem, serō aut perparum. Non igitur respuemus nos Doronicum, sed vtemur moderatē: si non vt aromate, saltem liceat nobis vt Theriaca & antidoto quapiam: cuiusmodi instituisse vides in Degemmis Mesue, & aromatū Electuario, celebres Medicos, quos temerē inscitia & sceleris reos facis. Sed hæc fusius paulò mox, in Paride & Napelli muscis, non muribus tuis, quos multi equē catti herbarij, atque; te non minus sagaces, nequicquam venati sunt. Istæ dudum descriptæ radices, à nobis Aconita censita, vt omnes cōgeneres, sic sapore penē eodē sūt, nēpē ignauiore subdulci, & emplastico. Quò magis adducimur, vt credamus Dioscoridis legitimā esse Adonidis, quippe ascēset ille, oculorū scilicet remedijs blandis temperatissime calore & crassi nonnihil, emplastica, pauxilla astrictione, digerēte.

ἐλάου ἢ γοσσίπιον. GOSSIPIVM sine Xylon
Bombax.

Ger. Baumwoll.
Ang. }
Gal. & } Cotton.
Belg. }
Ital. Bombace.

QUEMADMODVM sedulitate Europæorum factum est, vt sericum sit iam valde plebeium & passim emolumentum ex eo multum sentiat, sic Gossipiū priscis fermè ignotum, adeò creuit nostro æuo, vt ex tractibus & insulis Arabicis iam non opus sit petere: multis enim mediterraneis littoribus alitur, & venum inde deuehitur. Vidimus Patavij & Venetijs, aliquot abhinc annis in Trevisani & publico horto fruticantē cubitum altū caulē, aliquot furculis & petiolis cinctū. In quibus folia Alceæ aut Vitis, sed minora, mollia ora, incana: Flores lutei, nonnihil in medio purpurascētes, nukulāsque; relinquunt, aut potius mala exigua, pullo colore, Aristolochiæ rotundæ magnitudine & ritu radiatim hiātia, dūque; maturuerūt bombace referta ambiēte intus, semē terebinthi aut Cubebe oblōgū, copiosū, Bb. ij. medulla

medulla plenū alba, oleaginosa, non insuauī gustu, Pineæ, aut Amygdalarū, præsertim dum recens est. Ex:qua radice, fibrosa, alimenti perboni: pulmonum & thoracis congestam materiam ad excludendum & detergendum apta: hepatis & renibus amica, stomacho haud perinde, aut capiti. Dysentericis etiam opitulari nouimus, eoque; lubenter voluissēmus quōdam hanc Dioscoridis facere Gnaphalium, aut huius speciem, & per descriptionem licebat: mollia namque & incana sunt folia, vsus in tomenta optimus. Verū Theophrasti postea loco moniti, ad illius lanigeras vites referendam agnouimus. Sic enim ille: *Insulam esse Tylem (qualem hodie narrant navigationes) non illam quidem algidam & cymeriam Septentrionalem, in sinu Arabico ad Orientem, feracem arborum, aliarumque multarum stirpium lanatarum, quibus solum inest vitis, sed minus. Et fructu quidem orbem, (intelligit vesco) καίτοι δὲ ὁ δὲ φέρει (legendum εκφέρει) & hic expungendum signum, & porro legendum ἐν τῷ φέρει in quo lanugo. Eundemque; fructum parem esse pomo verno occluso, maturo verò pomo, euelli eximique; lanuginem, qua texunt vestes, partim eximias, partim plebeias. Easdemque; plantas in India & Arabia oriri, vbi etiam easdem Plinius recenset, tametsi foliorum non meminit. Et, qui mos illi vertendi, paulum variat, aut aliunde mutatus fuit: Senensis verò tantus vestigator negat vspiciā factam huius mentionē à Græcis antiquis, nec tamen istum luculentum adduxit locum: alioquin velitationum ex Manardo, Brassauola, Ruellio, & Fuschio importunus merusque; interpolator & proxeneta: sed imposuit illi versio Gazæ, quæ videtur innuere (neglecta disunctione) Xylon arborem esse: atqui ne deinceps risui sit criticis istis, qui illum ne Latine quidem, nedum Græcè scire inciuiliter negant, adeat Græcum codicem Theophrasti, & discet non arbores solum, sed etiam communi nomine stirpes, lanigeras inibi memoratas.*

Apricis maritimis ad Austrum iam multis, prouenit semine: quod suillo aut vaccino stercore triduum macerari olitores Candiotæ asserebant nobis. Sic enim vberius & felicius enasci, nempe celerius emergit, copiosiusque; fert, antevertitque; frigoris tyrannidem, & sequitiā. Sic enim industrii plerique omnes herbarij, etiam minus tepido & commodo cælo plantas vel morosissimas assuefaciunt citò & uberè ferendo.

Sylvestris MALVA vulgaris procerior.

Ger. Pappel.
Bel. Malwe ende keekens cruyt.
Gal. Mauluc.
Ang. Mallow.

CVILIBET genti notius nihil, aut vtilius Malua, appellationem ob præcipuam emolliēdi vim assequuta: Græcè enim μάλαχη est: quam cultu teneriorem & suauiore sapore frugi antiquitas in hortis efficiebat, famemque; ea explebat quotidiano olere, & ventrem mollebat, vt festinè dicit Poeta: *Exoneraturas ventrem mihi villica Maluas Attulit.* Etiam nū hodie primo Vere vnà cum Asparagi pullulationibus plebecula in agro colligit, & esitat eius turiones teneros: nam hortis exulare, iamdiu iussit luxuriam ipsam, & officinis vtendam reliquit quotidiano ad varios morbos præsidio: vbiq; viarum & arearum propè vrbes luxuriat, caulium teneriorum flexili sobole: folijs quàm plurimis, crassiusculis, ambitu nonnihil laciniosis, viridantibus, circinatis, partim & initio, partim & postea angulosis: flores tota æstate particulatim exeunt, colore subpunicante & ex purpureo pallidi: edentes clypeolos aut orbiculos seminum: radice pusilla, longa, digitum æquante, lignosiore.

MALVA Sylvestris.

MINVS copiosa, quæ pusilla visitur Sylvestris, ramulis repens minoribus, propè rudera, & inculta pagorum, minore folio, rotundiore, minutius crenato, radice penè pari superioris, flosculis purpurantibus, albicantibus, vtilitate aut facultate non diuersa.

MALVA arborea Sylvestris.

Eucenit

VENIT huic Maluæ quod Ficilici Sedo Arundini, atq; alijs non paucis plâtis, vt etiâ nô cultæ arboreâ proceritatē, durationē, & ramorū magnitudinē assequatur. Etenim quā meminimus in cœnobio D. Spiritus prope Venetias, & alijs locis maritimis Thyrenæ oræ, nô procul Sauona & Arbenga sponte adultas, Persicam arbusculam æquabat, altitudine & crassitie stipitis, qui ramis sparsis, frondis læuore, virore, inò toto flore, semine, & facie Maluam testabatur: sed crassiore totam & habitiozem, qualem Gallo Belgia, Anglia, & Germaniæ horti hodie colunt, qua driennium, quinquenniumque edurantem, lignosiore prægrandi radice, & solido trunco, duritiæ lignea, senum & octonum cubitorū, facultate non diuersa à Malua vulgari: nec tamen olitorum industria, vt falsò Senensis arbitratur, sed solo natiuo deberi hanc differentiam specificam, è natalibus manifestum sit: nec enim vulgaris Malua studio, aut fortuitò in holeraceis hortis culta, vspiâ visitur arborefcere, aut tot hyemes trunco perennare.

MALVA ROSEA FRUTICOSA, an Galeni

Anadenomalache?

Germa. Ein Rosen vnd herbstroß.
 Belgis. winterroosen,
 Ang. Holy hocke.

QUÆ autem floris Rosæ elegantia & similitudine à Septentrionalibus vocantur winter roosen, id est, hyemales rosæ, vel Maluæ rosæ, videntur ex equo cū Althea istis Maluis cognatæ: quippe foliorū & cauliculorū incana superficie, molliore, mucagineaq; radice Altheam referunt, ambitu verò Ficulneo, aut Maluaceo, & scapo arborefcientem Maluam penè assequuntur, sed Althææ positu & modo oriuntur, quotannis etiâ moriuntur, radice denuò primo Vere sese propagante, culmòsq; edente ternum & quaternū cubitorum: secundum quos serotini prodeunt Augusto flores, magnitudine, effigie, & elegantia tricolori Rosam ipsam prouocâtes. Trifariò enim variat hortis Septentrionalibus flos, qui multiplicior, confertiorq; foliorum serie struiculi euadit, vt plurimum Pæoniæ, pinnicæ saturæ concolor: Sed cæcidus non rarò: interdū dilutè rubet, aut vtrîsq; confusis coloratur. Semen illi etiâ similius, sed grandius, Althææ: cuius loco vtuntur plerique, nec enim etiâ radicū huius dispar facultas ab Althæa, quare esse hæc Galeni Anadenomalachen certius quis affirmet, quàm arboream superius adductam.

ALTHEA IBISCVS.

Germa. Ibsich.
 Gallis. Guimalues.
 Belgis. Witte huenst, & witte Maluæ.
 Ang. Marsh Mallowe.

RIFÆ medicatricæ vel medicæ vocantur Græci hæc, vt quæ sit certissimi & ferè ingentis commodi ad quàm plurimos affectus morbosos: è Syluestrium Maluarum familia, sicuti etiâ monet Dioscorid. esse, cui libet primò intuenti satis ostendunt folia Maluacea, lenia, sed oblongiora, incana, nonnihil tomentacea ad Populneam frondem accedentia: flores albidiores, & semina prorsum sylvestris Maluæ: radice tamen multò habitioze, carnosiore, tota mucagine prægnat, & in multas fibras digiti crassitie diuarcatur, ac pratensibus maritimis lubentius sponte propagatur, nec ferè alibi quàm in afflatu maritimo: idcirco asserunt quidam Pharmacopœi auulsas radices è maritimis, & procul transmotas in hortos in Maluâ vulgarem abire. Medici & exercitatiores Veneti Pharmacopœi, è mucagine radices, ad tenues in pulmones defluxiones, offulas, morsellos vocatos, diuinafculos ex sacharo excoquant, vsque mouendo, ne vrantur, nec enim cuiusvis est, propter lentorem, benè parare.

*ALTHEA arborea Olbia
in Galloprovinc.*

NON fecus atque Malua Arborefcens à vulgari, differt hæc ab Althea cõmuni: sed paucioribus locis, & feruidio: re czlo (quale in maritimis Galloprovinc. ad Olbiam) prouentu tanto fruticat, vt ad sepes constituendas sat fit. Mul to autem solidiore scapo est, quàm Malua arborea, Salignæ quasi concretionis, inque arboream texturam fermè verso: flos item Maluæ vulgaris, aut Altheæ, nec dispar semen: quod in Morgani hortis Londini satum, hac æstate plantam ipsam peperit minus incanam, aut hirsutam, minùsque speciosam: tantum abest vt cultu aut mangonio arboream euassisse quis argutetur: perdurat etiam hic in Septentrione aliquot hyemes, nisi solito sint seuiore.



Althea palustris, Cytini flore, Aristolochia vtriculo, SIDA Theophrasti putatur.

RARIORE & perelegans Maluacea hæc, Altheis generica habenda certè est, eademque non abs re à quibusdam doctissimis SIDA Theop existimata, cui quidè, vt si quæ alia, exactè æquiparatur. Nam SIDA Græcis dicta fuit à flore Balustio concolori, nec absimili, qualem venustum imprimis ostendit hæc planta, florere solita in locis riguis, lacustribus agri Ferrariensis, inter Patauium & Eridanum flumen. Radix hortensis Maluæ: caulis cubitorum duorum. Folia Altheæ, sed oblongiora, laciniis acutioribus. Flos illi purpureus, saturior Peoniæ, aut Maluæ satiuæ, aut Cytini: iuxta & in summis cauliculis visuntur tempore vindemiarum vtricoli rotundi, oblongi, phæo vel pullo colore, Aristolochiæ effigie, pregnantes semine Smirni, aut Milii colore & magnitudine.



LVTEIS floribus Althea, an Theoph. Ibiscus, & Anicenna Abutilon?

*Senensis videtur
foliaceæ Ab-
tuli inuolucrum
Sida appinxisse,
& Abutilon pu-
tasse Icon 926.*

NEC huius quidem vlla apud Dioscorid. mentio, cum tamen plurima occurrat in humetibus viarum marginibus, præsertim propè Ferrariam Bononiâ redeunti: flos- culis Iunio & Iulio luteis, Potetillæ aut Altheæ Venetæ, per Augustum & Septembrem se- mina relinquentibus, parua, nigricantia, conclusa præsepilis pilosis, membraneis, acero- sis

sis radiatim sese pendentibus : radice Maluacea, foliisque Altheæ, sed longiore, leniore; flaccidiore, supernèque acutiore; vt Sidæ: nec gustanti ab vtrauis diuersa, nisi quod non adeo est glutinosa. Quare cum nullam sciamus in Maluaceo cœsu flore luteo, præter hanc, æquè tuto Ibisum, vel Altheam Theophrasti profitemur, atque Altheæ speciem.

EXOTICA Maluacea, Bamia Eben quibusdam.

IAM DIU est quum rarissimam hanc primùm Veronæ in vrceis pensilibus vidimus: posteaquæ Monspellii seimus, & virentem habuimus anno 1565. in horto Regii professoris perquam eruditi Iuberti. Et tamen si facie sit Maluæ, sed arboreæ nondum adultæ; nempe folio crassiore, rotundiore, minúsque sinuato, & magis ad Sidam accedente, tamẽ incertum nobis adhuc, sitne Maluaceo generi accensenda: florem quidem nullum prompsit illic, & hyeme prima sæuiente perit nobis: Semẽ autem à nobis terræ mādatur, allatum fuerat Alexandria aut Barutho, Maluæ & Altheæ dissimile, teres, rotundum, pullum; Erui aut Orobi par: fortuita quadã ex Arabistis codicibus, vt videtur, cōiectura remotiore, quidam Bamian Eben diuinarunt, quæ species Maluæ videtur.

VVLGARIS ALCEA.

QVASI ceteris robustior & efficacior foret, videtur antiquitas hanc etiam syluestre Maluam ista appellatione insigniuisse: ἀλκή siquidem robur, præsidium, & remedium Græcis est: multo autem notissima hæc ruri vbique: prodit quidem facie Maluæ, ortu, & cauliculis, sed altius incis, quinque partitis foliis, qualia sunt Maluæ vetustiori, pusillæ, aut Geranio, è radice prorsum Maluæ, & virgultis seiquicubitalibus, numerosis, semẽ rotundum, orbiculatũ, compressum edentibus, post florem copiosum; sed particulatim florentium, vtrũq; item Maluæ, calidis pariter & Septétrionalibus familiaris: plurima in Anglia, prope Couentriã urbem: magis digerit, muccæginis minus dat, quàm Malua aut Bis-malua.

FRUTICOSIOR Alcea Pentaphylli folio.

PERMULTI Herbarii habent hanc, prolixioribus magisq; vimineis furculis fruticantem, diuisura altiore, quinaria, & crenulis exiguis, planè rubrũ Pétaphyllum, aut canabina folia exprimētibus; purpuratẽ flore: nullatenus dissimilis superioribus tota herba, qualem meminimus ætate superiore in hortis videre.

PEREGRINA Alcea Solisequa, an Theophrasti Malua?

QVAMNIS quidam hanc Italicam & Venetam dicant, tamen nuspiã meminimus in Italia, nedum Veneriis, nisi in hortis vidiſſe, & multo plurem Herbarii Septétrionales habet, quàm Itali. Emicat in summis sesquipedalibus lentis virgultis peruenuſti flores, aliquotq; foliolis constant, foris albidis, medio & intus purpurantibus, Abutili effigie & folliculo, è medio florum emergentẽ croceum cuneolum, teretem, oblongiusculum ocululentes, nisi quando Sol ferè meridianus celi nostrum verticẽ scandit, tunc enim, quasi sideris iubari inhiantes, se pandunt, vnaquẽ aut altera horula post; illius veluti digressu & desiderio mœsti, marcescunt & occluduntur, vnde quis Theophr. suspicetur Maluam esse Horariam, quam Columella Molochen videtur intellexisse illo versu: *Et Moloche pro-no sequitur quæ vertice Solem*. Radix exigua, tenera, folia ab imo terna quinãve, Pentaphylli aut Papaueris Rheadis vel Alceæ: flexilibus cauliculis, hirsutis: flores Maluæ vel Anemones; Capita numerosa, secundum caulium longitudinem, lanuginosa, mollicella, strigata, membranosa, hirsuta, operculo tenui, radiato, clypei forma, obducto; vbi semen nigrum, Nigellæ ferè. Admodum rudis est Cōmentator, qui Rutæ folia huic esse contendit, oculis reclamantibus ceteris notis, & viris doctis monentibus ac negantibus, quibus feroculus insultat. Et quod deterius est, sibi nobisque discendi auidis, imponit, dum huic vires Opii asserit: nam gustanti potius insipidum quiddam & ignauum linguæ relinquit,

An Argemone
altera Ensis

B b. iij,

ab

ab Opio prorsus alienum amarore horrido: qui explorarunt gustu, humidum tantum & calidum secundo ordine, facile dicent.

GERANIVM Robertianum. Syderiti Achilleadon, aut congener.

ROSTRATI capitis Gruini cum praeferrent effigie cuncte huius familiae rostrata femina, nomen obtinuerunt Geranii: quorum non valde peruia sunt, quae duo memoriae prodidit Dioscorides, multis Europae regionibus, ubi nihilominus ubertim tres quatuorve luxuriant differentiae, eidem & plerisque priscis indictae, fortè nec isto nomine cognitae: nam etiam si inutiles putassent, non tamen tacuissent, cum hic alteram describat & dicat *αχελύς*, id est, nutilem suo tempore, hodie tamen utilissimam. Eapropter operae precium noster conatus faciet, si perspicuas omnes fecerit, atque cum inter se, tum etiam ab aliis, nempe Anemonibus ranunculis & Napellis distinxerit, ne deinceps tyroni imponat, nèue negotium face scat multiplex concors & hallucinatrix paritas.

Quocunque aciem verteris multis in ruderibus, parietinis, & imbricamentis, vel fugundis tectorum, denique segetibus & aruis videre est, tres notiores differentias herbu le Robertianae vocatæ, summo cespite virentis, cauliculis gracilibus, sparsis, multis, retrò deflexis humi, hirsutis, purpurascensibus vel xerampelino vel phoeniceo nitentibus, singula teneriuscula ferme folia educantibus, Pentaphily, Arthemisæ, & Ranunculi diuisura, sed profundiore: complures flores quinis item foliolis in summo constant, purpurei, circinnati, qui defluentes rostratos mucrones, aut acus, è latiori basi & rectum desinètes, relinquunt, ubi semen pusillum. Sapor non ingratus, astringens; vulneribus perefficax; odor teter & vehementior; notissima & utilissima: radix ex flauo viret.

Hæc duabus adhuc differentiis donatur: quarum altera floribus maioribus visitur, foliorumque altioribus incisuris, cætero simillima. Tertia itè Robertiana pluribus, cauliculis, teneris, nonnihil hirsutis, reliquaque similis: duntaxat radice dissidet sanguineo prorsum foris & intus colore, longiuscula, flore item roseo colore & ambitu. Est hæc tertia, quam Achilleam vocat Dioscorides sub eodè Syderitidis ambitu, tum quia descriptioni quadrat, tum quia præstat planè ea quæ eidè Diosc. reddit, eoque *Blutwurtz* Germani vocant.

PES Columbinus, seu Dioscoridis alterum Geranium.

RECENTIOR atas istud perutile agnoscit, & pedem Columbinum vocauit, ut cuius folia circinnata Alchymillæ vel Saniculæ similia, senis octonive incisuris laciniata, flaccida: singula in exili caule appensa, similibus flosculis Anagallidis minoribus, purpura dilutiore, è quibus caliculi seorsim seminula oblonga cohibent, & acus exerunt prætenues, fuscas, & nitentes. Balneis percommodæ asserunt practici (tamen si Dioscor. sua memoria inutile) & ad intestinorum tormina utilissimam scimus. Cultis & incultis passim inodorum.

MYRRHIDA Plinii, Rostrum Ciconiæ, seu Acus Moschata
Officinarum, & Pastoris.

{ Germa. Storckenschnädel.
{ Gallis. Bec de Cigogne. { Ang. Storckes bill.
{ Belgi. Dycuares beck. { Hispa. Pico de Cigüña.

PAVLominus obuia ista, cauliculis itè gracilibus, copulibus, è radice exigua subpurpureis & hirsutis, præsertim adultis, è caule medio apice tenus foliis enascentibus Myrrhidis aut Cicutæ, positu Tanacetii, in plumam tarsumve deductis: in summo flosculi superioris, qui caliculos in suis petiolis relinquunt foras intròque reflexos, collum ciconiæ effigiantes, stylumque protendentes exile, tenuem, & longum, unde nomen, & acum Moschatam vulgus etiam dixit, ab odore suauis Cicutariæ veræ aut Myrrhi.

BATRACHIODES, siue magnum caruleum odoratum
Gratia Dei.

FAM speciosius istud & calidos tractus euitans, amantius multò frigidiorum, pratis & glareosis etiam lumis vel senticetis Angliæ lasciuit, floribus cæruleis, aut violaceis, Anemone magnitudine, conspicua: Folia rotunda, fissa, peramplis multisq; diuisuris, Ranunculi aut Aconiti viridantia, & interdum maculosa, è iuncis ramulis apta, glabris, pluribus ab vno caulium internodio ortis, qui copiosi à radice propagantur, & variè inclinantur: prorsum horumq; procumbunt cauliculi: è pediculis ambiunt verulos crassiores cuspidè: ve tridentales, aduncas, breuiores quàm superiorū, apicibus dehiscentes, nonnihil inflexas, cum iam præ ætate maridi nutant deorsum flores: gustanti ficci, nonnihilque astringentes, minus amari: odor quiddam Rosæ Moschatæ non ab simile resipientes, cuiusmodi inest Acui Moschatæ Dioscoridi indicat. Sed vulgus iam Plinij æuo Myrrhida vocabat, vti dictum: adeò efficax comperta vulneribus est, vt **God** signat Germanis, Deive gratiam nomen inuenerit.

BVLBOSVM Dioscoridis *primum*.

DI V est cum quidam Pharmacopæus Oenoponti, nobis istud Geranium pro Anemone venditabat: verum animaduersis postea rostellis, quæ huic toti speciei peruia sunt, facile calculum reduximus, & radicem pallidam, subliuidam, rotundam, sapore insipido, insulso, vel vesco animaduertimus, in petiolis prælongis, folia ab vno centro quinq; partita, & diuisura Geranij Robertiani donata. Flores non ita intensè purpurei fuerunt: no. primū Dioscoridis Geranij agnoscimus, tametsi nullum periculum illius fecimus. Rarò enim in Italia & Gallia obuius nobis fuit.

GERANIVM *μαλακοειδές*.

AP V D clarissimū, ni labat memoria, Cæsarem Odonè Bononiæ istud vidimus, etiamq; Florentiæ Thomas Transylvanus summæ spectationis Iuuenis, in quopiam vireto nò procul ab vrbs pomærijs nobis cōmonstrabat, priusquàm luculentū prouetum nacti essemus ad Monspellij moenia, porta Egidia, & via qua ad arā, dirutumq; fanū itur, in colle amœnissimo, nec non via qua itur Mospellio Besiers, 3. aut 4. ab vrbe lapide. Mollicella tota, cauliculis & folijs, Maluæ instar humi fufis, sed longioribus, ex viridi pallentibus: flores minores, albicantèsq; purpura, acus, verulive Venerei pectinis, sed breuiores: Radix cuiusmodi Fumi terræ. Senensis Commētatoris arguere videtur (vt non pauca aliæ) hæc planta supinam securitatem, quippe quam paulò superius titubans in hortis sibi visam, & Mordicam herbarijs quibusdam nuncupatam dicit: eandem postea rerum incertus, quasi alterius generis plāta foret, vt Calciolarij donū, describere & appingit. Sed fraudi illi fuit, nolens tamen, ille qui à Sequino acceptā illam, quæ magis albida & tomentosa erat, misit, nec nouerat eam ipsam esse quæ Bononiæ hortis lata, magis glabra & minus cādida cernitur.

SANICVLA & *Diapensia*.

Ger.
Bel. & } **Sanikel & Sanicle.**
Ang. }
Gall. Senicle.

APotiore Medici munere, sanandi nempè, nomen factum Sanicula: Sanat quippe potu vulnera, & prærogatiua quapiam interiorum excrementorum commotionem inhibet, sistitq; ne in partes imbecilliores corriuentur, corruantq;. Hæc Septentrionalium & motanarum regionum, Syluofarumq; vdarum amantior, quàm calidiorum, Copiosissima & notissima Anglis & Germanis. Folio quina diuisura altiore, & apprimè compto, crenatura fimbriata, Geranij columbini modo, rotundo, virète, & ex atro polito lænore, nūmque rosa, singula è singulis purpurascens quafi pediculis, ab ima radice multum fibrosa, El-lebori nigri aut Epipactidis, foris nigra, intus alba: è qua caules cubitum aut pedem alti folia superant, glabri, teneri, graciles: flores albos quafi ymbella collectos: semine hirsuto, aspero, & mordaci lanugine, Iunio Iulio etiam in hortis chirurgorum & muliercularum Belgarum floret.

AL.

ALCHIMILLA, Stellaria, & Leontopodium
recentiorum, non Dioscoridis.

Ger. Synnaum, Lewenfusz, vud grof; Sanitel. Ang. Ladies mantell.
Belg. Synanwe, onser vrouwenmantel. Gall. Pied de Lion.

VMBROSA etiam montosa & rigua editiora hæc amans, celebre Alchymistarum præconijs nomen indepta videtur, & Germanis Chirurgis, qui hanc multum vsurpant, Maior sanicula vocatur: nec abs re sanè, est enim admodum affinis viribus & facie, haud ita folia dissimilia, latiora tamen, & multò minus altè incisa, rotunda, angulosa, Maluæ, sed virentia, polita, senis pluribûsve angulis, quasi plicis donata, & antequam erumpant, vnà facta & conuoluta, argutis crenulis fimbriata: interq; hirsuti cauliculi exeruntur, sesquipalmum & pedem alti, albi, rotundi, quibus stellati, luteoli flosculi, vel herbidi, racematim congeruntur: & in tuniculis herbidis semen exile Portulacæ vel Papaueris: radice crassa, fibrosa, foris nigra, minûsq; calida quàm Sanicula, sed admodum sicca & astringens, vulneribus, si inflammationis suspicio adfit, admodum oportuna.

ALPINA Eleborine Sanicula, & Elebori nigro facie.

DE Eleborine aut Epipactide, multa lectorè monuimus in albi Ellebori calce pag. 131: istam verò, vtpote Saniculæ & Ranunculis propiorè huc adduximus, iisdem quippe motosis, vmbrosis, sed celsioribus & Alpini oblectatur: è radice fibrillis vno nexu appensis donata, erigit pedicellos teneros, glabros, flexiles, in quibus summis folia quinquepartita, diuisa, & parum crenata, Geranij Columbini aut Saniculæ diuisura insit: Floribus radiatis, foliolis senis, gustu non ingrato, sed acriore, Ellebori nigri radice: quare nonnulli voluerunt Elleborum nigrum esse. In vallis Ostensis saltibus, non procul à Iouis monte, aliquot plantas collectas seruamus.

Βατράχιον. RANUNCULI.

Ger. Zanenfuß.
Bel. Zanenboet.
Gall. Balliuet & Grenouille.
Ang. Crofoote.

QVIUSDAM è Geranij non parùm similes sunt Ranunculi, quos cognomines Ranis fecerunt, quia iisdem lacustribus oblectarentur, & floribus vt plurimùm ranatis, vt loquuntur Græci, id est, luteis herbido permixtis, insignirentur, vnde facilis cognitu fuit semper planta. Eius autem multò plures differētias & varietates quàm Dios. notauit posteritas. Et vulgatissima quidem est vbiq; pratensis à Brabantis ritè *Dotterblom* vocata, vt qua tenera floribûsq; onusta multū pastæ vaccæ, quæ ad mulctrà veniunt vberius lac dant: idq; colore pallèsaute subluteû, odore primæ bonitatis & notæ: folia initio rotunda, in ambitu Geranij columbini, deinde incisura Coriandri, maculis paucis, fuscis conspersa aut ferrugineis. Flores *Dotterblom* Calthæ palustris fulgent nitore: foliolis concatis, peluim pusillam effigiantibus, aurei. Semen in racemosa, siue Adonidis simili cogerie, grumosa, minus vrente gustu, nec insuaui odore, quem etiam lacti impertire creditur: pascuntur enim hæc præ cæteris armenta, quia gratior & pratis pinguioribus vsque cunctis copiosissima.

PRATENSIS Ranunculi varietas.

EVNDEM fere videas iisdemq; penè pratensibus & germinosis vdis marginibus hunc, sed minorem totum, folio altius & minutius diuiso, Coriandrinis simili, & in cauliculis pedalis summis multò tenuius inciso, flore aureo & capitulis congerie non diuersis.

POLYANTHEMOS, multiflorus, siue
Holeraceus.

Hunc

ET hunc putet quispiam duntaxat superioris varietatem, sed florum foeturā perelegā-
tē & multiplicē sortitū cultu hortensi : vnde Polyanthemum Plinianum arbitran-
tur recentiores. Nec sanē non alius videtur à vulgari pratensi, nisi quatenus cultu mitior
& tenerior factus, quibusdā in holere manditur. Angli horti quendam habitu rotundio-
re Geranii folio habēt, florēsq; duplō maiores, & sēpē geminos, nēpē inferius medio ferē;
caules, latiores, quos medios transadigit cauliculus, alterum in summo minorem florem
ostentans, amœno in hortorum deliciis spectaculo.

BVLBOSVS Ranunculus, hirsuto muricato semine.

NEc infrequens hic, sed amantior multō satorum, aut fabuletorum, quā denfi cōni-
pactique soli pratensis: folio paucioribus, sed altioribus incisuris, superioris Ranun-
culi simili, sed seminis inuolucro villis asperiusculo, lapposo & tantillum echinato, Xan-
thii aut Caucliadis modo, radice bulbosi Geranii, subtus fibrosæ.

PALVSTRIS rotundiore folio, semine Echinato, estne Apium Rissus?

IN nullam magis quadrat Ranunculi nomen, quā in hanc, vtpote ranis conuicticem,
& aquarum potricem, quasi refocillationis & frigidioris egeret alimenti: quia omnium
Ranunculorū habetur calidissima, eōq; Apium Sardonium Discori, putatur. Et certē ra-
rius quidem, sed tamen alicubi in montosi strigosiq; agri lacustribus visitur, foliis al-
bentibus, nonnihil pilosis, Aceris, aut Pampini penē diuisura. Plurimū tamē est videre
vulgaris vbiq; torpentii, aut pigrē labētii aquarum, folia sublustri virore nitentia, Smir-
nii, aut Paludapii, quē idcirco ex Dioscoride nonnullis persuaserunt esse Apium Rissus,
nobis neutiquam inficiantibus, sed hærentibus aliquantū, propter caulem huius, qui
vix superiores æquat: est hæc aureo flore & semine superioris, cæteroquin acrimonia
ructis excitandis, & hemoroidibus referandis, si in Oleo Violaceo maceretur, aptissima,
propterea dicta Homeroidum Herba.

Flammeni RANUNCVLVS, aquatilis, angustifolius, Tاراconis effigie.

PER QVAM familiaris hic riualis & propter steriles tractus segnius fluentibus Belgii,
Franciæ & Angliæ, non perinde calidis tractibus, quasi frigidiusculo succo & aëre gau-
deret, quia feruidissimus: enecat quippe edendo pecora, & ideo arcent sedulō pecus o-
pilliones, ne eo vorato inflāmentur præcordia, indidēmq; moriantur, vt videre est in ba-
lantum extis, quæ huius pabulo ambusta fuerant: & summi floris quidem calyculi aurei
lucentes Ranunculi sunt: folia tamen angusta, oblonga, carnosa, nitentia, Lyfimachiz
rubræ paria, ambitu aliquantum serrata, in rubellis geniculatis rectis pedem ac cubitum
altis, caulibus concavis, capillata radice, albida.

*Pumilis RANUNCVLVS, gramineis foliis
& geniculatus.*

PARVM obuius hic, duntaxat Norbonæ pratensibus
ponē publicū diuerforiū monti Lupi, & in arduis Min-
deni Ruthenorum pascuis nobis repertus: aspectu latio-
re, & flore quidem, radice, ac semine racemoso, prorsum
Pratensis: verū folia pauciora habet, & adeo exilia, vt
vix nisi floreant, à gramine dignoscas, præsertim locis il-
lis strigosis, vbi caulis palmum & sesquipalmum non ex-
cedit.



NEMO.

Nemorosus RANUNCVLVS, flore albo, stellato & luteo.

VI x nisi syluosis, aut frigidiusculis & montosis reperire est pusillos istos Ranunculos, primo Vere florentes, luteos interdum, saepius candidos: foliis stellatim dehiscentibus, caule palmum alto, folio, diuisura Napelli aut Anthore, plerumque vno, nec pluribus, radice Filiculæ, siue Polypodii, minore tamen, nec impressis cotyledonibus,

*MINIMVS RANUNCVLVS Septentrionalium,
herbido muscoso flore.*

VN A cum Ranunculis istis & Vnifolio, in iisdem syluosis & vmbrosis, frigidiusculis Angliæ, Belgii, & Northmanniæ, non semel reperimus quandam tenellam, petiolis gracilibus, viridantibus, flexilibus, palmariis, folia laciniosa fulcientibus, perquam similia Fumariæ Plinianæ, vel superioris Ranunculi syluosi; sed nientia, ex pallore virentia; in cauliculo pariter Fumariæ, seminum glomerulus apiculis aliquantum verrucosis compactus visitur, etiam radice aliquantum asperata, squammosis grumulis, candida, pellucida; sapore Geranii Robertiani, non ingrato.



ACONITVM Batrachoides, an sit Diosco. albo flore Ranunculus?

FA C I T arctissima Ranunculorum

Aconitis similitudo, vt vtri sint referenda quædam plantæ, alioqui apprimè nobis notæ, nesciamus: E quibus est vna hæc in montibus Veganiis Norbonæ, Aruerniæ & Sabaudiæ satis frequens, iuxta Cacalia, & in mediis riuulis in Maio prominentibus ramulis, caulis sesquicubitalis & bicubitalis, flores candidi, delicatiores, Ranunculi effigie, seminum capitulo non absimili. Folia singula, quinquepartita è pediculo, incisa Aconiti, Ranunculi, aut Saniculæ diuisura, ambitu parū ferrata, pallentia. Radix cauo cauli subest, in multas maiusculas fibras disparata; acris vt Ranunculus.

*RANUNCVLVS
quartus
Mathiol.*

Quem quartum non Mathiolus describit, sed eius pictor ostendit, totus est facie Napelli; montibus celsis, sed vdis oritur. Radice Hellebori nigri, floribus albis, Ranunculo maioribus: caule sesquicubitali, foliis diuisura Napelli.



*BVLBOSVS vnifolius aut Bifolius Batrachoides,
Elleboracea herbula.*

FN S O L E N T I O R E effigie, hanc Venetiis in mercatu holitorio primum à mulierculis herbilegis emimus, posteaque Patauio vicinis collibus, vbi viperæ capiuntur, e-

an-

eandem euulsumus. Recto, vno, gracili caule surrectam, palmari & sesquipalmari, in medio quasi centro, singulum item folium (aut non plura duobus) fulciento, quod multis & altis incisuris radiatim diuisum Aconiti foliū refert, cuius in medio, quasi vmbilico, flos vnus, herbaceus, pallensq; Aprili & Maio visitur, Hellebori prorsum: siliquosumq; semen relinquitur, etiam stellatum, & effigie Hellebori: radices bulbillus, quantus Fumariæ Plinij, admodum acris gustanti, etiamnum nouem abhinc annis erutus.



ANTHORA seu αντι φθορα.

ISDEM prorsum natalibus, nempe Rheticis atq; Sabaudicis alpibus, emicat æstate Anthora, quam quodam prouidentia munere aduersum Thoræ pernecabile virus compatatam rentur Taurini Ligures, & Lemani accola, quorum opera plurima radicum copia cœpta Venetias adferri plusculis abhinc annis. Agrytis plurimi sit, ad omnium venenorum amolienda nocumenta, dum plebeculam panagyrice declamatiunculis excitam præstigijs illis oblectant & illudunt: etiam purgationi apta est, educit namq; mucosos ferrososq; humores & putredinem corrigit aut exugit, lumbricisq; exactis, materiam futuris præscindit. Amarorem auersatur plebecula illic, aitq; si quidpiâ peramarū gustarit amarior esse Anthora, id est vernaculè *L' Anthoro*: tametsi scimus etiam alijs eos hanc nomenclaturā indere. Quam Thoro paulo altior caulis huic, rotundus, striatus, alterno foliorū ab imo summo tenus exortu, singulari, multiplici, folio altè & tenuiter inciso, quadantenus Delphini, Nigellæ aut Napelli: cuius floribus similes, sed luteos, minores, cuculatos, & rictu hiantes, habet galericulos, geminas radices Cypeti aut Orchis, foris rugosas, solidas, fulco colore, intus albas.

ACONITVM Luteum Ponticum, Lupicida, Canicida.

ALIA & natura & facies alterius summi Aconiti generis, cuius differētiæ plures quàm recensuerit Dioscorides nostrum nouit æuum, tametsi ambigua mediæuæ naturæ inter Ranunculos, Helleboros atq; Napellos videatur earum nonnullæ. Ponēda ex primū quorum vires certiores, exploratiōesq; euentu representant facies, vt quæ folijs est viticeis altè incis, nigricantibus & Gerani maioris, vt similibus sic maioribus edit. Caulem rotundū, tenuem, bipedalem, lentum atque nonnihil flexuosum, pteiolis, nudis alterno situ folia gerentibus donatum, floribus ornatum luteis vel pallentibus Linariæ colore, & effigie: siti quulis subnascentibus, semēq; angulosum & atrum cohibentibus. Radix flexuosis & numerosis, nigricantibus fibris cyrrisve implexis, montosis, & opacis saltibus auisq; nemo ribus oritur: in hortis Galliæ & Belgiæ colitur, proque deteriore cæteris veneno habetur à venatoribus qui Lupicidam vocant: non quòd idem non faciant aliæ, sed quia hæc citius & certius: quin nonnullis in locis adultæ flores vel solo mansu fauces linguamq; tumore illico excitato adurunt, & vertiginem cient.

NAPELLVS verus, Caruleus.

CÆTERA Aconiti genera tametsi Dioscoridi nomine tenus duntaxat prædita sint, tamen quantum ex stirpium collatione & virium obseruatione assequi quimus, Napellus vulgaris vulgò Germanis *Rapenblomen*, id est, flos Rapaceus, nam radix Rapi modo turbinata huic, nō oblonga, aut conica, dictus vna fuerit differētia: alterā arbitramur,

Cc. j.

quam

quam Sauenæ Monspelliacæ accola perperam Thoram, nempe vaga cum cæteris nomenclatione vsum propter, vocitant. Huic folia & facies luteo Pontico non disparia, sed minutoribus pluribûsq; incisuris molliora: è radice tereti, nigricante, & quam Anthoræ græciore, sed longiore, ima parte recisa, obtusa, caulem cubitalem, singularem exerit. Flores & semē in corniculis Aquilegiæ Napellive modo. E deuexis horti Dei Linguagotticis nemoribus nobis Canonici Lignipedes illic venationis callentissimi ostenderunt, huius copiam in hortos Monspelliacos transfulimus: vixit diu in Hermeti Pharmacopœi viridario ad Ægidiam portam.

Napellus.

Illud verò iamdiu etiam hortis præsertim Germanicis & Belgicis peruulgatum, & florum amoenitate duntaxat mulierculis expetitur, quos propter similitudinem Brabantij *Munchscappen*, id est, monachi cucullam dicunt. Germania superior *Knappenblomen*, ex radice & flore conflata nomenclatione: insignis quippe radix, insignior & flos arguto naturæ opere: præ se namq; fert cucullæ hiantis aut cassidis speciem, cuius anteriore media parte demissior paulò frons in faucem promissam inferiorē vergit, eq; medio exerit linguam geminam, paulum quid inflexam, multis indidem porrectis villosis staminibus, quibus extremis puncta lurida, viridiave insunt: in thecis semen simile nigrum & angulosum vt luteo. Radix orbiculata Apij modo, vel Dracontij oblonga, emittit caulem tricubitalem, petiolosq; graciles, prælongos, folijs nigris donatos, multis magnisq; incisuris, quadantenus pampineis, aut Platani. Huius videas accliuēs montium saltus Iunio & Iulio perquam elegantem & luxuriantem fundere vbertatem in Rheticis Alpibus, cui tamen (cuncto illic arroso gramine) parcat quantum est pecoris, præsertim secus iter, quo Constantia Nasaretum versus itur, vbi à quouis, animalium illibatum perstat, præterquam à muscis, quæ illi turmatim insident & aduolant, & floribus fortè innascuntur, sunt enim fermè concolores, maiores, quàm communes, alis capitulisq; ex lurido viridive cæsis vitente, quasi cantharides, vel cincedulæ, hæc attentius obseruauimus quidem continenter de floribus rostellis delibantes: cæterum murem Napelli frustra diu & multis auulsis plantis, quæsumimus, & an vidissent opiliones percunctati, nusquam sibi visum negebāt: *μύρ* siue murem è *μύρι* fecisse, nempe è musca murē, igitur iam tum suspicio, nos incescit istos Arabas cum scriptum fuisset: Musca. Murem legisse quippe nullam antidotum è mure parant: è muscis præstantissimam aduersum funestum Tarantæ morsum atque Epidimicos morbos, cuiusmodi hæc.

Rec. muscarum quæ pastum ceperint de Napello N. xx. Aristolochia, Boli armeni. añ. 3j.

Nec in vlla planta huic congenere, muscæ hæc cæruleæ insidēt aut visitant, quò certior est coniectura istum Napellum esse Arabum, idemq; Dioscoridis vnum ex Aconitis: nam quòd qui perfunctoriè paginulas perpaucas Auicennæ lustrarunt, argutantur illum diuersis capitibus quasi diuersis de plantis scripsisse, quàm non multæ, neque accuratæ sint lectionis, indicio sunt tam multa capita vnius rei, quas ille aut propter varias nomenclaturas putauit & descriptione secreuit, aut quò incertus rerum quæ parum plenè commentatus esset exactiore opera prosequeretur. Sic Serapioni non vno loco contigit: quin & Dioscoridi ipsi non paucis, magno flagitio eius dignitatis & dispendio posteritatis. Senensi vero cum sepe vt alibi ostendimus, tu autem, quòd mirum magis isto, etiam loco, easdem plantas bis terve inculcare, nimirum nomenclaturæ diuersæ ignorance & suis imaginibus delusus. Quas enim imagines se dono accepisse iactat, easdē spectandas dat, nec descriptiones, quod illi familiare, apponit, sed meris, nescio quàm veris, picturis, duntaxat oculos, non item animos pascit.

Elleborastri & Consiliginis.

Elleborus niger.

Christ ophoriana.

Astrantia nigra.

Pæoniæ

- Peonia* { *Mas.*
Femina.
Promiscua.
Leontopetalon.
Alabastrites & Coralloides Cordi.
Staphis agria.
Ricinus.
Quinquefolium, siue Pentaphyllum.
Pentaphyllum { *Minus luteum.*
Album.
Purpureum.
Alpinum petrosum, siue minimum argentatum.
Eupatorium Græcorum, siue Agrimonia Officinarium.
Agrimonia, siue Eupatorium odorum.
Potentilla, Argentata.
Leucas.
Tormentilla.
Fragaria { *Alba, flauescens.*
Rubra.
Garyophyllata { *Alpigena.*
Montana.
Vulgaris, an Geum Pli?

HELLEBORASTRI & Consiliginis.

NONNVLLE adeo Aconitis germang, nec ita Hellebori nigri ab similes visantur, ut cum neutrum verè exprimant, vtriusque tamen vel altervtrius æmulantur faciem & vires impendit purgatrices: vnde quis coniectari possit Consiliginis dictas primum, quod cicerent alium, non solum quia segetibus confererentur, aut adnasceretur. Sic enim interpretatur Concilium, siue Couoluulum Plinius, quia Venerem cicerat, tametsi inter segetes luxuriat frequentissimus. Geminam autem Consiliginem nouit ætas nostra, nempe segetum locia, quæ passim Biturigas circum, & Beaucia variis aruis, Gallia Aquitanica, & Norbonensis exit: ut iuxta Lanum amne MonsPELLII, omnium maxima, sectura luculentæ foliorum, florumque: caules sesquicubitales, geniculatos: cute ex virore pulla, vel atra, squammosa, multas semiuncialis latitudinis fundens alas, quæ densa pleraque folia fulciunt, singula septena, leuiter crenata, digitata, Lupini, Platani vel Viticis diuisura, figura, & folio, sed longiore, crasso, rigido: colore, odore, & sapore, ferè Laureolæ. Porriguntur indidem multiplices petioli, qui in flores herbaceos, Buxæ olivæ, pallentes, rugosos primum explicantur, Garyophyllatæ montanæ, Tithymallivæ Helioscopii modo: deinde succrescentibus corniculis membranceis, pallentibus, quadantenus Aquilegiæ, semen teres, atrum, & oblongum, grano tritici minus recludentibus; Sole arietem ingresso. Perennis Bruma rigidissima etiam Septentrionalibus perstat, floretque Christi ferè Natalibus: vnde Germanis Christwurtz. Radix durior, intorta, valdeq; fibrosa, nigricans, subamara, acris, virosa.

Christwurtz Germanis, quod floreat ad natalis

Anglis à figura Werwurtz.

ALTERA, quæ minor tota, paucioribusq; caule & foliis, sed maioribus & latioribus, flaccidioribus, magisque serratis, è pediculis sesquipalium pedemve longis, eductis, qui in tenuem fibrâ porrectâ florè edunt, & siliquatæ & semine, cuiusmodi proximè descripta, sed non perinde copiosa; eodè tamen sidere & frigore: verum syluis hæc & vmbrosis gaudent: fibris nigricantibus implexa radix, uti Vicetoxici, vno quasi oblongo nodulo aptis. Hæc propior nigro Helleboro, illa Aconito, viribus & facie. Hæcque, quasi sui dissimilis foret, si serius, ut Februario floreat, procerior: sin citius, multò minor fit, tametsi eodem solo: & tempore satâ: quin, ut crebrò notauimus, etiam clementiore hyeme, soluraq; nec gelida tellure, quæ minor, est florum partione alteri, mense, aut sesquimense ante-

HELLEBORASTRI duplex differentia.

vertit. Dudum monuimus, nostra memoria Pharmacopœos harum vtraque vfos fuisse. Hellebori nigri penuria & ignoratione: nonnulli etiam veri Hellebori nigri persuasione: qui tamen non parum accedunt, tamen illi neutiquam tuto vtendo suffici queunt.

HELLEBORVS NIGER.

Germa. Christwurz. Belgis. Swert Riscrypt. Ang. Oxe hele, and sett er Worte.

NIGER verò Helleborus (nam Veratrum nigrum qui dicat, videatur & dicere posse atramentum nigrum, vti Sesquilogobardus ille ineptiebat) iam plurimus ex Pyreneis & Alpinis in hortos transuectus, qui ineunte hyeme, itidem paulò post brumam flores dedit ex candore Roseos, interdum albos, nonnunquam purpureos, nec è foliis, aut caule, sed è pedicellis statim à radice ortos, cuiusmodi Cyclaminis. Folia fert in singulo pediculo minora, breuiora, rotundiora, & retusiora, supernè qua duntaxat pusillum quid crenata sunt, diuisura septena, Peponiæ foeminae, aut Smyinii fermè modo. Viridantia ex atro, minus crassa, aut rigida. Radix intexta, intricata, innumera fibrarum atrarum sobole, eodem fermè superno complexu appensa, amara valdè & ingrata. Morbis penè inuictis, non modò Melancholicis, sed etiam merè pituitosis & sanguineis eximium præsidium esse, certum habemus. Præter namque vertiginosos, amentes, & cancro vexatos, etiam paralyti de sanguinea pituitosaque materia spiritû partim obstruente, partimque neruorum & fibrarum tonum vigoremque laxante, correptos, valetudini restitutos fuisse scimus: & quid Arelatensi cuidam Monacho, colore & habitu vegeto, viribus athleticis, repentè Paralyti & Podagra percusso, Rôdellietius præstiterit, in memoria etiam nû habemus. Vocabatur Apis Monachus perquam notus & scitus aulicus ille, id est, Abeille, vernaculo Narbonico. Nec tamè ac albus, est perinde formidandus hic: nam decoctis vnus libræ purgâtibus & mitificantibus, Melancholiâ drachmæ duæ trësve radicû, infuso addebantur: quin & nonnunquam albi & nigri mixti, ana 3 ij. addimus. Quò magis accedimus eorû sententiæ, qui primùm è Pyreneis Perpignanæ, & Salsæ Hispaniæ coterminis, eruti Hellebori periculû fecère. Postea nobis collectû idè in Apenninis Bononiæ accliuibus, & valle Austri Pedemontana, ad Iouis montis fastigia & ardua circû, nigrumque, nigri Hellebori opinionem auxit: alioqui minus cõgruit Dios. delineatio: nulli enim huic flores racemosi, semè Carthami Sesamoidisve est: & caule glabro leuique, nõ aspero, aut nisi mauis interpretari rigidum firmumque caulem *ὑποτέλατον*, vt posse, nos alibi docuimus. Quod verò inter Platani & Spondilli folium, crebriusque incisum dicit, ferendû Dios. descriptioni: non enim adeò rigidè ad normâ minima queque exigenda: verùm in floribus, semine, aliisque nonnullis, luto hærendum est. An suspicandû luxam hic laceramve descriptionem, aut potius quodpiâ *ὑπομονὴν ἀμείντην* subesse? siquidè albi flores, muccosi, racemosiue cum sint, tamè descripti non sunt, sed fortè huic ascripti. Huic excusationi venia si desit, verisimile sit, nos illo antiquo carere veratro. Idcirco CHRISTOPHORIANAM illâ, Aconitum racemosum nonnullis censitam, Helleborum nigrû, non semel arbitrati sumus. Radix quippe atra, confibrata, quàm plurimis appendiculis, morsus Diaboli aut Veratri: Folia crebribus incisuris, effigie Napelli lutei, ferratis, longioribus, pendulis, atro-vrentibus, Spondylium, vel Imperatoriam aliquantum præferentibus: caulis sesquicubitum altus, gracilis, geniculatus: è quo extremo flosculi racematim cohærentes, Oleæ, aut Helleborine albæ, albidæ, Corylli nucameto maiores: quibus dilapsis, bacculâ Laureolæ haud dispares, acinorum modo in Botrum congestæ, cuiusmodi in Ligustro. Iunio floret: saltibus montosis & dumetis gaudet. Prope Taurinum in Pedemontanis Trâspadanis collibus, vbi & Laburnum vidimus: verùm cum hanc tantoperè nocuam accepissemus, in ægroto vllo periclitari vires, religio fuit: eoque vulgarem retinere consultius visum fuit: erratum rati non in re, sed in Dioscoridis codice.

ASTRANTIA NIGRA.

TANTO minus illi quadret Astrantia nuncupata Atra, German. Schwartz Aſtrentz, oder Mutterwurz, quàm periti Saniculam alteram putabant, alii Helleborum nigrum, leuiuscula

STIRPVM aduersaria noua. 305

uiuscula sanè coniectura. E radice multum fibrosa, aliquantum Helleboro nigro simili, atra, emergunt complures petioli & cauliculi glabri, graciles, quibus folia quinis diuisuris Pétaphylli, Saniculæ uero modo, per ambitum serratis, obscurè virentibus: flores acruatim glomerulis collecti, muscosi, Bellidis, Succisæ uero modo & colore: luteum vniuersa fudit succum, cuiusmodi Astratia maior, cui hæc etiam alijs notis meritò assimilatur: idcirco nigra Astrantia vulgus dicitur. Sed enim huic cum Helleboris cognitionis: montana tamen est, sed vulneraria.

P O E O N I A fœminâ.

AVSPICATISSIMO Apollinis cognomine, & fœlici ope præstanda, Pœonia notissima, quæ quasi sexu distincta foret, marem & fœminam fecere: vtramq; Genearum Alpinis & Norbonæ arduis Veganij culminibus, & indidem syluosis non procul alio celebri monte Lupi vocato, fœminâ eruius Vere florentis & ineunte æstate: vbi perequè frequēs vtraque hortis, tamen notior fœmina, eoq; vsu frequentior. Quæ nãq; prostrat Officinis, Fœminæ sunt, Asphodeli, Cyperi maiores, aut Oenâthes, vno tuberoso nodo pèdulæ, latè sparsæ, glâdulosæ, rufescentes, oblôgæ, & tenuiores, quàm promiscuæ Pœoniæ: caules primulùm pullulantes puniceo rutilât: folia inter Helleborû nigrû & Smyrniû, diuisura maris minora, auersa, cæsia & albida: flores roseis folijs & calycibus maioris, saturatis, vt Maluæ hortensis, succedente terno folliculorum fœtu, Amygdalæ putamini simili, & pari fermè, concolori, dehiscente per maturitatem, Hellebori nigri filiquæ ritu, atque pendente purpureum seminis partum rutilum, oblongum, nitidum, teretem, serie mirabili stipatum, acinis Punicæ non dissimile: plenè maturum, nigrum, lucidum, medullosum: sapore medicato, acri, subastringent, nonnulla dulcedine cum amaritudine.

M A S.

RADICE simpliciore, nec sparsa, sed rectius altiusq; depacta, & interdum binis, ternisve maiusculis flagellis, odora, intus albida, foris ruffa. Folia Iuglâdis situ & ambitu minora, crassiora, ad Terebinthum aut Staphylodendrum accedentia. Flores, filiquæ fœminæ similia, sed semine exquisitè rotundo, concolori.

P R O M I S C V A seu Neutrâ.

QVÆ nondû mari Pœonia reperto à nonnullis Mas credebatur herbarijs, nobis Promiscuum, quasiq; vtriusq; cinnus esset, & neutrum, visum fuit appellare. Quippe quantum à solo extat, si perpendas, Masculum dicas. Sin erutas radices intueare, fœminâ iudices: nisi quia pleniores & habitiores. Hæc Plinio Mas fortè est, tamen id excutere nostra haud magnopere interest, nec ocium est, nec lubet anxius profèqui, nû idè author errarit, dum marè folijs ait redolere Myrrhâ, quippe cum Smyrniû Myrrham redoleat, perinde sit, vtro modo dicas, omnes iâ in hortis & vsu sût. Radice rediuiua multos annos perstât,

L E O N T O P E T A L O N.

MVLTIS ab hinc annis qui complures radices tuberosas prostrare quibusdam Veneris Pharmacopolijs sepius vidissemus, putabamus esse Cyclaminis adultæ aut vietæ, primo intuitu. Postmodum sciscitati institorem, respondit esse Leontopetali radices: cùmque multis postea in hortis accuratius viuam perpenderemus, flores Anemones vel Ranunculi, in filiquis semen, caulem non ita procerum, adeoq; radicem magni Cyclaminis aut rapè foris fuscam, tuberosam, vti Dioscorides prodidit, meminèramus. Cæterum folia tametsi ampliora multò, tamen sinuosa & circinato ambitu diuisa, Pœoniæ modo: non Brassicæ similia, aut Papaueris diuisura obseruabamus. Iam inquilina cùm sit Italiæ & Galliæ, lectori integrum erit nihil assentiri, vsq; dum vires exploratas habuerit.

Nemoralis Alpina Herbariorum ALABASTRITES, CORRALOIDES Cordi.

POTEST ITIDEM PENTAPHYLLI VOCARI EA, QUÆ in vmbrosis saltibus Taurinensis agri, Calcaris montis Seuenæ, & trans Rhenum non procul

Cæ. iij.

Ba-

Basilca reperitur. Folio è singulo pediculo quino & septeno, Ellebori nigri, aut potius *Pæoniæ*, ferrato, in pediculis gracilibus, glabris, è caule singulari, sesquipedali, innixo radici crassiori, minimum digitum æquanti, transversim depactæ humi, quæ crebribus articulatur portiuculis, frustillisve marmoreis, & *Polypodij* modo radicem acetabulis insculptam, effigiem Coralli albi præferentibus. Flores in summitate plusculi pallentes insunt Maio, postea siquosa vaginula erumpente, maiore Erucæ aut *Chiledonij*: semen pusillum claudente, gustu tota hæc amaricante & calfaciente.



RICINVS.

Cerua maior.
Cataputia maior.
Granum Mesue.
Palma Christi.

RICINO siue *ῥικινος*, semini imago, quæ animalculum cognominem imitatur, vocaturq; Ricinus, appellatione dedit, uti *Echio*, *Psyllo*, *Verucariæ*. Ceruam maiorem siue Cataputiâ passim officinæ appellât. Granû regiû Mesuæ: Palmam Christi vulgus, propter frôdis digitatam effigiem, quæ volam palmamq; expansis digitis quadantenus æmulatur, oriunturq; ex caulibus crassissimis, a. t. sex cubitorum, pixidatim consertis geniculis, depressis, alterno situ folia in ficulneo pediculo hærentia, septenis & nouenis altioribus diuisuris, Ficus, Platani, Castaneæ equiue Staphidis agricæ vel Ellebori nigri, subnigra aut subcærulea, pinguis. Siliquato secundum summitates fastigio, racematim compactis floribus luteolis, succedente, ubi conduntur plurima ternis costis, aut loculamentis, conspicua conceptacula orbiculata seminis tricocchi medullosi, multumq; olei pressi reddentis. Vix alibi quâ in hortis videre est, tamè tum calidis, tum frigidis lata tota ex cæruleo in fuscum languet, annua est, nec rediuiua.

Lat. Pedicularis.
Gall. Pouilleuse.
Ger. Luyscruyt.

σταφιδῆς ἀγρία STAPHIS agricæ, siue vitifolia.

DVXIT à foliorum diuisura, qua Labruscam siue vitem syluestrem imitatur nomenclaturam Staphis agricæ, quæ & pedicularis notissima est vocabulo, & compertissimo vsu, ad pediculos illitu & suffitu abigendos: maceratæ namq; & tuse in aceto vegeto, grana si affricentur interulis, quantum est pediculorum vel lendinum enecant. Ad quod bel lum pediculorum in præsidij ipsa planta alitur vbiuis gentium, & nusquam vitrò prouenit, caule cubitali, surrecto, fusco, folia ab imo in pediculis pampineis laciniosa, crebra, profundaq; Aconiti, Ricini vel Vitis diuisura. Cæruleos autem flores stellatos, Rapôtij, Iulio & Augusto dat. In oblongiore siliqua multis, costis compacta, dehiscente, semina erumpunt triquetra, pulla, amara, & vrida, oleosa. Radix non ita magna, annua est.

QUINQVE folium.

FOLIORVM numero quinario notum *Pentaphyllon*, perinde ut *Argentina* cognata, frequentissimum vbiuis itidem marginum & viarum vdis cuiuslibet plagæ. Folia crenis & aspectu *Agrimoniæ* vel *Potentillæ*, in lorulis prælôgis, flexilibus, purpurascens, qui sese nouis, qua solum subierint, propagantibus *Fragariæ*, *Potentillæ* vel *Vincæ* peruinca modo quinq; partita effigie digitata, Ricini, aut Lupini, ad *Saniculam* etiam accedentia, *Argentinæ* luteis floribus. Radix quanta minimus digitus, lôga, purpurea, vel *Cêtearei* maioris colore, quæ arida facta quadrata cernitur, verissimè monente *Theophrasto*: qua etiam nota aduersante *Barbarorû* pertinacia, manifestò distare à *Tormentilla* quilibet in promptu sit nosse.

Huius

STIRP IV M aduersaria noua. 307

Huius animaduersa iamdudum quadruplex aut quintuplex varietas, in magnitudine florum, colore, & folijs sita.

PENTAPHYLLUM Minus Luteum.

MINIMUM omnium differt Pentaphyllum luteum & minus vocatum, rarius tamen nisi syluosis pratis & herbidis muscosis occurrit, vbi Tormentilla, quā gracilibus tum folijs tum viticulis, simul ac pusilla statura (nec sese defixis ramulis propagante, vt prior) admodum representat. Folia quā terram spectant, albicant.

PENTAPHYLLUM album.

Nec multum magnitudine superatur commune luteum Pentaphyllum ab hoc, cui item quinquepartita & Helleborastri modo digitata & antierius duntaxat crenata folia, subterque in cauliculis hirsutis, flores conduntur albi, radice multis adnatibus huc & illuc vagantibus. In Belgia & Gallia hortis meminimus vidisse.

ALIVD album, & Purpureum.

PRÆ omnibus procerius & speciosius istud, quod in pingui pascuum solo vel pratorum. Saenæ Norbonensis Iunio & Iulio flores edit candidos, interdum purpureos, & in cauliculis ab imo, rectis, firmis, pedalis & cubitalibus folia sunt quinquepartita, sed altioribus & crebrius, Coriandri Geranij Robertiani vel Alceæ modo: foris nigricat radix, intus rubella, digitum lata, palmum longa, & sesquipalmum. Etiam in Apennino Italiae purpureo flore, perquam aspectu ameno, legebat peritus Pharmacopœus & amicus non vulgaris Iacobus Rainaudet Massiliensis: Belgia & Galli in hortis alunt.

ALPINUM petosum & minimum Pentaphyllum.

NE hoc quidem adhuc descriptum, quippe non frequens occurrit, nec nisi celsioribus montium iugis gelidisque; cautibus, quales sunt Sabaudia, in Austriæ valle, & Norbonæ ad Calcaris horti; Dei ardua, & in verticibus editissimis Mindenij. Foliola sunt circinato & integro ambitu, quinquepartita, tenuia, & subtus candore nitido lucentia, aduersa, viridia, Saniculæ tenellæ multum similia, sed minora. Flosculi stellati, racematim collecti, candidi, interdum & purpurascens, Alchymilla similes, defluunt ventisestate, in gracilibus admodum cauliculis, è radicibus fibrosis capillaceis, fuscis, purpurascens. Quidam Tormentillæ annuerat istud, cui multum sane simile est. Incompertæ tamen facultatis nisi exsiccantis & astringentis.



Incana Pentaphylli effigie, an LEVCAS Diosc?

NON penitus nihil sentiebant docti amici nostri Valerandus & alij, qui hanc plantam intuiti, Leucadem censebant: non modò enim tota incana est, vt flagitare videtur ipsa nomenclatio, sed etiā Triffagini folijs est, qualem oportere esse, facit suspicionem consequutio. Folia sunt terna aut quaterna, crebra diuisura & magnitudine Triffaginis, furculis breuib, crassis, lignosis, subrubris, rugosis, fuscis, vt Pentaphylli, quod inequali à radice exortu multis depacta portiunculis quodam habitu adubrat: item ex fusco purpurascens in alias fibras diuisis, gustu etiam Pentaphylli vel Tormentillæ, astringente, exsiccate. Quare & fortè non minoris quàm illæ duæ efficacæ aduersum venena est, quæ causa fuit, vt illi, fortè vires radicū experti, ausi sunt Leucadè hæriolari. Et præstat (quado nulla est Dioscoridis delineatio) hanc perpulchrâ plantâ nosse &



Cc. iiii.

expe-

experiri, quàm nullā, nihilq; periclitari ad eruditionis supplemēta. Admodum inuentu rara, nec nobis lecta, nisi propē Allobrogum deuexa, planitie in arida, glareosa.

EUPATORIV M Græcorum, Agrimonia Officinarum.

Ger. Oderwe-
nig. vud Huc
Wrtz.

Ang. } A-
Gall. } grimo
Bel. } nie.

TAMETS I quosdam nouimus in Belgio & alibi, qui Agrimoniz, siue vero Diosc. Eupatorio in morbis hepatis, lubentius Canabinum aquaticum, à nobis superius memoratum, subdant, vsurpentq; frequentius, tamen quia non rei ignoratione faciunt, sed viriū maiorum explanatione freti, eos adeo nō incessimus, vt potius laudemus, si veterū quopiā simplici perboni aliud melius vsu comprobarint. Agrimoniz autem nostratem satis cum notæ cunctæ, tum nomen Argemonæ in Agrimoniam detortum, (non Arthemisiam, vt sub capitis finem Dioscorides monet) verum esse Eupatorium satis testantur. Quin vires multo magis, sed multo plures sunt, quā quas Dioscorides enarrauit. Estq; notitiæ vulgaræ planta, frequentissimi commodi, vbiuis gentium in pratis siccioribus satorum, viarū marginibus fruticat cubitum & sesquicubitū alta, striatum, angulosum, subpurpureum, hirsutū, durum, lignosum & vnicū sapissimè caulem promēs, multis ramosis neruulis, folia quasi pediculo innixa, ad Vlmariā, Potētillā, aut Rosam effigiata hirsutæ, nōnihil incana, florēsq; in summo exiguos, luteos, stellatos, Pentaphylli minores, secundum totam summitatis longitudinē edit, vbi seminum series Lapposā hirsutāq; pannis hærete, quos vel tactos mordicus tenet: medulla intus albida, sapore non ingrata, vt nec odore tota planta. Radix crassior, foris fusco rubore, dura, exsiccante, & moderatè astringente, adeo apta foris & internis affectibus, vt decoctum dilutūve colore lymphido vini gilui, placeat: & potu viscerum, hepatis præsertim, tonum restituat, intemperiemq; omnem feruē corrigit, obstructions referet. Eoque succum officinæ expressum in Trociscos seruant, Xantis Pictauē Galliz finitimæ syluæ eandem Agrimoniam edunt, quam odoratam vocitant, propter odorem multo flagrantiorē, etiamq; in hortis colebat superioribus annis, & dabat nobis illic eruditus Medicus Lamoureux.

Ger. Brensing.

Gall. } Ar-
} gen-
Bell. } stine.

ARGENTINA siue Potentilla.

Ang. Wildæ Tanse.

TANTOPERE est hæc affinis facie Agrimoniz, vt & vulgus Syluestre vocet Agrimoniam, & non raro mulierculas Agrimoniam se collegisse ratas fallat: discernitur verò reptatu viticulorum teneriorum, gracilium, Fragariæ vel Pētaphylli, cuius flores sunt similes, & concolores, lutei: folia autem supernè virent dilutè, auersa autem argenteo splendent nitere, vnde Argentine dicta. Potentilla pariter à viribus, quibus eximijs pollet, ad frangendū calculum, interiora vulnera & vlcerā maligna, & dysenterias, viscera roborando, similiter Agrimoniz: cuius, potius quā Tanacetī, tēperamento exsiccate, siue calore moderato est, sed astrictione superat: multum sanguinē grumolū potu dissoluit. Viarū, vdarū præsertim, nulla amantior, frequentiorq; alumna vbiq; gentium dignū obseruatu. Hanc inditam pelui frigida aqua semiplenæ, & operculo oclusæ destillare, siue vapores in concauū operculi subuehere, quod sublimare vocant, ferūt. Huius stillatitiū ad lētigines, pānos, & maculas, fuscūq; colorem Sole contractū delendum, Anglæ mulierculæ adhibent.

Ger. Brückwurtz

vud rot heyl-

wurtz.

Gall. } Tor-
Ang. } men-
Bel. } till.

TORMENTILLA vel HEPTAPHYLLON, an Chrysogonum Diosc?

QVI Pentaphyllon nouit, non potest quin norit Heptaphyllō, à septena foliorum diuisura sic vocatum: Tormentillam verò, quia tormentum, cruciatūve dentium sauiissimum placat, atq; venenatorum quorundam rerum compefcatur furiam cruciantem. Nemorosa, montana, sicciora, macilentioraq; prata sternit, surculosis, gracilibus, senis vel octonis ramulis, folia Quinquefolij minoris lutei, sed septena diuisura, sparsis, rubellis, nitidis ab radice exortis corpulentiorē, & crassa, pollicem ferè æquante, Bistortæ, & colore intus rubro, foris nigricante: flosculis Potentillæ, vel Pentaphylli lutei minoris.

FRAGA Fragaria.

NON ITA diuersa ortu & habitu ipso visitur in syluosis Fragaria, prætermissa etiam Diosc: sed versu Maronis signata: Qui legis flores & humi nascētia Fraga. Fragrat nam-

namque non modò fructus & flos, sed etiam stillatitia; præsertim fructuum maturorum: qua mulierculæ Erisypelaceas & furfuraceas lentiginosâsque faciei sedationes leniunt & abigunt. Ad calculosos & inflammationes epota optimè facit. In bellariis, præsertim cul-
tæ plaræ idè vsus, sed quàm Idei Rubi delicatior fructus. Humilis herba, syluosis familiaris
& viarû marginibus, primo Vere floret, & tota estate fructû fert, purpurei, sanguinei dilu-
ti cruoris saturum, folia terna Rubi, aut Idei, adeò similia, vt nonnulli somniarint eandè,
differt verò herbacea natura, (tamen si hyeme perstante, quando etiam Brumæ tempore
semio aperta niue in Anglia, mora esitauimus nonnulla) viticulis exilibus, enodibus, nu-
merosis, pilosis, nequaquam spinosis, ab radice tenui, superficiali fibrosa, prodeuntibus;
floribus in summo albis, Rubi, sed minoribus.

Vulgaris *GARYOPHYLLATA*, an *GEUM* Plinij?
Germa. Benedikten wort. Gallis. Galiot. Ang. Auens.

NUTRIVNT & syluosa vulgarem hanc, illis non multum absimilem, nec item Græ-
cis & Latinis (nisi fuerit Geum apud Plinium) dictam, cuius tamen radix eximii
odoris nullum latere debuit, qui olfecisset: quippe Nardi Garyophyllæ suauitatem spi-
rat, multum capillosa, rubella intus, caulem pilosum, subpunicem, sesquipedalem, &
bipedalem emittit, alis aliquot diuisum, quibus summis flores Potentillæ, aut Tor-
mentillæ insunt, & pilulæ deinde oblongæ, scabra hirsutæ mordaces, in pediculo singula
ad imum folia ferè Alchimillæ, in summo Fragariæ, sed hirsutæ & similitudine Agrimonie,
cuius qualitates ferè est assequuta: calore & siccitate temperatis: ad vulnera intus forisq;
vsu laudatissimo; quare & in hortis vbique herbarii colunt.

Septentrionalium rotundifolia Pappo flore *GARYOPHYLLATÆ*.

BRABANTIÆ syluosis conterminis Mechliniæ, & in Northmannia frequens ista, in
Anglia verò plurima: quæ magis totius plantæ habitum perpendenti, quàm foliorum
expressionem, aut radicis, Garyophyllatam repræsentat: sunt etenim circinnata, & ali-
quantum cristata, ambitu Hedera terrestris, in petiolis exilibus nonnulla foliola admo-
dum exigua habentibus, vulgaris Garyophyllæ modo: radice crassiore, minus fibrosa, mi-
nimû digitû æquante, Geranii moscati momordicæ dicti, nec perinde Garyophyllam, aut
Nardum halante: flore speciosiore, & caliculo pallidiusculo, relinquente papposam orb-
tam, quasi plumbeis vndantibus, quadantenus Alceæ Venetæ radiatam.

Alpina Pentaphylea *CARTOPHYLLATA*.

IN Rheticiis Alpiniis nò procul Clauenia, hanc primùm na-
ti, putauimus esse Tormentillæ, aut Pentaphylli speciem: ve-
rùm radix Geranii fibrosior, forisq; rubiginosa, parum
quid suaue redolens, Garyophyllatam testatur. Quinetiam
erigit caules pedales, cui herent folia quinquepartita, am-
bitu ferrata, Penthylli, aut Tormentillæ, flore luteo-
lo pallentè, staminulis lanuginosis, croceis, pappo-
sis, minoribus Garyophyllatæ.



VERONENSIVM Garyophyllata, flore Saniculae Vrsinae.

INTER complures insigniores plantas, quas apud Veronensium Pharmacopœorum
peritissimos, Franciscum Calceolarium, & Andream Bellicoquum, partim in Offici-
nis, partim in hortis videbamus 1563. fuit quædam peruenustis florum quasillis, pusillis,
ortu

ortu & similitudine Primulæ, aut potius Saniculæ Alpinae, intus luteis, foris purpurantibus, nitidis, è medio filamenta crocea ostendantibus, & pluribus in singulo cauliculo, glabro, gracili, è radice numerosa coma donata, quæ permultos petiolos statim fundit, quibus cunctis singulū foliū Geranii, Maluacei, aut Saniculæ, rotundū nēpē: sed per ambitū altius sinuatū, minutinūq; crenatū, asperiusculū, flexū humi, & fufius aliquatō se pandens, ritu Geranii. Qualē meminimus in hōrtulo pone ædes Iacobi Cortusii Parauini Patricii, rei herbariæ perquā periti & auidi, cui & nos vicissim quasdā transalpinas & Norbonenses plantas, partim dono, partim spectādas dedimus; sapore ex astrictione siccante.

Imperatoria.

Podagraria Germanorum.

Angelica satina.

Varietas.

Angelica sylvestris.

Benzoin, Assa dulcis.

Panax Heraclea.

Altera Olsatri aut Pastinaca facie, Panacis species.

Lascepium.

Leuisticum.

Spondilion.

Libanotis Theophr.

Coriandrum.

Apium hortense.

Oreoselinum, siue Petroselinum

Macedonicum.

Hipposelinum, siue Olsatrum

Smycinum.

Ligusticum.

Pastinaca domestica.

Sylvestris Baucia.

Pastinaca marina.

Sysarum, Asphodelus Hesiodi.

Potades, siue Batades Lusitanorum.

Esaphoboscum.

Costus adulterinus Illyricus.

Barba Capra, siue Vlmaria, an Rhodera Plinii?

Flos Aphricanus, siue Orhonna Italicorum.

Centaurium magnū duplex.

Thu, siue Valeriana omnis.

Nardus montana.

Phytanma Monspelliensium.

Saxifragia hircina { Maior.

{ Minor.

Phellandrium Plin.

Pimpinella.

Daucus secundus Selinoides.

Anni vulgare.

IMPERATORIA.

AVVSTO hæc propter raras facultates donata fuit nomine, ceu quæpiā lectæ mercis indicatura. Affinior autē est facie satine Angelicæ, quā sylvestri: folia tamen propius Spondiliū & Hipposelinū æmulantur, vt plurimū terna, statim ab humo cauliculis subuecti: gracilis caulis, nodosus, sesquicubitū altus est: umbellæ & semē Angelicæ sylvestris, vel Anethi: radix digitū æquat, multis fibris in terram sparsa, foris fusca, albicans intus multo

STIRPVM aduersaria noua. 311

multo vehementioris & acrioris facultatis, & odoris quàm Angelicæ. Iisdem gaudet naturalitjs.

PODAGRARIA, German.

MVLTVM abest ab huius facultatibus ea quæ ad eò restibili & importuno prouentui iuxta sepes horticorum parietes vdis vmbrosisq; locis pinguibus prouenit, vt vix inde possit radicitus deleri. Pedem alto caule candida vmbella, Imperatoriæ, minora folia & radix, odore, minus suauis, quo & viribus quadantenus ad Ebulum accedit. Ea propter plebecula rata Ebulum esse, vsq; iam diu est, etiamnumq; experitur ad Ischiadicos Podagricos optimè facere. Vocitantque Belgæ *Hercincrypt*, id est, Podagrariam. Sanè facultates Ebulo quàm Imperatoriæ similiores fortita est.

ANGELICÆ.

VIX credi par est nostrates Angelicas Indicijs delitijs aut præsidijs neutiquàm posthabedas, Antiquitati notas, nisi sint apud autores veterinarios Gallorum *Laserpitia* memorata: nec enim siluissent illi tam diuinam fragrantiae gratiam, & vicarias diuinæ Beneficentiæ vires, siue Angelicas, triplicis nostratis Angelicæ. Quarum quæ procerior, radicè crassa & aliquantum supernè tuberosa, multis appendicibus humimersa intus candicat, foris pulla, odore perquam suauis, aromatico, pinguem, gummosum, flammique succum remittente. Caulis bicubitalis binum triumve cubitorum: striatus, pallefcens, ferulaceis. Folijs latis, Hippofelini, Simonijve æmulis, ex viridi in pallidum languescens, mollibus, vmbellæ sunt Pastinacæ, domesticæ, luteique flores & semina foliacea, rotunda, compressa, & albida, acris gustu & odoris eximij.

Varietas.

Nonnullis in hortis hic Londini, Antuerpiæq; visitur alia, tota minor cuius suauiore odorem radix spirat, prope quam folia ima ex purpura rubescunt: superna autem, ex rubore virescunt: vmbellæ cæteraq; semina similia. Celso vtraque montes gelidæq; amat iuga, veluti Imperatoria dicta, cum quæ in hortis colitur in Anglia, Belgio, Gallia.

SYLVESTRIS Angelica.

SED quæ sylvestris rarius hortis, sed sæpius vlginis, pratensibus locis frigidis, gaudet, radice pluribus fibris odorèq; cæteris multo minore est, gustu non ingrato & Pastinacæ ferme: minoribus folijs, acrioribus, paucioribus, minuscq; incisis: graciliori, & humiliori caulij, vmbellæ albicant magis. Cuilibet hæc notæ in Anglia, vbi lubenter vtuntur, quia aptior edulij condendis. Corrigit enim prouentum saburamq; crassorum & viscidorum humorum, atq; foetidum halitum emendat tetri spiritus, ex praua concoctione manantis, copiosior etiam & gratior est.

ASSA foetens, an sit succus Cyrenaicus mixtus. BENZOIN recentiorum, non est succus Cyrenaicus.

SVCCVM Syrenaicum longè alium fuisse, & Benzoino vocato excelluisse in promptu est nosse: cum legenti, alterum Fernaceæ plantæ, alterum verò arboris proceræ multo suauissimum excrementum esse: tum etiam facultates, qualitatèsvè exploranti, quæ gustui in Benzoino, neque feruorem in intima sese dantem, neq; in corporis meatus peruadentem, sudorèsvè affatim cientè exhibet. Capite autè de Lacca, Benzoin inuentum recentioribus, & à Cancamo differre, differuimus. Ac tametsi Syrenaicum illud celeberrimum iam tum defecisse Plinij æuo assentimur, non tamen prorsum nullum extare in naturæ familia Laser persuademur. Præter enim quàm quòd speciem nullam penitus posse interire docet Metaphysica dogmata, tum verò nobis suppetit Asa foetida, quæ potis est Syriaci, Armeniaci & Lybici laseris opinionè sustinere. Solitū enim erat istud notæ deterioris mixtum Sagapeno vanum vehi. Sagapeni etiam est odor Asæ foetidus affinis, quod Laseri nondum siccato soliti erant remiscere, sicq; venundare, Dioscoride auctore, cuius recensione doceri oportet Laser non ad eò celebre fuisse, quia odoratissimum, alioqui primo libro recēfisset, aut hic vsum tam rari odoris addidisset, vel saltem odoratissimum dixisset: atqui dūtaxat Syrenaicū laudat, quia aptius cibis, maiore cōmodo, minore odoris saporisq; fastidio esitetur. Odorè nō suauē, sed intensū vegetūmve cōmendat, quo mixto sali aut condimentis, oris foetentē halitū corrigit, vt puta Ligustico Imperatorio, Zeduaris, Lemnificæ

non

non suauis, sed gratiore quàm naturæ placeat odoræ. Hunc Serenaico temperatiorem multo esse, & os eo imbutum minus vehementer spirare. Ipsi subductis, si quis duplicem asfiam meminerit Arabibus dictam, alteram dulcem, alteram foetidam, vires nosset sic satis quadrare: odorem verò mitiorem illius, quæ dulcis dicitur, agnosceret, ut cui minus aut nihil additum sit foetidi Sagapeni, aut alicuius consimilis gummi. Foetidam verò ubi multum sit remissum, eoque sit ut interdum liquidior, liuidior, rubicundior, remissior cernatur, pro ut mixta, recēs aut vetustior fuit, neque dum exaruit, cuiusmodi interdum visere est in radicis officinis.

*PANAX Heradium Herculeæ, siue Heradia
fronde Pastinacæ.*

DIXIMVS antea Panacis nomenclaturam communem fuisse pluribus plantis, quæ neque inter se facie, nec planè viribus similes essent, magnæ tamen celebritatis commendatione κατὰ τὸ παν ἀκρίβη, seu quemlibet morbum dolorēve abigerent, dictæ fuissent. Hanc autem etsi Herculis nomine claram difficile noscitare sit, quia aliquam multis, quas noui nus in nostro cœlo oriundas, effluat nullus succus, tamen non desunt qui quandam in hortis coli non ita diu cœptam, nobis etiā (commostrante Doctore Asfatio) rursus lectam, veram asserunt. Verum permultæ sunt aliæ huic nulla dote aut nota inferiores: radix exigua nimis videtur, dum cubitorum caule ferulaceo enim, folijs quadantenus Smyrniæ aut Imperatoriæ, sed laci nijs ambitūque magis circinato, viridis pallentisque coloris, rigidis, & leuiter hirsutis. Radix non perinde succulenta Lignifici vel Angelicæ, umbellæ lata, floribus luteis. Creuit suapte sponte in illo saxoso colle, qui Frontignana redempti MonsPELLIUM ad læuam est, propè aut pone Sacellum dirutum, ut nos monuit multiplicitas industriæ atque indefessi laboris hac in parte Doctor & professor MonsPELLIENSIS Asfatius: sed studiosorum accursu, qui auide istam plantam in chartis seruabant, deleta illic ferè fuit.

PANAX altera recentior Olusari aut Pastinacæ facie.

VENETORVM quidam potiores etiamque Leopilli circulator, alebant & ostentabant quandam Panacis speciem ferulaceo caule binum & 3, autem 4. assurgere cubitorum, multos in ramulos supernè diuiso. Ferulacea autè folia squabra, asperiora, in singulis petiolis, geniculis, singula prodeunt, ampla, tharfi, plumatimve ex interuallis æquis posita Pastinacæ, & folijs constans multis in vno peciolo, oblongo: Africani ferè floris luteoli aut pallentis flores in umbellis pastinacæ aut Bauciæ, quam et iam assimilat tota planta hirsutæ incana, radice longiore, albida, nec ita dissimilis in Venetis & Flandriæ: hortis meminimus gustu aromatico, calfaciente, & digerente, gummeo, oponaceum succum redolente: quare meritò putetur hæc, ut si qua alia, Panax legitima.

LASERPITIUM.

CONTRA quàm sit hodie ab istis autoritatum racematoribus, minimè nobis lubet multas acervare super hac historia paginas ex veteribus, quibus ne nunc quidem si viuerent fortè essent ipsæ plantæ notæ, Lasipitij dico Sagapen permultarūque eiusmodi gummicarum, quæ videntur Dioscoridi & Theophrasto non visa, sed lectione aut auditione accepta. Eamobrem non multa hic verborum velitatione, ut moris hodie, sed sedula lustratione & pergrinatione opus esset, quando antiquorum manca sæpe, sapius nulla recensio extat. Igitur ipsi quantum inspectione assequuti, fuimus candidis amicis lubenter impertiemur. E regione Massileæ, & non procul insulis, quas videtur vocasse Dioscorides Stachades (quæ tamen putantur hodie illæ è regione Olbiæ, à Massileæ ferè diei nauigatione, uti, capite de Stachade dictum fuit) inter multas raras nascitur ferulacea &

& visenda planta, cuius radix prægrâdis, intus alba, foris cineritia, succo prægnans, mollis, pinguis, odorata, maior quàm Thapsiæ, aut Ferulæ. Caulis proceritate & crassitie Ferulam æquat. Folia Paludapii, sed crassiora, rigidiora. Umbellæ prægrandes Ferulæ, aut latiores quàm Anethi. Semē Angelicæ foliaceum, rotundum, compressum, odoratū, & colore buxæ. Hanc Iacobus Rainaudus Mafsilensis Pharmacopœus, stirpiū valde cupidus & peritus, nobis misit: deinde attulit Monspelliū quatuor ab hinc annis: quæ præceptoris eximii ingenii Rondelletio visa fuit Laserpitio aptius congruere, quàm quæuis alia ex multis, quas ille vidisset, Ferulis. Satum in Belgio semen, an creuerit, nondum scimus.



Laserpitiū è regione Mafsilia reperitum.

LEVISTICVM, Germanicum Laserpitium.

SPECIOSA minus hæc superiore, odore nec tam grato, nec perinde suauis, quàm Leuisticū eiusve speciē censuere. Folio enim Apii palustris maiore, radice crassa, fusca, odore graui usculo, caule & umbellis ferulaceis, semine oblōgo, foliaceo, Sileris mōtani dicti. Vtranq; proponimus doctioribus arbitris expendendam: possunt siquidē esse in dissimili similitudine, & tamen congeneres, veluti ferulacæ illæ Afræ vel Cyrenaicæ: Quibus nostratis triplicis Angelicæ & Imperatoriæ (eximiis & penē diuinis, tum nominibus, tum dotibus nobilitatæ) si non sunt affines, certē accenseri, ne dicam præferri, sunt meritæ.

SPONDYLIVM, Germanis falsò Acanthum.

NVL L I non regioni sponte oritur hæc, & pro Spondylīo etiam vulgò noscitur: siquidem præter odoris grauitatem, à qua propter virorem, Spondylium, qui itidē fœtet & radici similis est, dicta videtur, etiam nulla prorsum deest, aut aduersatur descriptioni. Plerisque locis vdis & fœtus scrobes oritur, foliis longis & latis, Panace Heracleo maioribus, & incisuris propē æquantibus, crassis, laciniosis, albicantibus: Caule, umbellis, & floribus Bauciæ, candidis, latis: radix Hyoschiami, candida. Vniuersa nonnihil fœtidi olet; & ab Acantho vero non modò viribus, sed etiam toto genere differt: nec enim spinosa vspiam: aut perinde emolliens est, nescio quàm verè, sed monebat quidā Medicus, huius solum & merum succum curasse pro enemate indi, ratus esse Acanthum verum, & sensum primum glaciæ, deinde stuporē inuexisse, cuius tamē periculum nullum facere licuit.

LIBANOTISTheophrasti.

NON multum videtur abesse à Theophrasti Libanotide plantā, Hippofelini, foliis paucioribus, parum in ambitu ferratis; semine in umbella foliaceo, lato, oblōgo, odore & sapore Angelicæ, radice ferulæ, quæ comam promittit villosam, furuam, Peucedani fermè vel Dauci, alba intus, foris pulla, odoratu medicata, fermè Syluestris Angelicæ, hanc Commentator, nescio si vidit, certē non descripsit, verum suo pictori præcepit vt pro Ethiopico Sefeli sculperet, qui perperam æmulatus est ex commentariis Dodonei, cuius mentionem

D d. i.

nem

nem nuspian cur non fecerit facilè subodorari. Folii Lactuce syluestris, sterilis, orba caule, flore, & semine, Theophrasto memorata, nusquam nobis visa.

CORIANDRVM.

VBICQVE hortorum peruium Coriandrum, à cymicum putore, aut potius cicuta fœtore viroso, & consimili facie, nominatū: tametsi & simili, vt videtur innuisse Dios. viribus cognatum. Cuius sententiam si accuratius subduxisset Senēsis, non quidem iam commentator, sed Diosco. immerentis desertor, neutiquam tam multas farragines ex Galeno, Auicenna, Ruellio, Brassauola, in suas paginas conuassasset. Quin potius, quod solertis interpretis & candidi est, à veritate Dioscoridēque stetisset, neque nostra delusa spectatione sic, nihil docendo, elapsus abiisset. Licuit enim cuilibet Philosophiæ mediocriter imbuto, dimidio paucioribus versiculis non parū lucis huic difficultati asferre. Et decuit etiā Medicum doctum hunc admodum pauca differere: Coriandri aut herbam totam, aut semen in vsum vt plurimum venire: & eius quidem, aut aridi, aut virentis: neque tam multis rixis, sed multiplici experimento, & antiquorum certissima obseruatione, eius expressum succum herbamve contusam, illitu tumorum feruores cōpescere; semen verò stomacho multis de causis proficuum, concoctionem iuuare, vaporum sursum eruptionem flatuumque impetum sistere, temperatāque qualitatis alimentum esse, vnde sanguinis seminisque incrementum, ac ne quidem correctum prodesse, ne tantoperè auersentur illud meticulosi isti declamatores: cum quisque Pharmacopœorum, aut etiam è plebecula quotidianis epulis aut medicamentis correctum misceat, nullo inde percepto nocumento. Plerumque etiam illud saccharatum officinarū, neutiquam correctum est: nisi putes saccharo, igneq; igitur non aceti frigiditate, sed potius seminis siccitate & tenuitate, virus fœtidumque spiritum abstergi putandum.

Rationis subductio igitur hæc est: Coriandri herbam præsertim succo frigidam esse, adeoq; nonnullis in locis, Arabum testimonio, eius succum epotum exitio esse: quod de Hiulca recentiores etiam exploratum habent: Herba nempe vesca & boni alimenti, succus cuius, hominem necat. Quapropter & sacris ignibus illitus reprimet succus inflammationē, exceptus polenta panis medulla, quam Galenus haud reiciet, vt qui libello de paratu facilibus, ex antiquis doceat hordei farinam polentam panemue & similia addi solita, non tam quò agant, quàm vt agendorum succorum vires excipiant. Tametsi videntur etiam iuuare digerendo, & siccādo, vt hordeacea, aut etiā demulcendo, vt medulla. Atque huic responsio eruenda obiectioni de strumis: multa namque sunt non calida, quæ strumas incipientes discutere valent: eoque hic farinam frescæ fabæ addi vult Dios. tum excipiendo medicinam, tum etiā iuuando actionē: Digerit namque faba, cumq; Coriandri succo mixta moderatè repellit exsiccando: qua etiam vi testium phlegmonibus opitulatur: sicca enim optimè id præstare, modò modicè refrigerent & discutiant, præsertim initio, Methodus Galenica docet: sic Plantago etiam Dioscoridi, sic capilli Veneris strumas discutiunt.

APIVM Hortense. Σελινόριον

Germ. Peterfilgen. Gallis. Persil. Ang. Persele.

MALIM equidem elinon quasi Lunaticum dictum, ab illo formidando affectu, quem accerferet esu, quàm à palustri solo, vbi non semper nascitur. Ei autem non desunt vires quædam Coriandro analogæ. Siquidem eadē fermè vtrunq; præstat, experimento & Diosc. suffragio: non tamē cum dicimus analogas, easdē aut similes, intellectū iri volumus: sed sic loquimur, vt enucleemus istius authoris scitū solersq; ingeniū, pauci eloquii & veritatis amicissimū. Vt quid nō argutetur nūc criticus ex Galeno, hæc Methodis aduersari, calidū nempe Apiū? inflammationibus oculorū mederi, æstuanti stomacho amicum mamisq; turgentibus: & tamē hæc Dioscoridicā medicatio, eiusdemq; intellectio, est Galenicæ Methodi anima, perquàm dignā cui nauet quippiam operæ sedulus Senensis: Sicque se expediat, esse præsidia non parum multa, quæ contrariis, aut valde diuersis polleant.

STIRPVM aduersaria noua. 315

ant effectiōibus, & tamen eidem medeantur affectui eiusdem incrementi & modi. Id in capitis fracturis atque vulneribus facillè de Galeni Celsique lectione, & medicamentorum collatione discas: quorum hic siccantibus frigidis, ille verò calidis digerentibus, etiamque humectantibus feliciter vti suere: sicq; testium tumoribus violaceum farinis exceptum leguminosis quidam, alij verò Cretensi feruido vino exceptum Cumini pollinem medetur. Sic hic nihil mirum Coriandro sicco refrigerante, & paulum quid astringente partim diffipari, partimq; repelli materiam eiusq; incrementum, vel Apio calefaciente digerentq; in halitum per poros laxatos diffilari. Multa cum sint Apij genera, omnium frequentissimum gratissimūq; cibus est domesticū, eōq; merito tacita cōiectura magis quam certa vlla expressa figura, verum antiquorū putatur. Nam illud perelegans & rarum, quale viruit in hortis CRISPATVM superiore anno è montibus allatum, nihil distat, nisi foliorum crispatis oris, argutioribusque & minutioribus incisuris. Istit haud abfimiles cetera species, viribus tamen efficaciores & medicatae magis.

Paludapium vocatum satiū quidem maius, sed ingrati tum saporis, tum odoris, vt si PALVDAPIVM quod Apium merito fuerit Chrysippi Dionysiq; consilijs Medicorū, à cibus abdicatū, quia propēsius paroxysmum epilepticum excitet, acieiq; obsit: istud palustre sit merito censendum. Est tamen efficax valde, eōq; Arabibus & Pharmacopœis nonnullis vsitatus in syrupo ad obstructions, Bisantino & 5. radicum.

OREOSELINVM, sine Petroselinum.

OREOSELINVM verò radice est crassa, longa, alba, odorata, acri, aromatica, quam quā caulem promit, capillamenta quādam in ambitu habet Libanotidis modo. Folia à Venetis reperto Macedonico Petroselino similia & aequalia: caule non procero, sparso: Semen & umbella non diuersa. Rarius istud, nisi montosis Lugduni, prope Sequanam, & in valle Ostensi Pedemontana.

MACEDONICVM.

ADOMESTICO perparum distat effigie Venetorum Macedonicum vocatum: Folia consimilia, aut potius Saxifragæ Pimpinellæ: caulis cubitalis, albicat umbellæ, semenq; euanidum, pusillum, minus, minorisque energiae & virium, quam satiui Apij, multo studio ceptum est coli, quia rarum, nescio an verum.

HIPPOSELINVM, sine Olusatrum.

PERQVAM similes Olusatrum & Smyrnum, adeo vt minus circumspectè vtrumque exploranti, alterutrum vtriusvis possit veram delineationem representare: at cui vtraque planta viridis præ oculis, atq; descriptio non item. Magis conspicuæ differentiae sunt hæc. Istud genus, quod plebecula frequens esitat, præsertim primulum asparagos dum promit, vocitatq; Macedonicum vel Alexandrinum, vt Angli, in hortis copiosissimum, vbi radix illi crassior, magis succosa, vesca, & tenerior, quam suapte sponte nato. Foris color pulchus, intus albus, odora, gustu grato, & non nihil medicato. Caules edit alæve multas statim à radice, & folia Apij palustris, sed maiora, rotundiora, viridantia ex atrore, vel lurida: caulis striatus, bicubitalis, concavus, Apij umbellæ, chorymborum instar, pedulæ visuntur maturitatem assequutæ, onustæ femine copioso, atro, vnde illi Olusatram, pleno, graui, semisphærica figura, sed paulum quid vtrinq; retusa in basi, medicato gustu acri, ad Smyrnum accedente. Doctiss. Marcellus & Brassanola esse verum Hipposelinum asseruerunt, quod qui respuunt, anili prorsum argumento, non vt veritati, sed suæ potius dignitati consulunt, ne & Leuisticum vulgare abiurent, pro maiore Selino, nève verum Smyrnum, doctiorum omnium iudicio, melius & repertum posterius in Italia, in huius locum sufficiant. Sicque volens vidensque errores ingeminat, cudit, & tegit Senensis dictator, in faceto hoc seculo plaudente. Virgilius Marcellus tibi peruersus interpres immerito videtur, quippe hoc

Dd.ij.

non

non est pervertere, si radices foris nigras, intus albas in quopiam non tibi viso codice aut exemplari legit & scripsit. Peruerteret autem, si contra quam author innuerit sensum exprimeret, atqui si, uti tu vis, Dioscorides nullibi meminit, igitur nec aduersatur, nec Mathi-olus meritò Hipposelinum verum auersatur. Quod tamen vulgus Italarum avidissimè expetit in acetarijs, non secus atque Germanorum, Anglorum & Græcorum, qui etiamnum, ut iam tum tempore Dioscoridis, cum Smyrnio confundunt. Valde familiare olus est, alit bene & præstat eadem quæ Apium, sed efficacius. Sic Angla plebecula *Pulegium* Origanum, Anagallidem autem *Pimpinellam* facit. Et Hipposelinum Alexandrinum, Apium vocant. Leuistico autem est semen multum diuersum, sapor, odor, & tota umbella: nullus fermè vsus in acetarijs, non enim oleracea est, qualem optat Dioscorides, sed ingrattissima & acerrima gustu.

SMYRNVM.

*J*A M in procinctu fuerit vera Smyrnis cognitio, & cum Hipposelino ac Leuistico distinctio, cui nota sit illa planta multis iam diu Belgie & Gallie hortis enata. Cuius radix cõsimilis Hipposelini, aut Ferulæ: folia pauciora, maiora, crassiora, ima retusiora, summo caule circinatæ rotunditatis: quo quidè traiecta, ut Perfoliata herba dicta, cernuntur, proxime ramicellos amplexa, umbellis Anethi aut Perfoliatæ donatos. Floribus albicantibus, aut pallentibus, ubi semen fuscum, subrotundum, Raphano minore, Brassicæ par & simile, prorsum Myrrhæ spirans, acre. Commentator commentatorum Senensis, morosè nimis, cum in superiori suo, tum in hoc Smyrnio semen Brassicæ exquirendo satagit, lectorem seque intricat suo more. Nam & illic paucis interiectis lineis sibi refragatur, & hic (quia, ut fermè eius omnia, emendicatam habuit plantulam, radice mancarn, umbellis semineq; chartis fortè appressis, eoque minus exactæ cognitioni aptis) Brassicæ simile semen negat, nec quicquam melius indicat.

LYGVSTICVM.

*S*I quis Genua itinere terrestri profisciscatur Sauonam, & paulum ad læuam Austrum marè versus desleat, magnam copiam videbit huius Lygustici, inibi propemodum ubi Saliunca visitur oriunda: verum illic, unde nomen habuit, apud Lygures, quibus nummus fermè Numen est, non solum hæc, sed etiam pleræque multò præstantissime stirpes neglectui habentur. Vniuerso illo tractu maritimo reperitur hæc, cuius semen fuscum, odorum, Fœniculi fermè, vescum est, multoque vsui illic motum accolis, Mei simile & par umbellis, è caule Ferulaceo, alis diuiso, folia ferentibus angustiora, Galegæ aut Sileris: radice Panacis, odora.

PASTINACA Domestica.

{ *Ang. Persnippe.*
 { *Gall. Pastinades.*
 { *Ger. Mören.*

*Q*U I A sponte hæc in agris nascitur, quamq; quælibet paupercula gens pascitur, Pastinaca dicta videtur, quemadmodum etiam Staphylos à radice rapo Bryonig (quæ & *σάφύλος* etiam vocatur) non ita absimili, appellationem traxisse potuit. Tamen non esse figuram diuersam à satiuâ Pastinaca, sed viribus duntaxat ignauioribus quam Sylvestris, ex Dioscoridis oratione non liquet: tamen, quia posteritatis consensu, & multo vsu ista recepta est, ideo ut genuinam agnoscere visum est. Similis Sisaro facie, similior tamen Elaphobosco, Sylvestri Pastinacæ, siue Baucig officinis dictæ, visitur: lutei namq; sunt Baucis flores, & radix concolor, & eiusdem saporis.


SYLVESTRIS.

SYLVESTRIS similis est tota Carotis, seu Dauco, cui Galeni Pastinacam syluestrem succedaneam faciunt etiamnum Pharmacopœi. Umbellæ densæ & satis magnæ sunt; flores candicant. Eascatent arui & lata, minor multò superiore, & radix eundem gustum, sed medicatum exhibet: minus tamen cibis expetita.

SISARVM *Angl. scyrrer. Gallis. Ceruys.*

NOSTRATE Sisaron retinet cōspicua vestigia appellationis & similitudinis Sionis: alioquin ex descriptione antiquorum, quibus notissimum fuerat, non satis notum, nisi hac nomenclaturæ & radicum coniectura: ideo quòd vulgò frequens Norbonensi agro (non perinde in Italia aut alibi) vscendi causa alitur, legitimum putatur. Sapor illi quàm Pastinacæ domesticæ gravior, cui facie similis est, aut Laueri, quem Pastinacæ aqua-
Pastinacæ aqua-rica.
 ticam fecerunt: sed in radicibus discriminis plus: sunt enim ex vna quasi radicis basi pen-
Hesiodi Asphodelus.
 dulæ, bulbosæ, teretes & oblongæ, Oenanthæ Asphodelivæ modo; quæ quia vescæ sunt essentne illæ ab Hesiodo stultis exprobratæ, vt quondam ambigeremus fecerunt. Nam Dioscoridis Asphodelus non homini, sed pecori potius, aut sui alimentum cedat.

BATTADES, *Ignames. Ang. Potades.*

HVC Sisaro non parùm accedere videntur radices illæ, quæ insulis non procul nouo Orbe disitis, suapte spontè oriuntur. POTADES vernaculè tum indigenæ, tum Hispani illic vocant, quibus hæc in patina & Veneris illicia frequens veniunt: singuli bulbi teretes, oblongi, Napum vtrinque obtusum æquant, color pul-

 lus illis foris, albidus intus, sapor gratus valde & tener, quasi Milii delicatioris, aut fabæ fresæ, cōque gustu insulsæ sunt, nisi condiantur: salæque aceto & oleo interdū eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis. Hisce congenere sunt & persimiles quæ ab Hesperia, Ethiopia, & Guinea afferuntur, Ignames vocatæ, quales aliquoties esitauimus: folia vtrisque hederacea & Maluacea audimus.

PASTINACA Marina, an Secacul Arabum?

ERVTA shuius radices in maritimis sabuletis Norbone inter Eryngia, dum esitat plebecula illic Pastinacæ Marinam vocat: sunt enim prorsum eodem sapore, nec longè à figura absunt, nempe longiore radice Pastinacæ aut Eryngii; caulem sesquicubitalem, ferulaceum, striatū, Eryngij fundens, quem multæ alæ è geniculis emergentes ambiunt per interualla vtrinque: folia crassa, mucronata, pingua, in quo summo albicant flores, quædamque rudimenta umbellarum effigiant: vbi semen spinulis refertum muricatum & Calcitrapæ, aliquantò Pastinacæ gustu, sed salso.

Baucia, an ELAPHOBOSCVM?

DVAS PASTINACAS Syluestres, alteram ex Dioscoride, alteram ex Arabibus, scitè statuunt plebs Pharmacopœorum. Illam Dioscoridis, vtiam monuimus, pro Dauco substituunt ex Galeno. Hanc Arabum, quæ dissimilis est (quippe foliis, facie, floribus & caule similima Domesticæ, sed radix minor, gustu tamen magis vegeto & medicato, & paucioribus foliis) BAUCIÆ nomine discernunt, quam si attentius expendas & cum Elaphobosco Dioscoridis conferas, nihil prorsum erit, quod requiras. Monspelliensum autem pabulum Ceruinum Elaphoboscum putatum, multum abest à veris notis, vt superius dictum.

Dd. iij. COSTVS

HVC etiam pertinet noua & perlegans illa, quam quidam vocant hodie Costum Illyricum: folia enim sunt lineamentis Pastinacæ maioris, terram fermè radentia, inque ramulis caulem sesquicubitalem sceniculaceum amplexa: vmbellę summę in cogerieramulorum lutei flores sunt: radix pollicem crassa, admodum amara.

Barbicapra & VLMARI AVulgi, an Rhodora Plinii?

MARGINENSES herbidi, aut prata vmbrosa, vda, latiora, tēperatiōrū regionum Gallię, Germanię, Italię, & Anglię, vix elegantiorē habent herbam ista, quam recentiores vocant Barbam Caprę, propter ramulos florum scetura racemosa amictos, in prælongas quasi comantes barbulas effigiatos, aruncos, spirillōsque caprarum imitantes: candore nūeo, puniceo, roseōve colori intermixto, visu & odoratu pericundo: folia Caryophyllatę, sed situ aut Agrimonie, Vlmi folium admodum exprimentia, superficie, rugis, & ambitu Agrestis Valerianę, vnde vernaculum nomen: nam recentiorum est herba, nec enim de antiquis noscitur, nisi pro Rhodora Plinij habeatur, quod studio hīc relinquimus, nec alibi in aliis excutiemus, vt lectoris exercitationi simul & iudicio id relinquamus.

CENTAVRIVM Maius Duplex. κενταύριον τὸ μέγα.

Gallis. Grande Centauree, Belgis. Broote Scentory. Ang. Great Centorye.

EFFICIE & natura abesse Paruum Centauriū à maiore, superius patuit in illius classe. Maioris autem duo genera, foliorum incisura dūtaxat differre videtur, magis quam radice, quę vtrique, cūmaxima, equat carpum humanum; colore Pentaphylli, flauo succo, subruffescēte: flos & semē vtriusq; eadē: folia verò ex vno octona, aut septena, non pediculo, vt in alio, sed medio neruo aptata, tarfi aut serratulę modo, serratis & profundè laciniosa: radices cōsimiles, quę ficcata, vtrius Rhapōtico, falsō eadē olim putabantur. Iam vtrius nullo discrimine vtuntur sanguinem spuētes & asthmatici: etiamq; matricis fordibus educentibus, vtitur Dodoneus, quem aptius possent hīc erroris insimulare critici, quā eius Centaurii maioris iconem, vt non legitimam, recusare. Nam illic potuit decipi, Arabas sequutus, qui vires maioris & minoris ferè contrariis confuderunt, hīc neutiquam. Vireta enim Belgica plurimas huius Serratifolii alunt plantas, vsui optimas, & nulla nota à vulgatiore, nisi foliis Iuglandis, discretas. Semen vtrique Cnici simile & par, in capitulo squarroso laccę nigrę maioris: flos purpura albicat. Hoc posterius, Belgicis hortis frequentius: rarius autem Alpinis tractibus, vbi alterum frequentius, etiam spontē.

OTHONNA Italorum, aut flos Aphricanus, an Lycopersion Galeni?

Belgicę, Thunis bloemen.

EX Aphrica, Italię, Gallię, cunctisque ad septentrionem hortis factus est inquilinus flos hic specior, quā salubrior: quem idcirco Africanum vocant, vel Thunethanum. Foliorum magnitudine, ortu, positu & ferrato ambitu, quadantenus Valerianam syluestrem imitatur: in ramulis sumis flori calyces, ocellive Lychnidis maiores, intus flauo miniatōq; rutilant, holoserici emula gratia, sed tetro putent comminus odore: semen villosum nigricat, oblongum, compressum: fibrosa & foetida item radix, non secus atque vniuersa planta venenata non immeritō creditur, vt cuius esu porcis tumeat rostrum & fauces, ac nonnullis, vt audiuimus, exitio fuerit. Cuius potius varietas est, ille duplō maior aureus, & tantō pulchrior flos, quem Itali Othonnā decernunt: horti in deliciis habent ad coronamenta; quia aut minus, aut perparum tetri spirat: foliis, aut caule, non diuersis, sed multō maioribus: flores multipla serie maiores & confertiores cernuntur, aureo fulgore visum oblectantes: calida gustu vtraque videtur, vixque opinionem Othonnę tuetur, vt diximus in Othonna Monspelliensi.

An VALERIANÆ nostrates sint Dioscoridis?

VALERIANA maior.

Ger. Gros Baldrian. Bel. Speerccrypt. Gal. Valeriane. Ang. Serwall.

IMPENDIO morosiores sunt, qui nostratem Valerianam maiorem negant esse *Phu* apud Dioscoridem; nam florum Narcissi collatio, quam vnā isti vellicant in Valeriana, potius auctoris inculcare diligentiam videtur, vel nimis frequentem illam inuersionem, aut ^{PH V.} peruersam, quantitatis designationem, *μακρὰ* pro *μικρὰ*: *ῥιζοειδὴ* pro *μειζοειδὴ* (cuiusmodi in Dioscoride & Theophrasto crebrò obseruatur:) quā Valerianam improbare, utpote quæ cæteris indicis quadret, & plenè respondeat antiquorum *Phu* facultatibus, quibus multis valet, vnde Valeriana vulgò vocatur. Eius hodie noscuntur quatuor differentię. Quæ in hortis ubiq; maior & notior vocatur, caulē emittit bicubitalē, glabrum, concauum, eque geniculis folia prelonga altius sinuata edentē, Erucae aut Pastinacæ diuisura: flores sunt nō inuenusti, in summis ramulis umbellatim collecti, purpurantes per initia, odori: radix transuersa, humi immersa, crassa, pollicē æquat, calidiuscula & exsiccans, lotio ciendo efficax, suauē olens Nardum; sed tantillum grauitatis mixtæ prodit; certiore adhuc coniectura esse antiquorum *Phu*; quam potest quispiam festinè dictā putare à putore graui odore mixto Nardæ suauitati, quem *Phu*, siue *Phy*, aduerbio admirantis & abhorrentis auersarentur subodorati, qui sic appellarunt.

VALERIANA Sylvestris.

SUNT & sylvestris in Northmaniæ & Anglię humentibus nascentis, caulis, ortus, & flores Domestice multum similia: quinetiam radix, suauitas, Valerianam testatur, folia autem in longitudinem pedem & sesquipalmum porrecta, altius incisa, & crenata minutim sunt, Sionis, Laueris, aut Barbæ Capræ ritu, floribus candicantibus, penè Eupathorii Canabini.

VALERIANA MINOR.

EST actiam gaudent syluosi riuuli, humentesve tractus, præsertim Septentrionalium, totaque effigie maiorem Valerianam fatetur, minor tamen multò, adque imum folia aliquā multa promens, Nasturtii aquatici quadantenus; in medio caule minora habet incisa, superioris Valerianæ similia, flosculis syluest. Valerianæ, aut Nardi Montanæ radice longiore, geniculata, reptandoque sese propagante.

VALERIANA Peregrina Belgarum, & Herbariorum.

EQVIDEM nescimus nos, nec sciunt fortè qui huic Valerianæ nomen impertierūt, quid hæc habeat Valerianæ præterquam exiguam cum foliis similitudinem, aut potius cum Astragalo: sunt enim in cauliculis & pullulationibus consertim enascentibus, rectis, folia pennatim gemino stipatu concinna, serie neruo medio hærentia, minutius ac elegantius quā in Astragalo, exiguis flosculis, multis, cōsertis, viuida cærulea placentibus, eque medio breuia staminula aurea emittentibus: postque semen æstate media nigrum pusillū in siliquula oblonga, creberrimis filamētis radice donata, hortis Francei, Belgii, & potissimum Anglię familiaris, ad concinnandas ædes, olfactoriola, & coronamenta.

PHV MINIMUM.

PRÆTER relatas hæc est quædam harum omnium minima, flore & umbella ex candore purpurascēte Thlapsi, & foliorum diuisura tertiz simili, sed adeo exigua, ut vix minoris adiuge folia æquent, palmum alta; radix candida, exilis admodum, & Nardi penè infimis fibris similis, odore tertiz: interdum montosis locis saxorum commissuris, interdū in segetibus, ut propè Monspellium, adolefcit. Nec non sæpe nobis visa & enata in Angliā.



Dd.iii.

MON

MONTANA Nardus.

DE Montana Nardo Anguillarii iudicium & descriptionem sequimur, istaque planta admodum oblectamur, quam inuenimus tum motibus Mindeno coterminis, tum Veganiis arduis accliuibus: natura paruula est, Valeriana minori persimilis, flore & folio, sed purpurascens, Erucae diuisura, & Valeriana maioris: radici bulbi, bini, oblongi subsunt Orchis ritu, e quibus caules sesquipalmum alti.



PHYTEUMA Norbozensum.

QVAsi foret ad amorem serendamque prolem apta, Phyteuma vocata fuit: forte etiam seminis pertusi occasione, quale etiam copiosum in singulo pericarpio, sed exiguum Hyosciami par, rotundius tamen, pertusum impresumue foraminulis, visitur hodie in Galloprovincia, & Norbone oliuetis propè Monspellium: ubi studiosis admodum notum est isto nomine, effigieque Valeriana minima: verum folia illi in imo infestoria luteola sunt, superiora autem diuisura & magnitudine pusille Valerianae: plusculi sunt flores albi muscosi oleae: semina pusilla instarq; vnionum rotunda: sed quae paululum cernuntur compressa, vestigium foraminuli insculptum habentia, inclusa Pliniana folliculo Rheseidae, in cauliculis palmaribus & sesquipalmaribus, reptantibus. Radix exigua Valeriana minima. Tamen non nescimus eam tam concisa descriptione nulli ferme integrum esse quodnam Phyteuma, verum sit asserere. Tamen prudentius duximus istud coniectari, quam ut Mathiolus Campanulam quandam, à Fuschio & Dodoneo iam diu depictam, intrudere.



PIMPINELLA, aut Bipinella. Ang. Burnet.

ANTIOVIS putatur indicta omnes Bipinellae differentiae, idque recens nominis adeptae a foliorum binis ordinibus pinnatim, plumatim tarsive effigie digestis: cuiusmodi Filipendulae sunt perquam similia sanguisorbae Bipinellae, eoque hic recensenda & distinguenda quodam cognationis & consecutionis filo. Est itaque Bipinella quae minima, frequentissima ruri & domi notissima, pedem aut cubitum alta, exili radice, exiguis Pentaphylli, sed numerosis & teneribus turionibus, oleraceis multis foliolis, æquis spaciolis Chamedri vel Eufraſie similibus, ambitu crenatis & bini ex aduerso positi: Summis in caulibus rotundi flosculorum glomeruli muscosi, interdum punicei ex candido, interdum subfului insunt, qui floribus elapsis Adonidis, vel Mori fructum exprimunt. Poculis gratia conciliat saporem & odorem atomatico & vinoso, quodammodo Melonis: nec minus in acetariis expetita, ex oleo namque sale & aceto Belgi, Angli, & Galli libenter esitant. Peramica visceribus, Hepati, Cordi, & praesertim spiritibus, perhibetur: magne commendationis etiam ad Pestilentes morbos, ut cuius succo etiam abiguntur febres exitiales, locis gaudet incultis, aridis & squallidis collibus & marginibus: Astrictoria vi & exsiccante pollet: citra mordacem vellicationem: Eoque internis & externis sanguinis eruptionibus & vlceribus opitulatur: vocaturque Bloetwurtz Germanice, id est, Sanguinaria vel Sanguisorba.

SANGVISORBA altera, maior, sive Pimpinella.

HÆC

HÆc tamen natalibus differt, & plusquam cultu, contrā quā nonnulli arbitrantur, tamen quanta quanta est, vt maior multo, sic similima est. Folium interdum Betonicæ par. In alis & caule duum, triūve pedum alto. Capitulis item iisdem, sed lōgioribus, rufescentibus, semine anguloso, triangulari: herbis, montosis lubens oritur, & plurima in Angliæ Northamptoniæ pratis & paluis prope Aigshot: vtriq; vires eadem, sed hortensi gratior & potior est. Suauem tamen & maiorem vino mersam meminimus illic.

Bipinella Saxifraga vtrāq; an PHELLANDRIVM Pl?

Ger. Beuernel.

QUIA Saxifragiæ nomenclatura planè diuersa genera notat herbarum, & perquā diffita, vulgōq; indita, nolimus ita nominis aura sonōve abripi, vt naturæ vel cognatas classes, vel cognitioni mutua accōmodas, faciliè diuelleremus: non enim magis hisce cū Dioscoridis aut Italicis Saxifragijs cōgruit, quā diureticis Rusco, Polygonato, vel Asperago. Harum aut notissima hircina, nonnullis Bipinella, cuius folio adeo similis exit, & facie, vt eadē planè putetur: nec eas sepe pilis discernere est, vt putat verificator: *Pimpinella habet pilos, Saxifraga non habet villos*: nam eodē proximè loci tractu videre meminimus Saxifragam foliorum interna superficie pilosa: nullos tamen in Pimpinella, Sanguisorba, vel hortensi videas. Anne non folijs innatos, sed inter frangendum tractos villos, tenuissimave & fermè Arachnea stamina, innuit, qualia in Scabiosa animaduertas? In caule rotundo, glabro, cauo, è geniculis, flores in vmbellis, albi, Dauci semē, acre, Carui, sed calidius, acrius. Radice multo acriore, albida, Dauci Sylvestris. Germaniæ, Belgiæ, Galliæ, Angliæq; in pratis siccis, secus sepes.

MAIOR

In syluis verò tota maior & vmbrosis pratis, sed minus acris feruidave, quā minor, & folio longo propius exprimit Apium, quā Pimpinellam. Creberrimus vsus apud Belgas vtriusq; seminis & radice calculo frangendo lotioq; proliciendo, vehementior siquidem vtrumque præstat, Proindeq; nulla magis Pliniani Phellandrij opinionem tuetur. Ruta quippe pratensis dicta, & Parisiēsis nostris præceptoribus Phellandrium putata, multo minus quadrat, multoq; ignauius præstat id muneris, quā Hircina isthæc, neutiāquam à viroso hircūmq; olente sic dicta (Dauci namq; Pastinacæ vel Ligustri quiddam, nec insuaue redolet) sed quia illa adulti hirci, eo quo docent Practici modo, sanguis & carnes eximium sint calculosis præsidium. Etiamq; Ictericis & Hydropicis. Petrifindula verò vocatur etiam eadem prærogatiua.

DAUCVS secundus Selinoides.

VENETI Pharmacopœi quā Matheolus Daucum alterum facit, Saxifragam dicunt, illiq; vires consimiles frequenti experimento asserunt: nihil tamen obstat quin sit Daucus alter Dioscoridis. Folijs namque Coriandri, aut Petroselini Macedonici veri, do natur. Semen illi in vmbellis oblongum, angulosum, Fœniculi modo, Radix aroma olet, suavis gustanti, superneque comata, Mei modo.

VVLGATIVS ammi.

QUIBUSVIS fossarum ripis, nec solum inter olera sponte Galliæ & Angliæ videas vulgare istud Officinis Ammi Iunio & Iulio, flores pusillos, in sumis albicantes, radia tos, vmbellis Carui gestare: semēq; Augusto exiguum, pullum, sed nulla aromaticitate, acrimonia pauca, amarore ingrato, & proinde verum Ammi inficiante: caulis sesquipedalis, & bipedalis est, rotundus, in alis folia oblonga, bina, terna, & quina, singulo quasi pediculo, & alia pusilla latius sparsa, Hircinæ planè, Saxifragiæ, aut Sisari, summas vmbellas obfident: radice Cicute, albida.

{ Anisum.
Carum.
Creticum verum.

{ Daucus niger Theoph. siue Carotta rubra.
Carotta syl. siue Daucus Officinarum.
Cerefolium.

Ammi

Ammi omne. { *Creticum.*
Gustu Origani.
Gingidium.
Scandix, pecten Veneris.
Vismaga.
Percepiet Anglorum.
Caucalis triplex.
Oenanthe herba.
Filipendula.
Oenanthe siue Filipendula montana.
Oenanthe maxima Cicutæ facie.
Cicuta.
Cicutaria.
Myrrhis.
varietas.
Seseli Peloponense, folio Cicuta.
Seseli Creticum siue Tordilion.
Siler montanum.
Seseli Pratense Monspel.
Thabctrum, Sophia.
Delphinion.
Melanthium satium.
Melanthium sylvestre duplex.
Cuminum vulgare.
Ethiopicum.
Sylvestre villosis glomerulis.
Cuminum sylvestre, filiquosum, duplex.
Nucula sylvestris Septentrionalium, an Bunion
Diosc. & Bulbocastanum Tralliani?
Pencedani facie pusilla planta, an PseudoBunion
Diosc?
Heliochryson.
Sideritis altera Diosc.
Sideritis Achillea.
Achillea montana.
Millefolium siue militaris flore { *salbo,*
purpureo,
luteo.
Millefolium aquaticum, Coriandrinis foliis.
Stratiotes Millefolium.
Aquatica Scdi facie, sua reddenda classe.
Tanacetum { *maius.*
minus.

Matricaria non est Parthenium.
Abfynthium.
Abfynthium vulgare non differt specie aut fi-
gura à Pontico & Romano.
Abfynthij veri dua duntaxat differentia.
Abfynthium Sardinium Galatie, non Santo-
nicum Gallie, est Anglorum, Germanorū, &
Gallorum, Abfynthium Romanum.
Abfynthium Seriphium siue marinum verum,
folio & facie Abrotomi femina.
Seriphium Egyptianum.
Seriphium Commentatoris falsum.
Santolina siue semen sanctum officinarum.
Capnos, siue Fumaria.
Fumaria varietates.
Fumaria lutea, montana, & alba, siue Split Illy-
rica, an Ety Phragmites & Fumaria Cori-
dalis Galeni.
Capnos Plinij bulbosa.
Capnos bulbosa caua, & varietates.
Chelidonium maius.
Aquilegia.
Arthemisia.
Arthemisia tenuifolia.
Arthemisia altera.
Arthemisia marina.
Ambrosia.
Abrotomum mas.
Abrotomum mas Monspellensium.
Abrotomum peregrinum.
Abrotomum femina, Chamæcyparissias.
Cotula foetida est verum Parthenium, & an Ga-
leni & Pauli Amaracus?
Anthemides, siue Chamamille.
Leucanthesis.
Cotula marina.
Bupthalmum.
Heranthemum, Adonis.
Helleborus niger Theoph. folio Ferulaceo.
Pyrethrum vulgare.
Pyrethrum umbellatum.

ANISVM.

MAGNI fuit olim Anisum antiquis, præsertim Pythagoreis: non modò quia cibi ap-
 petentiam reuocaret, vnde Anisū & Anicetum dictum putant, sed vt verisimilius orī &
 vñci τὰς ἐμπεφυχτάς, remittit & laxat tensiones flatulentas internas, & externas. Et sanè
 nullum è cæteris flatum emittentibus oleraceis seminibus gratius est ventriculo, minus ha-
 bet acrimoniæ, aut plus suauitatis, quàm istud semen, quod neutiquam, vt ex Diosc. Gale-
 nus arbitratur, 3. gradu hodie gustanti apparet calidū: nisi quia ruri rarò aut nuspiam apud
 nos visitur, in hortis verò ubiq; gentium etiam Septentrionalium, vt Germaniæ & Angliæ
 prouenit, cultu & solo nonnihil deponat caloris.

D A V C A S Cretensis Vernus Diosco.

VT natura sic appellationis cum Cauclide videtur particeps Daucus, quē etiam *Δαυκός* vocatum, à seminis in umbella quasi furfuraceas verruculas & aspergines ostentantis effigie, à qua & viribus communis nomenclatura fuit, diuerso alioquī folio à Daucis est: nam quod primum designat Creticum vocatum Dioscori. à Selinoide non parum differt, nec tamen id sola Creta fert, quippe Germanicæ Alpes non modò, sed etiam Genuensium colles, & Geneuentium circa Iuram rupes, hoc Cretico abundant, vnde Lugdunum atque alia ad emporia hodie venum deferunt: eoque plurius emitur etiam Venetiis, quia ad Theriacam & similia anthidota efficacius est, quouis alio congeneri Dauco, cuius folia exilia, inter Fœniculū & Carottā media sunt, vmbellis cādidis, floribus Anethi, copiosum semen, oblongum, vt Cumini, sed lanugine albidum, gustu acre, odorum, & cuius vsus potissimum est: vsui etiam radix, quē Pastinaca minor, gustu feruidiore, & odoratior. Huic, quod minus sit Creticū, si quid deest, solum, celūmve erit. Sanē effigie nihil, viribus autē perparū abest. Quo tempore Senensis cōmētabatur istud, Patavinū viretū vnam aut alterā plantā alebat, vnde ille habuit, quod opinionē illi faciebat non nisi in Creta oriri.

VENETI Pharmacopœi quam Mathiolus Daucū alterum facit, Saxifragiam dicunt: *SAXIFRAGIA venetorum*, illique vires consimiles frequenti experimento afferunt: nihil tamen obstat quin sit Daucus alterū Dioscoridis, foliis namque Coriandri aut Petroselinī: semen in vmbellis oblongum, angulosum, Fœniculi modo: radix albicat, aroma olet, suauisque gustanti est, suā alterā, pernēque comat, Mei modo.

D A V C V S niger Theophrasti, C A R O T T A Vlgaris.

FECIT similitudinis cognatio, quæ Daucus cum Carotis intercedit, vt Theophrastus hanc Daucū nigrum censuerit. Est tamen duplicis à colore radice differentia: Carotta: isthæc namque flauet, altera purpureum atrum remittit succum elixa fixāve; cuius vt plurimum gulæ irritamento apparatus esitat vulgus. Mediæ videtur inter Daucū & Pastinacæ naturā, vtriq̃ue congener: neutra tamen dici possunt. His qui Behen album & rubrum augurabantur, suo respondetur loco. Istis nomenclatura indita fuisse videtur, ab illa quam cum Carui similitudine & cognatione fortitē fuerunt.

C A R V I.

CARVI namq; radix, & folia Pastinacæ agrestis similia, vsus, esusq̃ue non valde dispar: vtrumq; enim olere mādatur: semen tamē vegetius & odoratius Carui, præsertim eo qui pratis Ostēsis vallis prouenit, albis floribus & vmbellis, caule pedali & sesquipedali.

Vsitarius D A V C V M Officina, inter Caryotam & Pastinacā Syluestre.

NVLLE huic desit copia Officinis Italiæ, Galliæ, & Germaniæ, quæ istud frequentius Cretici penuria vsurpant, duplumque nonnulli subdunt, freti Galeni sententia: tametſi non parum facultatibus & effigie à Dioscori. Daucis absit: edunt hunc loca tum frigida, tum calida, fragosa, & margines steriliores: è radice lignosiore & minore quā Carotis; cui multum similis, caule cubitali; foliis latioribus, hirsutis; Coriandrinis, ad Bauciam accedentibus: vmbellis albidis, & semine.

A M M I.

COMPLURIA Ammi genera, quæ passim vbique hortorū obuia, neque planē displicent, quia Ammi nescitur effigies vera; neque tamen placent, quia multa in semine considerātur. Quippe *ἀμμι* appellatio videtur perpusillū quasiq; arenaceū exilitate & colore semen designare, quale Diosc. *αρεμύτιον* seminulūmve dicit, Origanū respiciēs feruidū, exsiccans. At quod passim in hortis visitur foliis Sifari, satis superq; patet è superioribus.

Et rursus illud quod in Patavinis hortis cultum; etiamq; non procul Ageno & Garumna in Aquitania lectum ad huc seruamus: foliis & vmbellis Dauci Cretēsis, semine & radice horrensis Apii, neutiquam illis in Ammi semine viribus expetitis præditum est.

IGITVR quod semen plusculis abhinc annis cœptum fuit deuchi ex Syria, aut Creta Venetiās, hortensū Apio par, sed flauo, gustu aromaticum feruidum Origanum præfert

præfert. sapius satum, non vietum, aut marcidum, delusit nos, & in eam suspicionem coniecit, quam quidam nos monuerat, fieri posse ad Theriacæ Venetæ mysteria, vt quispiam hebræus mango, Cretensiū & Syriacorū portuū Telonarius, decoctione dilutōve semina maceranda merferit: sicque compendii causa cum Pharmacopœis Venetis non parum gratiæ inierit.

GINGIDIUM species videntur.

MVLTI iam sunt anni cū industrius Pharmacopœus Martinellus nobis hanc allatā ex Syria asseribat: sed cōtrā, nos esse indigenā plantā meminimus, & biennio pōst magna copia in vinetis & segetibus, inter Pisa syluestria & Caucalides crescentem vidimus: quam si facie & viribus ad Gingidium alludit, tamen ex Diosco. & minus accurata descriptione nullus ausit pro Gingidio certō asserere: Planta enim est Caucalidi natalibus & facie eadem, folio tamen longiore & angustiore: illi vmbella candida, semen hirsutum, odore pastinacæ syluestris.

CEREFOLIUM.

Cerefoliū tamen, vt pro Senēsis cōmētatoris Syriaco deferant Medici multi, & mulierculæ, nunquam efficient ipsius persuasiones: est enim cibus gratius, efficacius & multō exploratius, quod hinc amotum, quō relegandum censeat ille, peruelimus scire.

VISNAGA.

Visnagam verō peregrinam, vt solent pleraque, sibi missa videri, multis Italiæ locis, præsertim via Pefaro Romam, & Aquitanix Ageni, secus Garumnam & Burdegala vidimus & æquē bene potest congruere descriptioni atque cetera: nam de vmbella, nulla mentio in Diosc. Foliis est pastinacæ syluestris tenuioribus, & caule, sed nudo, & minore diuisura prægrandi, adeo & rigida vmbella, vt dentiscalpiis sit apta, flore candido.

SCANDIX.

SI quid coniecturæ captari potest, cuiusmodi planta fuerit Scandix, id sanè ex capitum consequutione stirpiūq; cognatione accipiendum videtur. Descriptio enim non tam ambigua quā nulla est. Hæc tria serie recensita olera Syluestria; vix dum innotuere vlli, propterea quia incertis & paucis, partim etiam nullis verbis designata sunt. Nam Peæten Veneris, Fumariā gustu, foliis, & vsu repræsentat: vulgus Pharmacopœorum etiam Veneris, putat & vsurpat. Acrimonix verō & amaroris eiusdē momenti sunt argumenta, quæ lia sunt Galeni de Fumariæ acrimonia: quam sententiam meritō docti viri vellicant, & ipsa re clamat res: Sic Chelidonii minoris, Ari & cæparum experimur multō mitiorem acrimoniam, quā illis tribuerint antiqui.

PASTEN VENERIS.

PERCEPIER Anglorum.

QVI Percepier Anglicum probè perspectum habent, harum duarum stirpiū vtrius simile esse sciunt, & nequitiam iisdem viribus secundum: amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causa olere manditur: Figura ei Cerefolia nupernati proximi; sed herbula semper est, nusquam Spithameo adultior, toto anno suapte spontē erumpit, arido & trito solo luxuriat, sine caule, flosculis herbaceis: vehementer & repenti vrinæ ciet, muria conditum seruatur: & ex eo aqua stillatiua magno vsu elicitur. Hanc plantam proponimus magis quā asserimus, quia Herbariis nō valde notā, nequēdū quod sciamus descriptā. At Angliæ tamen Bristoiz, arbitramur, frequentissimo apud mulierculas vsu receptū est.



CAUCALIS.

POTVI dici Caucalis à seminum effigie, quæ vascula oblonga & semisphærica imitantur aut cū præarida strepitum edunt hæc semina ventis concussa, vindemiis exactis. Et sanè luxata videtur lectio Dioscoridis, aut quispiam non imperitus videtur oræ codicis

codicis hæc verba, folijs Apij similibus, adie-
cisse, quæ postea in contextu Latinum irrep-
serint: nam nostris Græcis exemplaribus de-
siderantur, & etiam superuacanea videtur,
vti vir magnæ sedulitatis & exercitæ cog-
nitionis Anguillara annotauit. Eam plâtam
quam ille Caucalidem autumat, nos iamdiu
collectam in præruptis S. Specus vocati, ad
Fanû Magdalene in Prouincia Norbonensi
hic appingendam curauimus, & liberum fa-
cimur quid cuiilibet ea de re videatur. Est
hæc caule Fœniculi, & folijs, & diuisura, cu-
bitum alta, umbella albet, & odorata est, ra-
dix vnica, recta, humi pacta, candida, sapore
pastinacæ. Verum hoc magis placent vulga-
res Caucalides, quia sūt caule, folijs, umbel-
la & semine hispidis, eoque magis congruūt
verbis Dioscoridis.



Dux namq; sunt in nostris vinetis & segetibus differētiæ, altera enim candida, folijs mi-
noribus, sed caule proceriore, & hæc Mathioli. Altera purpurescens umbellis seu floribus, fo-
lia habet latiora & crassiora: semē maius. Est istud semē argutū & elegans, nam triquetra
oblonga, & spinulis horrida habet glutinā, Glycyrrhizæ quadatenus similē, vestibus mordi-
cus hæres, ea exuta granum oblongū, Auenæ exenteratæ modo cernitur, haud gustu insua-
ue: qua quidem satis expressa nota insigniuit Caucalides Diosc. & similibus discreuit.

OENANTHE, flos vineus aut vinaceus.

NOMENCLATURA ista tres designant varias stirpes, sed florum decore, odore, & qua-
dantenus colore non dissimiles. Eæ sunt Labrusca, siue sponanea vitis, & eius cogno-
minis Vitis sylvestris, primæ florum eruptiones & germinationes suæ quiddam halâtes,
cuiusmodi Filipendulæ, præsertim quibusdam tractibus Linguagotticis & Aquitanicis, radix
& flores spirant, sed suauius multo: quam obesæ naris Commentator non respuisset, nec
doctiorum sententiam spreuisset, si verba Dioscoridis pressius perpendisset, & locis aridis
petrosisque plurimam erisset: Hic enim in Anglia, vbi libenter vtimur, non procul Bri-
stolia ad Vincentij rupes & cautes deuexas, etiam in Germaniæ aridis, plurima Iunio &
Iulio, floribus candidis, exiguis, stellatis, confertis, Brioniæ & Rutæ situ. Semine muscoso,
squamoso, rotundo, Pimpinellæ, cui folijs etiam similis, Pastinacæq; sylvestris diuisura: cau-
lis cubitum & sesquicubitū altus. Radix non altè infossa, sed latè sparsa & ampla, è pendu-
lis fibris multis pilularum, Cypri, Pæoniæ scemine, aut Alphodeli modo: quæ perbellè qua-
drant Dioscoridæ effigiei. Nam μέγαλη ῥίζα, radicem magnam, amplam, fusamq; ex rei
cognitione & alijs collatis locis interpretamur: καπλὸν παχὺ, caulem crassum, sanè habet
pro altitudine sui, quem palmarem facit: cuiusmodi est hæc nostra, nonnullis glariosis mon-
tosis: Demum καφέλας ἔχουσα πλείονας σφονγίλας, capita plura rotunda habens: cuiusmodi
planè hæc sunt. Verum versio fortè ista calamistrata, & Pliniana imitatione oppidò tubero-
sa, illi sit fortè Commentatori, aut eius Theseo Tridentino, adegitq; vt Aristolochiæ rotun-
dæ & adultæ, perquam similem facie radicē astruerit: quæ ab Oenanthæ tātum distat, quàm
Bunium vel Bulbocastanum Tralliani à Filipendula: quod plebecula Gallica, Germanica
& Anglica eum monuisset. Illa enim Fauertotes, Germani Earts nuts: Angli verò Kipper nuts
vocāt, vtriq; à nuce, castanea vel basilica, sapore & similitudine: neque enim eminet tuber-
culis, nisi valde vetus, vti Aristolochia rotunda. Et Kipper nuts opilio nūc nūcem sonat, quia
illis cibo cedit: est enim oleraceus bulbus, edendo totus & gratus, Castaneæ sapore: folijs
Gingidij, vel Scâdicis, vti superius diximus, in pediculis & mollicellis caulibus, teneris & ca-
ducis: floribus itē pusillis, albis in umbella, adeò eidē, vel Pectini Veneri, similibus, vt eius-
dē naturæ videatur. Semine Cumino aut Fœniculo minore, odorato. Arua & pingua um-
brosa amat. In Holladiâ, & Angliâ plurima, præsertim ad Pagum Cleton propè Bristoliâ.

OENANTHE vulgaris.

Filipendulæ nomen assequutæ sunt itidem plantæ duæ, quæ vt Oenanthæ non ita dissimi-
les, ita hic commodè referendæ. Ac si natalia spectes, minimè Oenanthē dicas harū duas:

Ee. j.

alterum.

Bulbocastanum

alterum quippe plurimum solo vliginoso & pratensi, & tamen Commentatoristis nomen inscripsit Oenanthies, Filipendula ademit, quæ præterquam quod viribus, etiam natalibus montosis & saxeis, vt diximus, magis quadrabat & recentiorum consensu.

Hæc autem quæ minor & veræ Oenanthæ similior, radicibus amplis, globulis oblongis, prolixis, filimentis pendulis: turiones promit, ima; folia Apio hortensi, teneriuscula, saturè virentia, cubitalem & sesquicubitalem caulem, geniculatum, alis folijsq; & umbellis Anisi vel Coriandri, flores albidis, pusilli, ætate in conuallibus herbidis aut verrucis pratensibus Angliæ: Mospellij etiam prope pontem Cellenouæ, Magalonæ inter Narcissos, atq; Gram-muntiam syluulam circum,


OENANTHE siue Filipendula altera Montana.

RARIOR multo quæ hic depicta Filipendula, nulli dum memorata scriptori. In celsum montium verticibus, vt Norbonæ ad Veganiū, in Dei paradiso vocato, Calcar contermino, nobis eruta, radice non æquè fusa vel ampla aut cirrosa: sed proxime caulē bulbosis, teretibus, lōgiusculis, æqualibus fermè processibus, modicè protuberanti b°, Corrudæ annotinæ partibus: Pæoniæ modo radicata, Caule assurgit sesquipalmum alto, crassiore, rotundo, nõnihil striato, & sulcato, imò mediòq; sui folia alterno situ emittente Filipendulæ inter & Millefolij, exigua Cornu-cerui diuisura: extremum florum, thyrsus album, speciosum amplexa, cuculatis galericulis, crebribus, cõfertis, conflatum, in Cristæ Galli, vel Chynosorchis, vel Napelli speciem.



OENANTHE Cicuta facie succo viroso crocante.

Nec quidem admodum nota hæc, nisi Borealibus præsertim Angliæ, erumpit riuiulis, lutulentis uel & riguis ripis, vbi Paludarium, cui folijs non absimilis, vel Ruta pratensi similior, multo pullulatu, virore tetro, colore & facie Cicutæ. Caules bicubitales spargit, è radice in pares Asphodeli albi bulbos multiplicata, & quasi brachiata, nullius fibræ vinculo aut interuētu (secus Mathioli) continuos, teneros: gustu acres & ingratos, succo lacteo primū, deinde flauescente viroso & exulcerante pregnantes: Umbella cicutæ: cui affinem autumant, qui maleficioparè expertos se asserūt. Vfos namq; in acetarijs nihil factum fuisse propius quam vt interirent, aiunt: alios, qui esitassent, vertigine tenebricosa palantes, nutantes, attonitos, inq; gyrum versantes se vidisse. Et certè tam non est Oenanthë, quā ab ea distat Ruta pratensis aut Cicuta. Ijs igitur & quibus ægrè lotiū it, secundinæ cunctantur, suadente Senensi, dato, & Themiso non Medicus audies: tantominus epilepticis, analepticis, atq; vertiginosis propinabis, quos tamen eximia quadā prerogatiua magnoperè iuuant Filipendulæ radices, qua calculū è renibus, mucū è vesica dissipare atq; excludere mulierculis, ne dū nobis, creberrimis compertum experimētis.



Cicuta, Cicutaria Myrrhis.

Ang. Hom-
blacke.

Ger. Schirling.

Bel. Dulle her
uel.

Gal. Cigue.

CICUTA qua flagrauit olim infamia viq; pernecabili, fuit semper notissima, uelutop à Græcis vocata ἀπὸ τῆς κυκλῆς, à circumuertendo, siue gyRANDO ea potos, qui correpti vertigine tenebricosa humi prolabebantur. Omnium regionum hæc indigena est, figura

Cere-

Cerefolii, siue Pastinacę syl. aut Myrrhidis, & figura adeò cognata Cicutarię vt indiscrcta penè similitudo, necis occasio fuerit nōnullis, qui esitarāt, etiā nostra memoria. radice etenim simili, alba, breuiore, crassiore, caua superius, quā caulē alit, qui planē ferulaceus, quatuor aut sex pedes procerus est, cauus: dēfē admodū geniculatus & maculosus interdum, umbellis dēfis, flosculis minutioribus, & anguloso Anisi semine: odore quā quauis alia nota, discernitur à Myrrhide: tum parua, quę Cicutaria non foetens vocatur: tum ab odora Myrrhide verā, & saluberrima.

CICVTARIA.

CICVTARIA FATVA quę minus Foetida.

NE quęquam fallat, quia nō se prodit odore hęc, aduertendus eius color, qui atrior aliquātō, nec maculosus est, nec adeò putorē halātibus scrobibus, umbrosis, vdis exit, sed ad margines & sepes paulò editiores & ficciores: alioqui nō minor copia secus vrbiū ag-
geres & vallū sepes visitur. Equidē noxia & inuisa olitoribus & hortis, vbi spontē, viridiorq; & nitidior, p̄sertim minus feruidis, Petroselino propior & cōcolor, & minor ta-
men vera Cicutā.

Varietas.

Germ. Wilder Korfel MYRRHIS. Gal. Persil Dafne. Bel. wilde Keruel.

ODORATAM hanc, siue Salubrē & esculentā possit quis vocare Cicutā, quam Myrrhidē, siue Myrrham, propter suaueolentiam, quiddā Myrrhę respicientē, dixerūt. Nec hęc perinde freq̄ens, vt superiores, aut procera occurrit, sed rarior, & in pratis, vel germinosis marginibus: etiam olitoribus ad vescendum in Belgio multa colitur: & esitatur in iusculis Cerefolii vice, cuius nomen apud Germanos asciuit, vocant enim wilde Keruel, id est, syluestre Cerefolium, quod odore saporisque iucunditate imitatur, etiamque facultatibus diureticis: facie verò est Cicutā, albicatibus ramis & foliis, tenella hirsutie, Pastinacā satiuā, aut agrestem referente: radix prægrandis, altē depacta, prolixa, nec facillē auellenda, Ferulę aut Pastinacę esculentā, quam sapore & odore, sed magis medicato, & ad Smyrniū accedente, repræsentat: semen admodū longum Cerefolii, duplō maius, striatum, angulosum, fuscum, odorum. Hęc etiam Myrrhis Pliniana videtur: foliis Cicutę minutioribus, caule breui, rotundo, saporis & odoris iucundi: quam orta confusione à Germanio odoro, Myrrhidē Romani perperā faciebant: vnde quispiam Scandicē vulgarem oleaceam merito suspicetur, aut illius aliquam speciem: nam Syriacam Scadicem valde variam prodire certū est, & Adagio cōstat. Varia enim olera in Syria ali dictitabat plebs olim.

Myrrhis Plin.

MYRRHIS Altera.

CICVTARIÆ odore, siue Myrrhidis, affinis ea admodū est, foliis & ramosis umbellis minoribus, delicatioribus tamen, & semine oblongo, Dauici Cretici, exiliore, nō hirsuto, nec ita absimili sapore: ē Geneuæ & Saleuæ vicinior moribus: peritus iuxta ac amicus medicus Pennius Anglus Londini ferendam curauit, nobisque impertiuit.

SES EL I Peloponnesse, Folio Cicutā.

AD montem Lupi & iuxta edes Sacrificuli, in decliuius salebrosi Insulæ montis Ceti, quā mare se pandit, est plāta quidem copiosa, sed nō ubiq; obuia, cuius radix magna, intus alba, foris nigricans, recta & altē porrecta, Ferulæ Thapsiæve modo, odorata, & aliquantūm acris. Caulis digitum æquat crassitie, sesquicubitū altus, ferulaceus, à quo promuntur alæ turionēsve cōplures in ambitum sparsi, vbi folia multa, Cicutæ magnitudine, sed incurua, pilosa & crispa rugataq;. Umbellę multę Anethi luteę sunt: semē latū foliaceum, compressum, Angelicę figura & magnitudine, sed multò minus grauius: color illi ex pallore flauescit: odor suauissimus, Ethiopici adeò similis, vt statim odoratu, cum primū vidissemus, Peloponēse cōiectarimus. Et cōiectū-



Ec. 1j.

ram

ram certiore exploratione notarum & virum præceptores Monspellienses fulcierunt, vt nullus illic ambigat de eius assertione; cum tamen antea nonnulli Thapsiæ speciem suspicati fuerint. Verum Thapsia, quæ vernat multa in Aquitania Vasconum, multo ab hac diuersa, colore & vultu.

SESELI Creticum, Tordilion.

PASSIM in segetibus Norbonæ secusque vias occurrit furculosa, hirsuta, rigida, aspera planta, folio rotundiore, Cerefolii, umbellis albidis purpureis, paruis: quibus succedunt semina copiosa, circinnata, quasi toreumatis elaborata, vnde fortè nomen peculiare fuit, orbiculata, compressa, atque geminis valvulis, vt Ferulæ semen, conflata, clypeoli speciem referentia, gustu Myrrhidis. Numnâ hæc sit illa, qua se deceptum Cômmentator conqueritur, cum ille scribere aut nolit, aut non ausus sit, ambigimus: voluimus tamen hanc non ignobilem plantam studiosis notam esse, vt horum iudicia ad collationes accurratioribus excitaremus: ne deinceps fastui commentatoris, qui innumeras propemodum, aut non nouit, aut perperam prodidit, aut silentio abdidit, asuescere discant; luculento enim detrimento eius ignauia, aut ambitio Tyronibus fore certum est, quemadmodum & nobis multos annos per initia nimium credulis, fuisse meminimus & dolemus: non tamen illi insultamus, quin potius veniam damus, si docere non potuit quod nescierat: liberèq; profitemur, nos dehinc non modò non liberius quicquam animaduersuros in istis pannosis centonibus & commutationum aduersariis, sed potius si minus de re herbaria bene meruit, & melius voluit, gratiâ habituros, & melius in posterum bonas horas collocaturos: potius, vt certa prodamus, quàm vt incerta, ambigua, ambitiosè emendicata munera, furta, versuras, censuras, iurgia, simulates, obreftationes, conqueftiones, Apologias, Apomaxeis & recantationes, retegamus.

SILER MONTANVM Officinarum.

GENVINIS plantis Sefeli cognitioni prisce restitutis, in promptu est nosse, aliud ab istis esse Siler montanum officinarum, siue Sifeleos, quæ retinuerunt bono quidem consilio, qui Neotericis ansam errandi dederunt, atque fanciendi nihil aliud esse Siler, seu Sifeleos vulgò dictum, quàm Dioscoridis Mafsiliense Sefeli: bono inquam consilio vsi sunt. Est quippe planta multò maioris acedinis & efficacitatis quàm vllum Sefeli, eoque mentis ciendis valde quàm commendatum. Duum est cubitorum ferulaceus caulis: radix odorata Ligustici, folia terna, non modò sceniculo, vt Mafsiliensi Sefeli maiora, sed vel Peucedano latiora, ac paulò minus Ligusticum, vel Coronarium Rosmarinum æquantia, mollia: umbellæ prægrandes Angelicæ: quibus semè foliaceum, longius Cumino, colore pallido, quod gustu etiam saccharo conditum, acrius quàm Æthiopicum est: tantò magis, quàm Mafsiliense, cui acrimonia præfert Dioscorides Æthiopicum.

PRATENSE SESELI Monspelliensium.

STVDIOSI Lutetiani & Monspel. plantam illam quæ in pratis frequentior occurrit, Saxifragiæ tenuifoliæ similis, vocant Pratense, Sefeli. Radix illi Dauci, vel Peucedani: foris nigra, odora, caulis bicubitalis, folia Sileri montano minora, angustiora, rigidiora: umbella candida: semè Mei, nigrius & maius quàm sceniculi, omnium Sefeliū minimè odoratum, eoque perparum acre, ideoque putabant olim quidam Monspel. esse Mafsiliense sefeli Dioscor. Anglorum verò Pratenfis saxifragia, ne cui similitudine imponat, huic quidè similis, sed tamen & diuersa, vt monuimus suo loco.

Sive Sophia Chirurgorum THALICTRYM Dioscoridis.

TAMETSI industrii quidam Thalictrym Dio. eam esse Pratensem, quam Rutam fetidam, siue luteam Saxifragiam Pratensem, nobis cõmodiore loco redditum opinentur, tamè illa magnæ cõmendationis

dationis & meriti vulneraria Sophia vocata, apud Septentrionales præfertim, cum propter figuram, tum vel potissimum propter eximias sanandi claudendiq; vlcerum antiquata & maligna, vires, aptius forsitan Thalitro conferretur, & eadem tuto asfereretur. Quæ quidem in admodum succincta, nec satis distincta, foret Diosc. descriptio. Est enim Coriandrinis ramulis, folijs, & incisuris, sed tenuioribus folijs, albicantibus, Abrotano non absimilibus, virgultis sesquicubitalibus, gracilibus, rotundis, rectis, lignosis, pallidulos vel luteos flosculos, Erucæ vel Synapi sylvestris, nec siliquas dissimiles, sed exiliiores edentibus: Semine exile, rubellum, claudentes: multa in parietinis & areis propè vrbes Galliæ, Nortinaniæ, Belgiæ, & Angliæ: sed rarior calidioribus ad meridiem. Hæc pollicentur Carboniuri Paracelsistæ nullum non vlcerum se percuraturos, cuius curationis cognitionem, non item fatuam promittendi fiduciam, didicerunt à Chirurgis practicis, qui ætate Guidonis & Petri Argelatae vixerunt. Cæterum, quod sæpius inuiti monuimus, hic etiam inculcandum rursum est: apud Dioscoridem collationum plerumq; excessus non de plâta, quæ describitur, sed in ea cui confertur accipiendos: vt hic, Coriandrum pinguiore folio esse: & superius, aliquot retrò capitibus in Cotyledone secundo, prioris Cotyledonis folia latiora, non angustiora: sic in proximocapite de Verbasco, sic capite de Enula, & alibi frequens.

An Consolida Regia, siue Calcaris flore recentior, sit DELPHINIVM,
vel Sofandrum Diosc?

Ger. Ritter spectis
Ang. Larches

QVAMVIS nusquam vlla mentio Delphinij apud classicios authores extet, tamen non illico necesse est hanc Dioscoridis codici irrepsisse. Fieri namque potest, vt ista appellatio, quam foliorum (aut potius florum cucullæ infundibuli) similitudo plantæ inuenit, louette, autore Diosc. indita etiã fuerit Sylvestri Cumino, sicq; duo plurimè nomina à diuersis scriptoribus accommodata fuerint propter varias facultates: quod idem non parum multis alijs contigit plâtis, vt diuersa designetur voce à nimirum communi totius Cumini speciei: siquidem indicio sunt, non modò notæ satis perspicuæ, quæ descriptioni quadrant, sed etiam virium, quæ vtrinq; similes produuntur, nempe aduersus venena & alia incommoda: quæ dotes in Calcare equitis nondum plenè compertæ, in Anthora Arabum & recentiorum exploratissimæ sunt: vtriusq; hic mentionem facimus, vt ista expensione iudicium excitemus studiosorum. Est enim Calcaria folijs minutim profundèq; incis, exilibus, longis, viridantibus, confertim, quasi ex interuallis, nascèntibus, vt in equitis calcari. Flores item purpurei, corniculis repandi, in morem Napelli dispositi. Hæ itaq; duæ, duas Delphinij delineationes explere possunt: quarum Calcar in segetibus frequens, Anthora verò non nisi asperis montosis, nec tamen inibi frequens obuia. Prope Genèuam & ad Allobrogum Delphinæsum Alpes multa.

claw.
Gall. Pied'd'A

MELANTHIVM, siue Nigella.

Ger. Schwartz
Fumich vnd
Schwartz Himmel
Bel. Nardus
fact.
Gall. Nielle.

MELANTHIVM genyinum eiusq; quatuor differentiæ, Diosc. concinniore quàm solitus est descriptione, per quam notæ sunt. Priori & potiori Nigellæ dictæ officinis, atq; alteri, quæ à Citreo seminis colore, Nigella Citrina nuncupatur (si colorem exceperis) idem odor, sapor, vis, vsus. Folia, capitula membranulis intercurrentibus discepta. Flores purpurei, pallentes, semen multum, pingue, odorum, oleoq; efficacissimo reddendo aptum, quo puerperæ mulierculæ excludendo partui atq; symphomati isterico propellendo multum vtuntur. Vocitâtq; vulgi persuasione Nardinum: nempe odoris suauitate & efficacia haud dispari. Istud oleum prælis expressum, nigro sed lymphido colore, pauca quantitate haustû, splenis tumores duritièsq; demolitur: sicq; foris illitum. Citrina ex Syria alijsq; Orientis Emporijs aduecta nigella Itali multum vtuntur, etiamq; in condimenta, in placentas synapiq; addunt. Anglis iam & item Germanis hortis copiosior quàm Italicis: vbi quæ odore cæteris excellit, Romana quodam nominis eulogio vocitatur: nam alioquin Romæ vel in hortis pauca.

Citrina.

STLVESTRE duplex.

QVÆ VERO INTER SEGETES NORBONÆ PASSIM ORITVR SYL-
vestris ab Hortensi nihil nisi exilioribus folijs & odoris præstantia discrepat, acrimoniaque vincitur, sed Capitula & flores in solo natiuo aliquantam maiora sunt. Se-
cunda autem sylvestris, quam in Normano agro inter Druidum & Carnutum
legimus,

Ee. iij.

legimus,

legitimus: capitula mucronibus in ambitum repandis retroré flexis, cuiusmodi in Lycostono aut Aquilegia fert. Spernuntur tamé vtriusq; semina, quia & meliorū copia suppetat.

κύμνον ἡμερῶν (VMINVM.

Ger. Kimmel.


Gall. Comin.

Æthiopicum
Basilicum.

TAMTÆ feracitatis est inter oleracea Cuminum, vt etiam maledictis fatum vberimū luxuriat, vnde Cuminum quis, quasi prægnaus, à *κῦμνον* verbo manasse putet: nec sponte tamen apud nos oritur istud vulgatius, quod quidem aliquantum diuersum diuersis è locis Syriæ, Ciliciæ, & Græciæ allatum obseruatur. Quod enim albicat, hirsutumq; est semen, præstantius habetur, ac idem cum eo quod neutiquam hirsutum est, apud nos feri & virere solitū. Nec item putandum discrimen aliud fuisse Æthiopici Gallatiue, quàm loci prærogatiua: visusque est Hippocrates satiuū istud albicans hirsutumq; Basilicum, seu Æthiopicum statuisse. Nec enim argumenti vllam umbram habent Patauini quidam herbarij, cum alius generis semē pro Æthiopico Cymini ostendant, pusillum enim valde est, acerofum, euanidum, viribus multum & odore ab communi deficiens.

SYLVESTRE Cuminum Diosc.

SPECIEM præ se ferunt vtriusque Syluestris duæ plantæ, quæ locis glareosis prope Aquas Sextias Galloprovinciæ vbertim crescunt: cuius stirpes aliquot & semen ferendum nobis Monspelliū misit Iacobus Reinandus industrius Pharmacopœus Massiliensis, & indidem in hortos quosdam Italiæ translātū fuit, vbi rarissimū à paucis colitur. Prima foliola Gingidij vel syluestris Pastinacæ modo diuisa sunt, radix albicat, parua, cauliculi inflexi, exiles, Scandicis, seu Pectinis Venerei modo, sed albidis, rotundis, villosisque glomerulis, globulos Arction imitantibus, vt perquam scitè Dioscorid. notauit, tenera papposave lanugine cinctos, in spherulam densam, magnitudine Pimpinellæ, Platani modo Globulariæve Monspelliensibus dictæ. Semen dentis Leonis vel Platani, sed multò minus.




ALTERVM Diosc. Siliquosum.

ALTERI verò Syluestri duæ sunt plantæ, quæ effigie sic satis & peræque congruere videantur: Ea namque quæ minus cognita, exigua & pulchra, nō procul Aquis sextijs oriunda, compluria gerit cornicula, siliquosa, adūca, Scorpiodes dictæ modo, sed crassiora, semine intus præsepiolis distincto, colore flauo, oblongo: cauliculi graciles, teneriusculi, & folia parua, Carui aut Scandicis. Pectini Venerei Fumariæve incisuris, profundis: exigua radix, lutei flores Maio mense, Chelidonij maior aut Er



ET eidē iisdemque natalibus siliquosa perquam similis forciatur altera hæc, nec nisi folio tenuiore, angustiore, Sefeli Massiliensis diuisura, & ad imū radicis albidæ Cerefolij plurimum nascente distat, cauliculis fermè glabris, siliquaque maiore, semine inibi contento, Galegæ, subfuluo.



REGIA verò consolida alibi dicta, Cumini folijs, floribus purpureis & interdum candidis, speciosis, coronarijs, Calcaris antiqui in speciem, è quibus cornicula oblonga, recta promutur, semine Nigellæ nigro, adeo hortis mulierculisq; familiaris est, vt minimè notio- nis dilucidioris egeat: hæc itaq; ceu veras, nō mutis picturis, sed verbis volumus subdere, vt cuiq; quod visum sit de illis statuat. Cum enim Cumini satini sapore odorè grati non polleat, nedum vt id superet, dubium est vllāne sit Syluestre Cuminum. Alteri nam lutei flores insunt, & semina Melanthij defunt. Sola horum Regia, quam proinde herbam cul- cariam, Delphinium inferius dicendum, Cōsolida vocata, videtur adhuc Cumini syluestris coniecturam posse fouere: tamen vsus medicameptis aut cibus vel nullus, vel incertus.

NUCULA terrestris Septentrionalium, an sit Bunion
Diosc. & Bulbocastanum Tralliani?

Bel. Eeid noten. Sabaudis. Fauertotes. Ang. Kipper nutz.

VB1 superius distinximus Bunion à Buniade, maluimus præ cunctis alijs hanc Bunium Diosco. asserere, vt cuius nomenclatio reliquam Dioscoridis descriptionem expen- denti, videatur à similitudine radicis bulbosæ Buniadis, siue Napi, appellata, & vsu, quia si- militer vt illa editur à plebecula: vnde fortè Trallianus Bulbocastanum, quasi castaneā Bul- bosam vocauit: alioqui nimis tota facies à Buniade dissidet: Anethi enim est comis, folijs imis, aliquantò latioribus, ad Coriandrum accedentibus: floribus in umbellis Anethi, sed albis. Semine Anisi minore: Radice rotunda, Cyclaminis, Castaneam æquante, fusca foris, intus alba, gustu Sisari.

PEUCEDANI facie pusilla planta, an PSEUDOVNION Diosc?

NEc non concinnè huc quadrat pusilla illa palmatis plāta, Peucedani facie folijsq; sed breuioribus & ad Fœniculum tortuosum Nefeli Massiliense accedentibus, ramulis intortis latius, in alas sparsis, cōcoloribus: umbel- la exigua, candida, Anethi semine, Anisi breuiore, exilior- re, gustu grato, aliquantū acri: radice crassiore, comosa supernè, gustu Oreofelini, non lōga, parui napi, crassiore quàm pro sui paruitate, cibo idonea: Qualè Bristoiæ in Anglia, ad rupem Vincentij, nobis primum magna copia repertam, & icone damus.



ΕΙΛΙΟΧΡΕΨΟΝ vel ΗΛΙΟΧΡΕΨΟΝ sileris flos Chrysanthemum.
Ec. iiii.

ELIO.

HELIOCHRYSO eximium aurei flores decus, coronamentis, vt Theophrastus innuit, addi solitum, adque radiorum Solis repercussum, coruscant lucem & vegetam intuitibus vibrantes, corymbi nomenclaturam speciosam reliquerunt, nobisque signarunt certissima illius cognoscendi indicia, qualia in isto vulgato cernuntur, ymbellæ Corymbaceæ multis è bullis extantibus circinata, & aureo aspectu micantes, Tanacetis & Ageratis diuturnam coloris gratiam tutantes: in rectis virgis, gracilibus, viridatibus, pedem & cubitum altis, duris alis & folijs per interualla Abrotani, vel tenuifoliæ Artemisiæ: exili & lignosa radice, Niceæ ad Thyrenum mare, Genuæ Lygusticæ, & in Galloprovincia asperis, macilentis conuallibus, & desertis incultis, fruticat: pollet multum ad podagras & vlcerum maligna, humorum impetum illuc incitum & ruentem reprimendo, lotium deriuando, & faburram vehementius impellendo: & eadem ferme quæ Millefolium promittit.

SIDERITIS altera Diosc. an nostras Sanguisorba Bipinella.

APennatis pediculis & folijs quadantenus Filicis, nostram esse dictam Pimpinellam, vel Etymon plebeium testis locuples est. Esse verò vulneribus valde accommodam, nullus non nouit, qui audit vocatam esse Sanguisorba: cuius cunctas partes si Dioscoridis conferas descriptioni, nihil planè deesse, nihil e superesse facillè intelligas: quin qui nobiscum sentiunt & faciunt doctiores, narrant etiamnum in Chio insula Sideritidem vernaculo adhuc superstite dici. Sanè folia incisura prolixoque; nervio, modo, situ, vtrinq; pinnata, Filicem fatentur. Deinde in ramulis gracilibus & longioribus, tenuibus viticulis sphaericos glomerulos, supernè cacumine asperiore capitatos gestanti, vbi clausum est semen: omnia demum suffragantur, & nobis inuitis Senensem præcipitis inscitæ specimen dedisse clamant: vbi carpebat quosdam, qui Pimpinellam hanc 3. Sideritidem autumabant. Nam folijs, inquit, Coriandri. Atqui nullum tam inscium putamus, quin facillè videat, cum tertia nihil prorsum, sed cum secunda penitus quadrare Pimpinellam: quam præstitit retinere, illamque; nec descriptionem, neque; capitatam, fortè, neque; notam, magis spectandam, quam percipiendam, proponere.

SIDERITIS Robertiana.


CRATEVÆ Herculeæ est nostras Robertiana notissima & vulneribus sanguinisque eruptionibus non solum, verum etiam vlceribus, adeoque potionibus vulnerarijs certissimi præsidij exploratione merita nomen hirsutæ Sideritis: folijs Coriandrinis, qualem Geranijs recentiorum ascripsimus, est.

*SIDERITIS ACHILLEA, lutca, odora,
Alba purpurea eadem.*

HIVIC Sideritidi laudatus Chirurgus Achilles, Chironis discipulus, nomen famamque dedit, vt qua Telephij vulnera medicatus fuisse creditus sit: Ac quò citius quiuisset queat vel ab intuitu solo (quàm in Recentiorum vel intempestiuas, vel salebrosas, vel confusissimas pedicas impingat) quid distet Achillea hæc Sideritis à Militari (rectius quàm à Plinio millefoliū) vocata, sic discernat: Achillea hæc multò procerioribus est scapis, numerosioribus, pedem & cubitum altis, & folijs tenuioribus, magisque; ac profundius incisis, Artemisiæ tenuifoliæ similitudine, muscaria congesta, gereutibus, pusillis flosculis, densè numerosis, & quàm Militaris maioribus, albidis, odorem medicatum spirantia, Artemisiæ vel Matricariæ, cui etiam similis est, in æstatem duratura: radice fibrosa, lignosa: tota odore & sapore Matricariæ, vel non foetentis cotulæ, sed minus amaro. Solum in aruo edito amat pingue & lætum: cuiusmodi in Italiæ Romano & Tusco agro, & non procul Rioli, Pedemontis. Et passim etiam Galliæ Lugdunensis ac Allobrogum.

ACHILLEA Montana, Artemisia tenuifolia facie.

PERELEGANS est, & parum frequens hæc, nisi celsioribus Calcaris & horti Dei, montium Norbonensium iugis: vbi Iulio & Augusto. Umbellis aureis Millefolii, & quadantenus Ptarmicam nostram præferentibus lucet, è sparsis multis caulibus, pedilibus, gracilibus. Folia quàm superioris tenuiora, habitiora, succulentiora, viridiora quæ, Cotulæ odoratæ: radice pusilla Senecronis, Tanacetî, aut Abrotani: oblongo semine.



*MILITARIS terrestris, &
Militaris aquatica dignotio*

MILLEFOLIUM militare duplex proponitur ex confusa vel ancipiti descriptione; nempe Filici-folium terrestre vnum; alterum aquaticum, & Cumini syluestris folio; duabus fortè plantis, vnam in descriptionem congestis. Vtramque seorsim damus: postremò aliud palustre sceniculi folium, vnde nomen factum.

HABD dispar huius Militaris terrestris Achilleæ facultas, vti neque facies; verùm, nomen si non vtraque ex æquo merita est; sanè magis debetur Millefolio, quàm huic Sideritidi: quippe, illo vlcera vetusta & fistulosa, sinuosave, eximia quadam dote percurari, testatur Dioscoridis: quare isto videtur vsus Achilles, & postea fortè similitudine deceptus populus, nomenclatura est abusus; aut potius vsu suadente: magnoperà namque iuuat vlcera, aut fistulas, nedum vulnera istud Millefolium, tum oleo, tum confuso. Plebeium istum consensum, & meritò sanè, est sequutus Plinius, quem immeritò lapsus insimulant istæ dentatæ censuræ nostræ ætatis.

MILITARIS, siue Millefolium, flore albo, purpureo, & luteo.

Germa. Garben. Gallis. Millefeuille. Ang. Tarrowe, nose blede.

FREQUENTIOR multò & nusquam non occurrit, tum terrestris, tum aquatica Stratiotes, seu Militaris, sic dicta, quia militibus vulnere sauciatis crebrò & consuetò iumento siue ferrumini esset; veluti Sideritis Achillea, cui tanoperè sunt affines (præsertim terrestris Stratiotes) figura & effectù, vt cum Plinio vtranuis recentiores quidam pro vtralibet acceperint: adeò vt si illas non cognitas habuissimus, illis etiam ipsi nos subscripturi eramus: verùm è rebus ipsis faciliè discrimen perceptu. Terrestris namque Stratiotes paruior est, furculis rectis: foliis verò alatis pennatisve, Filicem inter atq; Filipendulam: sed minoribus multò & quàm Achilleæ breuioribus: Umbellæ ex disparibus ortu *Varietates.* furculis gracilibus circinnantur atq; constantur, plurimùm & passim pratorum & aruorum marginibus, candidæ: sed præter hæc etiam purpurascens, & luteo aspectu micantes umbellæ Norbonæ in montosis, squallidis, editis, sed æstuosis inuenimus, & ad *PURPUREA scens.* Magdalænæ saxum specum Prouinciæ Galliæ, & Italiæ Genuensis asperis, vbi cinereo colore, & lanugine pubet tota.

MILLEFOLIUM AQUATICUM

alterum Coriandrifolium.

Luteis floribus

QVandoquidem hæc mutila aut deprauata visâ fuit lectio nobis, post multam perperam collationem, animum aduertimus hanc repetitam foliorum Millefolii cū Cumino syluestri

MIRIOPHYLL-
L. 102.

collationem, aptius nulli quadrare posse quàm illi Millefolio in aquis nascente, eiusdem cum isto speciei & facie, cuius folia quàm plurima à media ad imum scitè exprimunt Cuminum syluestre, aut Coriandrum: superiora verò sunt Feniculi, sed tenuiora, delicatiora, molliora, vt aptè etiam quædam habet lectio: non amaraci (vt falsò legunt) sed Maratri: reliqua minora, sed similia superne floribus Millefolii: vnde perspicua supina Commentatoris somnolentia, dū vsque & vsque carpit hunc & illum, ipse carpendus & ridendus magis, qui non videat hanc neutiquam foliis esse Semperuiuo maioribus, magisque refrigerantibus, sed potius Cumini sylue. Coriādri, & Maratri, qualem ipse Senensis bellè pinxit. Umbella etiam huius est Millefolii, aut sylvestris Cumini, cui hic Dios. confert, post satium fuit Mathiolo expendendā: vbi etiamnum animi pendemus nos, si non est luxata orationis series

STRATIOTES, siue Militaris Aizoides, inter Aizon species
reddenda fuit Dioscoridis.

ENIM verò si huic sunt folia Sēperuiuo similia, sed maiora, nomēq; eidem inditū sit, quia incubet aquis, Dios. interprete, & innatando latiore sessiliq; basi suas occulat radices subtus, vel, vt verisimilius, propter facultatem vulnerariam, militi necessariam & notā, (nam alioqui effigie, imò omnibus notis, dissidere videntur: nisi quis harioletur militarem, quia sine radice, quasi sine lare & re, vt miles, vicitet vitam incertam & fluctuantem) sanè nequaquam illa Commentatoris erit Stratiotes. Sed diuersa facie à Millefoliis potius vera fuerit illa, quæ multis fluentis pigre & ferme stagnantibus riuiis in Belgio nō procul Antuerpia & ad Lisam flumen prouenit, Semperuiui maioris figura, maioribus multò foliis, mucronatis, angustis, Lanceolæ, Plantaginis longioribus, sed extremo angustiore & rigidiore stilo: E medio autem foliorum & ad latera exortis pediculis non longis insident flores ternis foliolis, quadātenus Ranunculi albi, sed medio lutei, & pillis hirsuti, è carinula, aut forcipula cancri marini trifida emergentes. Ei subest contractior radix, foliorum sessili latiori & quasi basi radicem compressam obtegente, sed indidē tenuissimæ & penè aciem fallentes fidiculæ trans aquam humi demittuntur, alimentumque latenter sugunt, vermiculorum speciē ementientes: vnde plebi mentiuntur scelerata scamundicorum colluies, quæ mulierculis istis radículas in aquæ plena Phiola, quò maiores apparent ostentatas, iactat se eduxisse ex intestinis vermes, vt doctissimus spectatæ modestiæ Dodonæus affirmat, & Ioannes Cruthmanus Mechliniensis, sibi visum nos certiores faciebat. Huic temperamentum esse Potamogetonis, siccandi & refrigerandi, certum: quare facultates sunt dispares (ne dicā cōtrariæ) superiori Millefolii: quod renibus sanguinem potius prolektaret, dū vehementissimè vrinas mouet, cruenta ducit, vt nos scimus.

PEDICULARIS Alektorolophos, Pedicularia Tragi,
an Stelophuros Plinii?
Germa. Kodel. Belgis. Roodc Katelen.

SVPERIVS in Gallinacea Crista hanc minus quadrare Pliniano Alektorolopho, & inter Filipendulas aut Millefolia reddendā censuimus; quòd illis nō absimilis sit ortu, & foliis itè minutim dissectis, in tenellis, palmaribus, gracilibus cauliculis, partim erectis, partim humi fufis exeat: propter autē flores Cristæ Gallinacæ, purpureos, aut albos, Alektorolophon & Cristam Galli, fecerunt recentiores: vsu alioqui hactenus incomperta.

TANACETVM Millefolii, foliis, floribus Abortani
fœmina, aut Agerati.

PROPRIVS Millefoliis quàm Arthemisiis, aut Parthenio, est Tanacetū dictū. Folia siquidē emittit pinnata Millefolii & Filicis media: Caules è radice lignosæ, reptrice, fibrosiore, plures, fuscis, sesquicubitales, rotundos, geniculatos, nō nihil striatos, per summa alis diuisos, quibus flores aurei in umbellis Agerati, aut Menthæ Corymbiferæ insunt, semēque Seriphii Absinthii, aut Abrotani fœminæ: quo vtuntur mulierculæ ad vermes necandos

dos & vrinæ stillicidia: gustu subacre amaricantis, cum graueolentia. . Nascitur pratosis marginibus, & iuxta sæpes & fossas agrorum.

Illud idem in Angliæ hortis in delicijs habetur, longè argutioribus fimbrijs, minutiori- *Varietas.* bus, & latioribus folijs.

Tanacetum non odorum Syluestre, in Galliæ Delphinatis sponte, prope Valentiam fræ- quens oritur: nullo odore præditum, floribus Matricariæ, quibus à superiore discrepat: alioquin cuncta sui parte prorsum simile.

MATRICARIA nostras, non respondet Parthenio Paul. & Plin.

ABVNDE differrimus inter Anthemides, cur magis quadret vulgi Cotula, Parthenio *Pli. Pauli:* quàm herbariorum Matricaria, quâuis si vsum odoremq; respicias, quibus virgineis morbis Matricis opulentur, vtraque possit Parthenium dici: verum hanc, quia longius absit à Dioscoridis lineamentis, postponendam illi duximus. Fruticat autem sic- cis vbiuis viarum, & horticulæ marginibus squallidis. Folia Arthemisiæ aut Absynthio Ro- mano propiora, quàm Coriandro: flores Chamæmeli Iunio & Iulio edit multos, sed odore Cotulæ, radice fibroso.

ABSYNTHIVM vulgare, non est aliud à { Romano & Pontico.

Ital. Assenzo.

Ger. Wermut.

Bel. Aîsène.

Gall. Alluïne forte, ou Absyntè.

Ang. Common Wormewood.

Noscitur à *ἰνδιόπ* & *ἀντιόπ* quia id pecus nō pascitur, neq; vlli bibitur, vnde *βότρυς* dictum. Cuius veri nō nisi duæ videntur differentiæ, tametsi multæ sunt similitudines: Quod namq; vulgatus & amarius est, sponte natus vel cultus, caule fruticat ramoso, fo- lijs, figura, Arthemisiæ incisura: incanis flosculis, rotundis, aureis, racematim aggestis. Pon- ticum est, tum antiquis, à præstantia & regione cognomine, tum recentioribus barbaris ab alstrictione, quàm illi Ponticum saporem sua, non Latina voce, appellât, quem laudabant in Absynthio Pontico, Diosc. Cuiusmodi est vulgatissimum vbiq; peruium nostrum, sed Natalibus Capadotici, Tauri montis & Pontis, vtpote puriore cælo & aere perflato com- mendatus, magisque aromaticus, vt plerq; alia idem author & Galenus eadem comenda- tione celebrauerunt. Et inter Arabas Mesues interpret, cum Romano Ponticitatem vin- dicasset, id est, alstrictionem siccam, & valde Medico vsui opportunam, idem Ponticum atq; Romanum esse, nihil fortè huiusmodi meditatus, verissimè literis mandauit: vnde *Phar* macopœorum tam sedula huius Romani conquisitio & exploratio etiamnum durat. Ro- manum enim, id est, optimum, vt Camomillam Romanam ceteris præstantiorem & ge- nuinam, expetunt. Quin ne Barbaros istud nomen Romani cōmentos se ignorare conque- ratur noster Vercellētis *Apollō*, sciât Romanum istud commendatissimum inter paucas herbas & sacræ plebi Romanæ fuisse, quod quidē victori sanitatis præmio, & quasi omine fausto propinabant, vt Plinius author. Et quod nostro æuo in Romano agro antiquisq; ru- deribus passim visitur, non aliud à nostro est, & vtrumque Pontico idem est. Quare non o- ratione descripsit Diosc. quia vbiq; regionum copiosè fruticaret, tantum indicauit quò loci præstantius nouisset, eodem enim illo monte cætera duo describit & commendat, nō quòd non passim alibi, vt iam dictum, nascantur, sed quia ibi potiora. Nec itidem vllū spe- cie aut figura discrimen assignat Galenus: sed tantum Dioscoridis fidem sequutus, vt plu- rimum solet, vires præfentiores, non diuersas, Ponticū habere ait: nec natura, sed loci præ- rogatiua, quam etiamnum multis in regionibus vulgatum obtinet. Est enim vbi odore non insuaui, vbi odoratum, & vbi ferè fœtidum percipias. Sic Agrimonia odora locis non nullis vt Xantronicis, alijs autem expers odoris, qui igitur vni gratus, alteri fœtet odor.

Folia verò magnoperè doctos torserunt: nam vbi legitur Ponticum minora habere folia, legebat codice & rei exploratione fretus præceptor Rendelletius, maiora esse, quæ Metathesis, vt facilis, ita nimisquàm familiaris fermè omnibus de plantis scribentibus, ex- tat sæpè in Theophrasto, sæpissimè in Dioscoride, vt capite de Helenio, Meo, & alijs: inter- dum & in Gal. non suo, sed amanuensium vitio. Sed quòd *ἰνδιόπ* obijciunt, dum obijci- unt, nihil efficiunt: nam si magis odoratum, igitur & odorum erit alterum, est *ἰνδιόπ* non gratia

gratia odoris vel suauitatis, sed fragrantia & vehementia plerumque indicatur, ut in Vngue odorato, Myrrha, pice, aliisque. Nec plura (ubi data opera) Absynthia meminit Galenus, capite de Abrotano: tres inquit sunt species vel differentiae: una generis nomine designata, Absynthium vocata, cuiusmodi est Ponticum: Secunda Santonicum: Tertia Seriphium: Seriphium autem & Santonicum admodum sunt infesta ventriculo. Solum enim inter ea Absynthium, & maxime Ponticum, id est, Ponto natium, gratum stomacho existit: Quo ex loco istorum veliatorum placide derimuntur certamina: absolute enim vulgare nostrorum vocat Absynthium, quod in Ponto feliciter ex Dioscoride provenire indicat, semoto speciei vel generis discrimine. Sic certum stat nostrum Romanum, vel vulgare, à Pontico non aliud esse: sed loci gratia vegetioribus, non diuersis viribus pollere. Amarorem in hoc agnoscit Galenus, & biliosis vomitionibus atque obstructionibus extergendis necessariam asserit alstrictionem, ventriculo gratam, cui robur & vires conciliat: quae quotidianis & infinitis propemodum, etiam vulgi, nedum Medicorum, experimentis, scimus prestare istud nostrate intus, forisque admotum. Vina hodierna factitia tam multa optima sunt, & idcirco multis locis Germaniae plusquam satis expetita, non Pontico, sed Germanico imbuta, foetorem nullus inculcat: quin potius siccum, sicuti vino, inditur: odore est aromatico, & viribus recreandis apto. Quare ubi Galenus Ponticum utendum dicit, potius duo videtur respicisse, Seriphium & Santonicum, quae istud, quod simplici & absoluto nomine vocat Absynthium. Si grauius olebat Galeno in Graecia, non foetet Romanum, seu vulgare, in Italia, Germania, Gallia & Anglia. Quin caetera potius à foetore & putredine tuetur. Nec huius foetoris Dioscorides meminit aut Plinius. Nam cum Lucretius pueris tetra Absynthia potui, valetudinis ergo, dari canit, non odorem, sed saporem amarum & tetrum, ut Aloe, innuit: unde nomen Gallis *Alluine*. Sic ubi Theophrastus, ut illa, Absynthium & Fel terrae, amara & male olentia dicit, non foetorem, ut interpres: sed odoris intensam vaporemque iaculationem indicat, quae nares rugat, cerebrumque ferit, ut multa odora, Myrrha, Vnguis odoratus suffitus. Plinium hic mendacem, ut sapius alias, accersit Senensis, ut qui Ponticum amarius Italo Absynthio censuerit: sic ignauus fucus, nec Commentatoris partes agit, sed potius meri recitatoris, & nos quippiam eruditi haurire expectantes, abiens deludit. Respondeat Galeni doctrina, Galeni autoritate. Amari est aperire, abstergere, urinas ciere, & bilem purgare: id videas in Aloe, Centaureo minore, Chamamelo, aliisque. Iam si Ponticum Absynthium Galeno tantoperè ad bilem laudatum ex Theophrasto & alijs Medicis: id potentius praestat caeteris, potentior igitur pollet ea facultate, cuius ope potètius agit: ea sane est amaror. Igitur quò vegetius, eò amarius: & quò Italo melius, tào amarius fuit, ut Plinius, non sua, sed antiquorum Medicorum sententia, unde haec vertebat, asseruit, ut videre est còferenti illius & Dioscori, capita. Vbi verò mera amara non cògruere ventriculo Galenus inquit, si ut alimento utaris, verum: si ut medicamento, contrarium ratio & euentus docet. Aloe enim gratissima & utilissima ventriculo, & istud medicamentum potius he pati quam ventriculo còparatum. At gustati Santonicum & Seriphium, minus quidem amara, ut Plinius notauit: sed tamen ingratiore multo odore & gustu.

*SERIPHIVM Dioscoridis, Abrotani
fœmina facie.*

Seriphium & Abrotanum fœmina mutua collatione Dioscoridi assimilantur: proinde perpensis apprimè notis & argumentis quibus utraque dignosci queat, tandemque naturae cognitione ducti, & virium exploratione, sic statuimus. In Galloprovincia montis celsi Magdalensæ celebris accliuibus quæ S. Maximinum oppidum spectat: redeunt item Olbia maritima vulgo Galloprovinciae Hyeres dicta, multum obuivum istud Absynthium fruticat: exilibus, leuibus furculis, pedè altis. Radix albicat, prolixa, furculosque statim ab humo numerosus promit, crebribus foliolis minutim



minutim crenatis, teneriuscula lanugine incanis, vti Gnaphalium summo tenuis obfitos: vbi extrema capitula aureis floribus bullatafulgent: semine paruo, copioso referta, similitudine Tanacetii, sed minore: Tota candida, sapore & odore illius quod Romanū & Ponticū falsò putatur Absinthiū Belgis, proinde *Roomsche alse* dicūt. Adeoq; simillima Abrotono Fœminæ vulgari, hortorum (*Francis Cypres*) est, vt haud facillè vtramuis ab altera discernere sit: nisi quia hæc tota minor, odoratior, candidior, tomentosa; quod alteri deest, cui folia breuiora, sapor non adeò ingratus, aut vehemens. Atq; hoc non ambitiosè, cæteris è sua classe amotis huc inferitur, sed quia propius est Abrotono fœminæ, cui comparat Dioscorides, præfertur: propter summam affinitatem, qua vix crededamus differre à Fœmina Abrotano, nisi vtrumque contulissimus Frquentissimum Norbonensi Nitiobrigum agro spontè frutescens & eadem Londini Sata in horto Hugonis Morgani & enata, neque quidquam mutata, vidissimus.

Galatium Sardonium, perperam Santonicum vulgi: est Officinarum Absynthium Romanum falsò creditum.

GE O G R A P H I Æ & Græcè peritis Lutetianam versionem, Græcūve codicem Aldinum legentibus, facillè licebit nosse, neutiquam Alpes Gallicas in Xantonum agro vulgò Santonge existere, vbi crescat cognomen Absynthium Santonicum: sed secundum Alpes Galatiæ, vernaculo cognomine Sardorum, Sardonium vocatum. Sic enim etiam hodie legitur & restituitur, facili intellectu & proximè sequentis capitis repetitione, vbi in Galatia Asiatica Abrotonum: vtpote cōgener oriri dicit: & quot Absynthii sunt species, tot iam eodem Galatiæ & Capadociæ loco commendat Dioscori. vt ratio nulla sit hæsitatiōis, aut in Santonicū Gallicū deprauationis. Totā Plāta Absynthio simpliciter dicto similis est, sed minor, minusque candida: seminibus non adeò multis, floribus exiguis. Nonnullis Germaniæ locis frequens: in Flandriæ & Angliæ hortis copiosa & vsu multo expetita, illic vocata *Roomsche Alse*, id est, Romanum Absynthium publica periuasione. Quam sequutus Senésis (si Æsculapio placet) in Hūgaria, & Bohemia, Ponticum, istud seu Romanum sibi repertum prædicat. Nam *Roomsche Alse* Conseruam, in officinis Antuerpianis & Belgicis paratam, mulierculæ Mulomædice & clinicæ lubentius emunt, quia non ita amaram, facilius deglutiunt. Deceptæ quidem, nam si caret amarore, igitur & facultate amica & grato calore. Atqui Ponticum verum, seu vulgare, viuis argumentis docuimus amarius esse: & Dioscorid. Seriphium ac Sardonium dicit aliquantum (non multum) esse amara. Nec minus Romanum posse, quam Seryphiū odor & sapor indicio sunt.

Gallis Barbotine, Belgis Semen Zedoaria.

EQ V I D E M semen sanctum, vel Contra, officinarum aut Santolinū dictum, horum triū Absynthiorū, nullū esse videtur: nam tametsi nonnulla amaritudinis & figuræ similitudo illis intersit cunctis: tamen non adeò sunt plenè adulta horum semina, aut horridè amara. Et satum nonnullis in locis vidimus semen peregrinum istud, ex quo fruticulus furculosus enatus fuit, vndequaq; seminibus gliscens, pluribus fermè quàm foliis. Quodque semen nundum, vietum, sed plenum & recens qui sit nactus, si serat variis locis, facillè plantam afsquetur.

Aliud Peregrinum, sine ÆGYP TIVM Absinth.

AG Y P T I Y M quoppiam vocatum Absinth, Pollitrici forma, foliolis albis, alterno situ digestis, digitum altis apud Gesnerum iamdiu, & post penes Valerandum *Domex* siccum videramus, infirma aut certè nulla coniectura Ægyptio cognomine in scriptum & à quodam herbario missum, qui ex hoc semen sanctum produci coniecitabat.

Ff.i.

C. 1.

CAPNOS FVMARIA.

Germa. Erdtrauch, KatzenKornel.

Belgis. Grysecom ende Duynekeruel.

Gal. & Ang. Fumeterre, Fumyterre.

CAPNON, siue Fumum, fumidam, fumariamque è Græco dixere Latini, quia succo oculis illito, non secus ac fumo, exprimerentur vellicando lachrymæ: maximo hodie vbique vsu & veris restibili prouentu notissima herbula est inter segetes, & proxime margines, ramulis fibrosis, & fruticosis, quadratis furculis, ex viridi in cinereum pallorem languentibus, emergens: folia diuisura Coriandri: flosculis purpurantibus, interdum albidis, & interdum rubellis: semine rotundo, viridante ex fusco, & ætate colligi oportuno; viget verò & floret herbula Vere, quum succus illi efficacissimus, & exprimi solitus ad Syrupos, electuaria, & pilulas Officinarum: amaro gustu & subacri.

VARIETAS.

N Norbonensi agro minor multò, sed minus frequens inuenitur quædam Fumaria, ramulis & foliolis palmaribus, Scandicis, nec procumbentibus, sed surrectis, & albicantibus, tum foliis, tum floribus: radice exili, gustu amaro. Montpellii rure propinquo Boutonet nuncupato, aliisque aridis glareosis vere etiam visitur.

FVMARIA lutea, montana, & alba, siue SPEITT Illyrica, an Ætii
PHRAGMITES, & Galeni CORIDALIS?

NOBILITAVIT hanc raris laudibus nostra ætas, charamque etiam fecit hortis & notam carendi metus & paucitas, paucis namque locis obuia, nec nisi calidiorum Regionum montibus Illyriæ, Dalmatiæ, Hetruriæ & Norbonæ Galloprovinciæ. Serius nempe quam vulgaris Fumaria flores luteos, stellatos, Chelidonii minoris, Iulio & Augusto edit: folia verò Fumariæ bulbosæ, vel Chelidonii maioris, minora multò, glauca, cineritia, exilibus cauliculis, pluribus, sesquipalmaribus, & pedilibus: è radice latius sparsa, fibrosa Robertiani Geranii. Semine rotundo, depresso, atro nitente, in corniculis Fumariæ bulbosæ, vel Chelidonii maioris, minoribus multò, cui admodum similis facie & colore est, vnde scite coniectet quilibet esse Capnum, siue Chelidonium Phragmitem Ætii. Quam Coridalim Galeni qui asseuerant, propter colicum dolorem, cui opitulatur, nimis anticipati vtuntur argumento. Quippe nostras etiam Fumaria idem interdum non inestrenue præstat, digerendo, discutiendoque viscidam pituitam, è renibus eliciendo saburram, quæ non rarò colicum dolorem efferat & ementiatur. Quin Coridalim videntur vocasse potius Bulbosam Fumariam, ab effigie Alaudæ auiculæ, cuius capitis galericulatum verticem æmulantur flores cristati, turbinataque cornicula. Hucus sapor ferè qualis vulgaris Fumariæ, sed efficacius videtur factus tenuare, atque incisos in lotium deriuare, vnde laus magna ad Hydropsen. Robur etiam addit visceribus, reliquaque præstat quæ Mesues de Fumaria vulgari narrat, de qua quod ille dixit, contrarium de hac dici posset, scilicet raritatem auxisse opinionem, at vulgatam copiam nostratis Fumariæ laudi offecisse.

VARIETAS.

QVÆ via ducit Florentia Pistoiam & Lucam Tuscam, hanc eandem Fumariam floribus albis fert, vt ferunt quidam amici nostri admodum periti: nobis tamen nullibi illis in monticulis, nec quidem in Iuliano, vlla visa fuit superioribus annis, mollicello tene- rorque caule in aquis fluitante, eque radice exigua euulsu facili.

Cana radix Herbariorum, siue Bulbosa Fumaria Plinii, non est Magorum
Eriphyæ, nec Pistolochiæ.

QVAM DIU, quam falsi fuerint scriptores minimè mali, qui hanc Aristolochiâ rotundâ esse prodiderunt, quiq; etiamnù eandem quasi verâ rotundâ vsurpant, in Clematide obiter diximus: nomen autè occasio plantæ huic, & eroris istis fuit radix, quæ rotunda cum sit

STIRP IVM aduersaria noua.

339

bubosq; & perinde vt Aristolochia rotunda faciat, ad vermes & maligna vlcera, facile opinionem illis fecit Aristolochiæ, qui veram nondum vidissent. Sed dissuadendo sat fuerant folia & flores, qui Martio & Aprili in vmbrosis decliuibus & nemorosis saltibus frigidioribus erumpunt purpurei & aliquando albi, more, & similitudine Fumariæ vulgaris, ad cuius folia multum accedit læuore casio & diuisura foliorum, maiorum tamen: semen pellucidum est in corniculis: in hortis autem Belgij alitur frequens, & reliqua Germania, vbi etiam è montibus oriundam habent.

FABACEA radice, altera CAPNOS.

Bel. Boonkens holwoztele.

Singularis item & penè par huius radix, sed minor, maiore tamè commendatione apud Chirurgos & mulomediatrices mulierculas, quæ istâ puluerem efficaciorẽ & delicatiorẽ ad lumbricos interimendos prædicat. In Belgio, Germania, & Sabaudia, vt Geneuæ aruorũ quorundam sepes & margines hæc scaten t. Meminimus etiam in Veganijs hortis Dei nos eruisse: non vlla totius facie nota, præterquàm radicis exilitate, nulla insignita cavitare discrepans, etiamq; natalitijs, nam inibi nuspiam superiorem reperiã, quæ alioqui multa occurrit, vbi neutiquam hæc.

CHELIDONIVM maius, Hirundinaria maior.

Ger. Gros; scolwurtz, Schwalmenkraut. Goldwurtz.

Bel. Bouwoztele, ende Broote Bouwe.

Gall. Esclayre, & Chelidoine, Felongne.

Ang. Celondine.

PRIMA hirundinum tranatione, vernaq; nostratis cœli temperie oritur maior Chelidonia, non secus atq; minor, à qua tamen multum alia est, aliaq; occasione dicta, nempe cum aciem oculorum succus illius acuat, hirundinulisque suis occæcatis visum restituere credantur herba ipsa matres: radicem etiamq; totam plantam in hortorum scrobiumq; marginibus multum obuia, & succo croceo, fuluiore, virosiore quàm Papaueris Cornuti gliscentem, neminè latere quit, tota reliqua facie ad Plinianum Capnum vel Aquilegiã comparata, folijs cæsijs, & siliquis tenerioribus, non ita diuersis: lutei autem sunt flores, Keiri violæ, feruidiore tamen acrimonia & foetidiore est, minimè gustu aut odore grata: rarius intrò vtenda, commodius foris ad impetigines & pforas puerorum, necnon metallorum chymicas medicationes.

AQVILINA, Aquilegia recentiorum aut Columbina, num sit Ponthos Theophrasti, siue Desiderium, Gaza interprete?

Ger. Akeley.

Gal. Ancholies.

Ang. Columbine.

SI hæc antiquis innotuisset, non dubium quin illis coronaria futura foret, est enim non vulgari nec inuenusta florum elegantia, cærulea purpura nitentium, aliquot calyculis cornutis aduncis vtrinq; gracilitate ceruicem & rostellam columbarum adumbrantibus, vnde Columbina Anglis dicitur, & doctissimo Aldrouando Bononiensi professori POTHOS Theophrasti, cum illic versaremur, putabatur. Frigidiusculos Meridionalium tractus amat, pratensis etiam est Franciæ & Angliæ, sed squalidiore minúsque hilari aspectu non culta, nam in hortis duplò, triplò, & multiplò flores densioribus & nitidioribus caliculis stipatur, triplici varietate coloris seorsim conspicua, aut in eodem vno flore distincta, albo, purpureo, & cæruleo. Reliqua foliorum totiusq; facies Chelidonij compar & similis: maior & similima Plinianæ fumariæ: semine itè lucido in foliosis recuruis infundibulis Consolidæ Regalis aut Melanthij, gustu tantillum astringente, temperatæ ex calore siccitatis: eoque ad faucium pharyngis & trachæ incendium & vlcuscula vitur plebecula.

Ff. ij.

ART E

Ger. Heyfusz. Groß Keynsarn.
Bel. Byuoet
Gall. Armoise, ou herbe S. Iean.
Ang. Mugworte.
Offi. Mater herbarum.

COGNITIONIS ordinisq; consequuntione Absynthij generi Arthemisia succedunt tribus hodie quatuorue differentiis distinctæ, quas, valere iussis ostentatorum velitationibus intempestiuis, perspicue paucis secernemus. Quæ vulgaris cognitionis & vsus perpetuò fuit Arthemisia, plurima vbiuis locorum secus sepes, & in iterum margines, Absynthio vulgari, seu Romano, similima fruticat, procerior tamen, & folia maiora: supernè nigricantia infernè incana, habet: Semen item illi Absynthij, & flores albidì, odore non insuauès, sapor minus aut parù amarus. Viribus hæc exploratissima, quia in vsu aut sola, aut frequentissima, & vtilissima. Sed & eadem quibusdam locis inauspicatæ telluris & præaridis adeò strigosa, parua, & odore quadam grauitate feriente visitur, vt alia prorsum putetur: vt Absynthio nostrati & Pontico solo nascenti euenire monuimus.

Varietas.

ARTHEMISIA tertia Dioscoridis
Leptophyllon.

HVIC studio nōnulli qui Dioscoridis æuo operam nauabant, Arthemisiam vnicaulem nuncupasse videntur herbulam sesquipalmum, cubitumque altam: folijs minutis, Abrotoni mari similiter incisis, paruis, virentibus ex atro, lignosis in ramulis, floribus, semineq; quàm plurimo refertis, paruis, & ex viridi luteolis, flauescuntibus. Prope culta & oliueta Mōspelij alijsq; quàm pluribus Norbonæ locis multa & nota: sed vulgo quodpiam Abrotani genus credita. Equidè per Dioscoridè licebit sic appellare, quia nō de sua sed quorundam sententia, hanc inter Arthemisias recenset. Odor tamen illi non Abrotani aut Absynthij, sed Arthemisia prioris est, & prorsum eadem videtur, quæ Leptophyllos tenuifolia, seu Leptocarpus, proximo capite indicata, & in culcata, duntaxat explicationis causa: & facultates autè vidètur à quopiā authore, cuius oratio multò cultior, & pollicitatio maior de Arthemisia est, quàm quæ Diosco. conueniat. Sed ille potius deceptus non pauca similitudine odoris & foliorum, indicasse videtur herbam illam fruticosam, odoris suauissimi & Sampsucum imitantis, quam fecimus cum doctis Abrotanum marè, vulgus Picardorum & Francorum, Herbam & lignū S. Iohannis vocitant, eòq; in coronamentis & lûborum superstitioso cinctu ad epilepsiam, morbū D. Iohannis putatā, auerruncandā expetūt. Hinc D. Ruellio dubitādī ansa iudicij hallucinati, quam factiose, vt solitus

Abrotanum
mas Monspel.
alterum.



est

est illi impropert ille Bambalio commentator, qui omnia conuiciis hinc miscet & dirigit, docet verò nihil, aut dicit.

ARTHEMISIA Marina.

TAM nuspam in mediterraneis, quàm frequens in maritimis istam reperiens, eoque meritò maritimam vocas. Pluribus fruticat sarmentis ab vna radice lignosa, fibrosa, surrectis, alternis interuallis, cineritii colore, muscosoque semine simili Abfynthio communi, quàm Arthemisiæ: flores item lutei, numerosi sunt. Folia ima & ferme humi strata, paucioribus, sed maioribus incisuris: media verò, aut superna, angustiora, minora, interdum vna, aut altera incisura, Portulacæ marinæ, aut Fœniculo marino non abfimilia, carnosæ, albentia, vti vniuersa planta, quæ gratum de se emittit odorem, Abrotani maris ferme: sapor subsalsus, perparum amarus, cuiusmodi Arthemisiæ prioris. In sinus Adriatici littoribus ad Lyo insulam & Venetam plurima.

AMBROSIA.

EXimia fragrantia gratia etiam Diuis expetita, nedum coronamentis, Ambrosiæ nomini finxit: apud nos autem nuspam nisi satua Ambrosia visitur, eoque procerior merito est, quàm quæ sponte oritur: Nec quisquam argutator nostratis magnitudinem obiciat, quam tripalmarem Dioscorides facit: multis enim, nec magnis de causis, incrementum decrementumve capit hic fruticulus: cubitum altos edens complures ab ima radice caules, ramulosque toto è caule multiplices, striatos, graciles, à medio ferme summo tenues: semine & flosculis quàm plurimis alternatim dispositis, luteolis, muscosis, surfurcisve acinulis, vt oleæ, racemosis, sed rotundis semper, nec latius sese aperientibus. Quibusdam inter folia è pediculis vtriculi emicant, angulosi, Echinati, minores & similes tribulo terrestri. Semen nigricans, rotundum, aut potius Gygarthi vix æmulum, gustanti non ingratum. Folia Rutæ similia, & circa imum æqualia, sed supernè maiora, maioribusque diuisuris, Arthemisiæ, vel Abfynthii, teneriora & tenuiora: vniuersa albicat planta, odorinque per bonum halat. Labruscæ florentis vini in *ἑν τῶν πάλαι* antiquis dicti, id est, boni odoris Bononiæ in hortis lectam multis ab hinc annis meminimus hanc, quæ eadem etiam nunc viret Londini sata, radix gracilis, palmi vel sesquipalmi.

ABROTONVM Fœmina.

{ *Germa.* Garten Cypress.

{ *Gal.* Petit Cypres & Garderobbe.

CHAMÆCYPARIS sos, seu pumilla Cnpressus dicta, vulgò *Petit Cypres*; in hortis frequens colitur, & Galliæ Norbonensis Nemausensi vinetis & campis patentibus fruticat plurima, via præsertim quæ MonsPELLIUM ducit, sesquileuca ab vrbe, ad dextram, sesquicubitum alta, ex virore candida, Corymbis bullatis, crebribus, fuluo colore renitentibus. Mense Iulio est cætera hortensi similis, sed odoratior, lignosior: huius semine necant lumbricos quotidiano experimento mulierculæ esse: Idcirco Abrotonum fœminam minimè ambigimus: tum quia notis candoris, amaritudinis, fruticis arboreæ habitu, Corymbis aureis, refertis foliis, minutissimè incisis, Seriphii modo, quadrare videtur: tum quia viribus scimus iisdem, nec ignauioribus pollere, quas Diosc. & Galenus illi vendicarunt. Huic quàm bellè cõgruat Diosc. gemina collatio Seriphii & Abrotoni. Siquidem Senensis Seriphio nullis notis & autoritate confirmatū, nõ foret verum. Foliis enim Arthemisiæ est, aut Abfynthii vulgaris, seu Pontici, cui Dioscorides & antiqui dissimile faciunt istud viribus & forma. Et cum asserat Galenus Seriphio & Abrotono vires consimiles & noxias esse, etiā feruorē, acrimoniā ingratā cum faldedine: nempè vbi mari propius oritur: vtrumque autem viribus & forma sæpius comparet, Seriphiumque vltimo loco ponat, & vicinius Abrotono: sanè nullū inuenies Abfynthiū Abrotono per omnia similis.

F. iij.

Dodo.

Dodonæo responsum, in procinctu illi non est: meritò ambigendū fuisse super Abrotano, cui perperam fuisset agnitum Seriphium: nam qui explicatiorem Abrotoni descriptionem haberet, potius ex isto de Seriphio, quàm ex hoc de Abrotono iudicium suum eliceret, aut confirmaret: illa enim Arthemisiæ species, potius vulgare refert, floribus, foliis, & semine, vt metipse fatetur: minutissimis incisis foliis, Seriphii modo neutiquā est: ideo non Seriphium Pontico contulit Dioscorides, sed semper Abrotono fœminæ.

ABROTONVM Mas. ἀβρότονον.

Germa. Stabwurtz, Schefwurtz, seu Gertwurtz.

AVRONE Gallicè vocata, & hortis rurique oriunda, Masculum Abrotonum meritò censetur, sarmentosum duriusque: seminibus tenuibus, odorum, subalbidum, amarū, foliis fœniculi modò minutim incisis, paulò latioribus, erigendis hortis & deambulacris concinnandis coluntur: flore luteolo, Absynthii, minore.

ABROTONVM Peregrinum. Cupressi folijs.

SABINA Æ-PLVRIEVS ab hinc annis hanc elegantia & raritate memorandam stirpem eiusque nomenclaturam dono accepimus ab illustri professore Publico Medico Cæsare Odone Bononiæ, qui hanc Sabinam Ægyptiam vocabat, huiusque mentio facta capite de Sabina, exigua radice, ex vna stirpe pluresculos viticeos, caules rigidiores, nigricantes, folia Cupressina, aut Sabinæ, textura reticulata effigiata, longa, angustia, & per virgulta crenatis extremitatibus denuculatis foliis.

Anthemis vulgatiore, siue CHAMÆMILLA.

PYETRI.

ANTHEMIDI odor suaueolentis mali, nomen fecit Chamemilū, seu Chamæmalum, plebs autē Chamomillā, & Cotulam non fœtidā vocat: huius ē floribus & odore quadruplex est conspicua differentia, nominibus secernēda. Et Europæis regionibus frequentior vberiorque, luxuriat vulgaris, dicta Germanis Chamamillbloemen, quæ Græcorū Leucanthemon: surculis numerosis, cubitū altis, erectis, in alas diuisis: quibus ab radice pusilla folia crebra minutim incisa & perangusta diuisura Anethi, vel Coriādri, viridia, tenuia hærent: flores in summis cauliculis numerosi, candidi, Bellidis, radiatim bullatum glomerulum luteum, quasi modiolum, ambientes, Cytonium malum quadantenus redolentes: semine pusillo, luteo, ineunte æstate segetibus tam frequens & fatis, vt non parum incommoda sit: ingentis hæc commodi & vsus Gallis, Italis, & Germaniæ nonnullis locis, quibus defit copia alterius Leuchathemi, quem iam dicemus.

Anthemis siue LEVCANTHEMVM odoratiore, Romanorum.

Belg. Boomsche Camilbloemen.

VT suauius multò, quiddamque aromaticū Amaraci, aut Abrotani halat Romana hæc, sic multò ad aspectum hilarior & comptior est: ea denique notione dicta, qua Basilicas præstantiores plantas vocare soliti fuerant, vt Romanum absynthium, & Basilicum asparagon: Tenellis cauliculis repit, haud diuersa foliis, & floribus vulgatæ syluestri, restibili item fertilitate & perenni radice, qua sese instaurat, & fundit propagationes proculcationis contemptrices: eoque voluptatis ergò totum vertentem annum in Anglicis viretis attondetur, secus puluillos & toros insternens & ambulacra: neglecta namque, protrita, & resecta, fœlicius & vberius vernat & luxuriat. Siquidem Angliæ vniuersæ haud alia fermè nota, vel vsu recepta quàm hæc: Ruri miliari vno aut altero ab vrbe Lódino plurius, herbidis, aridis, vbi spontè orta florū capitula & folia gracilitate elegantiora à cōmuni discerni queunt: Galliæ & Italiæ meridionalibus (tametsi Romana dicta) rarior spontè. In Belgio & Northmannia ad Druidum vrbeculam, quò loci religionis ergò cōmissum fuit funeste & cruentum prælum, multa. Qui syrupus huius floribus, succo, & vino albo confit, multò ad splenis & icterum hydropis præsidium optimus.

Angl-



Anglorum NIVEVM λευκανθέμιον, flore multiplo.

CULTIORES horti hanc eandem alunt, sed floribus adeo multiplici folio & radiata serie propagatis, vt cador eximius bullatum centrum prorsum operiat: nec alius, aut odor sapor illi.

CHRYSANTHEMOS Anthemis dicta, umbellis aureis. HERBARIO ve bullis, folii facie, odore & sapore Romanæ Chamæ-*ru* Anthemis milæ est: Sed magnitudine vincitur, nullisq; foliolis radiatim cingitur eius umbo prominulus: Belgio, Angliæ, & Galliæ, non nisi hortensis est, vsus non dispar.

BYPHTHALIN, Oculus Bouis.
Millefolij folio, Chrysanthemi flore.

HÆC Germaniæ, & Angliæ hortis inquilina. Romano autem agro, Hetrusco & Galloprovinciæ prope Olbiâ ad mare Hieres vocatû, sponte secus vias & margines satorû, cubitales & sesquicubitales crebros spargit ramos, graciles, teneros: folia similia, sed latiora, ad Cotulæ & Tanacetum nonnihil accedentia, creberrimis minutissimisq; plumatim & scitè ductis diuisuris Abrotami, Arthemisiæ concolor, floribus Anthemidis prorsum & odore: sed intus forisq; luteis, vt Chrysanthemi vulgaris, aut Calêdulæ: quos æstate, etiâq; in vsque brumam hîc Londini vegetos vidimus in horto Morgani, & Bristolæ.



BYPHTHALINVM alterum, folio & facie Cotulæ Fœtidæ,

NON inelegans istæc nobis reperta secus Arantiorû lucos Olbiæ in Galloprovincia maritima. Caules promit flexuosos, cubitales, & duos pedes altos: quos ambiunt folia tenella Anthemidis, latiora, Cotulæ fœtentis paria: flores sunt radiati, lutei, Chrysanthemi aruorum, aut Calêdulæ sponte nascentis. Hanc etiam nobis repertam in agro Romano meminimus.



Ft. 111.

CRAN-

QVAM plantam Eranthemon Gesnerus, cui ostendimus, opinabatur, quia aptior haec genus defuit, etiamnum veram esse coniectamur, similitudine & viribus Anthemidis persuasi: est enim Anthemidis facie, sed maior tota, & Cotulae similis, vel species, latioribus maioribusque floribus, Bellidis maioris, infernè rubentibus ex purpura, superne cædore intermixto, melinaque bulla media, interdum inter alias Cotulas satis enasci solet sapor ingratus illi, odor Cotulae: Tametsi periculosæ est alex res, de icone lectione duntaxat notas, illicò propter nonnullam similitudinem, quæ nam sint, certò statuere, Amicus quidam Pyrethrum vulgare tuebatur Eranthemon genuinam, ob flores subtus purpurascens, & folia Anthemidis haud ab similia: verum radices figura & sapor, vrens satis, nos dedocuerunt.

ADONIS.

TANTO minus sit Adonis, vt nonnullis visum fuit, vt cui bullæ luteolæ mediæ, flores autem Anthemidis, semen & facultates longè absint: quare commodius nos inter Anemones.

PARTHENIVM, vel Virginea, est Cotula foetida, non Matricaria.

AMARACVS
Gal. & Pauli.

NON nescimus morosulos istos censores leuiuscula plerumque adductos notula, auctores perbene de re herbana meritos, incitæ traducere, atque irridere plerumque, ridendi ipsi cum forent: idq; in Parthenii disquisitione liquidò videre est, quod nolunt esse Cotulam, sed Matricariam autumant, propter duntaxat Coriandri folia: at tenuia Dioscorid. dicit: φύλλα ἐχέει παρὰ ὁμοίαν, λεπτά: Intuere igitur Coriandri adulti in ramis media & summa folia, & fatebere collatione apprimè congruâ, imò omnia Coriandri sunt: folia consimili diuisura, rami, situs, tenuitas, figura, præterquam ima per pauca folia, quæ latiora sunt Apii aut Oenanthes, quibus eadem foliorum disparilitas contigit, eoque scitè addidit λεπτά, nimirum vt collationem nō ad ima, sed ad media pluraque folia faciendam innuet. Matricariæ enim nequeunt esse Coriandro, & λεπτά seu tenuia: sunt enim ipsa Coriandro maiora, nedum tenuiora, Arthemisiæ & Absinthio propiora pariaque reliquæ plantæ partes, floribus duntaxat Anthemidis. De amarore autem quòd blaterat, indicat in legendò supinam negligentiam, atque in gustando factuum palatum: est enim Cotula amarore inameno & perquam ingrato, vt Parthenion: verum hic nulla exuperantiæ adiectione, foetidam subuirosâque & amaricantem dicit, πικρὶ ζῶν, quo indicat non excellere amarore, sed, vt Anthemis Leucanthemon, amaricante sapore esse. Cui etiam, quia similis erat Partheniū, seu Cotula, idem nomen factū Leucanthemidis, è Græco contextu discas. Iam verò si ad facultates & vsum animum aduertat, quod intererat Senensis Commentatoris, neutiquam ulterius inficias ibis, Parthenium esse Cotulam foetidam. Meminimus namq; quod probè nouit clarissima Agathopolis Schola, Rondelletium aliòsque professores præclaros, sæpius addere Cotulam foetidam decoctis, ad serosos, adustos, salios, melancholicosque Elephantiales, & mali mortui vocatos, per inferiora educendos: purgat etiam aliquantum succus per se iussulis inditus, magnoperè in syrupo, ab iisdem laudatus: quia thoracis & pulmonum factus, lotium euidenter ciet, & tumores emollit, digerendi vi paulòquàm Chamæmilli vegetiore. Sumus & nos vñ percommode totum hoc sexenniū Rondelletii imitatione, multo cōmodo. Eapropter multum nocuit, maleq; actum cum studiosis hætenus, quibus persuaserant πολιτάωντα ista cōmentaria, Matricariam Partheniū esse: deterius verò multò cum ægrotis, qui herbæ duntaxat ad menses ciendos vsurpatæ, purgatoriæ (ceterum amaroris horrendi, & foetidi) vsione vexati fuerunt: nec enim Matricariæ, vt Arthemisiæ, mēsisbus eliciendis aliisve matricis particularibus affectibus prærogatiuam, sed tantum ad duri- tiem & Phlegmonas commendat Parthemion Dioscorides.

Varietas.

PARTHENI igitur, seu Cotula, varietas duplex à magnitudine & odore. Notior & frequētor quæ foetidior, caulibus & alis teretibus, succosis, teneris, viridibus, crassioribus, longioribus, quàm Leucanthemidis agrestis: foliis verò & floribus illi adeò alludentibus, vt


bus, vt vel exercitato, nisi nares consuluerit, illudat: attentius tamen intuēti folia latiora, & florum mediæ bullæ depressiores, latiores, ijsdem satis ætate cum Chamæmelo Leucanthemo floret.

Inodora Cotula.

MINOR itidem inter segetes, superiori Anthemidi Cotulæ dictæ prorsum similis, eoque ad discernendum magis difficilis, quia magnitudine penè par, & odore imbecillo aut nullo est. Flores tamen latiores habet & teneriores caules: radix quotannis regerminat.

COTULA, siue Parthenion maritimum minimum.

AD Ceti montis Norbonensis radices, non procul piscatorum attegijis, hæc frequens oritur: & Cichorio Bulbosolubens associatur. Exilibus palmaribus cauliculis humi sternitur, quibus folia insunt Buphthalmi vulgaris paria, diuisura Bellidis maioris, carnosa, odore feriente, putidulo, Cotulæ vulgaris: Floribus item non ita absimilibus. Vires autem nec inferiores, nec dispares.



BUPHTHALMVM, Oculi Bonis.

ENIMVERO Galenus & Egineta, quasi Chrysanthemum foret Buphthalmū, aut nomine tenuis distarent, nusquam Chrysanthemi meminerunt sed Buphthalmum ijsdem quibus Dioscorides verbis posteritati suam mandarunt; peneque persuaferunt commentitiū vel spurium caput de Chrysanthemo esse, vel cuiuspiam amanuensis industria nominis & ordinis quadam cōsequutione illeceſti, illuc inter Chrysogonum, Chrysocomen, Heliochryson & Ageratū apud Diosc. ascitū, eodemque penè orationis filo & viribus, quibus Buphthalmum. Tum utroque posterior Plinius, videtur vnā tantū descriptionē legisse, vel, quod verisimilius, vtrāque; ratus eandē, Buphthalmi vnā delineationē conſaſſe & Chrysanthemi. Buphthalmos, ait, similis Bouū oculis, folio Fœniculi, circa oppida nascens, fruticosus caulis, qui & mandūtur decocti, quidā Cachlā vocant, hæc cum cera sciromata discutit: Vbi vides coaluisse ὀφθαλμοειδῆ siue ὀφθαλμοειδὲς καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς, colorēque melinū, folia multifida, seu fœniculacea, & circa oppida oriri. Verū addita esse ex Chrysanthemo, caules mandi decoctos. Abesse verò illi flores vehementer splendidos, caules leues: variante nimirum nonnihil descriptione ex Buphthalmo atque Chrysanthemo conſata. Hæc factis viſa fuerunt non paucis doctioribus ad astruendum, non nisi eandem vnāque plantam & descriptionem vtrumque; esse. Quibus sanè & nos assentiremur, ni & ipsæ stirpes, quasi se amotas sua tribu & capite diminutas quærerentur, nunc postliminiò reduces se nobis offerret, atque lectio paulò vtrōque; attentior liquidò præluceret. Siquidē Buphthalmo caules sunt teneri, tenues: folia Fœniculi specie, flores lutei, similes & maiores, quàm Anthemidis (nempè Leucanthemi) oculi imagine. Chrysanthemo autē fruticosa facies, leues caules: Folia multum incisa. Flores vehementer splendidi, vel rutili, & caules holeracei, esculēti. Quā propter oppida, nō itē in agris, oriri tradit. Quæ quidē varietas cū par ipsis in plātis cernatur, facit vt arbitremur, Galenū, quē sequitur Paulus, recēſione hac super sedisse, dū ex Dioscoride exſcriberet, quia plātas inter se non comparasset: aut, vt lenius dicamus, Chrysanthemi historiā eius monumentis intercidisse: quemadmodū in vulgatā cognitionis Iride contigit. Facultates præterea si quis arguetur easdem vtrisque redditas, idem factum in Schænantio cum Calamo, Myrrha cum Bdellio, Iberide cum Cardamine, Cichoriis cum Hieracijs, & non paucis alijs. Ea propter exercitatoribus binum damus Buphthalmum, & totidem Chrysanthema, quorum accessione saltem naturæ familiæ duæ auctiores locupletioresque sunt futuræ.

HELLEBORVS ferulaceus. Buphthalmum Dod.

THeop. Helleborus ferulaceus folijs fœniculi, huc accersiri ex capite de Helleboro: perplacet Doct. Dod. sed flores nō ita congruūt. Facultates minus multò catharticus enim est

vt ex Germanis afferit Mathiolus. Sin verò non vehementer purgat, non perperam quadraret: quippe durities inque scirrhum abituras collectiones dissipare certum: quod tamè haud perinde videtur præstiturum primum Bupthalmum.

PYRETHRVM Officinarum, flore Bellidis maioris,
folio Anthemidis.

AFERVORE igneo Græcis, deinde Latinis dictum Pyrethrum nullus nescit: & isti Officinarum Pyrethro, quò minus censeatur verum, nihil est quod derogat, præterquam flores, quos in umbellis Anethi circinatis tradidit Dioscorides (alioquin radices illi, cum adolefcit, cuiusmodi plurimum in fasciculis ex Hispanijs ad Septentriouis emporia conuehuntur, nonnunquam non adultæ Pentaphylli radicem, interdum etiam vetustiores pollicem æquant) cauliculos plurimos, sesquipalium altos, crassiusculos, folijs Anthemidis stipatos, crassioribus, longioribus, Florem item Anthemidis æmulum, aureo in medio umbone, sed magnitudine Bupthalmi. Radicis feruor igneus immanem dentium cruciatum placat: oleum ex recenti radice eductum mirificum est. Vernat hæc etiam non semine, sed duntaxat cauliculo, depacta tantum in hortis Belgicis & Anglicis.

PYRETHRVM alterum.

ALIAM plantam Pyrethri veri nomine donabat Guilandinus, & alebat in Patauino horto, cui radices & folia Cotulæ foetidæ. Umbellæ ab vno quasi centro multis pedicellis innixæ, Venerei pectinis ritu, aut Anethi, candidis flosculis, feruido & amaricante gustu. Sed illud ite lectori Senensis, qui hanc non nisi labore arduo sibi comparatâ, neque omnibus cognitam asserens, quasi inuideret nobis tyronibus cognitionem, aut metueret criticorum reprehensionem, tacendo docet, nisi quænam illa esset, nõ perspectum planè fuerit illi. Et sanè minimè habet hæc alterius illius mirificas vires: vt neque nonnullæ aliæ, quæ quia gustu feruido sunt, & nonnullam foliorum similitudinem sortitæ, illico ab intempestiuis herbarijs Pyrethri nomen accipiunt, quasi id præstaret Pyrethrum feruore tantum, ac non potius alia comite facultate.

Fœniculum. ^{vulgare}
dulce.

Anethum.

Meum.

Ferula.

Ferulago.

Sagapenum.

Galbanum.

Ammoniacum.

Euphorbium.

Sarcocolla.

Thapsia.

Peucedanum.

Panax Asclepium.

Libanotis seu Rosmarinum recentiorum.

Helleborus niger Ferulaceus Theoph.

Saxifraga tenuifolia, Ferulacea.

Saxifraga Anglorum.

Seseli Massiliense.

Asparagus.

Corruda.

Nepa.

Myrio.

Myriophyllum vel Matriphyllum palustre.
 Myriophyllum Equiseti folium, flumatile.
 Polygonum femina.
 Equisetum omne, siue Hippuris.
 Tragano.
 Scorpia Theoph.

μαραθρον. FOENICVLVM, siue MARATHRVM

Vulgatius.
 Dulce.

Germa. Senfel.
 Belgis. Uenckel.
 Gallis. Fenail. Ang. Fenell.

QVONTIAM multus vsus in cibis Foeniculi emarcti & arentis, Marahrum quidam doctissimi dictum volunt, satius tamen è Græcis Latini, quòd quasi fœnem in hyemes arefactum & marcidum reponetur, fœniculum dixerunt. Id autem apud nos in triplici differentia visitur: vulgare, & omnium vsu frequentissimum apparandis cibis, Dulce vocatum Officinis, semine maiore Cumino, gustu An. si, dulci, colore albedo, minus acri, breuioreq; caule & exiliore; folia itidè sunt Anethi. tũ coquis, tũ Pharmacopœis vsui. Hyemes istud non perinde fert vt vulgatius, nec perinde frequens feritur, vtpote semine è Græcia, aut Syria allato. Vulgaris autem spontè virentis feracissimus ager Norbonensis, siccior, squallidus.

Hippomarathri autem ab antiquis prodiit syluestris, semine præsertim ab isto diuerso, cuius plantam, quæ aptè respondeat, similem equidem habemus nullam, Guilli. Driesch probus & peritus Pharmacopœus aluit superioribus annis Antuerpiæ, procerum, prægrædeq; Fœniculum, communi simile: caule ternum, quaternumve cubitorum, foliis breuioribus, aliquantò rigidioribus, albicantibus Corrudæ. Semen par, aut paulò minus altero, rotundius, & Aniso propius. Ili Hippomarathri nomen fecerunt.

ANETHVM.

Germa. Dyllen. Gallis. Anet. Ang. Dill.

ANHTON, quasi ἀνήκτος dictum volunt, quia appetentiam cibi excitet, sed etiam ἀντήν & congressus, & coitio est, ad quam Venerea lacepsit Anethi esus, vt antiqui prodiderunt: tametsi plurimo vsu tandem genituram exhauriat, Dioscor. teste, diffatq; quippe è stomacho crassum spiritum, quem tenuatum in intima & vasa spermatica vrget, sed demùm populatur. Hortis hæc frequentissima, spontè interdum nata, etiam in Anglia & Northmannia: teneræ comæ in iusculis esitantur à quibusdam calculosis, quibus nò parum prodesse certum est, sed cibo, parum grato sapore: tantoperè Fœniculo simile a libi diximus, vt ipso Pharmacopœo interdum deludat, nisi sapore facillè discernereetur, ingrato, calidiore, & colore obscurius virente Anethum.

MEVM. Germa. Beerwurtz.

MEI veri plurimas sapissimè vidimus plantas in Germaniæ, Italiæ, Galliæ, Hispaniæque locis Alpinis: Quin nuper etiam dũ hæc meditaremur vireto peritissimi Pharmacopœi Londinensis Iohannis Riccii, Radix odore suauispicæ, vel Angelicæ, caule & foliis Anethi, umbella candida, Iunio & Iulio floret. Semen Hippomarathri, odoratum. Eadem in celsissimis montium iugis sterilis Seuena, præsertim loco cui nomen Gallicè l'Esperon, id est, calcar latinè, monticulis Cestre nuncupatur vernaculo nomine, vt Platearii & Pandectarii æuo, cui nulla doctiorum omnium suffragio deest nota veri Mei Dioscoridis. Cuius etiã



senten-

Feniculum tortuosum.

sentia est, noster eruditissimus Turnerus Anglus, qui in ore Septentrionalis Alpibus Cheueoticis Scotia finitimis, magna vbertate scatere hanc stirpem nos monuit. Vix enim quadrienniu est, cum primu hanc planta Venetis Pharmacopæis innotuit: nam tametsi radices ad Theriacæ cofectionē ex Syria & Apulia aduectas norant, & in singulas libras singulum aureum ducatum institori pendebant; tamen exoticam putabant, nec vilo loco Italia oriundam, vt qui neque caulem foliave vidissent, & Herbariorum Senensi dictatoris, summi, placitis acquievisent. Hic enim Massiliensium & Mōspelliensium Anethum feniculūve tortuosum, tortuoso errore, verum Dioscoridis Meum astruxerat, ansamque illis errandi præbuerat. Quin ne nunc quidem, vt errorem aut tegat, aut foueat in istis postremis Commentationum recoctionibus atque recantationibus, nisi inuitus hanc genuinam esse fateretur: Et fatali sua modestia argutatur, odorē quadantenus virosū, folia non Anethi, sed Aspetagi, radicibus non adeo tenuibus; Tum paulo mox subdit, Appuli Imperatricem vocant: quo quidem vocabulo, vbique ferme locorum ignara herbarum plebs solita est alicuius incognitæ plantæ eximum & gratum odorem & vires insignes signare: Sic enim vulgò etiam Angelicam Imperatricem vocāt: alioquin Angelicæ, aut Imperatricis cum Meo nihil est affinitatis, nisi odoris, qui in Meo perinde iucundus est. Et peritis indicio est eum neq; multas radices huius eruisse, neque folia plane perspecta habuisse; sunt enim situ & similitudine Anethi, non Asparagi, vt asserit: cui etiam si essent similes, tamen ambitionem sic suam magis proderet: Asparagum namq; metipse feniculo assimilat, & Anethum adeo similem feniculo suo capite asserit, vt plerumque colligetes fallat. Ne porro in multo reconditioribus plantis deinceps fallamur abs te, nos tyrunculi, cautio vna & summa erit, non temere tuis argutis inductionibus picturisve credere. Penè enim nos fefellerat libri initio de Iride syluestri, quam Medio ex Plinio cōparabas: at nobis post longè aliud Mediū dedisti quam inibi præferebas. Hic porro de Sefeli, Androsache & aliis permultis plantis, fauere linguis consilium est. Qui non nesciamus, te tantum Dictatorē iamdiu supra aleam humani iudicii vel erroris summo ignaorum quorundum suffragio euectum esse, & vereamur scuticam Reuerendi fratris Adriani Veneti, qui in vasi tui operis vestibulo & Priuilegio, dicit totum volumen, tuum à sua Paternitate examinatum, approbatum, & ab omni suspicionē erroris liberatum.

Νάϋτης FERULA & Ferulago. Hispan. Cananheia.

QVEMADMODVM Νάϋτης virgultum, thyrsū aut bacillum Græcis signat, sic Ferula Latine à ferendo, quod illius scapi pedamenta fruticibus, & senibus pedum ac scipiones essent. Plurima & procera in Galloprovincia & Norbonensi Gallia, præsertim illis rupibus præruptis que saxis prope subteraneas Cryptas, via qua Monspellio Frontignanā itur ad rectam: itidem in celsis squalidisque saxorum sinibus, qui soles æstiuos & feruidos exceptos totū ferme fouent diem, propè oppidulum Rochauē Castrum vocatum, quā ad austrum vergit: quinūm cubitorum caulis, radix magna, recta & altè in saxorum commissuras hiantes rimas descendens, euulsu difficilis, candida, lacteo pinguiq; succo turgida, odorem vehementem vibrans. folia feniculo maiora, pinguiora crassiora, vt & caulis: umbellæ prægrandes Anethi, Iunio & Iulio flosculis luteis defluentibus. Semē foliaceum, compressum, oblongum, rotundum Angelicæ ferme, duplò maius.

Alia FERULA & Ferulagines, eorumque succi & excrementa
SAGAPENVM.

SVNT etiamnū duæ in herbariorū hortis huius classis, naturæ & similitudinis plantæ, quas idcirco Ferulagines vocant. E videntur distare duntaxat cultura, statura, elegātia & succi copia, prout sunt naçæ radices aruum aridum, magisque excoctum, sub cælo sūdo & feruidiore: vt in Aphrica, Media, Cyrene & alibi. Quare, minus mirum est Dioscoridem paucas & obscuras notas de Sagapeni, Galbani, Ammoniāci, Euphorbi Ferulis, aliisque permultis gummiferis scripto reliquisse: cum ne nunc quidem sint nobis cognitæ, postquam à nostris hominibus terra & mari lustratæ sunt Lybia, Æthiopiaq; cuncta.

ita, multoq; plures regiones, & magis diffusa nostro orbe. Equidem Dioscorides videtur agnoscere Ferulam eandem esse atque Sagapenum: nam e radice Ferulae fauciata manare Sagapenum primum dixerat: deinde inferius, quasi superius nihil dixisset, alteram plantam Ferulaceam docet, ex qua alius generis Sagapenum effluat: quae arguunt potius succos ipsos agnitos illi, quam plantas. Quippe Plinij etiam Sagapenum in Ferula oriri tradit: forte quia eadem plantam cum Ferula vulgari putauit. Cum autem multis e plantis, gummeus, pinguis, & resinofus succus exeat, ut Coniferis, Amygdalis, Mastiche, Terebintho, Cerasis, Hedera: herba Rutha, Dragacantha, Ixia, & alijs non paucis: tamen omnium nobilissimum excrementum medicamentumq; videntur Ferulacea remittere: & earum quaedam parce, nec nisi alicubi, ut Foeniculum in Hispanijs, Thapsia apud nos: de quorum natura, viribus, & mixturis, commentationem plenam instituiamus inter succos medicatos, ubi facilius cum ceteris liquoribus concretis, pinguibus, & cognatis comparabuntur. Nunc tantum si quae faciunt ad hasce plantas vestigandas, pauca leuiter attingemus. Diximus haud dudum in Lasere, ad quam vocem alludit Asa foetis, solitum olim misceri Silphio siue Laseri Sagapenum, eoque, tum propter alias rationes, videri nobis cognatas plantas: quae coniectura fouet Diosc. qui Sagapenum nescio quid medium inter Laser & Galbanum olere affirmat: idq; sensum perceptio hodierna confirmat, adeo namq; similia collidunt ad nos, ut exercitato sit opus oculo & nare sagaci ad ea inuicem discernendum. Purius siquidem Sagapenum, & illud recens, quale non multis ab hinc annis ceperunt Venetias asportare inuito, concolor est Asae, purius, odore item ingrato, Porrum respiciente, vel Galbanum, quum praefertim recentissimam & efficacissimam intueris glebam lachrymis thuris concretam.

Quin & Galbanum Ferulae item Syriacae succus gummeus, Asam multo propius aspectu imitatur: odor tamen minus teter illi, & Gpoponacis quoadatenus cognatum videtur: cuius modi habemus hodie ex Officinis Venetis quoddam fulvum, molle, Ceram nouam referens: cuius grumos glebulae lachrymis pinguibus congestas seruamus, aliorumq; multorum lectiorum gummosorum succorum specimina, ut quiddam iumentum nobis afferant, etiam ad plantas ipsas noscandas, interque ipsas distinguendas. Siquidem verisimile sit, sic inuicem hasce Ferulas se habere, uti ipsorum gummi sunt aut diuersa aut affina. Nam Hammoniacei gummi, quod perquam recens optimum & copiosum hodie adfertur, tamen si plantam ferulaceam esse, ipsa frustilla festuca siue harundinacei corticis, quae inter glebam reperiuntur, fidem faciunt, & Dioscorides affirmet: tamen longius abesse videtur ab illa communi ferulae specie, cuius cognatione Asam, Galbanum, & Sagapenum suspicabamur. Ista etiam semina latiuscula ferulae, quae inibi immixta glebis conspiciuntur, caulisque, uti diximus, frustitia, arguunt ferulam diuersam quandam, sed tamen congenerem: tamen vides ipsum gummi alio odore, figura, & copia multo maxima. Adde quod Euforbij ferulaceam arborem etiam tradit Dioscorides in Mauritaniae Athlante monte, cum tamen ipse liquor concretus non parum discerpet a superioribus gummis, similior multo Sarcocollae. Quare utris credendum sit, merito haeremus, Dioscoridinae, qui ferularum, aut ferulae arbori similem tradidit: an recentioribus, qui istos cunctos tractus Mauritaniae admodum exploratos habent, ipsamque plantam Euforbij frequentissimam sibi visam eodem quidem loco ubi Dioscorides, sed longe alia specie representant. Nempe spinosam plantam, Acantho aut Cynarae similem, cuius radici innascuntur cumerorum effigie fructus praegrandes, succo isto seruido turgentes, quibus per maturitatem incisus, lac effluit, colligitur exceptum in vtribus, mollius quam quod habemus Euforbium. Verum qui saepius obseruauimus inter glomerulos & acervos Euforbij multa semina tricocca Chamaeleae, Lathyridis modo, gustu acris, lubens audiremus, num haec sint eiusdem semina plantae, quod tamen minus videtur, si ea sit Cynaris syluestris similis. Non autem esse Euforbio congenerem Sarcocollam, tamen si admodum similia ipsa grummi grumosa sint. Dioscorides monet, & ipse seruor in Euforbio, amaror autem in Sarcocolla, tum facultates diuersae, quas nos prosequemur, quo loco polliciti fuimus.

*THAPSIA Turbith Gallicum, & Turbith
cineritium Officinarum.*

Gg. j. Potuit

POTUIT dici Thapsia, nō solum vt placuit Dioscoridi, à Thapso insula cognomine, quæ vna è Sporadibus est: sed etiam propter flammæum calorem, quem corpori adnota inureret, adeoq; eminus, præsertim aduerso flatu spectanti. Valdequàm similis Tapfia habitu toto & viribus: tamen si vsu multo præstantiore atq; purgatrice vi. In Aquitanix macilentioribus montosisq; squalidis inuentam nobis dedit præceptor Rondelletius, prope vadum quâ traiecitur in Hispaniâ, tum ad radices Pyreneorū, non procul Perpignano vrbe: crassior radice cortex, fusco foris colore, intus pallet, succoq; multo gliscit lacteo, gummeo, sed inibi loci neglecto: caulis Peucedani gracilior, quâ Ferulæ, foliaq; Fœniculo latiora, breuiora, in umbellis semen Ferulæ minoris, oblongum, angustius, montani Sileris. Merito desita ex istius succo purgandi antiquis consuetudo, vt quo multum noceatur præcipuis visceribus, & tormina dira interdū excitentur. Verum siquidē miscentur leuioribus & naturæ amicioribus, proderit Sarcocollæ, Hammocami, Turpetiue succi modo. Nec Ferulæ Peucedaniq; succis gummeis desūt vires purgatrices: verum tū quia planta tum succus foetidus cerebro aduersatur, ideo non correctâ plus discriminis inferret. Sagapenū vocatur gummi ex Ferula eductū, vt Hāmōniacū, Galbanū cæteri; congenere ex Ferulis consimilibus, sed tamen pro succorum natura inter se differentiæ eliciuntur, de quibus paulò mox.



Herbariorum THAPSIA Vulgaris, Carotæ effigie.

QVAMVIS sit hæc vulgatio Thapsia officinarum verior existimata, & superiori Thapsiæ radice non parum assimilis, tamen certum est longius à descriptione abesse: est enim folijs potius Carotæ, siue Danci agrestis quâ Ferulæ: ex Italia iamdiu hortis Belgicis & Francis translatitæ notitiæ. Sed quia Aquitanica radice vtuntur pleræq; omnes Officinæ Septentrionales, ideo se putet vti istius vulgatiois radicibus, quia nō ita sūt absimiles.

PEUCEDANVM. Fœniculum porcinum.

Ger. Harstraug, Schebel Wurtz, und Seum Genchel.
Belg. Werckens denckel.
Ang. Horestrange.

FERVLÆ COGNATIS hæc, cui radice succiq; gummeus, resinofus, piceus foetor, Peucedani nomen fecit: Apuleius Pinastellam, tamen si potius horrendum amorem & foetorem apud Poetas πυνέδαρος vox signet. Multum crescit in Italiæ Hetruscæ æstuosis atq; Norbonæ glareosis collibus, præsertim in Luci Garamontij aditu & circū inter sentes, lumas, & dumeta. Radix profunda nigricat foris, intus virescēs, succūq; remittit gummeum, flauum, odore grauis & foetentis: comatq; supernè denso capillitio fusco, ambiente caulem gracilem, sesquicubitalem: multis interdum ab imo surculis diuisa, in folia terna Fœniculi modo, quàm Ferulæ duplò latiora, longiora, minus crassa, umbellæ latiores, luteis flosculis prægnantes, semine Angelicæ haud absimili, ingrato. Sic & purgandū vi donata fuit radix herbæ, sed propter foetorem vtriusq; minus in vsum deducta.

PANAX Asclepium Ferulæ facie.

NEc diuersi generis est Asclepium Panax à Ferula, nec item figura absimile, præsertim istud doctioribus verum putatum, fortè quale in Mathiolo pictum vidimus: Sed quia is autor admodū notas plantas oratione prolixiore prosequitur, rariores autem tacitas præterit, aut nomine tenus indicatas pictori relinquit, nos potius dubios quàm certiores ple-

STIRPIVM aduersaria noua.

351

plerumque facit intuēti omni hanc iconē, illicō Ammi, Mei, Anethi, aut similium, veniet in mentem, nisi quispiam aperiat descriptione concinna, sintne folia fœniculo minora, odoratiora, hirsutiora, quæ umbellæ, quo flore donatæ, sic paucis Cōmentatoris officio & pollicitatione defūgeretur, præclarè opera posita, nec multa: quæ tamē multum plus tibi honoris, & vtilitatis nobis esset allatura, quàm ex Authoribus, qui peruii sunt studiosis, paginas suas infarcire, vt plebi multa loquutus videatur, quum dixerit aut docuerit nihil. Ex Illyrio tractu, cui Histriæ nomē, hodie plātas non paucas asportauit industrius Valerā-
dus Insulanus Lugdunī Pharmacopœus, quib⁹ multa cū hac Panace affinitas, quas in Hor-
to Doctoris Iuberti Monspellii seimus: Ferulæ similis erat effigie, sed multò minor ma-
gnitudine. Semine tamen non Fœniculi, sed vt Ferulæ, lato: foliis & floribus haud dissimi-
libus, caule & radice, magnitudine atque similitudine Anethi odorato.

ROSMARINVM ferulaceum, Fertile Dios. cuius Semen Cachris dicitur.

DI^{VERS}I admodum generis plantæ Libanotidis appellationē asciuerunt, ob odorem quem spirarent, quadam sui parte Thuris quadantenus æmulum, cuiusmodi primæ Libanotidis radicem olere Dioscorides author est: qui idem à Theophrasto quandā Li-
banotidem memoratā, cuius folia agrestis Lactucæ amaræ cādidiora, asperiora: radice bre-
ui, narrat. Nobis autem nulla hodie plenè innotuit Libanotis ē tot Ferulaceis, quæ vulgò *Libanotis Theū*
Libanotides putantur, perinde descriptioni consona, vt hæc, quam Patauinus olim ha-
bebat hortus, quæ etiamnum hac ineunte hyeme lata virebat Londini in horto Iohā-
nis Riccii, non vulgaris peritiæ Pharmacopœi. Surrigit ea caulem quinum & senum in-
terdum cubitorum, fœniculacæum, aut ferulæ, nitidum, obscure viridantem, alis multis
& ramulis diuisum, ē nodosis geniculis exeuntibus, foliaque gerentibus crebra, fœniculo
crassiora, Cotulæ maiora, auersa, virore cæso & glauco, umbellas per ætatem latiores Fe-
rulæ, aut Tapsiæ, floribus luteolis refertas, & semina Fraxini, folliacea, oblongiora quàm
Ferulæ, & Cucumerino semini maiora, cōpressiora, striata, acerosa, resinacæa, aut Thu-
reum halituum dum fricantur, Sileris Montani, aut Pelopōnensis Sefeli dantia, manuque
os resinaceo & Thureo sapore complentia, acriora: reliqua planta tenera, calidiuscula,
sed non ingrato holeraceo & Smini gustu, quo quidem facile dignoscitur à Ferula: nam
alioqui lacte multo turget tota, vt Ferula, sed albidior & minus feruido, aut graui odo-
re, quin potius odoro.

HERBARIORVM Septentrional. notior Libanotis.

NON perinde Libanotidi congruit hæc ferulacea, quàm multi Herbarii horti in Gal-
lia, Germania, & Anglia fouent: tametsi caule gracili, recto, Mei, aut Anethi, stri-
ato, atrouirente, bicubitali sit, paucis alis & geniculis donato: in quibus, imis præsertim,
Peucedani proluxiora folia, fœniculi tortuosi, angustiora Saxifragiæ Anglicæ, medio &
superiore caule pauciora; Umbellis & floribus pusillis, candidis, Mei: Sed exiguum semē,
sub hyemē maturās, minus Carui rotundi, ferè Ammi officinarum par, quod neutiquam
potest conuenire Rosmarini fertilis Dioscoridis semini, Cachryn, aut Cancryn vocati;
quia grano hordeaceo esset simile, aut potius quòd vrentis facultatis cū esset, similem
escaram inurebat cuti, atque pilula Cæri propterea ab antiquis vocata.

*NIGER HELLEBORVS Theophrast. caule &
foliis Ferulæ, radicibus nigris.*

ET hīc cogimur etiam iassentiri doctioribus inculcantibus nobis istū Senensem minus
versatum stirpium in inspectione, aut authorum classicorum lectione: nam vbi Tra-
gii vestigatoris pertissimi & Gesneri indefessi laboris viri iudicium, vt vanum plerūque
incusat, nē ille quàm non esset multæ exercitationis, aut lectionis, liquidò prodit. Sal-
tem debuit monuisse, Theoph. fortè & Hippocr. Helleborum descripsisse Cotulæ & foliis
G g. ij. ferula-

ferulaceis nigris radicibus, albi similibus: vsum qualem nescius & auis pseudocōmentator, isti pseudohelleboro attribuit. Radix quamplurimis, nigris, tenuibus neruulis, Helleboro similis; ternos quaternosve erigit cauliculos, pedem ferme altos: foliis densis, tenuiter incis, virentibus, Ferulæ Adonidisve potius similibus, cuius flores etiam æmulos, sed luteos & maiores Calthæ palustris, aut Ranunculo propiores, suboriente confertim crebribus conflato seminibus pusillis capitulo orbiculato, oblongoque, Morum imitante, simili eidem Adonidi, vel Ranunculo: In variis Hælsatiæ locis oritur, & hortis colitur. Iam vero si neutiquam Hellebori vires habere verè tuentur & profitentur obseruatores, non sit igitur Helleborus: floret tamè viretque Bruma, Ianuario & Februario, vt Helleborus & Ferula.

SAXIFRAGIA Ferulacea Italarum.


QUIDAM horti Italici, vt Urbini & Florentiæ, alebant Saxifragiam bicubitalem, foliis ferulaceis, aut fœniculi, minus aut minimè geniculatis, tenuioribus foliis, obscure virentibus: floribus umbellatis, albidis, Mei, cuius videtur species. Radices albicant, Pastinacæ sapore.

SAXIFRAGIA Anglorum, facie Sefeli Pratenfis Monspelliensium.

AB eximia dote in frangendo calculo, Saxifragam scitè dixerunt Angli hanc plantam, pratis vdis familiarem: foliis fœniculi latioribus, pratenfis Sefeli minoribus. Radix odora foris nigra, intus alba, Peucedani facie. Flores in umbellis candidi: semen fœniculi, caulis sesquicubitalis & cubitalis est: hac stillatitiâ parât mulierculæ clynicæ in Angliâ.

SESELI MASSILIENSE, folio fœniculi crassiore.

PASSIM & vberè crescit Massiliense Sefeli illis in tractibus qui Massilia Aquæfextias ducunt, transq; Rhodanum in Monspelli agri asperis: Nobis etiam collecta, via qua Roma Senam itur, propè colles oppidi *Môstiascone*, vini optimi Mufcati commendatione, potioribus magis noti, quàm Botanici studiosis. Radix illi alba, fœniculi effigie & magnitudine, altè humi depacta, & euulsu difficilis, quàm fœniculi odoratior & calidior: caulem vt plurimum sesquicubitū ferulaceū, hincinde alis multis ex geniculis prodeuntibus reflexum emittit, prædurum, rigidum: Folia pauciora, sed firmiora, crassiora quàm fœniculi, & albida sunt: umbellæ confertæ Anethi floribus candidis, & semine, Aniso similiori quàm fœniculi: gustu suauis, acris, & medicato, cuiusmodi Mei aut Panacis gustu, Planta illic valde nota, fœniculi tortuosi nomēclatura: singularis industriæ amicus Iacobus Reinaudus Massiliensis ciuis & Pharmacopœus primus hanc Lugdunensibus medicis, etiamque Valerando *Donrez* illic Pharmacopœo, huius cognitionis suprà quàm dici queat consultis, miserat, ad Theriacæ exquisitâ confectionē, cui etiam Monspelliensium Doctorum instituto, Rondeletii præsertim, additur, cuius sententiâ non rarò sequimur. Neque quantū illic locorū est Massiliæ circum lustranti, villam plantā videre est, quæ magis quadret Sefeli, proindeq; hallucinantis commētatoris Tridētini Sefeli neutiquam genuinū esse quit: quidverò sit, cum ille describere non ausus sit, nobis ignorandum. Illud tamè asserendum, nos in Tridētinis alpidibus hanc plantam vspiciam vidisse, ac ne in Baldo quidē monte longè illis feraciorē.



An siler Mon-
saniū M. Sefeli

Ma-

STIRP IV M aduersaria noua.

353

Maritimus Diof. ASPARAGVS idem cum
hortenfi & holeraceo.

Ang. Sperage, or Sperache. Bel. Cozael cru vt. Gall. Asperges.

TENELLÆ & primulū à fatione erumpentes holeraceorum germinationes Asparagi dicebātur, quia σπειρα Græcè fero, & σπορά satio dicitur: proinde satius quispiam coniectet Asparagos è Græco Latinis deductos, pace multiscij Varronis, quā quia ex asperis virgultis legerentur. Dux autem differentiæ, quales antiqui scripserunt, passim vulgò noscūtur, & in hortis feruntur: nam spontè natæ potius gaudere videntur maritimis locis: sed ea species quæ vulgaris siue altilis est, depressiora decliuioraq; pratensia maritima amat: iam admodum nota & frequens primo vere Asparagis punctim emicantibus, multis crebribusq; tenellis thyrsulis, caudæ Equinæ quadantenus similibus, esu in acetarijs admodum quæsitis: affecta postea etate & ætate, multis fruticant ramulis caules adulti, proceritate ternū & quaternū pedum, densissimis foliorum exilium comis Fœniculi aut Anethi, flosculos edentibus oleæ luteolos, qui pariunt bacculas rotundas, Rusci duplò minores, pares fructu Ribe.

CORRUDA differt ab altili Asparago.

SEd enim Corruda magis montosis & collibus in deuexu & afflatu maritimo delectatur; perperamq; à nostris Herbarum Doctoribus hodie cum Altili confunditur, cum eadem putatur: tamen rarior multò occurrat, neq; enim Veneto tractui maritimo, Germaniæ, Galliæ, Angliæ maritimis visitur, vbi nihilofecius altilis frequens oritur. Facilis autem à superiore dignotio, quia hæc tota cādidior & rigidior est, & ramis diuariatis funditur per sepes. Folia acutiora, breuiora, & magis in ordines stipata: flosculis oleæ luteolis, crebribus, subter alis emicantibus, & semē illi, nō vt Altili, Coralli colore, sed vbi maturum nigricat ex viridi, magnitudine aliquatò inferius, quod glomeratim proximè surculos adnascitur: quas si seorsim species genericas vidisset & obseruasset Commētator, nec falsus ipse nos fefellisset, nec Corrudam apposuisset, non illius loco Asparagum altilem & vescum sponte erumpentem illi subdidisset. Is quippe nulla re prorsum quā transplantatione aut cultu, à seipso hortensio distat. At quid differat ab horum vtroque Corruda, satis iam liquet, vbi Altilis & maritimi bacca coccinæ sunt: Corruda autem ex nigro virides semper, & Asparagi marini bacca multò maiores quā Corrudæ.

NEPA apud Theoph. diuersa est à Scorpione, quam inter
Cali collocatam oportuit.

HVC autem properatione non ita incommoda irrepfit Nepa: quippe cui spinæ horridæ & infestæ, nomen commune fecerint cum Scorpione, qui etiam ab spinis punctim
Gg. iij. tans



tangentem faucibus dictus est: & similiter Nepa vocatur cognomine ab animalculo cauda ictu metuendo. Hanc autem fermè indiscretæ similitudinis esse cum Corrudæ prodidit Theophrastus: qualem plantam paucis adhuc notam, nullidum recentiorum descriptam: tum ob sui cognitionem, tum ad Corrudæ collationem apponemus: non pauci enim sunt, qui ad eandem quam Senensis salebram impeerunt, rati Corrudam nihil aliud esse quam maritimum Asparagum, passim locorum proueniētem, vt superius diximus. Sed enim qui nouerit hanc, Corrudæ simillimam dicet, non item Asperago: Eam nullibi præterquam in Prouincia vidimus, locis montosis vberè fruticantem, præsertim prope montium radices, qui Magdalenæ celebri Fano & specui sancto nuncupato finitimi sunt, via qua Aquasextias itur. Lignæ sunt radices, multiplices, implexæ, tenues: à quibus mox orsa spinulæ, rigidulæ, densæ, Corrudæ simillimæ, aliquantò maiores, vniuersa virgulta summo tenus vestiunt, sicq; tota planta densis horret aculeis pro folijs: & faciem, Corrudæ præfert, gustu amaricante. Locis faxeis & aridis, & Sterellæ montis decliuibus, ac propter argenteum amnem, *Argens* vulgo Galloprovinciæ dictum, multa.



MYRIOPHYLLUM aut Maratriphyllum palustre.

AFFINES nomine plantas Militares, siue Dioscoridi dictas Millefolias, scilicet Semperuiifolio Stratiotem aquaticā, & Filicifoliam terrestrem, ac Cumini syluestris foliā quamlibet suis alibi notis discreuimus: à quibus iam hanc fœniculi foliam diuersam agnoscere in procinctu cuiuslibet est. Quippe quam sæpius reperies in leui agmine fluentibus aquis & palustribus, innumeris foliorum capillamentis exilibus, è neruis per æqua interval la pinnatim exeuntibus, teneritudine & diuisura Fœniculi pullulantis, aut Corrudæ, mollioribus, colore ex viridi fusco, mollicello, teneroq; caule in aquis fluitante: eque radice exigua, euulsu facili, pallidula, lutea umbella emicat, gustu quadantenus palustris Equiseti. Qui hinc nulla de causa Marathrū vocem dispungunt, vt Amaracum subdant, gnauiter in nihil agendo, & sibi molestiam asciscendo, sudant: nec vident nomen à Marathro deductum, monente stirpis effigie & codice.

Myriophyllum Equiseti folium Fluuiale.

FSTVDIO Dioscoridi prætermissum, mediæ figuræ inter Hippuridem & Myriophyllum aquaticum exiit. Caulem siquidem edit cauū, striatum, & glabrum, duum trinumue pedum: flosculis albidis, confertis, fastigiatum, Nasturtij aut Cardami aquaticæ similibus. Aquarum residuum & riulorum vadosis innascitur lubens: folijs multis, flaccidis & languidis, fluitantibus, caudatis, aut setaceis, Equiseti, vel Millefolij fœniculacei.

POLYGONON Fœmina semine vidua.

PROPTER crebras geniculorum cōmissuras Polygonon dictum liquidò constat, sic vulgus diceret multinodiam: propior tamen & similior hæc species Equisetis, quam masculo Polygono videtur, natalibus, culmis, folijs, crebribus in geniculis, per interualla fermè æqua exortis, tanta cognatione iidem virium, vt non valde sit dispar aut modus, aut emolumentū vtēdi. Habet siquidem ternos & quaternos caules, sed læuioribus, glabros, neq; strijs asperos, rectos, folia angusta, lōgiuscula, sese per radiatos exortus, & articellorū pixidatas infertiones stipantia, Equiseti, aut asperulæ angustiora. Radix albida, longius propagata, & de se nonnulla germina Asparagosue promēs, tenera. Viginosas cōualles & quas riuli inter

interluunt, crepidines sectatur in herbidis vdis, ad cellam Nouum Monspellio exeuntibus occurrit. Rara tamen illic & nec multum alibi, nota: sicca & astringens valde.

HIPPVRIS.

QVILIBET è triuo Hippuridem nouit, sic dictam vt loquitur Plin. ob setas vel pilos equinos & foliorum similitudinem, caudæ equinæ imitatos, vnde etiam Equisetum dictum. Herba siccissima, *ἑquisῶν* tamē vocata quia vdis, humetibus pariter gaudet scrobibus & satrum marginibus, plurima quocunq; iueris obuia sit, & in duplici differentia cernitur. Equisetum istud notius, culmos arundineos, vel iunceos, cauos, nudos, asperiusculos, & geniculatos, & siccitate firmiores, detergendæ omnigenæ supellectili à mulierculis expectitos, initio edit, exiguis articularum vestigijs per initia, & racemosis in summo donatos: floribus oblongis, rotundisq; asparagi nouellæ nucamentis, albidis, & herbaceis: progressu ex vertebrosis quasi articulatis commissuris, quas in ambitu per intercapedines radiatim cingunt multiplices exilium foliorum quasi setæ asperiusculæ, prolixiores, Laricis folijs, Myriophylli aquatici comas, aut Equinam caudam satis emittentes. Minor interdum tota hæc rotundos fert asparagos, teneros, summos, non clauatos, sed racemulis longis, & spicatis donatur ramulis, comosis etiam è lateribus.

Ger. Rössch

wantz.

Bel. Doertstert

Ital. Asperella.

Gall. Queue

queue de chat

Ang. Horse

taille.

Minor fontalis HIPVRIS.

PROBIT & istud subtilis & sabulosus aruis, vt in Anglia passimè viuus ipsis scaturiginibus trans vndantem aquam erupens prope Castell Cary: estque secunda Dioscorid. species, quā autores implicuisse & confundisse videtur. Est ea recto caule, crassiore, magis cauo, habitiore: per interualla carnosos exortus foliorum multo breuiorum, albican- tium & teneriorum edente: radix nigricat, geniculatis articulationibus & fibris donata: viribus videtur impar superiori.

An racemosa Equisetifacie planta sit TRAGOS
vel Tragonon Diosc?

CEREALEM frugem multum acerosam Tra- gon vocarunt, qua ratione nuncupari & hanc innuit Diosc: cuius vtriusvis origine vocis nequa quam ad hircum intelligas allusum, sed potius *πρός τὸ τραγῶν*, ab comedendo, vnde Traganon & Edulem, & Tragemata Bellaria Latinis dicta: Gal- lis etiamnum *dragee*. Sic in *Trasi dolce* Veronensi, quia edendo esset, eadem vocis vestigia remanse- runt. Est aut Traganos, quæ hic verum profitemur, fruticulus raritate & elegantia in primis cognitu dignus, nequedum vlli recentiorum memora- tus, quæ primùm in siticulosis arenis oræ mariti- mæ ad Ceti promontorii Agathæsis sinus radices, & finitimis aggeribus arenosis, inter mare & stag- num Laterensem, tres quatuorve Leucas Mospellio distantem, legimus, cuiusq; fructu, siue acinos, quos hic Diosc. *ἐχῶς* vocat, ex granulis tritico parib' congestis, ternis aut quaternis, mori Bati effigie, vinaceis aut arillis perquam astringentibus, magna cum voluptate esitauimus: vbi vulgus piscatorum & naucleri accolæ, etiāq; studiosi Monspellij *Rasins de mar*, seu marinā vuā vo- cat. Luxuriat inibi tanta vbertate, vt ea plaustra onerare queant. Foliorum prorsum ex- pers est, sarmetosis, gracilibus, copiosissimis, & confertis viticulis, iuncum, aut potius spar- tum, partim & Equisetum referentibus, ramosis comis, humi accubantibus, ex crassiore, duriore, rufescente breui stipite, arenosæ superficiei multis anfractibus immerso, & radi- ci continuato, quæ in senos octonosue pedes tortuosa excurrit, genicula ruffa, graminea,



Gg. iij.

cre-

crebrioribus etiam geniculis in breui sparteo, crassitie & duritie stipitis, in alas exeunte geniculofas, comofas Equiseti. Sed duriores, amaras, siccitate & astringione mira, vti vniuersa etiam planta, secundum autem ramulorum inferiores superioresque exortus, in iuncis innumeris cuspidibus minutim racemosi (Iulio & Iunio) erumpunt flosculi, ferè iunci aut botridis, albicantes, herbidi: post quorum defluuium, ingens acinorum agmen totam operit fruticem, coccinei enim grani triticei sunt, pares a cinuli, & purpureo multo pingues, Rubi idèi, nò prorsum maturi exiguos fructus referentes: è quolibet eorum gygartum duriusculum, triquetrum, vtrinque acuminatum, grani tritici aut Sefami Theoph. similitudine, fuscum foris, intus albū, medullosum, astringēs, nò ingratum, gratus verò esu ipse fructus & prædulcis, etiamnum vrinam multum ciens, biennio, triennioque regustatus. Satum item in Belgio amicis, nobis istud Londini bellè enatum fuit: nondum tamen acinorum ornatus comparuit, Rupellæ etiam maritimis exire, & ex aduerso Salinorū insulis Oceani Occidui, nobis amici non vulgatæ fidei retulerunt. Nos tamen Autumno 1566. qui multa illic rara nacti fuimus, non animaduertimus. Quir Tragon non sit hic genuinus agnoscendus omnibus eruditis, causam haud dicet. Senensis, qui triuiale & claudum nominis Scorpij argumentum aucupatus, illic solita qua est fiducia, Cali dat speciem spinosam, eandemque Tragon Dioscoridis ratus, confundit cum Theophrasti Scorpio, quem alium à Ne-pa docuimus, & suo loco vtrumque dedimus.

TRAGON improbus Math.

EST enim ille Crithmi Salicornij seu Cali congener, propius ad eam speciem spinosam accedens, quam Pastinacam aut Secacul, aut alterum Crithmum faciunt, pedem & cubitum altam, intortis, crassis, densis, ramulis diuisam, & adeò horridam, armatamque; folijs pungētibz Aizoi colore & figura, carnosiss, crassioribus, numerosis in imo, in summo muricatis, cuiusmodi in tribulo terrestri & aquatico, vt impunè effringere surculum nequeas: hisce ad imam basim interiorem, flosculi herbacei rotundi, ex quibus semē exit compressum, Kali modo (puto) in volutē speciem. Radix cespitem summo exilis, lignosa, Cali, & herbaceo prorsum gustu, succoque; multo glutinoso prægnans, minimè astringente, falso, & alioqui nullius excellentis qualitatis: quam si Commentator propius gustu & visu exploratam habuisset, descriptione declarasset, nec Dioscoridis Tragon fecisset. Est enim succulenta herba, nò frutex, nullos acinos habet rufos, tritico pares aut supernè acutos, numerosos, magno perè astringentes: quæ omnia insunt prorsus nostro Trago, quem sine folijs, nec spinosam Dioscorides tradit. At hæc folia & caro carnosa habet, spinis horrida, astringitio penitus nulla & prorsum à Scorpio Theophrasti non alia, qualem descriptum eleganter Theophrasti Scorpium leges. Qui quàm exquisitè huius inspectione herbæ percipitur, tam longè abest à Dioscoridis Trago: cui ex proximo superiore capite potuit irrepisse Scorpij vox, vti multa nomina casu inserta sunt, aut frequenti amanuensium lapsu, qui etiam isto loco florere Corradam & Scorpium μετὰ νεοτὲρῶν φθινόπωρῶν, cum tamen longè ante florere certum sit, eoque μετὰ ἐφ' ἡμέρας æquinoctium vernum, vel Plin. lectione, qui non rarò notas res aut dispares, simili descriptione amplectitur, vti multis locis ostendimus.

Rubia utraq.

Erithrodanum Marinum Norbonense.

Aparine.

Aspergula, siue Asperago Pli. Gallis Mugnet.

Spergula.

Gallion. { luteum & album.

Cruciata minor.

Polygonatum minus.

Paserina Tragi.

RUBIA utraque, Erithrodanum marinum.

Ang. Madder. Gall. Garrance. Belg. Grappe.

Vber

VBERI tum prouentu, tum quæstu oritur & colitur Rubiæ vbiuis locorum, præsertim in Germania & Belgia Insulis vrbe dicta, vbi radices proluxissimas & numerosas, flexibus multis humi sparsas, rubentes intus, forisque Coralli nondum perpoliti colore: *Ang. Madder* erutas hyeme ineunte, mense Nouembri, siccatas trapetis subdunt, confringuntque, quo commodius ad externa emporia compendii causa venum vehantur. Infecturæ lanarum colorumve impendio expetita, necnon officinis medicis notissima: hæc maior & melior vocatur.

Altera verò, vt minor, sic deterioris est notæ, minus aspera tota, cuius radices è ru- *Syluestris Rubia Minor.* bello in luteum languent, flosculi nec luteo pallent, sed candicant, folia minora, numero- siora, geniculos frequentiores radiatim ambiunt, cauliculosque triquetros, semine rotundo, prorsum maioris Rubiæ similitudinè, vsus rarior huius.

RUBIA MARINA Norbonensium.

PAVCIS locis oriunda spectatæ elegan- tię planta, quam non temerè nisi in Nor- bonæ Maritimis, & squalidis scabuletis Ma- galonæ & Peraus circūiectis reperiēs, nec commodiori quàm huic loco referas. Radix pedem aut sesquipedem longa, nuda, farnē- tosa, arida, rubra, Anchusæ colore, modo, & magnitudine: intus ruffet obsoletius cuius- modi Iuniperi, aut Cedri ramenta: graciles numerososque cauliculos ab imo surrectos, teretes, geniculis crebribus cinctos habet: è quibus foliola Saturei aut Rubiæ minoris, tenuia, rigida, mucronata, sed incana, vt plu- rimùm quaterna decussatim promūtur, quæ suis axillis acerosos glomerulos foliorum pusillorum cōdant, deinde summis in caulicu- lis è mediis istis glomerulis flosculi prode- unt ex herbida lutei aut pallidi, magnitudi- ne Amaraci, & Iasmini modo oblongi sunt.



• *A P A R I N E.*

ERYTRODANI vniuerso generi videtur congener Aparinæ: valde quippe similis, & eadem penè syluestris foret, nisi intercederet feminis discrimen, tum etiam scabritia hirsutaque cuticula caulium & foliorum, quibus sese vestibus pertinaci applicat hesu, vnde Philantropos, seu Hominis amans, vocitata fuit. Semen verò vmbonis vmbilicivæ figuram cælatam medio sui habet.

Aspergula odora nostras, aut ASPERVLA, an Mollugo, aut Asperugo Plinii? Gallis, Muguet.

HISCE proximè accedunt duæ plantę priscis, vt videtur, incognitæ, nisi sint Plin. Mol- lugo, & Asperugo dictæ. Altera, Asperula vocitata, tamen non est nisi semine aliquan- tum aspera. Cauliculos complures quadratos geniculis multis cinctos edit, circum quos stellatim foliola Aparinæ, latiora, magisque virentia, septena vel octona sunt: florèsq; exi- gui candicant in summo, Valerianæ æmuli: tota planta odorè suavi cuiusmodi Lilij con- ualli: semen rotundum & nonnihil asperum. Rarè alibi quàm in hortis, vbi odoris com- mendatione colitur, Gallis Belgis per familiaris.

Sagina SPERGULA, sine Spurry Belgarum & Anglorum.

SPERGULA verò radicem exiguum: à qua statim promūtur palmum alti cauliculi ro- tundi, graciles, geniculati, crebrioribus foliis, sed exilioribus, circum in stellæ morem ra- diatis

diatis Gallii foliis similibus, flores in extremis albi, caliculis coercentur semē nigricans. Brabanti hac, vniuersa passim conferunt veruac̃ta, vt cuius pabulo mirificē vaccas saginari, lactisque copiam augeri, veterinæ iam diu exploratum habent.

GALLIVM Luteum.

Gallium album, PERQVAM simile Gallium huic, sed foliis minutoribus, luteisq̃ue flosculis, racemosis, oleæ modo, passim obuim & notum, odore suau. Huius altera frequenter visitur, differētia, floribus candidis, & foliis aliquantō latioribus, ad Rubiam syluestrem propius accedentibus, sed minoribus, quod Gallium album nuncupant.

CRUCIATA MINOR.

ACCENSERI potest isti classi Cruciata recentioribus vocata, iisdem quibus Gallium gaudens natalitiis. Pusilla radice, fibrosa donatur, à qua cauliculos quadrangulos egerit rectos, pilis hirsutos, ex æquis intervallis geniculatos, quaternisq̃ue foliis breuioribus, latiusculis, hirsutis, & flauo pallentibus decussatim stipantur, è quibus flores exeunt lactei, pusilli, singuli, oleæ, racemosi, sed in summo numerosiores, conferim aggesti, thyrsum Pulegii constituūt. Vulneraria hæc, haustibusq̃ue prolapsorum ex alto, atq; sanguinis exputioni admisceri solita, vti Rubiæ cætera.

POLYGONATVM minus, Rubia folijs, ambitu stellato.

Secacul Arab. *Bathades.* *Polygonati Pli.* A FOLIIS agnoscitur altera differentia Polygonati, Sigilli Solomonis vocati, cui radix & caulis, plantæq̃ue habitudo, & natales sunt eadem: verum folia angustiora multò, & ambitu stellato, Rubiæ maioris, vel Asperulæ, quaterna, aut quina: minores etiā flores inter folia herbacei, bacculæq; Pipereis minores: multus hic collibus, *Ruoli* & Taurino Pedemontium collibus syluosis vicinis, & arduis Vegani Norbonensis, Belgicis hortis charus & multus, vbi maius etiam in pratis syluosis spontē luxuriat. Ruri etiam Galliæ & Germaniæ prouenit crebra, vbi iamdiu & etiam nunc nostro tempore, officinæ cōdire solitæ sunt, ad Diasatyriionis Veneris illicium, persuasæ esse Arabum Secacul, multis recentiorum authorum negantibus, inter quos Senensis, qui quid illius Indici Secacul radice penuria subdendum foret, vt solet, silet: nos suo loco commodissimē vtendū monuimus radicibus Pastinacæ marinæ (quæ domestica vegetior est) esu gratis, boni succi, nonnihil flatulentis, sanguinem, semen & spiritum augmentibus. Eryngii, etiam Pastinacarum & Zingiberis viridis conditura posset vicem explere, vti nucis Indicæ pulpa vesca; & Indicæ *Bathades*, seu *Ges* vocatæ, quas inter Syzarum retulimus. Ruellius perperam astruit Polygonatum Syl. Plinianū, foliis Rutæ, Polemoniū fruticē, quē non nouit isto nomine, & fieri potest vt hallucinatio sit Polygonati ad Polemonium.

Herbariorū PASSERINA unicaulis, Linaria, aut Luteola figura, Lini semine vesco.

HANC aptius quis inter Linum & Scopariam inserat, quam nisi perpauca in locis Germaniæ videas, vnde habuit industrius & magnæ spei medicus Anglus D. Pennius, vbi *Wisd. Meer Dissen* vocatur, id est, Milium syluestre, quia Milii semen non dispar dat, gustu, & similitudine, quodq̃ue passeruli depascuntur, vnde Passerinam vocauit Tragus. E singulari, exili, paulum flexuosa, albida Lini radice, caulem erigit vnicum, iuncum, gracilem, sesquicubitalem, medio tenus nudum, sed indidem summo tenus, pusillis crebris foliolis Satureiæ aut Thymi angustioribus, inter quē granula multa, oblongiuscula, Milii magnitudine & sapore, sed calidiusculo, amaricante.

Phyllitis.
Hemionitis.
Ceterach, siue Asplenium.
Linaria minor.
Ophioglosson.
Tragum alterum Scolopendrii facie.
Adiantum.
Trichomanes.

Adiantum ^{album &}
 ^{nigrum.}
Salvia *vita*, *sive* *Ruta* *muraria*.
Filix *mas*.
Fœmina.
Osmunda *regalis* *sive* *Filix* *florida*.
Polypodium.
Dryopteris.
Lonchitis.

PHYLLITIS & Hemionitis.

LVBE interpretari Phyllitim quasi foliosam dictam plantam hanc, vt quæ caulis, floris,
 & seminis expers prodeat, nec nisi folia aut foliosus cespes appareat: & radice namque
 multis capillamentis fibrosa, nigricante, capilli Veneris, eriguntur senæ, octonæ, vel denæ
 frondes, crassiores, rigidiores, Vulgaris Lapatij effigie, passim viarum parietina & sylvarum
 amantes vda, magnitudine & mucrone sesquipalmaris spiculi: interius leuore semper vi-
 rente, aduersa, repandæ: à tergo autem transversas multas habent ferrugineo colore pluma-
 tim exiles lineolas, aut liras extantes, ab ima &
 latiore sui parte, plumatim secus medium neruum
 digestas, summo tenus quæ in mucronem Lapatij
 vulgaris, aut linguæ oblongæ similem deficit, vnde
 Ceruina lingua Officinis vocatur: quare nentiquam
 iam ambigitur, Phyllitim veram esse hanc, sapore
 exsiccate, non ingrato, & acerbo, subastringente, mul-
 ti ad splenem vtilis.

Hemionitides variantes.



Harum duarum
 quæ serrato am-
 bitu tantum di-
 stat, nobis repe-
 ra in montibus,

HEMIONITIS sive sterilis.

SED enim parum adhuc noscitur nunc ea quæ à non
 nullis recentiorum pingitur, non item descri-
 bitur Hemionitis, sit ne speciediuerſa ab vulgari lin-
 gua Ceruina dicat, quam idcirco fecerant docti quidam Hemionitidem, sive tu dicas mula-
 riâ: quamuis eam mulæ non depascatur: malim tamen sterilem dictam, quod seminis, caulis,
 & floris sit expers, eoque perquam affinis & germana nostrati linguæ Ceruinæ nobis vide-
 tur. In quibusdam Italiæ hortis eandem hanc, sed aliquantum loco latiorē, diuersam, me-
 minimus, hortatuque quorundam Itolorum frustra hanc Romæ quæsiuimus, quo loci no-
 bis indicarāt illi in augustæ antiquitatis rudibus ædiū collapsarū, quas etiamnum verna-
 culè *Septe Sale*, id est, septem triclinia, illic vocant. Quin sciscitantibus nobis negabant
 Romani Pharmacopœi se vspiciam inibi aut circum in vinetis vicinis Hemionitidem vidisse:
 sunt enim maceræ tantum illic & cæmentorum dirutæ moles aridissimæ & præ sole fer-
 uido minimè alendis plâis, nedum Hemionitidi, aptæ. Attamen nihil diffitemur viro per-
 quam sedulo Anguillaræ, qui nos idem quoque monuerat: nempe plantam indidem se ha-
 buisse, sed adeo obscuris notis distantem, vt perparum aut nullatenus differre videretur à
 lingua Ceruina. Nec enim minus fibrosam radicem nigricantibus villis, summo cespite
 vel superficie hærentibus, huic inesse: folia autem auersis exarata declinibus lineolis, seu
 obliquis liris, alterius similibus: basim tamen latiore habere & versum circumque pedicu-
 lum falcatam arcuatamque Volubilis modo. Hæc ille. Sed aliquot annis post, in Anglia oc-
 cidua, ad rupes antrosasque, cautes D. Vincentij, vno aut altero miliari ab vrbe peramoena
 Bristoia, vberrius luxuriantem quandam, facie linguæ Ceruinæ, plantam inuenimus: sed
 ternis quaternisque folijs, minoribus multo: vix enim quum maxima, tres digitos longitu-
 dine excedunt: minimè crassa, aut rigida, sed mollicella, quasi Acanthi veri, inter quem &
 alias plantas capillares, alioquin laticæ & bene adultas ita exilis nascitur: nec villis à tergo li-
 turis

turis asperata, ad mucronem lateribus vtring; ad mediū sinuatis, & reductis: basi latiore, lunata: segmento quasi vtring; interius recuruo. Londinum in hortis plantandos cespites misimus, sed parum diu superstitēs fuerunt: adeo namq; tenuibus cirris radicis, & folijs de licatulis iniuriæ oportuna est, vt vix se attrectare citra lacerationem patiatur: gustu tamen neutiquam à lingua Ceruina alio est. Hanc nonnulli Flandri amici, quibus dono misimus putarunt esse aliam speciem à Phyllitide, nec tamen esse illam quam depinxit Mathiol.

Asplenium Scolopendria, CETERACH
Arab. & Officin.

SEMI NE item nullo oritur aut donatur herba Aspleniū dicta, nata q; Spleni iuuando, quam etiam signatissima & perquam scita collatione docuit Dioscorides folijs donatam esse similibus Scolopendriæ, infesto animalculo, quod lumbricum putidi literatores, cum non nouissent, ausi sunt Ceterach negare, aut lapsus Dioscoridem insimulare. Iam vtrumq; notius, quam vt pluribus opus sit, etiam vniuersę occidue Anglię, quę scatet Phyllitide, Hemionitide, atque Scolopendria.

LUNARIA racemosa, Ceterach folijs, racemulis Ophioglossi.

PERELEGANTEM hanc antiquis indistam, recentiores Lunariam vocarunt, à foliis Lunæ crescentis in morem subter falcatis, alioqui tota plantula palmaris, habitior, crassitie rigidiuscula, Scolopendrium præfert: sed vnicum tantum folium fert, colore violatæ, gemina acie vtring; quasi securiculis vndatis lunatum, è medio cauliculo Ophioglossi tenello: qui surrectus, summus ramosum florem edit, Ambrosiæ, aut Botridis cōnexionē, quadantenus Ophioglossi, quam ipso aspectu & facultate eximiē vulnera ferruminandi, vlceraq; & luxata cogendi, vel æmulatur, vel superat: gustu præfica & astringens. Ericeta strigosa, steriliaque montosa amat: è Mindenis iugis etiamnum habemus, & postremo in Angliæ collibus, qui Grenuici Regijs ædibus, & Tamesi imminent, satis multū reperimus.

Ophioglossi sue Encaphyllum.

MULTO frequentior hæc, sed aliquantò minor: cui floris argutula cuspis, lingulam serpentis exertam imitata, Ophioglossi nomen impertituit apud antiquos, & nostri herbarij Lunariam dixerunt. Pratis & quibusuis in conuallibus familiaris, nec parū ad vulneraria præsidia commendationis: perquam exili radice, tenella, tenerum cauliculum promente, cui singulari singulum folium oblōgum, Pyrolæ, aut Cochleariæ, crassiusculū, ex viridi sublustre, aut pallidum insit.

TRAGIVM alterum SCOLOPENDRI folium.

NIMIS QVAM anxie multis abhinc annis Aloisium Anguillariam, materiæ medicæ callentissimum, modestissimūq; Ferrariæ conueniebamus, vt de Lonchitide, Stæbe, tertio Dioscoridis Dictamno, istōq; Tragio, sentētiam eius rogaremus: qui cum multa alia doctē & amicē nos moneret, tum istud Tragium sibi non semel visum Scolopendriæ diuifura, hirsuto folio, radice albida, interdum Drabæ, nonnihil tuberosa, & nonnihil Rapunculum accedente, non procul à Pisanis montibus. Nobisq; literas dedit ad quendam perbonum & industrium Lucensem Pharmacopœū: qui tamen plantam neq; ipse potuit, neq; quisquam alius, illic quo loci esset, indicare. Ta metfi balneas aliæque circum loca, & tandem montem Diui Iuliani Pisas & Liburnam vsque eā transmiserimus. Neque ex eo tempore vllum contigit audire qui viderit, aut aliam videre, quæ planè descriptioni fecerit satis. Lunariæ etenim minori hircinus deest odor, radices exiliores insunt: Lonchitides autē non magis huic, quam nō suo quadrant capiti. Quare ni potiora sese afferant dum ad vmbilicos properamus, hæc in coniectanea nostra syluamq; amandare, certum est.

ADI.

ADIANTHVM, siue Capillus Veneris verus.

QUINQUE congeneres pusillæ stirpes sunt, quas hic commodum discernere inter se oportet præcium non vulgare erit, propter istos rabiosulos & prolixos commentatores, qui dum rabie Cerberæ ad Dryphacta se mutuo proscindunt latratione, nihil aliud quam tyrones nos, nostrosque commilitones, hæc noscendi perquam auidos, torquent potius quam docent: ut quibus fortè scripturientibus non res ipsa præ oculis, earumve cognitio, sed potius ostentandi declamandique in animo ambitio esset.

Primo Adiantum verum Dioscori, nullibi quam Norbonensi tractui frequentius, saxi & rigui vmbrosis petrosisque, Vegano, sterili Seuenæ finitimis, ac rupium, fontium, & puteorum labris vel asperginibus MonsPELLII Namausiq; raro alibi in Gallia, Germania, Belgia, & Anglia, aut nusquam prouenit: quin ne Italiæ quidem locis multis, aut multum videre meminit; duntaxat quibusdam in puteis Rioli vrbs Pedemontanæ regionis, idque perpaucum: fibrillis verò capillofis, plusculis, fuscis hæret, vno omnes amplexu aptis, vnde panduntur numerosi cincinni iuncæve loruli prætenues, prolixioribus sed tenuioribus quam Trichomanes staminibus, palmum aut sesquipalmum altis, sericeo nitore & fusco colore nitentibus: folia Anisi vel Coriandri diuisura, latiusculis alterno situ cirrulis appensa, penè visum præ tenuitate fallentibus, tenella; vtrinque lateribus rectis clausa, trianguli speciei; sed superne ambitu laciniato & circinato. Hæc omnium præstantissima; quæ indidem Lugdunum, Lutetiâ, Antuerpiam, inq; cetera Emporia celebriora asportatur, caroque à Sepalsariis emitur, ad Capilli Veneris Syrupi dicti apparatus. Galliæ ditiores & aulici sibi curant non raro MonsPELLII conficiendum, indeque adferendum, quò recentiore, & præsentiore vtantur: mirum enim quantum thoracis affectus, hepatis renumq; iuuat. Immadidus, uti species cæteræ, in aqua perstat merus, quasi suis esset in natalibus, & tamen siccius creditur, aut potius ambigitur ab illis merito, qui ex huius expressa libra bessim fermè succi promanare asserunt.



TRICHOMANES, Polytricum.

VIRIBUS & sapore proximus huic Trichomanes, & Polytrici nomenclatura officinis non consuetum minus quam cognitum: vbique Belgiæ, & Angliæ parietinis, glareosisque opacis viis vberimum, radice fibris nigricantibus comante, crassioribusque & breuioribus capillamentis, fuscis, nitidis, rigidiusculis; gemina vtrinque foliorum serie, Astragali Tribulivæ terrestribus æmulis, ex atro aduersa parte virentibus, subter verò maculis ferrugineis signatis.

ADIANTHVM ALBVM
& nigrum Plinij.

PLERÆQUE omnes Belgiæ, Germaniæ, Burgundiæ, Franciæ, Sabaudiaque officinæ, non modò hoc æuo, sed etiam ab omni memoria Adianthi duas differentias hæc habuerunt; quibus semper vsæ sunt albi & nigri Adianthi vocabulo. Radix pusilla, filamentis crebribus compacta, atris, rectis, crebribus iuncæis, paulò crassioribus & prolixioribus quam Trichomanes; ex herbido pallentibus aut albicantibus: foliolis vtrinque & altrinsecus plumatim disitis, Filicis maris diuisura & situ, sed multò minoribus,



Hh.i,

altera

altera facie virentibus, altera in glauco punctulis rubiginis series geminas habent, sesquipalmum eoque plus alta, hæc alba, imò vtraque, quæ nihil planè differunt: quia nigro Adiantho cauliculi neruulive nigricant politiore nitore, foliaque sunt saturiore viore, vires eadem prorsum, quas etiam doctis multis, nedum nobis, exploratas scimus ad quotidianas & consuetas potiones multis annis, magno commodo, nullo detrimento. Ut tandem conuiciari dediscant isti tenebricosi commentatores, qui hæc Dryopteris virium ignoratione autumant: nihil enim acris, nedum caustici, hæc innoxia capillares habent: nam Dryopteridem aliam esse scimus, & suo loco dicemus. Audiuius nos in frequētissimo studioforū cœtu, Rondelletio præceptore docete, Dryopteridem nostram nonnullis suis ægrotis (dum in Allobrogum ad Rhodanum urbibus factitaret medicinam) exitio fuisse ob Pharmacopœorum flagitiosam inficiam, qui non parum Dryopteridis Potiunculæ medicatæ Polipodii vice misuissent: Hæc proinde, coniectura certa ducti, Plinio memoratum vtrumque album & nigrum Adiantum, foliis Filicis, imisque cauliculis fuscis & asperis, arbitramur.

*Herbariorū SALVIA VITÆ, siue Ruta muraria, non est Paronychia Disc.
Belg. Steen ruyte.*

NVL I herbarum tribui cognationi quàm huic accenseri quit, ea quam plebs, præsertim Batauorum, & muliercularum clinicarum in Germania, Saluiam vitam, seu Steenruyte, id est, petream Rutam, vocitat. Utuntur quippe hac euentu planè certiore & multo frequētiore, quàm quauis capillari. Cum enim huius copia multa suppēt illis, si quando præ hyeme cætarum vlla defit aut vieta sit, hanc subdunt etiam Pharmacopœi exercitiores: quibus nulla vnquam calamistrata oratione vllus persuadebit commentator esse potius Paronychiam, quàm ex Adianthis vnā. Iisdem enim inter Ceterach, Adiantum, Polytricum, ceterasque capillares, locis saxeis lubens prouenit: pusilla radice, cauliculisque tenuibus, non ita dissimilibus Adianthi, cuius foliola etiam non parum refert, sed minora huic, crassiora, & incisuris pluribus atque altioribus. Palmum vix æquat tota, & albicat colore pallido rutaceo, ad Rutam accedente, nonnulla etiam foliorum similitudine, vnde nomen vernaculum Ruta. Caule demum, flore, & semine orba, vti cæteræ capillares, quas prorsum exprimit gustum consulenti: vnde commodi petendi coniectura fuit, ad tussim, infestam è viscerum vitio atque Hydropes.

FILIX MAS, & FOEMINA.

{ Germa. Waldsarn mennle & weiblein.

{ Gal. Fengiere masle, & femelle.

{ Ang. Fern the male and femell.

FILICIS tametsi sterilis plantæ, nullus tamen tractus paulò incultior non feracissimus: adeò namque viua, restibili vbertate luxuriat, vt etiam Sole feruidissimo & Syrio vicinis enectis plantis, tamen ipsa non marcida perstet. Distinctæ autem sunt, & tritæ cognitionis mas & fœmina, vel ipsa πτέριδος Græca voce (quæ expansæ alæ effigiem adumbrat) satis indicante: Mas quippe crebriores, è radice crassiore, multis cōuoluta & implexa appendicibus, emittit prolixiores, bicubitales, vel proceriores pediculos, plumatim foliosos, alæ figuram, vnde nomen, exprimentes. Fœmina verò vnum sapius promit caulem, nudum, multis diuisum è medio ramis: minore radice, digitum equante, prolixè sparsa, nigra foris, in qua non transuerso ductu, sed calamitini incisa cernuntur quasi emblemata, effigiem aquilæ, aut similis alitis, alis & cruribus expansæ, affabrè mentientia: quam Aquilam plebs, aut ei similes quidem Chymistæ iactitāt. Vtraque semine nullo oritur & moritur: tametsi rudimentum quoddam seminis edant pulverulentæ foliorum fimbriæ, rugosæ, & ista atomos admodum exiles, tenuissimis arachneis filis, de summo Filicum ramo pendentes, passim Filicis fœminæ semen dicant, & plebi persuadebant: quæ non faciliè quid vtriusque folia distent, discernere nouit.

Recentiorum OSMUNDA Filix florida, luteolis sine flosculis
& racemosis ligulis.

MINVS verò nota Italicis Gallicisque tractibus mediterraneis Osmunda, Filix dicta Regia, regijs sanè ac præclaris viribus. Multa hæc in Pictauum nemorosis syluis, itém- que Belgio & Anglia plurima. Maris Filicis radice quasi costis compacta multis, & folijs ijsdem, sed neutiquam crenatis. Caule striato, quem bicubitalem folia nonnulla tarsum al- lãve imitantia æquis ex interuallis stipant, lateratimq; emittunt palmares & sesquipalma- res thyrsos, & florû ligulas oblongas, densis racemulis, Lunariæ & Ophioglossi æmulis, aut potius Tamaricis Norbonensis nuper erumpētis, quæ ex ferrugineo fufescunt, inque cari- osum & puluerulentum situm fatiscunt, seminum speciem aut spem ostentantes. Radices autem amplexæ, & toruli complures costis similes, squamatim sibi incumbūt, ad Hernias, ad vlcera exploratissimi commodi. Quinetiam colicis & spleneticis plurimum conferūt. Nonnihil calida est, & acris gustus, odoris non ingrati.

πολυπόδιον POLYPODIUM.

Ger. Baumfarin

Ang. Okeferne

Bel. Boon va
ren.

Gal. Polipode.

EI V S D E M classis sunt Polypodium, Dryopteris, Lõnchytis vtrâq; ac Polypodium qui dem Romanis Filicula dictum, notius quàm vt delineatione egeat. Potissimum radice, prolixioribus anfractibus, nodulis acetabulisq; donata & flagellis Polypi piscis similibus, cuiusmodi ferè coralli albi sunt: crassitudine digiti minimi, intus porracea, gustu nonnihil alstringens & subdulcis, querna præsertim hæc, sola in vsu, nec alia visitur, nisi si quando ma- cilentius nacta solum, gracilior, strigosiorque fiat. Sic etiam quibusdam opacis nemori- bus paululû folio est adultiore, neutiquam tamen specie diuersa, vt frustra faciunt quidã.

DRYOPTERIS, aut querna Filix.

HANC de vultu & de quercu Dryopterim, Filicem quernam dixerunt: folia huic Po- lypodij sunt prorsum, aut filicis Fœminæ, minora multo tamè (nò minoribus lacinijs) delicatiora, tenuiora, & teneriora: exilibus luncis pedem altis plumatim foliorû exortus ex aduerso exactè gerentes: auersa item folia, notulis aspersa, non extantibus, rubiginosis, sed candidis, ap- pectis, serie gemina, secus folij neruulum medium. Radix verò longa, variè inflexa, humi decurrens, fus- ca, subhirsuta, & villis cirriforme fibrata, Polypodij (ni- si quia gracilior multo) perquam similis. Hinc an- sa Pharmacopœis minus peritis erroris plectēdi fuit, dū huius radices dilutis decoctisque miscuissent, à medi- co institutis, rati Polypodium hæc esse: quæ exitio fu- it ægrotis, vt superius in Pliniano Adiantho monui- mus. Radici sapor acerbior multo quàm Polypodij, non gratus, & siccitas nonnihil calida, cuiusmodi in Tormentilla apparet, sed huius exitiosa.



LONCHYTIS prima.

A TRIANGVLA SEMINE, CVSPIDE, LANCEOLÆVE mucrone, dicta fu- it Lonchitis, sed hætenus ignota prorsus illa galericulata, quæ mirum quantum tor- sit & transuersos sui desiderio egit animos vestigatorum melioris frugis, Guinum, Ma- rantham, Anguillaram, quin vel Commentatorem ipsum pepulit ad Montes Italos, & Germanicos, sæpè diuq; tamen nequicquam quæsitæ. Idcirco puderet nūc (tametsi non deerat aliquid quod satis bene quadrabat) nostram tenuitatem, multum impendiò mino- rem, quasi fœliciozem aut diligētiozem, illius Heroicis conatibus intempestiuè præferre.

Hh.ij.

Verum

Lonchitis altera

verum Lonchitis altera asperave nuncupata, quæ Polipodij folijs minoribus, tenuioribus minutiusq; incis, palmos binos alta, pusilla Polytrici, Ceterachue radice est. Locis nemorosis asperis occurrit, vti nobis in Anglia, Belgio, & Basileæ, prope montē arduū, vno ab vrbe miliare distito: muscosi apiculi, vermiculorum in modum, præsertim prouecta ætate, glomerantur, spemq; & speciem dant feminis luteoli & racemosi, Oleæ fermè: tametsi sint euanida rudimenta, vti Filicis.

CARDVſ & Acanacea.



Vnificus naturæluxus, Carduorum siue

Acanaceorum familiam tam profusè auxit, vt non minus operosum fuerit antiquis, omnes differentias nosse, quam parum facile, exactè vel describere, vel notis inter se discernere. Quo minus licet nobis vtiq; eorum hæere vestigijs, aut obscuris designationibus, præsertim cum longè plures notioresq; inspectione, quam de eorū lectione habeamus Carduos: & nostro sæculo Cardui innotuerint non parum admirabiliores nostratibus, neq; vsquam memorati veteribus. Quare lubuit, si quæ possent ad antiquam cognitionem referri, ita expendere, vt interim alias complures species & varietates indicatas neutiquam transileremus, eoque hanc recensitionem seorsum auspicari & digerere commodius duximus, quam Sonchis (quibus cum tamen plusculum similitudinis fortita videbantur) subnectere. Sunt quidē vtraq; spinosis folijs, latis, & ferè holeraceis, sed Carduis sui generis peculiare discrimen statuunt capitata muricataue cacumina, vnde Acanacea dicta fuerunt.

Carduorum frequentissimi, hi sunt.

Acanthium maius, viarum.
Acanthus hortensis & sylvestris.
Scolymos vtraq; siue Cinara.
Sylbium, seu Carduus Maria argentatus.
Calcitrapa siue myacanthos Theoph. vel Ruell. Tribulus ex Theoph.
Atractylis siue Cnicus sylvestris Galeni, Pauli, Theoph. primus.
Carduus benedictus, siue Cnicus syl. secundus Theoph.
ex Ruellio putatus.
Crocodilion Fusch: Ruto, seu Ruto Theoph. Anguillara, seu Echinopus Gesneri. Carduus peregrinus Dodonei.
Astone Anguillara.

Rariores sunt.

Acanthium Illyricum.
Chameleon } albus,
niger.
Chameleon non aculeatus Theoph. seu Carduus pinus Monspelliensium.
Spina alba. Arabibus Bedeguard.
Spina alba altera Anglica.
Spina Arabica, Mauritanis Sucaba.
Leucacantha, radice Cyperi, an Chameleon niger Monspelliensium?
Eringium } Alpinum caruleum Geneuense,
Montanum, Illyricum & Italicum.
Chamaleontha Monspelliensium.
Scolymos Theophrasti, seu Eringium luteum Monspelliensium.
Spina Solstitialis, quia Solstitijs post seetas segetes in Norbonensi agro, infestis muricibus totos operit tractus,
Picnomos, seu frequens aculeata parua Solonensis Creta, vulgo Crau.
Carducellus rd radices montis Lupi.

Carduus

Echinoclocætus Perunianus, magnitudine & effigie
Melonis, uallata, sulcata, striata.
Hippophaes Hippephesion.

ΑΛΥΣΙΟΝ. ACANTHIVM.

Germa. Weiß wege distel. Belg. witte wech distel. Gal. Chardon argentin.

MALIM perolegi αλυσιον, vāgrandēve spinax, & vepribus infestissimum, quale est istud creditum, vbique viarū obuium, radice crassa, à qua folia statim complura emergunt magna serrata, in sinu lanugine obducta, & aculeis horretibus donata: caule crasso, & striis, spinis, Echinato capitulo, staminibus purpureis referto, & refertis sentibus armato, semine Cnici, sed compressius, Carduo Mariæ non absimili. Hæc foliis utcumque accedit ad Carduum illum Bulbosum, quem Leucacantha coniectamus.

ACANTHIVM Illyrium.

SUPERIORIBVS annis indefessi laboris Pharmacopœus singularis amicus noster Valerandus Donrez Flander Insulanus, ex Sclauonia rediens, huius semē attulit, & Lugduni in Gallia seuit, vnde miræ altitudinis Carduus fœliciter adoleuit. Folia Acanthi magni, vel Sylibi maiora sunt, procera caulis spinosi hâsta hominem duobus tribusque cubitis superat: capitellū Acanthi amplum, floribus stipatū purpureis fert: semine Cnici factum. Vniuersa planta magnitudine speciem præfert arbusculæ, & adeo aculeos quod quod versum protendit, vt nullus subter impune transmittere possit.

ACANTHVS SATIVS & Sylvestris.

{ Gre. ΑΛΥΣΙΟΝ καὶ ἄκανθα. } Officina Branca Vrsina.
{ Germ. Bernflaw. }
{ Belgis. Beerenklantw. }

STIWOSA duntaxat thyrso αλυσιον ex Diosco. descriptione, & columnarum apud Vitruuium epistilis, vulgatæ cognitionis & vsus est, nusquam tamen eam nisi satū enatā vidimus, præterquam inter oliueta Mœspelliësis mœniis proxima, & exeunti ex Ægidia porta, inter fontem & riuium, prope murum, vbi Pharmacopœi colligere solebant ad ænematum emollientium decoctiones, cui solo vsui duntaxat etiamnum in hortis satium habetur: nihilque differt ab illo, nisi mollitie & magnitudine. Videtur Galenus, aut eius amanuenses, quas facultates Dioscorides Acanthio attribuit, Acantho huic assignasse: cuius tamen, vel diurno & diurno vsu teste, radices emolliunt, vniuersaque planta mucaginosa est. Et vbi interpres vertit luxationes, aptius diceret torsiones, ligamentorumve tractiones, cui medentur, initio suaui malactica dolorem sedando, & leniter digerendo, si quid doloris appulsæ parti influxerit. Nam luxatis artubus potius oberrat, fractis & conuulsis proderit.

Κύναρος. SCOLYMOS, seu Cynara, Cactos Theophrast.

{ Germa. Strohbohn. }
{ Gallis. Artichaut. }
{ Belg. Artichauts. }
Itali. Articoca.


NON à cinere quo gaudeat, vt Columella vult, sed potius à cane dictā malūt κύναρον. Huius compluria vesca sunt, sed gratiora quæ cultiora: nam sylvestris delibatis caulibus teneriusculis, & capitulis nondum in flores erumpentibus, vti aselli, visitant etiam rustici Itali. Cultu adeo adolescunt & tenescunt caules & conii, vt gulonibus etiam tragemata minimè spernenda fiant. Nec sunt Cardui illi, nomine Cactos Theophrast. aliud quam Scolymi, quorum descriptiones, vires, & mangonia iamdiu notissima sunt.

H h. iij.

SCO-

SCOLYMOS SYLVE-
stris, siue Chamæleontha Mon-
spelliensium.

QVANTVS quantus est, spinis re-
fertus est ille, vsu, quàm nomine
celebrior, Carduus sylvestris, coagu-
latorius, Norbonensi agro pluri-
mus: quem, quia tota facie Scolymū
refert aculeatum, Cinarā sylue-
strem appellamus: Hoc tantū in-
terest, quòd foliis angustioribus,
aridioribus, & multò densioribus
spinis sit. Flores item eleganti pur-
pura multi, conferti lanugine; qui-
bus coloni, antequàm in pappos
abeant, decerpitis, lac coagulant, nul-
li vsui alii illic seruit: tamen non
insuauis gustu, nec absimilis Cyna-
ræ. Capita altero tantò quàm Sco-
lymo minora. Semine Cnici, com-
presso, aut Sylibi. Chamæleonthā
vocabant præceptores nostri.



SCOLYMOS THEOPH. seu Eringium luteum.
Monspelliensium.

SEd Theophrasti Scolymos haud parū à Dioscoridea abest, vt facile animaduertere
SCOLYMOS Sest ex vtriusque lectione, & illius plantæ inspectione, quam Monspelli Eringium lu-
Theoph. diuersa teum vocant, illiusque loco nonnulli suffiunt locis à mare remotis. Frequens hæc locis
à Cynara & Ca maritimis Norbonæ: radix pollicem æquat, magnitudine Raphani, sed fuluescens, suc-
cto prægnans lacteo, vti Dens Leonis, quæ cruda vel cocta estur à nonnullis: numerosos fun-
dit caules bicubitales, in ambitu circū sparsos, foliis obductos, caulem ambiētibus, quæ in-
imo maiora sunt, longioraque, virēntq; intenso virore nigricāte, & maculis lacteis pas-
sim impressis: adeò tota horret aculeis præduris, vt quā arripias, nescias. Cinaræ conum
profert, Nucis Moschatæ magnitudine, vbi flores luteoli, non Cnici concolores, sed si-
miles: Semen compressum squamis coni coercetur.

SILTBVM, CARDVVS Mariæ, & Lactem.

Germa. Maryen distel. Belgis, Onser vrouwe distel.
Ang. Our Lady thistle.

LACTEO Carduo, vel Mariæ dicto, adeò folia Chamæleontis albi similia sunt, vt non
parū multis doctis persuasum fuerit Spinam albā esse, quam illi assimilat Diosco-
rides. Sed quia seueriores animaduersores, solo magnitudinis argumēto, inficiantur, sal-
tem, puto, pro Silybo non respuent, quæ lata spina proditur: cuiusmodi est Mariæ Car-
duus, foliis pregrandibus, latis, spinosis, maculis & ductibus lacteis, crebribus, aspersis, vi-
ridibus. Caulis bicubitalis, crassus, spinosus, & echino donatus, spinis cincto, purpureo flo-
re referto: semen Cnici compressum, lapidi exterendo optimum, etiā muliercularū ex-
perimento. Imum caulem pullulante delibatum, & radicem in acetariis aliās esita-
uimus in Italia, vbi risum Germanis mouimus. Plebecula muliercularum copiam lactis
illius

lius esu prouocat. Dodonęi sedulitas, vt multis aliis locis laudanda, ita plerisq; minus tēpestiua, vbi ignotis plantis facultates certas asserit, quas ē Dioscoride accepit, magna detrimento ægrorum, & experimentatorum, qui quod vident à viro bono, & veritatis amico scriptum, illicò vt verum arripiunt, & per experimenta mortes agunt. Sic virpius & eruditus Turnerus Anglus, in suis herbariis Alphabeticis Anglicis.

Herbariorum Carlina, ē varietate, non genere duplex, non est Lencacantha, sed CHAMÆLEON ALBVS, Dios.

*Germa. Eberwurzt.
Gallis. Carline.
Belgis. Euerwortel.
Ang. Mylke thyskell.*

PLERISQVE omnibus officinis persuasum est duplicem esse Carlinam: quippe quam caule donatam, & carentem viderint: Sed hi, si (vti nos) vtriusque radices, & vtriusq; gummi subflauum vermiculosum, non nihil pellucidum, odore viroso, gustu & visu ex-
IXIA.
plorascent: demumq; eadem radice & flore caule donatam, alias verò caule carentes: Et alibi etiam proximè vbertim enatas, partim caule viduas, partimq; vtroque donatas, obseruassent, volentes sententiam mutassent. Id nos accuratè expendimus, non procul ab arduo & gelido dicto D. Bernardi monte, atque etiam via qua Isburgo itur Tridentum, locis lapidosis & siccis.

THEOPH. CHAMÆLEON non aculeatus, interdum aculos, alias caule donatus.

SIC videas Monspellio finitimis locis glareosis, inter Cystos & cocciferas Illices Carducellum foliis Scolymi non aculeatis, radice nigricante, digiti parui crassitie, cuius caulis palmum, sesquipalmum, & pedem altus, limbum fert intus florum, multis purpureis aggestis & collectis staminibus, foris squamulis lucidis, albicantibus, sibi imbricatim incumbenibus, compactum, visu pulcherrimum. Hunc sæpius plussculi studiosi cōmilitones inibi copiosum collegimus caule carentem, & eodem donatum: flos tamen, folia, radix, gustus, omnia eadem: quin & nobis tunc mirantibus, dictum fuit, hunc caule carentem, cultum, caulem promere primoprouentu.



*Iacea montana
& Caranus p.
nus Dorkonensi.*

IXIA, siue viscum Carline.

GVMMI verò Ixia dictum, Carlinæ caule viduæ & donatæ radici exudans virosus, & gustu ingratum scimus: venenum sit nec ne, nondum compertum habemus. sed id asserere possumus, non nisi vnā esse plantam vtranque Carlinam, vt dictum: quod præstaret istis nostris ampullatoribus docere, quā cōgerie autoritatum omnia turbare; neque etiam Dioscori. Viscum vllum in nigro Chamæleonte agnoscit, aut vilius illius noxiæ vis meminit, quæ pariter nostram fulciunt sententiam. Quid balbutiat de Ixia noster Plantarius Senensis, ne quidem à Ruellio doctus differentiam visci & veneni, alibi dicemus, vbi, sitne illud deleterium intrò ingestum, discutiendum. Immeritò namq; & ingrato animo fastidire videtur Maranthæ Neapolitani Chamæleontē pictum, sibi muneri missum. Nam, inquit, folia rubris maculis nullā habet, non variegata, nec rubet caulis, nō exesa, non acris, nec flaua radix, caules non digitali crassitie videntur: Quasi verò ista indicia ei, quem illē Senensis alterum statuit, insint.

*Nec Mathioli
nec Maranthæ
Chamæleō niger
pictus, est Diosc.
genuinus.*

Hh. iij.

Qui

Qui norunt Galenum mutuatum è codice , potius quàm de Dioscoride mera & met-
ipsa verba , vt plurimùm suspicabuntur miscuisse illum albi cum nigro facultates, hu-
iusque radicem venenatam prodidisse: quod neutiquam de isto, sed de albo , propter, vt
videtur , gummi *igla*; dixit Dioscorides. Idem contigit sepius à *Arabibus* , vt capite
de Centaureo, & alibi nonnusquã Galeno, vt de Iride & aliis: nec tamẽ vllam Theoph.
venenatæ qualitatis facit mentionem, tantùm canes interimere possẽ ait Sic possunt mul-
ta cani & pecori noxia dici, quæ sunt salubria homini , vt nux vomica , Doronicum , &
alia. Cùm autem etymon huius Cardui Chamæleontis, Dioscoride interprete, à coloris
& foliorum varietate deducendum sit : planta sit oportet varicolor, variis in locis,
vt Chamæleo , cuius cutis cuiusque solo incubuerit , concolor sit, iam nigra, viridis,
aut albicans. Quantum verò coniectari licet , nulla est planta , cui magis hæc Diosco-
ridis nomenclatura faueat, quàm *ERYNGIO* vulgari; nam montanus totus cæruleus fit,
campestris albus , interdum & purpurascens, vt etiã in maritimã ora Sclauoniæ inue-
nitur , & ad ædes virginis manufactæ Lauretanæ , vernaculè *Lorette* vidimus. Albus
verò secus Rheni & Sequanæ ripas , in Germania , & Burgundia prope *Maconem* , a-
liosque tractus.

CROCODYLION.

CROCODYLI-
et magna Aegy
Nec multùm liquet nomenclaturæ huius Cardui ratio, neque descriptio animum
explet : & Carduorum tam latè patet familia , tantæque inest similitudo , vt
vix ne antiquis quidè probè aut distinctè, aut cognitè fuisse putemus. Nam antiqui, *Ga-*
lenus , *Oribasius* , *Paulus*, duntaxat verba hinc videntur mutuati , aut è *Cratæa*, à quo
Dioscorides & *Plinius*, qui locis non syluosis, vt ille, sed sabulosis, codicis errore, non
suo, oriri scribit. Sed in *Cratææ* fragmentis desunt verba paucula ista: *ωρεπερες ον*
και αυλωυς ως ασπις, rotundum & duplex, vt scutum, vel potius, vt quis posset suspicari,
institit aspidis serpentis in spiram vel gyrum cõuoluti, vt esset quædam allusio nominis
argumenti ad *Crocodylum* , nisi fortè eò allusisse nomenclatores videntur , quia *Croco-*
dylion aquaticum sit, & ripis fluminum plurimùm degat. Ideoque ab *Ætio* mentio fa-
cta sit magnæ *Crocodyliadis* iuxta aquas nascentis, ad dolorem capitis. Quin neutiquam
puto istam vim tacitos præteritaros antiquos fuisse inter *Elenchos* hamagorum re-
mediorum, si plantam familiarem notamque habuissent. Nam puerili acclamatione fœ-
lices ominatur in Italia Medicos futuros *Senensis* Commentator, si hæc inibi nasceretur.
Potius gratulandum foret *Empyricis* circulatoribus, & vulgo *Scammidicis* vel *Montan-*
bancis , quàm emunctæ naris Medicis, qui cùm è naribus ducendus sanguis est , longè tu-
tiora & potiora remedia in procinctu habent.

An sit CROCODYLIVM, niger Chamæleo Marantha?

MARANTHE verò & *Anguillaræ* depictus Chamæleo, videtur aut verū esse *Croco-*
dylū, aut certè germani opinionẽ sustinere posse, vsquedum doctis exactior descri-
ptio, aut planta *Crocodylio* aptior occurrat: adeò enim descriptioni accedit, vt illis nigrū
esse persuaferit Chamæleontem. Qui verò sanguinis è naribus profectionem desiderat,
serò *Crocodylion* agnoscet, quia probationis incertus modus, experimētū etiam pericu-
losum & incompertum doctis, non tacituri, si nouissent. *Carduus* verò quem *Fusch.*
fol. 335. *Crocodylium* statuebat, huc pariter posset afferri.

RITRO, seu *RVTRO* Theophrast. *Crocodylion* Fusch. *Echinopus*,
seu *Carduus* *Echinatus* Gesneri, *Sphærocephalus* Cordi,
Spina Peregrina Dodonæi.

German. Welsche distel.
Belgis. Kroonsche distel.

HÆc inter spinosos carduos valde quam elegans, duplicis differentia visitur, & (quæ namq; in Anconesi, Romano, & Norbonensi agro ac Auinionensi, habentur, duplæ magnitudinis sūt) Chamæleontis ritu variat. Etiamnum siccas habemus, radice exigua, pollicem æquantem, folijs Chamæleontis albi longè minoribus, caule nullo, interdum exiguo, nonnunquam palmum & aliàs cubitum alto. Folijs semper proportionem exiguis, & Spinæ albæ modo profundè incisis. Echinus illi cæruleus, eximia cæcula purpurefctis, orbiculatus, spectatu iucundissimus, & magnitudine, quanta spherula luforia. Semen & eius glumæ similia Spinæ albæ: nullas tamen sursum rectas procul vaginulas aculeatas porrigit: tametsi sint acerosæ intus & lanuginosæ, vti in Spinæ alba. Rutrum siue Ritron Theophrasti censet Anguil-lara: qui tamen proximè, vt videtur, immemor descriptionis, eandem spinæ albæ notis accommodat, isdem fermè verbis, Altera, quam Crocodilion Fuschius putauit, prorsus genere eadem huic est, sed magnitudine impensè maior, vt plurimum, visitur: In sylua tamen Valena, qua Gangem oppidum itur, collegimus cæruleā, & hanc excaulem, & caule palmū alto præditā, quæ alibi ad duos, ternos & quaternos cubitos asurgit. Echinus cæcidus est, nō cæruleus, & cum maximus & rotundus, magnitudinem mediocris Arantij assequitur: semine alterius, sed multò maiore. Cauli imo secundum longitudinem striato, adnascuntur permagna folia, & Acanthi similia, spinosa. Belgici horti & Britanici hanc spectaculo alunt, vbi luculenta magnitudine Spinæ peregrina dicitur.

Fuschij Crocodi-
lion.

κάρδαξ λεύκη SPINA ALBA
Bedeguard Arabibus.

ARABICO idiomate Spinam albam Bedeguard vocant, nec tamen vllis notis notio-rem faciunt Mesues aut Serapionis interpretes. Quænam autè verior sit ex permultis, quæ prodi-æ sunt, paucis dicendum. Plurculis superioribus annis in horto Patauino illustrissimi Senatus Venetorum, indicante Melchiorre Guilandino, inibi præfecto (qui in stirpium historia quantè sit peritæ, & indefecti laboris, non nisi perdocti norunt) visus fuit Carduus totus albidus, infernè lanugine incanior, quā supernè: folia Chamæleontis minora in regionibus siccioribus: nam quem in Anglia seui-mus, latiora aliquatò habuit: fuitq; caulis bicubitalis, interdum tricubitalis, digitū crassus & incanus totus: Echinos marinis similes, rotundos habet: quando florent, ex albo



purpu-


purpurascens. Inter quos desfluentes sese in summo multò altius erigunt ternæ, quaternæ papposæ glumæ confertæ, rigidis, mucronatis, tunicis, semen claudētibus oblongū, auenæ excorticatæ æquale & simile. Hæc posterioribus & acurterioribus peritiorum sententijs omnium maximè quadrare videtur Spinæ albæ. Semen tamen cuiusmodi diximus Auenæ aut Secalo similis, sed rotundius Cnico. Non est hæc, quam sibi missam olim Patauio Senensis dat, cæteris omnibus iugulatis sententijs, vt suam ambitiosè intruderet ridēdis argumentis, & plus momenti allaturis ad suam ipsius, quàm ad aliorum refellendam.

SPINA ARABICA, siue Suchaha Mauritanis.

CONSECVTIO docet hanc Carduum quēdam Arabicum esse, non arborem: nec tantum natali solo, sed potius facultate diuersam esse ab Alba spina: & tamen hīc quidam profligati pudoris scriptor viros lectione & omnium artium exercitatione cultos gratis incommodo posteritatis lacerat: doceret potius, cur non sit hæc spina Arabica vna ex Egyptijs, aut cur non possit congener esse, Dioscorides similem albæ spinæ, natura nempe dicit, quia astringere asserit. Illa vrinas ciet, conuulsionibus prodest: hæc si astringit, filamenta ductūsq; fibrarum rugat, & conuulsionis causam impingit, inculcātq; materiam. Quare hic nec a phlog non vires, sed figuram interpretādum: nec enim, vtī aiūt, duo capita repetit, & locis diuisa eadem: an verò quod Phyllosophis summis contigit, sit μὴ μόνον ἀπὸ γήρας, id Commentatori propinamus: non litibus, sed modestis & parcis disquisitionibus dirimendum. Quando vtriusq; vires eadem: Et videntur huic potius subdubuisse succedaneum Bedeguard siue Cynorodi glomeruli ex varij coloris filamentis conuoluti, quàm illi: nam astringere hanc signanter notat: illā potius digerere.

TOMENTOSVS carduus Anglicus, aptior ne videtur descriptioni Acanthis Leucæ, quàm superior Pataunus?

Nec longius abest à genuina Dioscoridis Spina alba hæc, quàm superior memorata, facie, caule ternum quaternumve cubitorum, in cana lanugine obsito, Spinæ albæ Patauina, aut Scolymi sylvestris similibus. Florum capitula rotunda, compressa, Echinum marinum, (quum nondum hiat) bellè referunt, aculeis mollioribus, villosisq; quas Arachneis sericeisve Filis concinnè reticulatim implicata. E quibus per maturitatem staminea purpurea florū, Cynaræ aliquantò minorum, exerūtur, succrescente semine Sylibi, rotundiore, corpulentiore. Radix magna, fusca foris, intus alba, Personatæ similis, gustu non ingrata, diuretica. Frequēs hæc in Angliæ collibus strigosus agri Sommerseti, iuxta ædes generosi huius historiæ perquàm auidi & studiosi Eduardi Saintloo.



STIRPVM aduersaria noua

371

CARDVVS bulbosus Monspelliensium, an sit Leucacantha Dios?

PAVI o superius spinam Albam, propter folia candidiora quàm albi Chamæleontis sic dictâ, è Patauinis hortis recensui mus: vnde liquet hanc Albam spinam ab illa non parum dissidere, contrâ quàm nōnullis persuaserat vocum parilitas: illius namque descriptio satis plena, huius ferè nulla, præterquâ radicis quæ Cyperi describitur. Tamen ex Dioscoridis serie & aliis cōiecturis dignoscitur hanc esse spinosum quendam Carduum, non arborem solido ligneoq; trunco, vt audeat affirmare nuperus quidam scriptor, nō inuenustus Philologus medicus. Hanc autem Monspelliacam hic depictam si Mathiol. nouisset; potius puto, Albâ spinâ opinatus esset, quàm Carduum Argenteū Mariæue dictum, cui radices Cyperi nullę, reliqua indicia æquę incerta omnia. Locis vdis & pratensibus Mōspelliū circū Carduus hic oritur frequens, ita ter Narcissos & Aristolochias, cui folia palmum alta, pingua, aut crassiora, in ambitu laciniola & ferrata Acanthii modo visuntur, tenuibus spinis ambientib. Caulis binos cubitos altus, gracilis, cui in sūmo capitula, floribus purpureis stamineis oppleta, femine Cnici, sed minore. Radices multe, confertę, ex vno quasi nodulo aptę, in multos oblongos globulos diductę, Asphodeli, Cyperiue modo. Quæ nobis persuaserunt gustu explorantibus, & etiamnum hæc scribentibus, nullam stirpem propius accedere ad Leucacanthā mandenti multū glutinis exhibet radix, nonnihil caloris & tenuiū partiū, tamen amaroris penè nihil. Sed malumus vera & nobis cōperta prodere, quàm rerum naturas apparatus mendacionū ad nostrā gloriā detorquere, aut apros appingere Syluis,



CARDVVS Pratenfis
Tragi Acanthi facie.

INTER Acanthum & Acāthiū, medius videtur Carduus ille pratensis, luculentæ magnitudinis & venustatis, pratis Heluetiæ & Germaniæ familiaris: Folia namq; habet Acanthii, siue Bracę vrsinæ similia, diuisura & ortu paria, sed molliora, flaccidiora, palidius virentia sunt, in caule quaternum quinūve cubitorum flores congesti papposi, Senecionis maiores, ex luteo purpurantes: semēnque Cnici multo minus. Radix proluxa, crassa. Morganus noster Londini alebat in horto.



CARDVVS STELLATVS, seu Calcitrapa & Tribulus Ruellii
Coronopus.

NON minus notus quàm infestus Calcitrapa vulgo nuncupata, quia non manibus, sed calcibus atteritur, passim vbique segetum & viarum obuiâ. Radice longa, colore fusco foris. Folia lanuginosa, lacinia, undulata, profundiora, quàm Eruçæ, Coronopi modo, caulis sesquipodem altus, multos turiones promit, qui radiis stellatim distincti, mucronati, acutissimi, Calcaris speciem referunt, floremque Attractilidi similè purpureum claudentes. Semen exiguum, rotundum, compressum, Lenticulæ simile. Decocto huius radices plurimum vtuntur plebei ad calculum extirpandum, vrinâsque ciendas, vt & semine contuso, cui tanta vis, vt etiam anastomosi facta venarum emulgentium, aut vteretur cruentum lotium proliciat. Hanc non nouisse, aut neglectui habuisse, multis in locis contemptum Medici parit. Tantò minus decuit istum Medicum & Commentatorè indictam præterisse.

SPINA SOLSTITIALIS, Aurioles
Provincialibus, an Pliniana?

STELLATO Carduo similis, nec minus nobilis Spina, seu Stella Solstitialis: In Galloprovincia tanta feracitate luxuriat, vt segetum incremento nõ parum officiat, & messorum manus pedesq; sæpissimè cruore & vulnusculis afficiat: radice parua: folia incana, lanuginosa, caules multiplices secundum longitudinem ambientia, pinatim vtrinque surrecta graminis magnitudine, quasi pennæ suæ arundini affixæ, aut innatæ, & quædam striarum tentameta: muricès tribuli terrestres maiores sūt, Cardui stellati similiores, fului, lucidi, rigidi, pungendo valde quàm infesti, præsertim Solstitio exacto, quum maximè exaruerūt, tunc enim sepes harum aggeribus soliti sunt armare coloni. Flores Cardui stellati, sed filamentis luteis: semine Cnici paruo, paleo colore. Balneis admiscuntur ad tineas & Lichenas: stillatitiam dicunt tuberosas laringis glandulas & serophulas sine dolore dissipare. Empyrici etiam eiusdem stellis crura prætumida frequenti ictu aperiunt, & sanguinem vulnusculis eliciunt, vt idem agifolii ramis soliti sunt, ipsi meriti vt non crura, sed terga flagris lacera gestent.



ATTRACTILIS.

EST Attractilis Cnici sylvestris species Diosc. Gal. Plinii, Pauli, & Ætii suffragio. Ea plerisque locis, præsertim Norbonensis Galliæ, floribus, tum purpureis, tum luteis spontè oritur. Radix digiti crassitudine, folia longa, magnis incisuris & aculeis in ambitu: caule bicubitali, spinoso, cauo, & capite spinis horrido: flore stamineo, luteo, vel purpureo. Semen Cnico simile, sed minus, & nigrum. Colitur etiam in Belgicis voluptatis causa & fimbrosis.

CARDVVS Benedictus.

QUEM benedictum, seu felicitatum Carduum plebeius consensus nuncupauit, alteram Cnici sylvest. speciem esse iamdiu doctis nobisque ex collatione perpendentibus persuasum est, ea omnibus vsu & visu cognita est. Hanc colunt magno studio Chymistæ &

& clinici, morbi Gallici linitores. In arduis alpihus Galloprovinciae prope Monasterias Marignols vocatis, ubi vndiq; effodiuntur Crystalinae, Irides, & varij coloris alij lapides, crescit in summo montis rigidior & aliquantò minor hortensi. Senēsis suo more mordet, & nihil docet. Nam eius Attractilis nullis depicta aut asserta verbis iacet spectanda, non vt nos certiores, sed vt dubios reddat: parū enim Dioscoridis descriptioni aut receptae Attractilidi accedere videtur: vtrū verò illius silentium, an pictoris in exprimēdo solēcismus & cacofilia, incusāda sint, viderit lector. Fortè huc nullo delectu intrusa fuit, quia in penultimis illis Commētarijs absuit, nec dum vlla certa, vt videtur, auctori nota fuit. Ideo suo more, ne nihil ibi egisse videretur, velitandi ansam arripuit: ait Attractilidē non esse Carthami sylvestris speciē, duntaxat quòd argumento triuiali sanguineū succū nō remittat. Hæc iamdiu sibi scripturo obiecerat Ruellius: & responderat, nō quouis anni tēpore, sed messibus præsertim, nempe maturo & copioso succo, id deprehendi: tunc enim nonnihil cruenti coloris emanare. Quod etiam Lutetiæ in vireto Ioannis Hebræi singularis Rhisotomi meminimus iam multis annis ostensum nobis in Attractillide: etiamque Monspelli in benedicto Carduo & Carthamo idē cōperimus: nam florū & succorū colores, odores, aliāq; accidentia incrementa, decrementaque, assequuntur alijs locis & temporibus alio modo. Quin multa succo sunt aut fuluo, aut purpureo, in quibus non nisi affricu, maturatione, maceratione, aut expressione percipitur, vt in Androsæmis, Rheadis, Papaueris radicibus incisis, Verrucaria, siue Tornesole, & alijs plerisq; Sed testam ambitionem prodit imprudentia, nam qui vidisset antiquis classicis medicis nixum Ruellium, Galeno, Dioscoride, Egineta, & tio eorum sententias, contrā quā solitus est, in capitis calce reticuit.

Sequanorum Cirsium luteum, an ACARNA & Erythral Theoph.

FNCVLITIS & aridis Ericetis visitur carduus quidam, quem Acarnam Theoph. aut Carlinam Sylvestrem, alij Erythralem nuncupant. Exigua radix, folia Carlinæ aut Attractilidis, minora, spinosa sunt. Caulis gracilis, rotundus, cubitalis, quo tria quatuorve tubercula echinata aut acanacea geruntur, radiatis stimulis cincta: è medio patuli, Echyni exeruntur flores, ex luteo pallidi, sed multò minores. Hanc Anguillara Erythralem fecit, Sequani Cirsium luteum vocant.

PICNOMOS Cræta, Salonenfis Galloprovincia.

VT pusillus ita pulchellus & rarus est Carduus, quē solum in arida spatiosaq; maritima planitie, inter duas antiquas vrbes Arelatem & Salonem, cui quia, vt coniectura fert, cretaceum solum subest, nomen vernaculum Crau inditū est. Edicula media in planitie est olim D. Martino sacra, propè quā ex aduerso minoris diuersorij hic Carduus nobis primū lectus fuit, vti etiā alijs postea locis incultis & deujs. Radice est exigua, mansu quidpiam glutinosi præferens, longa folia secus longitudinē cauli adhaerentia, Chamæleontæ Mōspelliēsis modo, sed angustiora multò, in ramis magnitudine Calcitræpe, & illi modo in ambitu sparsa, spinosa, lōgisq; aculeis adeò stipata, vt arrepturo nihil pateat aditus. Vmbellæ numerosæ, flosculis Senecionum æmulis, luteis, pallentibus cōflatae sunt, quæ in pappos duriusculos Attractilidis modo euolant, semenque exiguum Cnico simile relinquit paleaceum. Hæc quò sit referenda, nescimus, nisi inter nigri Chamæleontis species. Picnomon non asseueramus, sed quia spinis munitissima est, significationi alludentes, ita vocitamus.

DIPSACI fatini Fullonum, & sponte nascentis LABRI VENEREI, discrimen.

QVASITIBUNDUS potōrve vocatus fuit hic carduus, quòd foliorum iuxta caulem alis & cauo plerumq; rorem aut imbrem excipiat & seruet. Eius autem varietas

II. j.

duplex

duplex lex hodie nota vulgo est. Nec enim videtur solo cultu euenisse, ut Fullonum Dipsacus aculeis aduncis, recuruis & rigidioribus, à Labro Veneris sponte prodeunte tantum cultu distet. Nam pleraque omnia culta molliora & teneriora, minusque spinosa euadere solita sunt: at hic satius capitibus est reductioribus, oblongis spinis, crebribus, aduncis, terram versus reflexis, adeo rigidis, ut stamina carpendo & vellendo filamenta non facile effringantur.

VIRGA pastoris.

SEd alter mollioribus, minoribus surrectis, nec aduncis, longioribus multo, imbecillioribus: folijs ite mollioribus, minoribus, haud dissimilibus, capitula crebribus, & bituminosis trifolio similibus. In Anglia Cantia secus vias & suburbia Rhia Sandvicium.


Tertium & minimum, non adeo frequens, vsui incompertum nam cetera duo refrigerantis & siccantis sunt facultatis. Cancerosis ulcerationibus multum conferentibus.

C NICVS Carthamus.

MOrdacem pungendo spinosumque carduum Cnicus significat, purgatricem autem eius facultatem Carthamus: Non est autem regionum Septentrionalium nisi culta & inquilina: ubi tamen laeta adolescit, sed non parum virium purgantium semini decedit. Nam Orientale multo facilius & vtilius minori quantitate purgat. Norbonense, ut quod *Massil* *larges* quatuor à Monspellio leucis colitur à Pharmacopoeis, imbecillius multo est, utque quod non minore quam duarum uncularum, sed saltem vnius & semissis mole, aluum subducatur, nec obstructions meseraicarum equè probe referet. Quia satis innotuit plura addere non operæ precium fuit, cum etiam de Carduo Benedicto congeneris satis cognoscatur.

CARDVNCCELLVS montis Lupi.

IN Norbonensis agri montanis, ad montis Lupi ima, Meridie versus oritur prope pusillum amnem aut torrentem hæc Cardui species omnium minima, eoque Cardum cellus nobis nuncupata. Plantula huic radix est implexa, alte humi depacta, à qua mox foliola plucula, exilibus & altis diuisuris dentata. Caulis vix spitameus, levis & gracilis: humi demissus, flos seu caput, maius quam pro foliorum responso, spinis horridis, foliosis cinctum florem claudit purpureum Attracilidis, cui etiam folia ipsaque vniuersa planta valde similis est, sed longè similior Ætj Attracilidi, purpurea flore vocata, forte & eadem: vsus incognitus, quia planta vix nota.



Vulgo *Astone Italica Anguillara*, Spinam *Ceanoton Theoph.*
tamen multa nisi radice nota vaga.

PAtauino agro subter humum prolixè propagatur huius radices. Folia similia, sed spinosiora quam Sonchi: caulis striatus, cui summo insunt paruuli multi Echini purpurei staminibus florentes, & in pappos ubi maturuerint euanescentes: Semen paruum, & simile Cnico.

ACVLEOSA Gase, an Polyacantha Theoph?

Carduus ille tritæ cognitionis, qui spinosissimus Polyacantha merito videtur: adeo enim quasi densis villis senticosis obuallatur tum caules & folia & foliorum capita, ut quacunq; intueri, multas spinarum phalanges animaduertas: flos illi puniceus & purpureus. Capita echinosa, oliuam equantia. Caulis sesquipedem altus: folia spinosa Acanthio, minora, nec lanuginosa, sed ex atro virentia, radix fibrosa, numerosa. Hæc tamen, ut plerisque spinis refertissimè aculeosa siue Polyacantha dici potest, non tamè continuè Theoph. sit aut Gase, quæ videtur ex subfruticum genere: Tamen putet quidam Polyacantham.

ERIN-

Vescum ERYNGIVM Marinum: Campestre, Mediterraneū & Montanum.

GRÆCI Philosophi Eryngium quasi ἐρύγγη, siue ructum dictum autumant, quia cæ- *Ang. Sec holze*
 præ quæ morfu surculum Eryngii præciderint vel deglutierint, cunctum gregem pone *Belgis. Dacer*
 sequentem quasi stupore attonitum fiunt, donec Eryngium ructu reiecerint. Quam pa- *wortle.*
 rum perspicuè calamus humanus, etiam res minimè suapte natura obscuras describat, vel
 hinc liquet, quòd cum Dioscorides oratione dilucida Eryngium repræsentarit, ta-
 men nondum liceat statuere, vtrumine Marinum dictum an vulgare Montanum in-
 sinuarit. Omnia tamen indicia propius Marinum referunt, quàm vulgi Montanum;
 duntaxat loci mentionem excipias, notam lubricæ fidei, & non adeò magni momenti. Ma-
 rini primùm folia teneriuscula sunt, neque statim aculeata, eoq; in acetaria veniunt, quem-
 admodum Crithmum aculeatum, seu Pastinaca marina, huic natalibus proxima: Deinde
 lata, spinosâq; sunt, extremo ambitu minus profundè sinuata & asperiora quàm montani
 gustu etiam plus gratiæ & aromaticitatis habent, ambitumq; asperum: adolescenti
 spinæ succrescunt: & cauli magis sphaerica capita infunt, rigidioribus, aculeis stellatim cir-
 cundata, vt vult Dioscor. color verò vtrique variat, sed vulgari non nisi variante loco. Ma- *Montanum*
 rinum ipsi vidimus ad Aquas Marianas & alia complura litora, colore cæzio, albo & viri- *cæruleum.*
 dante: Radix ei longissima, & quæ denos duodenosve pedes excedat, crassior etiam
 quàm Montani, odoratior, cibo, medicamento gratior, efficacior: non enim nisi hac de-
 ficiente vtuntur docti illa, non perinde freti viribus illius. Aspera Maritimū amat, editio-
 ra: vix nunquam enim in monte Ceti & similibus inter ædita saxosa occurrens, sed semper
 depressis, asperis, vel arenosis, incultis locis, interdum sesquimiliare à mari remotis. Cam- *Campestre.*
 pestrem verò superius cum Chamæleonte, cui magis accedere putabamus, contulimus, &
 obtulimus iudiciis emunctis: tamen si ab isto, colore, & foliorum laciniata altè incisura ma-
 gis, quàm natura distet.

ALPINVM cæruleum Geneuense perquàm venustum Echinis Dipfasi.

HVIVS Eryngii inspectio tantæ volupta-
 ti est homini plantarum noscendarum
 cupido, vt faciliè, non modò labores herba-
 rios intempestiuè improbos leuare, sed etiâ
 ad magis indies vestigandum excitare va-
 leat: miræ namque est elegantia: vniuer-
 sus renidet colore cæzio, cælestinæ purpu-
 ra, hilariore multò, & quàm in vulga-
 ri montano viuidiore: radix Enulæ penè
 par, Eryngio concolor, similis, & similiter
 odorata: caule erecto, ferulaceo, sesquicubi-
 tali & bicubitali, striato, quæ folia per inter-
 ualla ex geniculis orta ambiunt radiatim,
 superne mollicella & delicatiora, quada-
 tenus Eryngii Cæpestis, spinulis pluribus;
 sed ignauioribus. Ima autem statim à radi-
 ce exeunt folia hederacea, ambitu delicatius
 serrata, læuia Trachelii, aut Epimedii à no-
 bis depicti. Capitula echinata, similitudine
 & magnitudine Labri veneris, sed colore
 foris cæruleo. In arduis montosis Iuræ præ-
 tosis, & finitimorum Geneuæ imminetium montium iugis, atque etiam Claudii cellis
 reperitur: radix nigra foris, intus candida, boni odoris, gustus Eryngii.



HIPPOPHAES Hippophastrum.

OPem pollicetur veterinaria Hippophaesti nomēclaturæ explicatio: φλος enim vox, non
 Ii.ij. modò

modò lucem, sed etiam salutem, præsidium & remedium signat. Hanc fulloniam Dioscorides tradit, ac scitè sic delineat, vt nullū paulò diligentiorē vestigatorem, siquidem eam nactus fuerit, latere queat: quò factum vt iamdiu desierimus quærēdo nos torquere, cum post lustrata multa litora, præsertim Tirrheni & Norbonensis maris, vbi quidam spicilegali scriptores oriri sibi & nobis falsò persuaserunt, nullibi aliisve amicis magis sedulis comparuerit: aut vsipiam in vsu esse fullonibus Mediterranei, vel Occidui maris accolis audire à quoquam licuerit: fidem tamen gratiamque habemus fidissimo nec vulgari amico, huius historiæ peritissimo Anguillaræ, qui sibi hanc visam coram verbis nos certiores fecit. Sabulosis Pelopónensis maritimis oritur, vocaturque vulgò, inquit, *Spina Purgatoria*: radicibus palmum longioribus, lacteum succum frangendo fundentibus, amarissimum, odore graui. Florem aut fructum tunc nò vidit: cætera similia Hippophæsto fuerunt. Huius fulloniæ multa hodie simplicia vices supplerent; quemadmodum Cardui Dipsacive plantæ fatiui fullonibus vbique idem commodi præstant, quos tamen antiquitus ad vellendos carpēdōsve pannos vsurpatos fuisse, nulla in Dioscoride mentio: huius verò multa, cum apud alios, tum apud Theophrastum, qui Hippopheos, non Hippophaes vocat, & paracanthophyllis, siue iuxta folium spinas habentibus, vt sunt Anonis & Tribulus, accenset, quod indicium certius est, nostro in solo non prouenire.

HIPPOPHÆSTVM, nominis vsu, fortè & effigiei quiddam commune cum superiori habuisse.


SE D haud perinde nota fuisse videtur, atque superior fuit antiquis hæc: quippe cuius Galenus & Paulus non meminerint: Cum tamē hic Hippophæstū exscripserit ex Dioscoride, qui etiam paucis verbis incertisque describit, cauliculo florēque viduam, spinosis foliis plantulam, fullonis spinæ specie, qualem ē Norbona aduectam se vidisse, eruditior auctorū lectione, quàm stirpiū inspectione, vnde quaque literatissimus Ruellius, suis cōmentariis mandauit. At eandem nos putamus illam Norbonensem spinosam Echinatā, Ritro Theophrasti inter spinas dictum: qua de re iudicium peritissimo cuique deferimus.

ECHINOMELOCA

*Etos, siue Melocardium
echinatus India occi-
dualis.*

QU E M non iuuat in hoc miræ raritatis & venustatis Carduo, solertem Naturę opulentiam contemplari, is se putet auerso natum ingenio à lautiorē Philosophiā. Hanc autem sponte edunt noui orbis insulæ occidentis, præsertim ea quę Diuæ Margareta sacra est, vnde reduces naucleri Anglicis oris, *Morgano* peritissimo & perquam liberalis

ingenii Ciui, & Pharmacopœo Londinensi, attulerunt: in cuius officina instructissima, pleraque eiusmodi stirpiū nouarum deliciæ seruantur, quales suis locis appinximus. Sit ne celi Europæi patiens huius semen, nondum scimus; sed primo Vere experiemur. Videtur autem hic quasi quidam naturæ Cinnus, ex Peponē, Melone, & Carduo coaluisse: eoque nos Echinomelocacton, siue Melocardium Echinatū, signata magis quàm recepta nomenclatura vocauimus: Turbinata illi metæ effigies, torulis, callosisque quatuordecim quasi costis canuleata, à sessili & latiore basi secundum longitudinem in conū obtusiorē coeuntibus: ex quo, quasi vertice, emicat tomentosa, vt in Cynara, cericea bom-



bombax admodum farcta & delicata ferè quas lapidis Amianthi, qua inuoluuntur mucronata vaginula, siliquosa, sanguinea, Capfico concolores & similes, sed perquam exiles. Semine pusillo, rotundo, Amarathi plena, multis setis croceis supernè sese exerentibus, sed rigidis & pungentibus. Dorsa autem summa striarum, quà latius protuberant, exerunt infestis veluti Istricis aut Echini aculeos aduncos, corneos, denos, & duodenos quasi hamos, radiatim septenas vt plurimum stellas effigiantes. Adeoq; vniuersum corium armant, instar Echini, vix vt inultus manu premas. Est autem cutis externa callosior, crassiorque tota, Aloes aut Cucumeris colore & concretionem. Caro subtus albicat, pinguis, flaccida, Melonem aut adipem referens. Gultu insulso & acidulo, non ingrato, aqueo, refrigerante. Cuius frustum ex eaque decoctum experiendi causa vorauit & hausit innoxie, vir impendio doctus, & pius D. Foxius Anglus. Quasi autem Melo foret interiore & superna sui parte, quæ flori subest Acanaceo, carnem firmiorem dissepit membrauula per medium iens, sellulamque efformans, ferè qualis Cucurbitæ. Sed seminis vi fungosiore minusq; compacta medullam inibi inuoluit. Eius natales qui viderunt tum naucleri, tum familiares quidam, maritima fabuleta esse referebant: cum maturitè Peponem mediocrem vel maximum Melonem æquans, nouemq; & vnus trientem libras pendebat hæc. Humi sessilis est, nuspiã cõparentibus nequidem foliorum vestigijs in ipsa planta aut radice, quæ exilis est, aliquot appendiculis vimineis, pullis, prolixis, firmis, nec fractu facilibus, sparsa.

Poterion.
Tragacantha.
Ononis.
Varietates.
Natrix Pli. Recentiorum.

POTERION aut vougda.

QVOB neruis peramica sit, vougda & vocarunt, & Poterion fortè, quia potrix paludosi riguiq; soli amans sit, vt dicit Dioscorides, qui fruticem hanc ramulis & folijs Tragacanthæ aptè confert: eiusmodi namq; primum vidimus multum in quadam arcola horti Patuini, opera eruditissimi Guilandini. Deinde ex australi tractu Pedemontanæ regionis vultu nobis misit peramicus iuuenis doctus Pharmacopœus Massiliensis Iac. Rainaudetus. Sparsa & latè porrecta fruticat, multis cauliculis exilibus, cortice nigricante, tenui vestitis, etiam aridis, non rectis vti Tragacanthum, sed vtrò citroque flexis & ordinè intortis, vti in Nepa aut Corruda: sic etiã spinulæ nulla serie digestæ, sed multò delictiores, quàm Tragacanthæ, & minores, passim cancellatim & reticulatim implicantur folijs nudæ. Foliola non albida, sed nigricantia, quæ non ex aculeis, sed è caule fibrillis delicatissimis, triplò quàm Tragacanthæ minoribus Lenticulæ modo vel Astragali exeunt: Semè pusillum, rubellum, Sumacho simile, & minus. Hunc receptum scimus viris Doctis. Nec miramur tantoperè visum fuisse accedere ad Tragacantham, vt congener esse videatur Mathiolo, qui suū Poterion Constantinopoli, nempè vèdibiliore & plausibiliore loco, sibi ab Oratore Imperatorio missū dat. Cū nihil aliud quàm Tragacanthæ sit, aut ex eius icone depictum: non enim spinæ, non cortex similia, neque in spinis folia, neq; multa alia à vero dissidentia. Ideo vir prudens suo honori potè consuluit, cum descriptionem tacuit, vt solitus est: verumtamen dicit esse Tragacanthæ simile, sed verius dixisset eadem esse,

TRAGACANTHA hirtinos spicillos

& aruncos imitata.

li. iij.

Vera

VERA Tragacantha, cui spinularum barbulae vindicant nomen, plurima fruticat in Galloprovinciae propè pomeria Massiliae in marinis collibus ad Austrum deuexis, alijq; finitimis locis passim multa, vernaculo ibi vocabulo *Barbe Renard & Ram ebouc*, id est, vulpina barba, & furculus hircinus vocatur. Frutex humilis, densus, totus candicat, vno cespite multa copia aggestus. Radice alba, longa, lignosa, crassitie digiti, prolixis flexibus subter humum merla. Caulis cum procerrimus cubitalis, ex quo spicula, foliata vtrinque, quasi pinnis oriuntur, quae ima & vetustiora, nihil aliud quam veprem, aut aristae spina nudatae effigie ostentant. Superiora pallentia perpetua sunt, etiam peregrino solo, vti Melchliniae, vbi domi, totam glaciale hyemem fouit mercator indultius & harum amantissimus Georgius Ric. Caulis ab vna radice multiplex, rigidus, lignosus, candidus, quem vestiunt spinae foliatae, vepribus rigidissimum, stellis horridum. In summo inter spinosa folia & spinas stipantur multi flosculi inuicem collecti Genistellae similes, sed albi. Siliqua etiam numerosa, recta, Ciceris aut Genistellae spinosae modo, sed multo minor & candida, in qua semina exilia, albicantia includuntur, Sinapi magnitudine, angulosa. Illic planta nullius usus, sed negotium dedimus cuidam illic amico, ut radices vulneraret, ac si quippiam Gummosi deflueret, seruaret: sic nos in Terebintho, Lentisco, inibi lacrymas compereramus, quamuis exigua quantitate.

ONONIS aut Anonis Asinaria, siue nocua Offic. Aresta bouis.

SPINOSA haec, cui pruriginosi & strigosi Aselli sese lubenter affricant, Ononis quasi Asinaria Graecis dicebatur: aut potius Anonis quasi inutilis noxiâq; agrum defrugando & aratrum sistendo, quod vulgus alludens, etiamnum Arestum bouis vocat: adeo namque plenè respondet descriptioni nostra ubiq; fruticâs, ut qui quodam ostentandi studio verâ inficiantur, ipsi si non ut *évol* ridendi, certè inutiles balbutiores & nocui bouis studiis, sint habendi. Quâuis in plaga calida frigidaue fruticat flexilibus pluribus, sesquicubitalibus & bicubitalibus furculis, per initia cum adulescunt proximè & subter folia nonnihil geniculatis: postea spinis armatur adultiores facti, & floribus ornatur ut plurimum pisi purpureis, in pallidum languentibus: demum siliquae erumpunt exiles, vbi semen, radicibus instar funi um flexilibus & tenacibus, praelongis, prolixis.

Varietas.

Quaedam occurrit in pratis maritimis & vdis Angliae, praesertim ad Bristoiam & prope Londinum, folijs maioribus, & tantillum crenatis, similibus superioris, sed floribus luteis, prolixioribus, & magis lentis sarmentis. Non raro vidimus albidis, imò & candidis admodum floribus, alicubi etiam nunquam spinis armatur: nullas enim vidimus ipso Autumno exeunte in hac posteriore, quâuis in agro fruticantè & in hortis eam obseruauerimus.

NATRIX Pl. Herbariorum.

HARVM VTRIVIS perquam similis herba illa inter segetes & crepidines cultorum Monspellij frequens, & via *Boutonnet* ad nouum castrum, Radix pusilla, caules promit furculosos multos, geniculatos, pedem altos, & ab imo summotenus folijs exilibus, longis multis, Fœni Burgundiaci æmulis, obsessos: sed adeo viscida tota plâta est, ut vix manus attractantiliceat se interdum extricare. Odora impendiò est hæc, sed quippiam minimè grati spirat, odoris fortè vehementia, qui quibusdam Conizam foetidâ sapit. Flores illi lutei pallentes Aronidis: è quibus Delphinij cornicula, semine plena, sed pullo colore. Hæc natricem Plinij coniectabant nonnulli: quibus autè argumentis non vacat ariolari, neque per authores incerta spe quaerendo vagari.

AL-

379

STIRP IVM aduersaria noua.
ALTERVM FRVGVM GENVS nempe
graminis Trifolij, & Leguminum.



VVM initio ordiremur plantarum ex similitudine historias, decreueramus graminis & triticeæ frugis recensione absolu-

ta, è vestigio hâc quasi alteram graminum familiam illi proximè annectere, aut inter consimiles alias plâtas alicubi quàm cômôdè fieri posset, inferere: sed nuspiam occurrente satis apta statione, in hunc locum, vt nō lubenter, ita non inuiti eam distulimus. Quare si cui visum fuerit ad calcem graminum vel harundinaceorum referre, illi liberum reliquimus. Hic porrò hâc ita secum, vt quoduis reponi queât: & sic exequemur, vt loco & folijs potius quàm serie aut vsu distare videantur, hâc duo summa graminis fastigia: est enim par penè cognatio collatiôq; acuti folij graminis ad triticum, atquæ trifolij graminis ad leguminum. Nam vt frugis voce à suendo, tum triticum, tum legumen complexa fuit antiquitas: sic graminis appellatione, non modò quæ folijs triticeis exeunt, sed etiam quæ leguminosis, designauit, vt sunt trifolia Loti, gramen Parnasium folio hæderaceo, flore albo apud Dioscoridem, & Cerinthe ignobile gramen apud Marorem: perindè enim vberè gliscunt ista grâmina, cespites herbidos prætergrediendo, inque pabulum cedunt pecori, vnde Galli hodie Medicam, fœnaciâ vocitât, & fœnum Burgûdiacum saginandæ veterinæ impendiō laudant.

Trifolium pratense.

Varietates.

Trifolium Menianthes, sive Asphaltites.

Oxytriphylon Scribonij Lari.

Oxytriphylon aliud Herbariorum Scribonio attributum.

Trifolium luteum minimum.

Oxys Pliniana, Alleluia Officinarum.

Quindrifolium Tetraphylon fuscum hortorum.

Trifolium paludosum folio crasso Fabaceo, sitne potius ISOPYRUM, quam Melanthij species?

Hepaticum trifolium.

Fœnum Burgundiacum.

Medica, & varietates.

Medica incana, maritima.

Lagopus.

Lagopus segetum Alopecori facie.

Lagopus maximis folio & facie Trifolij pratensis.

Lagopus angustifolius.

Loti { *Sylvestris.*
 Trifolia pratensis siliquosa MonsPELLIENSIS.
 Egyptia.

Meliloti. { *Syriaca.*
 Italica.
 Gallica.
 Germanica.
 Londinensis.
 Coronata.

Foenigracum.
Cytisus *Diosc. & Gal.*
Cytisus altera minor & vulgarior.
Polemonium.
Dorychnium Monspelliensium.
Ruta { *Sylvestris maior.*
Hortensis.
Syl. minima.
Syl. altera.
Harmala Syriaca, an Sesamoides magnum Diosc.
Pratensis duplex.
Canina Monspelliensium.
Galega.
Viburnum.
Anagyris.

TRIFOLIUM PRATENSE & eius varietates.

Ger. Wyseflee.
Bel. Clauer.
Gal. Treffle.
Ang. Herbe trifolie.

NUspiam igitur desit trifolium pratense, trifariam floris colore, variâs, quippe quod flore purpureo purpureum, & albicâte albû dicitur, & maioribus etiam folijs discernitur: vtrouis nihil notius, frequentius aut vtilius pecori veterinariâe saginandæ. Nec aliud ab isto est, quo mortales miri, Hybernæ delicias, irritamentâque palati spreti placentas, lagana & panes pinsunt, ex quæ butyro subigunt, quæ latranti obtrudant stomacho, nonnumquam triduum fame exercito & penè rabienti, Sed hæc tollerantia prædonibus præsertim consueta itemq; militibus. Inter quos superioribus annis nobis noti generosi cum militia mererent propter defectionem latronum in Hybernia, mirabantur eos probè pastos, cingulo arctissimo cinctos, circum umbilicum tamdiu esse, quoad proximo triduo rursum cibum ingurgitarent. Qui ne præproperè elaberetur, persuasi erant multum profore ad roboris & alimenti supplementum, si vincu cinguli quàm diutissimè inibi coerceretur. Idq; natura docente potius quàm Scytarû imitatione factum reor, de quibus idem prodidit grauis author Plutarchus. Indigenæ enim insulæ cû sint hi & longissimè absint, Hæcque uis vbiuis gentium prata alût, ambo sæpius guttatis & falcatis superficie foliorû maculis.

ASPHALTEVM.

Asphalteum seu Moenianthes Dioscoridis non temerè alijs regionibus quàm Sole feruidiore lustratis, vti Monspelij & Massileæ in Norbonensi & Gallo, prouincijs, videas. Quin ne Longobardis quidem aut Venetis, nisi cultum in hortis reperias, vbi ineunte Hyeme non secus atque Flandris & Anglis vtplurimum interit. Fruticosa est, sesquicubiti vel duum cubitorum. Surculos præduros rigidôsve multos exiles. In ramulos hebetes, exiles, quibus in viticeos fermè pediculos exeuntibus singulis, folia terna insunt, nec plura. In imo & per initia circinata rotunditatis, sed in pediculis superioribus adulta, oblôga, angustiora, & in mucronem desinentia, lanugine horridiuscula, hirta, nigricetia, vti & virgulta, interdum albida. Florem purpureum, compactum, in oblongam glomerationem villosa textura fert. Semen pullum, asperum, supernè mucrone piloso clausum, tetro odore, cuiusmodi vniuersa planta, quam qui legitimam bitumen non norint, si odorantur, vix vnquam olfacient postea bitumen, quin illico etiam nendum visum agnoscant. Confimili Alphalto, sed excellentiore, quod mirum magis est, dote, tum occulta, tum comperta, nam

nam & Theriacis miscetur præsidio non vulgari: & foris admotum, multò vehementius & euidentius prima etiamque specifica vi venenum è summo corpore reuellit, secumque eductum, quasi vinctum, idè coercet: quodq; sanæ parti appressum, virus non minus ætuum inurit, quàm erat inflicta serpens, vt puta Vipera, aut quæpiam alia: non illud suo sibi insito nocendi vicio, sed ascititio veneno: quemadmodum capite de Anchusa, vel Echio, liquidò patet.

OXYTRIPHYLLVM Scribonii Largi idem videtur cum superiore.

ASTVD Asphaltium non aliud esse quàm Scribonii Largi Trifoliū acutum, Oxytriphyllumve dictū, propter mucronatum extremum, quasi eminentem aculeum, quem habet, & lanuginosa, plenioraque folia, vt author delineat, dum pedum fruticem, grauius odoratum, montibus oriundum, sed Siculis plurimū, Italiæ rarum, nec nisi ad Lunæ portum, qui est Thyreni maris ora, inibiq; sibi repertum profecturus in Britanniam cum suo Deo Cæsare Claudio, facilè sibi persuadet, qui meminerit superius dictum, haud facile nisi æstuosis regionibus prouenire, nisi colatur, vt in horto Patauino & alibi. Nec quisquam putet aculeatum intelligi debere, sed folii extremum in angustum quasi aculeum porrectum, cuiusmodi visitur in isto. Et de vsu ad quem commendat, noscas certius.

OXYTRIPHYLLVM alterum Scribonii, Herbariorum.

LVBENTER assensu essemus nostris perdoctis amicis, quos sententiam rogaramus super alio trifolio, in syluis aridisque collibus fruticante, què primū tum visum Scribonii Oxytriphyllum autumabant: nempe quia procerius, lignosius, atque hirsutius visitur, sarmento & foliis alioqui similibus, sed minoribus, ternis & quaternis, albicantibus magis, & obtusioribus: flores non adeò in globum compressi, sed hiantes magis, & depressi, atque albicantes: odor aut nullus, aut perexiguus, nedū vt grauem tetrūmve olfacias, vt in bituminoso superiore: quod ideo huic preferendum ex Scribonii verbis expressius, ducimus. Prope Lugdunum & Taurinum, etiamq; MonsPELLII iuxta Gramuntiam Syluam istud abundat.



Trifolium luteum minimum.

EST luteum minimum omnium, & non ita peruium, gracilibus, pusillis, reptantibus, iuncea, folio terno aliquantum crenato, luteolis floribus, in orbem compactis, in pratis & cultis visitur.

OXYSP LINIANA, Panis Cuculi, Alleluia Offic.

Trifolium acetosum.

TRIFOLIA Oxys Pliniana, Oxytriphyllum itidem vocata fuit, non quidem folii acutæ, sed potius aciditate, qua cum vtilissima, tum notissima est, pusilla videtur Lotus, opacæ umbrosa que sequens, radice ima fibrosa, summa mediaque squamatis loricata, e qua plusculi

plusculi exeunt pedicelli iuncea, glabriq; & prateneri, quibus singulis in extremis tria apparentur folia retrò & mutuo inflexa, quæ turbinis cordisve picturam præferunt. Flos stellatus, candidus, nonnunquam & luteus, uti semen luteum, in thecis oblongiusculis, & perparuis.

QVADRIFOLIUM Phyllon fuscum hortorum.

NE foret huic generi proprium utique terna habere folia, factum ne Naturæ instituto, aut mangonio, incertum nobis: nam quæ spectantur in hortis voluptatis potius quam utilitatis causa, è pratensium genere, tametsi quaternis, quinis, adeoque septenis donata foliis, non disparibus Oxy Plinianæ, cernantur: sed colore phæo, vel liuido, rubente: flores quales pratensis, albidus sunt, reliquæque non diuersa.

TRIFOLIUM paludosum, folio crasso Fabaceo, sitne potius ISOPYRON, quam Melanthij species?

PER QVAM frequens paludosis riguisque pratis Angliæ, & Belgiæ, & Germaniæ, alibi non item, aliud trifolium: quod quia non nisi in aquis uiuit, aquaticum vocant. Radicem, ut pleræque aquaticæ, crebribus geniculis distinctam, & fibris mesam habet: folia crassa, viridia, tenera, ut Phasioli, aut fabæ, terna, in singulis pediculis crassis, cauis, & porosis, viridantibus, è geniculis egressis radices: indidemque caulis consimilis, concolor, cubitalis, in cuius summo flores candidi, stellati, Ornithogali vel Sagittæ Plinii, alterno situ visuntur, de quibus mediis nonnullæ prædeunt fibræ, eodemque tempore floribus defluxis glutinæ, pusillæve pericarpia, Hyacinthi similia, semen fuluum cohibentia, Milii, sed minora. Huic, cur, quasi potius Isopyron, Mathiulus quoddam Melanthium prætulerit, vix coniectari licet: quando ille quæ maximè opus esset, mussat, nec hircere audet, in tritæ cognitionis rebus alioqui tantus hiator: est tamen hæc multa & vocata *Biberklee*, quasi Castoream Germanis, Belgis, *Borboonen*, id est, faba hircina, ab odore olido.

HEPATICVM trifolium, siue Trinitatis.

EOSDEM ferme hæc natales & vires, nec ita dissimilem vultum sortita est, cum Oxy Pliniana, præterquam quod acidum non est trifolium istud: Quibusdam Italiæ & Norbonæ montosis locis umbrosisque syluis & vdis obuium & multum, præsertim Taurino collibus Eridanoque Circumpadano conterminis. Rigida hyeme Ianuario incunte, vel exacto, primulum pediculi Violæ martiæ, aut Bellidis, pilosi, tenelli, palmum alti, floribus cæruleis, pallidis, stellatis, Chelidonii minoris nõ disparibus donantur, qui inuito interdum frigore, trans niues superstratas sese exerunt, nondum foliis enatis, quæ in diuersis (ut violæ Martiæ) & singulis pendula pediculis, diuisura, colore, & ferme magnitudine Hederæ helicis, aut potius Ciclamini hederacei, etiam vrgente niue perstant. Semen minutum capitula cohibent, apiculis herbidis, fuscis, conflata, conuli modo, aut potius Rannunculi. Radix capillosa, sparsa, nigra.

FOENVM BVRGVNDIACVM & Medica.

Gallis. Foin de Bourgoingne.


EMENIÆ regionis pascuis istud trifoliū habuit & coluit Græcia & Italia, vnde vocauit Medicam, veluti etiā Medicū malū citriū dicunt: Quare potuisset fœnū Burgundiācū vulgò dictū, saginandis veterinis natū, opinionē Medicæ facere, & hætenus fouere, cum è Trifoliorū pratensium genere sit, & folliculū siliquosum, cōplicatum, orbiculatum gerat: semine Fœnigræci aut potius Meliloti prægnantem. Flores ex cæruleo purpurascens.

SED

Medica tres in semine varietates.

Sed cum aliud sit genus Trifolij longè pecori gratius & antiquorum notis aptius, nobis ex recentiorum vestigatorū sedulitate geminæ suppetent Medicæ: quarum prior & certior est ea, quam vulgus in Galloprouincia vocat *Lauserdo*.

Ea satiuæ propter utilitatē, illic est trisera, trifolio prorsum similis, prolixioribus tamen caulibus, humi sparsis, vbi magis foeta luxuriat, in quorum alis frequentes sunt folliculi orbiculati, qui dum digitis in spiras expanduntur, volutæ figuram exprimunt, dum autem contrahuntur, nummos exiguos multiplices sibi aggestos pueri dictitant. Interdum filiquæ hispidae sunt, interdum spinosæ, quæ flores lutei, exigui, terniq; sunt. Visitur & quibusdam locis tantæ proceritatis, vt duplò maior excreseat, filiqua vero glomeratur in nucis galbulum uel Cupressi ferè figurâ, cui semina Genistæ semen ferè æquantia insunt,

*MEDICA marina.*

HANC SÆPIVS vidimus illis perquam similem maritimis passim oriundam, Venetijs & in mari mediterraneo, superioribus tota minor folijs, & filiqua & semine: caules verò humum præreptant prolixi. Lutei flores sunt: caules & folliculi densiores, omnia tométosa lanugine obducta, vt Gnaphalium & alia maritima pleraque. Hanc cur respuant viri docti haud indignam vel animaduersione vel descriptione, causam habet nullam, neque exemplum: si namque antiqui hac ignauia suam ignorance aut posteritatis ignauiam fouisset, longè plurima desideraremus, quorum beneficio plurimum profecimus. Hasce enim inspectione & vsu præstat notas habere, quàm nullas.

*LAGOPVS.*

Lagopyrò, quia inter triticeas segetes nasceretur, quasi leporeum aut leporinum triticum iam tum Hippocratis tempore vocabatur: Dioscoridis autem æuo etiam Lagopon quasi pedem leporinum, propterea quod in pilosa spica glumas villosasq; quasi aristas mollicellas, Leporini pedis, hirsutiæ & coloris æmulantes haberet. Sic enim in libro de vlceribus concisè, sed scitè describit Hippoc. Replet maximè cõcaua, pura vlcera Lagopyros vocata. Est aut triticeis, aut, vt alij legunt minus aptè, furfuribus similis, quado arefcunt, folium pusillum, instar oleæ folij, & minus. Vnde non difficile coniectari istam plantam in aruis

inter

inter segetes frequentem vniuersæ Europæ valde vulgatam, & gramineis Trifolijs accensendam, esse genuinum Lagopum antiquorum. Siquidem triticea est spica, inter triticum, melampyrum, & Alopecotum nascens, quibus est nomine & facie similis lanugine & pilis, mollicie & fuscidade concolor Leporino pedi: folia Oleæ, sed multò minora & terna, è viticulosis cauliculis, pedè altis, in multas alas diductis. Semine exiguo Sefemi, minore, Sophiæ pari, glumulis obfuso triticeis, aut trifolij bituminosi. Non parum huic astrictionis, siccitatis verò tantum, vt mirum seminis profluvio laborantibus præstet præsidium. Eapropter vlceribus canis, sed iam deterfis & mundatis, non dubium quin carnis prouentum, & cicatricem acceleret, vt vult Hippocrates, tumoribus verò inguinum & laxis Hernijs cohibendis peropportuna.

LAGOPVM MAXIMUM, folio & facie
trifolij pratensis.

NON perinde frequens, sed tamen inter easdè plantas & segetes nascens gemina huius differentia, altera cuius folia planè eadem, minus tamè acuta, & trifolij pratensis propiora, caules simpliciores, enodes, ferè rectos, cubitales ambiūt, spicatas item summitates gerètes, binos pollices longas, crassiores: pilis & lanugine hispidiores, villosis floribus trifolij pratensis, purpura rubellis, fuscis, fœniceis, pallentibus. Hæc Veganij, Norbonensis in pratis, & ad fontem publicū elegantissimo aspectu florètem colligebamus, Iunio & Iulio mens.

ALTERA angustifolia.

ALTERAM Lagopum Angustifoliam vocabamus, iuxta agrorū & viarū margines Sellenouæ Mōspellij enatā, in Delphinatu, & non procul Rhodani ponte S. Spiritus dicto, alibiq; passim, angustioribus & longioribus multò folijs, ternis inter Peucedanum & trifolium ambigentibus, viridantibus, pedali caule, aliquot geniculis donato: ex quibus nonnullæ alæ, in summo itidem caudatas spicas ferūt, isti proximè descripto pares & maiores: quarū flores purpurascens per menses deflorescentes, relinquunt aristas horrentes, & spicas aridiores, scirpoidis glumis pungentes: vbi exiguum continetur Sclami rotundum semen. Omnium horum partes, spica præsertim, desiccant & astringunt. Sed prioris potissimum, cuius vtilitatem certam nouimus & partim diximus.



Hortorum odora LOTVS, est verior Diosc.

Ger. Sieben gezeiten Kraut. Bel. Seuengetyden clauer of krypt.

CVm arbores, frutices, & aliæ, specie, facie, fructu, & floribus differentes plantæ, Loti dicantur, quapiam bonitatis commendatione, potius quàm inter se conuenientia, videtur hæc nomenclatio huic trifolio attributa, quasi quòd cæteris trifolijs excelleret, inq; paradisis & lætioribus locis oriretur, dictum foret Trifolium λωτον, siue volupe & voluptas, à verbo λω, vt sit adlusum ad λωτοφάγος Vlisæos, & Epithetum apud Homerum, qui vocat roscidum Lotum, Deorum lubetcentiam. Proinde coniectura plena fert, veram Urbanam illam verè dici Lotum, quæ domi hodie in Belgia, Germania, Angliā, colitur, decerpiturq; ad oleum conficiendū, celebratum valde tumoribus contumacioribus, & topheis demoliendis, à Pharmacopœis præsertim, qui vernaculo nomine vocitant hanc Seuengetyde clauere, quasi septies mutans die, nempe odorem, quem illi amisisse, & denud recepisse singulo die arbitrantur. Siquicubitale leuiter striatum ramosum à summo ad imū vsq; videas caulem, Pediculos & folia è geniculis educta, cuiusmodi Trifolij pratensis, Fœ nigreci


aut Meliloti germanici, sed ambitu oblique dentata, pinguis, crassa, habitiora, subpallida: flore & glomerulo pallido, Asphaltidis Trifolii, semine Milii pallescente. Eximii odoris Meliloti, non nihil gummi Elemnii redolentis: unde mulierculis Balsamum dictum, & sanè vulneribus paramicum. Digerit quippe leuiter, & inflammationes ingruentes reprimat moderatè, robur partim tutando, nec sanè multò dispari vi quàm Foenigracii aut Lotus, oculis opem laturam putandum.

LOTVS SYLVESTRIS Diosco.

PASSIM plurimèque, quæ dicitur erratica Lotus, secus Lanii amnis MonsPELLIACI pontem & crepidines pubet, in Angliæ etiam vdis scrobulis. Graciles, numerosos, bicubitales & tricubitales, sparsos multis alis promit à radice lignosa, fibrosa, caules, quos proximè ambiunt folia terna, mollia, rotunda, fusco virore, læuia: flores lutei, Genistæ aut Meliloti veri modo, è geniculis imis summisque copiosi, quorum caliculi postmodum fouent numerosas vaginulas, teretes, oblongas, rectas, rubentes, nitidas, intus semine Sinapi pari, cinericio colore. Sapor, qui leguminum quorundam & medicatus, vti Lupino, Phascolo, & Cytisi, quos odore etiam refert. Verum non interest cuius sit odoris ista, sed quàm bellè referat Lotum bicubito maiorem, multis donatâ alis & Loti pratenfis trifoliaz foliis. Semine aut potius siliqua (nam vtrumque apud Diosco. illud ἀνέλιξ designat plerumque) fœnigraci, sed minore, qualis nostra planta est, quam gustu, non etiam odore medicatam optat Dioscorides.

LOTVS TRIFOLIA pratenfis siliquosa, MonsPELLIENSIS
cui assimilatur superior sylvestris.

NON paucis locis MonsPELLIENSIS agri & decliuibus pratis, Lanio Grammuntiaque Syluæ interiectis, humilis siliquatæque Lotus inter Aristolochias, Scordium & Narciscos repit, angulosis cauliculis, geniculatis, pedem longis. Folia in pediculis per totum caule terna, pauca, subrotunda, crassiuscula, subpallida. Extrema caulia germinibus nonnullis, multifida, luteum florem, buxei, fabæ similem, singulâ singulis alentibus: etiam cuilibet, siliqua succrescente quàm fœnigraci maiore, sed recta & superius retusa, quibusdam secundum longitudinem impressis striis, fœnigraci flauescens semen dum maturuit, diffusiliente & ostentante.



ÆGYPTIA LOTVS, vel NILOTICA,
aut Euphratea.

VTI PERMVLTÆ sunt quæ nusquam in naturæ ditione ditissima & inexhausta extare suspicari ausi essemus, priusquam vidissemus: ita plerumque fit vt nonnulla etiamnum hodie anxie minus venemur, quæ aut præ oculis & pedibus iacent, sed male aut mutilè literis mandata, eoque incognita sunt, aut nusquam terrarum, prout historiarum produnt, oriantur. Idque cum nostratibus non paucis, tum vel maxime peregrinis in stirpibus agnoscendis nobis vsu venire veri fit simile. Hasce enim non visu, sed auditione plerumque discere soliti fuerunt scriptores, eoque fidem liberandi causa φασί, vel εἰσὶν, aut simile quippiam addere soliti sunt, quasi non asserant, sed duntaxat historię texendæ gratiâ inferant: Quod videtur vsu venisse in hac Loto, Theophrasto: fusiorem enim

enim quam certiore descriptionem dat, omisis foliis & contrariis seminis comparationibus repetitis, quæ suspicionem faciunt luxatæ literæ, aut recensionis mendosæ. Plurimas videas stirpes pluribus locis obuias, imò & mensis, quarum aut perperam aut fabulose multa commentitia in literas missa fuere. Exemplo sunt mandragoræ radix, filix, tripolium, Quercus Larix perennis, vel ipsa faba, fungi, tubera. Ac ne longius abeas, nobis etiam perplexius minima quæque de plantis vulgus, & interdum eruditos consulentibus, quam multa & sæpè relata sunt, risu quam assensu digniora? Et miramur postea, gratissimis etiam viris quædam excidisse, multis è millibus pauca, minus accurata, aut vera, auditione tenus prodita? Nec potius miramur non plura lapsos, puta alienis fretos assertionibus, aut lectionibus, quod Dioscoridi è Crateua, & Theophrasto huic contigit ex Aristotele, huius Alexandri iussu & sumptu, innumeris è priuatis hominibus conflata historię fuerunt.

MILILOTVS Syriaca.

MELITI odoris & coloris gratia Meliloto, siue Melita Loto dicta, coronas texuerunt præsci, quibus caput redimendo, non voluptas modo peteretur, sed etiam æstus febribusque distemperies arcerentur. Omnium quas nouimus huius familiæ longè optima & elegantissima, quæ è Syriaco Alepo ferri cepta fuit & coli superioribus, nec antea, annis, 1562. & tertio, cuius etiam culeos refertos proflare meminimus Venetiis, in Martinelli ad Angelum officina. Copiosis fruticat ramosisque cauliculis hinc inde deflexis, cubitum altis, geniculis crebribus distinctis: vnde emicant folia in pediculis terna, loti Melilotive communis, minus acuta, nec multum serrata: & flores lutei pallidi, stipati certa serier & modo, vt in Securidaca, aut Astragalo. In summo vaginulæ hamatę & è latiori basi, in mucronem aduncum exeunt rostri Pysyaci non disparem: semen Fœnugræci compressius, exilius odore Meliloti Germanicæ, vel Gallicæ, hinc proximè dicendæ, sed multò fragrantior, etiam in decennium perdurante. Sata Patavii, quasi soli natiui oblita, non nihil corniculis minus falcatis, lunatis, & ignauiore odore degenerat: Illuc nomen retinuit Italicæ; vbi tamen quia desit copia, pratensis ista fertula, seu corolla Supplemento est.

Italica Melilotus.

Germanica & Gallica.

NOSTRATES verò duæ germanicæ, Gallicæue nuncupatæ, odore quidem inferiores sunt, sed multò proceriores fruticant, ternos namque cubitos æquant virgulta crebra, teretia, ramosa, lenta, crebribus foliis in exili pediculis ternis, fœnugræco aut potius Burundiaco proximis, leniter dentatis, carnosus, subpinguibus. Cauliculorum summitates stipant complures flosculi, serie apti, penduli colore & modo genistellæ, siue Luteolæ Plinianæ, sed minores, interdum & can. Semen in vtriculis, luteolis herbidis exile, & perpaucum. Vbiq; iamdiu huius inoleuit vsus, propter facultates compertissimas emolliendi, digerendi, tantillo calore peptico, naturæ amico & astringitione moderata.

Londinensis Melilotus altera pusilla.

LONDINI in horto amici cuiusdam alitur huic per omnia similis, nisi quia cubitum non superat, & in siliquis paruis Araci modo, semen non dissimile habet, vtrique odor gratus, Syriacæ gravior: sed quia aliis de notis plusculum differunt, hasce putarim corollis non adeò expetitas fuisse. Illis tamen ueutiquam ad Medica commoda cedere.

MILILOTVS CORONATA.

NON DE NIHILO erat, quod quidam persuasi fuerunt, illam Lotum quæ siccoribus pratis, viarumque marginibus lætatur, Sertulam esse campanam, aut saltem pro Meliloto vtendam esse. Quippe præterquam quod nulla propius ad Syriacā accedit, etiam siliquosa est, & floré perquam hilarē, corollæ aureæ fertive persimilē habet, vnde plebi Gallicæ Corona Regia dicitur, indidemque Romanis Sertula fortè dicta. Ramulos spargit hinc indè copiosos, virentes, graciles, pedales, copiosos, teneros, foliis ternis

STIRPVM aduersaria noua. 387


terius trifolij prætenfis cæsis caule enatis plurimum quinis, sed in pediculis ternis, uti in Loto syluestri. Flores luteoli vel melini, nondum explicati ex flauo rutilantes, pisi effigie radiatim & æquis spatiolis diftiti Coronidem exprimentes, Sapor qui leguminum plerisque; odor imbecillior floribus, aridis & aceruatim congeftis non nihil gratus diffatur, quod mellis odorem præfert, quem linimentis relinquit, uti etiam colorem: vti sæpe fumus illitione ad viscerum feruidorum materiam concoquendam in tertianis nothis, ex floribus oleo imbuto, quod etiam oculis optime facit. Ea Pharmacopœi Galli præsertim, plurimum vtuntur æque tuto atque Meliloto, nusquam non Angliæ Galliæ, Belgiæ frequentissima, Siliqua Loti Syluestris,

Trifolium FOENUGRÆCVM dictum.

RAro aut nusquam nisi cultu: nam quod ruri ortu putatur Fœnugræcū, quibusdam locis in Italia, ambigit inter Lotos. Et Fœnogræcum hodie adeo notum est ut qui lotos norit, neminem latere possit: duntaxat differre videtur siliqua, qua maiore magisque adunca, acutiori stylo est fœnigræcū, albicant flores parui: inq; caulibus parum striatis, cubitum & sesquicubitum longis à teretibus folia sunt, ternis è pediculis, loti æmula, aliquantū crenata. Seminis fului angulosi Securidacæ, sed rotundioris, maximæ in re medica vtilitatis fœta cornicula. Quo paratur oleum viribus quam quisquam credat maioribus, ad intestinorum latentes feiros dissipandos, & strumis perutile,

CYTISVS.

TRifolius iste frutex Lotusie gentilem cognominis insula Cinthysæ quæ una è cycladibus est appellationem fatetur, unde relique Græciæ Latioq; factus communis fuit. Et mirum quanti putatus ad pecoris pastiones, lactis & prolis prouentum. Quare qui *κυνήλας* ex Poetis legunt, possunt apte interpretari fœcundum fœnum, quod multum sanguinis virium & seminis absque quo friget Venus, suggerit. Diu nos anxios & ambiguos animi habuit Cytisi veri historia & expensio. Verum subdūctis hinc inde rationum momentis & collatis varijs plantis, quas respuebamus speramus tandem probarum iri candidis arbitris. Quæ quis Roma regia via Florentiā addit, oppidulo, cui nomē Aquapēdulse, (ni perperā in Pälinoxesto herbario notauim⁹) decliui & depressa etiam planitie feracissima Cytisum fruticem 5. sexue cubitis proceriorem Genistæ sarmentis pluribus, gracilibus præduris, striatis, vidimus statim ab imo aut paulo stupeti? lignosa radice è tenuibus pediculis: folia terna, non ita numerosa similia fœnugræco, angustiora, habitiora, rutacea: genistæ vel Sparti aut pisi flores lutei, sed minores: Siliqua Genistæ par, cinericia, gracilior, compressior, intus loculis sunt discepta semina nitētia ex atrore Genistæ, est cana vniuersa plāta: uti Rhamnus Mōspel. aut halimus



Kk. ij.

Sapor

Sapor Ciceris aut similis leguminis odoris sanè iam non succurrit : aridam enim & inodoram duntaxat habemus uulgam Norbonæ præsertim, ad radices môtis Calcaris prope Veganiû: minus procera tamen, sed tenerior pabuloq; aptior est, fortè quia dum in montes abigunt pecus, ut quotannis faciunt, pastionis lætioris, atq; æstus conuallium declinandi causa, ineunte Maio & Iunio, Sole in Arietem ingresso, teneriusculos germinationum fœtus, florum siliquarumq; spem liguriunt oues, & capellæ. Eoq; Poeta venustè ex Theocrito canit. *Florentem Cytisum & Salices carpetis amaras*. Hæc, ut si quæ alia, apprimè quadrat Dioscoridis, Gallenique Cytiso : nam ecquid eadem sit Theophrasti haud magnoperè sollicitos facit nos, quando ille in describenda minus sollicitus fuit, qui de Lotis alicubi monuit, plerumque usu venire. ut eadem voce plurimùm diuersæ plantæ, effigie tradantur. Quæ propter uti Antiqui Cytisum vocarunt Pœnigræcum, Lotum magnam, & Trifolium, propter figuræ aut naturæ coniunctionem, sic ex varijs consimilibus fruticibus Anagyridi, Laburno, Coluteæ, incertum vagumque vocabulum remansit.

Altera Cytisus minor & vulgatio.



Terna item prodeunt hinc folia, sed pictor, quia emarcuerat, minus animaduertit.

NO T I O R & frequentior multo, quæ Italia, Galloprovincia, squallidis saxibusq; collibus inter cocciferas lices & maiores Ericas viret, florumq; amœnissima fœtura oculos capràq; pascit ætatis initio: sesquicubitales spargit fruticofas, lignosas virgas, tenues, ramosas; & folia terna virgultis oriuntur, & quàm prioris Cytisi maiora, rotundiora, viridantia ex atro: Genistæ flores in summis cauliculis luxuriant, lutei pusilli, sed stipatu longè pluri, quàm pro magnitudine plantæ, quò aduolât mellificatum apum examina læta: odor gratus illi, sapor alterius: Siliqua & semē minora.

Minus foetens Anagyris vel LABURNVM, Foetida ANAGYRIS arborescens.

Non foetens.

AUT regio aut putor quem ciet, huic nomen fecit, locumq; prouerbio, Ne moueas *æva-lybæu* dedit: idcirco nauteam, à nausea, quam mouet, Plautus vocauit. Cognati autem generis videtur, si non genericæ differentiæ, Anagyris æstuosis conuallibus & riguis, præsertim Galloprovincia oriunda, cum illa montana & aliosis Alpinis proueniente, quàm Laburnum & Anagyridem non foetidam nonnulli autumant. Plurima hæc Taurinis montosis & collibus Pedemôtanis, Vere ligulis vel pannulis conspicua luteis, prælongis, pendulis, congestis multa flosculorum serie, Sparti Genistellæ aut Cytisi non dissimilium: folia terna Asphaltidis trifolij, Cytisi, aut Polemonij longiora, ex pallore viridia, siliquulis, multis Genistellæ aut Cytisi, vni pedicello hærentibus, minoribus, minúsq; latis: semen item Cytisi aut Galegæ, oblongum, vel Genistæ: fruticat ad arboris proceritatem, prædura materia, rusticoque instrumeto nata, intus nigricante, foris Fusariæ colore, ex Alpibus Heluetijs in Germaniæ & Flædiæ hortis florentem vidimus, sed perparum aut nihil fœtidam, tamen si foeteat vernaculo soio; esse Laburnum Plin, ut non magnum operæ precium puta-

putamus probare, ita est valde verisimile: sed huius Romani ne imparatiores minusque accurata fuerunt in hac historia tum synopsis, tum versiones, uti sexcentis locis, ac proximo Anagyridis capite, manifestum fit.

ANAGYRIS.

SEME N lectum Anagyridis eminus etiam fœtentis in crepidinibus Argentei ammi vocati, Briniolam inter & Vallū vrbeculas Galloprovinciæ, in Belgio creuit, etiamq; Londini nobis prouenit in Morgani Vireto: folia item terna virgultaque Memantis Trifolii: minor tota fruticat, minus dura materia, cortex nigricat, flores in muscosis thyrsis racemosi, Napi aut Raphani, aut Brassicæ, luteoli, siliquis longioribus, latioribus, semen cohibetur, renis Phaseolive effigie, durissimum, pullum, nitidum, subpurpureum: quin sit vera nulli iam dubium reliquit semen & fœtidissimus odor, unde nomen illi & Adagio locus, *Mouere Anagyrim*, αὐτὴν ἀναγύρει, id est, sibi rem molestat & prorsum ingratam exciere; quia rarior, vltus hodie paucus aut nullus.

DORYCNIVM *Monspelliensium.*

Δορύκνιον, quemadmodum toxicum, quibus spicula cuspidatave tela infici solita fuerant; quod celeriore molirentur perniciem, nominatum fuisse par est. Multum verò abest istud hic appictum ab illis duabus, aut tribus plâtis, quas nonnulli hariolabatur fore Dorychnion, quæque nullum operæ precium commemorare, uti Phylleræa, Vesicariū cordis effigie legumen, & alia: Nam iamdiu Rondelletii Præceptoris, & Scholæ clarissimæ Nitiobrigum penè cunctæ familiæ diuturna coniectura, istam plântam Dorychnion statuebat: creberrima quippe illic & in Galloprovincia fruticat (non perinde in Italia) sarmentosis, lignosis, durissimiq; virgultis; tenuibus, flexilibus, rectis, sesquicubitum, & binos altis; numerosa alarum sobole è geniculis imis summo tenus per interualla foliola habente, incana, còpluria, Rutaceis, Chameleæ, aut Oleæ nuper pullulatis multò exiliora, multis flosculis muscosis Oleæ, vel Quercus, per cacumina candicantibus, & in radiatis quasi umbellis relinquentibus theculas vel folliculos albidos, membranosos, rotundos, oblongos, teretes, Loti sylvestris semina quina, aut sena, nigricantia, arentia, Araci sylvestris, aut Loti sylvestris condentes: radice lignosiore, gracili, proluxa, saxosis sterilibus ad Frontignanam & maritimam Norbônæ oritur. Gustu est insipido fermè planta, & ut reor, refrigerantis, non humectantis facultatis.

POLEMONIVM *Monspelliensium.*

HVI s est similitudinis Polemonium, quasi dicas bellatum & bellicosum, ut de cuius inuentione sibi vendicanda certatum inter Reges fuerit: Quippe quæ herba esset χλιδοναίς vocata, id est, mille viribus prædita, authore Dioscoride. Nullidum recentiorum nota fuit Polemonia, ac ne quidem illi nouo huius qui radiatò Appollini Vercellensi Math. alioquin amico non vulgari, & hac in palæstra riuali: ac ne nos quidè fœtè nouissemus, nisi Rondelletii præceptoris & Guilielmi Pelisserii Monspel. Episcopi, & Assatii sagaci vestigatione, factum fuisset, ut non multis ab hinc annis vniuersæ Academæ illic fuerit notitiæ vulgatissimæ, etiam viribus explorando compertis: nam frutex ipse vndeque exquisitè quadrat delineationi Dioscoridæ. Virgultis multis, lignosis, rectis, rotundis, gracilibus, cortice pullis ex virore, ternos & quaternos cubitos altis,

in quibus ad vsque summum heret vtrunque pinnatim ramuli & folia terna Cythisi, aut Rutæ, maiora, saturè virentia, crassiuscula & rigida. Flores Maio & Iunio emicant lutei, pusilli, vt Islemini, qui cedunt baccis nigris vnà circinnatim collectis, plenis, paribus ligustri, aut Corni fœminæ, succo hyanthino; vel atro purpureo inficiente pregnantibus. Radice proluxa, lignea, implexa, & vario flexu sparfa, intus alba, saporis nennihil acris & amari, euulsu difficilis. In Monspelio agro, ad Castri noui aridos colles & æstuosos margines oliuetorū & in luci Grāmūtii cāpestrib⁹ saxosis quamplurima. Gallicis, Belgis, & Anglis hortis iam quidē culta, sed putata & vocata ab illis genistę peregrinę quędā species. Pueriliter hic nōnulli ambigunt super foliis Nepetę: qui si meminissent esse speciem Calaminthę Pulegii, planē foliis similibus, & paribus, lubenter de *Behen* albo & rubro vterius ineptire desinere: Sunt enim *Pulegii*, *Rutę*, & *Polygoni*, folia non adeo disparia inter se magnitudine, vnde etiam discas, quid *Calamintha altera*, seu *Nepeta Dioscoridis*, sit.

MAIOR & *hortensis Ruta*, *Sylvestris*, & ei perquā similit facie, *Norbonensis* *Peganiū*, sine angustifolia *Rutula*.



Sylvestr. Ruta. **S**EMPER virentis hortensis figura trifolia, satis ex superioribus innotescet, tum etiam quia nihil hortis vulgatius *πυραυον* dicta, ἀπὸ τῆς πυρρῆς τοῦ ἀσέπου, quia semen genitabile suo præ sicco spiritu calidoq; vapore & tetro coaguletur, quasiq; arefcet, vnde sterilefcunt, præsertim viri. Agrestis autem *Rutæ* vires vegetiores, & odor vehementior multo, adeoque virosus & afflatu periculosus est: interdum enim vaporem ipsa planta inuentis vultui afflat, aut tangentis manui inurit, qua si faciem attigeris, *Erysipelas*, aut *Scabiem* excitabis: alta cubitum est, hortensis, & caule minore, sed foliis fermè iisdem exilioribus, *Pegano* paucioribus, filiqua & semine non dispari: sed nō perennat, ne in hortis quidem Gallicis & Batauis sedulò culta, flosculis herbaceis. Minima maximè omnium virulenta, angustifoliola, tota pallido virore albicat: *empetri* fermè habitu, situ, & rigiditate, cetera non nisi magnitudine multo disparia. Aridi Monspelliaci colles & saxeideuexi vtraque scatent. Vtriusque semen, præsertim minimæ, maximi ad arthritidem, & molas, & humiditates vteri vsus Medicis illic.



PEGANION
Norbonen. sine
Rutula.

An. Harmala Syriaca sit **SESAMOIDES** magnū
Dioscoridis?

VERVM illi *Syriacæ*, quæ non modo Venetis, sed etiam Belgicis & Anglicis viretis facillè propagatur, tametsi sunt capitula, seu pericapia, similia & trifida, aut triangula, tamen

men odor ille vehemens nostratis illi defit, quem si quis soli mutatione amissum dicat, sciat ex Syria quàm recentissimo semine satam, in odorem prouenisse. Atque inter Rutaceas, quas plures habemus quàm Diosc. nulla minus hac Rutam præferat, & sapiat odore & gustu, quam Martinellus misit è Syria, Harmalámque primus fecit: non incerta cõiectura quispiam possit illam eandem Sesamoidem maiorem opinari: est siquidem Agrestis Rutæ tenuifoliæ, siue Norbonensis Harmalæ foliis longioribus, maioribus Senecionis, & Arthemisiæ tenuifoliæ, flore Hyperici, sed albo: siliqua triquetra, Sesami minoris effigie, semine intus pullo vel cinereo, gustu acri, amaro, maiore Hyoschiami albi: tenui radice, lutea. Ex Syria per Italiæ hortos, indeque Gallicis, Belgicis, etiámque Anglicis viretis nota. Nec si non esset purgatrix hæc, illicò foret ideò reicienda: quippe antiqui Helleboro soliti erant addere quædam, quæ vires catharticas, vel accelerarent, quasque stimuli vrgerent excretionem, vt sal, acetum, & alia tum Helleboro, tum Elaterio: vel quæ impetum effrenè medicamenti moderarentur, vt puliculas, aut lactis dulciculum potiunculam, cuiusmodi posterior etas quàm plurima meditata est admodum oportuna: Barbaris nostris apud Me-suem consolatoria dicta. Nec hanc infernè deicere dicunt Dioscor. aut Paulus, nec per se, sed additum tribus semibolis albi Hellebori, vt fusius in Helleborino.

RVT A triangulo pericarpio.

QVANDAM habuit nobisque ostendit Rutam aliam Regius professor Monspellien-siam Iubertus, cui triquetra siliquæ aut vascula erant, nec tamen sapor ceteraque facies diuersa à vulgari Ruta: quam obrem arbitrabantur Itali (quorum in hortis adoleue-rat) hanc esse propiorem Syriacæ Harmalæ, quàm superiores dictas.

CANINA RVT A.

RECENTIORVM insuper quatuor sunt plantæ, quæ virium aut odoris efficacia, in-témque effigie, Rutæ nomen vsurparunt. Nec enim Caninæ Rutæ vocatæ Ruta vul-garis cognata est, nisi paucis & vagis notis. Sed id vulgo moris est, vt cum præstent quædam herbæ opem celebratioribus solitam ascribi, si nomine deficiantur, illo communi im-pertiantur. Rarò, nisi locis siccis & feruidis, satis, & marginibus, cuiusmodi Norbonæ, Ra-uenæ, & Romæ, circum oriunda hæc. Surculis virgulteis multis, sesquicubiti folia Rheadis, Papaueris, aut Argemones incisura, magnitudine minora, crassiuscula, ex viridi nigricât: vti & flosculi, ætate hiantes, alterius Veronicæ vel Anthirrii modo. Graue tota virosûm-ve Rutaceo ingratiorem vibrat odorem: exili pericarpio, Rutæ ferè aut Blattariæ ritu, sed multò minore claudit semè. Rutæ istam, Math. reiectæ Alceæ Venetæ, quam foliis & odore viroso refert, suffecimus: odor quippe etiam Meconii quiddam virosus halat, ramulique exiles sunt. Succus verò, quem Meconio æquiparat succo, idem: qui nobiscum suspicatur hanc esse Hippocoum, vires cum succo corniculati papaueris, aut spumei conferendas in-terpretatur. Verum è tam parua designatione iudicium differendum censemus.

RVT A Pratenfis Herbariorum, num. PHELLANDRIUM Plin?
quod potius SAXIFRAGIA Hircina videtur.

MVLTO adhuc magis Ruta pratenfis dicta abest: Plinianum hanc Phellandrium dicti-tabant Lutetiani nonnulli nostra memoria, quòd propius Apium accederet quàm Rutam, cuius nihil nisi odorem virosus sortita est: eodemque argumento ad calculum laudabant, & Saxifragium nuncupabant alii nuperi intempestiui nomelationum ærusca-tores, qui tum demùm se opere precium putant fecisse, si ex Plinianis incertis herbarum elenchis potius, quàm descriptionibus, aliquot selegerint minus auribus, vulgi assueta no-mina, & plantis itidem nondum agnitis indiderint, Horatiiq; conuicio locum fecerint, qui pisces appingere syluis vetat. Pratis vdis & riguis oritur hæc passim, caulem promit ses-quicubitalem, folia quadantenus Apii palustris, sed minora, rigidiora, nigriora, radix lu-teola,

Kk.iiij.

teola,

Nonnulli vulgò
pharmaco. Ru-
barbarū mona-
chorū à rubore
vocitant.

Ruta pratensis
tenuifolia.

Thalictrum te-
nuifolium Cordi.

teola, fibris multis donata, latèque humi fufis, Afclepiadis modo: flores ex luteo herbacei, pusilli, numerosi: radix pediculis & atomis, cironibusq; interficiendis, in balnea inditur, superiore gracilitate differre tantum videtur, alioquin iisdem natalibus & facultatibus, sed remissioribus prædita est.

GALEGA.

GALEGA foliis est Glycyrrhizæ, vel Lentis Glaucii, cui etiam nomen ab Herbariis factum alludit: duum cubitorum illi caulis, flores albi, purpurascens, in teretibus, oblongis filiquis semen exile. In Pedemontana planitie, iuxta Eridani fluentia & Taurinum vberim luxuriat, passimque alibi. Satis liquet, non ex delineatione, sed potius ex effectione, Rutæ nomen inditum illi, quia vel odor ipse potius Leguminis, cui videtur similior: sed quia venenis efficacissima, uti Ruta, perhibetur, cõsimili vulgò nomenclatura donatur. Veneti namque Pharmacopœi atque etiam Circulatorum illic fex, qui viperas stipis colligendæ causâ circumferunt, simulatque demorfi sunt, nihil certius hac aut præsentius habent; eadē multo magis, freti, quàm illis decantatis Theriacis.

LEGUMINA.

Maiores vulgarior, non est eadem antiquorum faba, sed congener.

Faba Minor. Sylvestris Norbo. an sit Faba antiquiorum.

Phascoli. Varietates.

Phascolus sylvestris.

Smilax hortensis Diosc. sine Phas. vulgaris.

Sesamum.

Frumetum Saracenicum, num sit Erisimum Theop?

Lupini.

Eorundem Varietates.

Maiores.

Minus.

Pisum Spontanæum.

Cordatum, & Cor. Indicum, Halicacabum

Peregrinum Offic. an isopyrum Diosc?

Ernilla sylv. sine Ochrum.

Lathyrus, sine Cicercula.

Lathyrus sylvest.

Pseudoapios, Germanorum Terra glandes.

Cicer Domesticum.

Arietinum.

Sylvestre duplex.

LEGUMINOSA.

Lens.

Orobis, sine Erum.

Vicia.

Cracca, sine Aracus.

Cracca altera.

Hedysarum utrumque.

Glaux vulgaris.

Caput gallinaceum Belgarum, an Onobrychis

Diosc?

Ornithopodium.

Ferrum equinum. Ferro Cavallo Italorum.

Scorpioides leguminosa.

Tribulus terrestris.

Anthyllis prior Dod. & Herbariorum.

Aphaca.

Erum.

Glycyrrhiza triplex.

Colutea.

Colutea Scorpioides.

Sena.

Dictamnus albus Officina. an Tra-

gium Diosc?

FABÆ antiquorum & recentiorum.

Germa. Boonen. Gallis. Feues. Ang. Beanes.

AGNOVIMVS superius triticea cum Leguminosis magis quadã vsus & partium proportionem conuenire, quàm delineatione: nã ut illa spicatur glumis & aristis, sic hæc grauidantur filiquis & vaginulis, utraq; magno vsui tum pecori, tum homini: illa à terendo, hæc à legendo Latini dixerunt, quia non falce uti illa, sed manu vncõve auellendo legerentur. Græcis verò *εργία*, quasi satiuia aut serenda, quod sementem multo fenore pensarēt: sunt enim legumina nõ parum fecundiora triticeis, minoreq; tempore & labore, sed maiore prouectu coluntur: à qua quidẽ feracitatis facilitate *κωκυς* vocarūt, ut Galenus annotat, antiqui ferè cuncta legumina Fabas, quasi prægnantes & feraces, id enim valet verbũ *κωκυς*, quod prægno, vnde *κωκυδι*, testiculi dicti olim. Speciatim postea indicarūt legumẽ fama multo omnium notissimũ & fami plebeia adeo vulgare subsidiũ, ut nõ secus atq; genera, aut diuersitates Tritici, sic fabarũ

harū delineationem nō tam rudem, quā nullā reliquerint. Cū autē prae Fabā Theop. Diosc. & aliorum antiquorum istam vulgarem nostram, vtpote maiorem, pinguioremq;, potiore duxisset posteritas, ea penē cōtemp̃ta, hęc nostrās sola nomen Fabae subripuit, retinētq; etiamnum hodie: Antiquorum enim Fabulæ siue Fabellæ, pusillæ tametsi, veluti pares, Loto & Terebintho comparantur. Taxiq; bacca maior quā faba asseritur apud Dioscoridē, & rotunda iuxta & æqualis asellis subter vrinis delitescētib; *κρυμνο* vocatis Galenus: Aristotel. autem pulli decimi incubitus diei oculos maiores Fabā facit: tamen non illic nōstrates ē Fabarum censu amouent, vt placet doctissimo & modestissimo Dodonæo: sed id nos docent, eorum Fabam fuisse minorem, quā hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem, & potius fructu, magnitudine, figura, quā plantæ naturā temperamento, aut lineamentis distare. Nam Theoph. & Plin. Fabam, qualis nostras est, describunt caule recto & vnico, solamq; inter legumina, vt plurimum, culmo tradunt: & multis locis Dioscorides caulem Fabae quadratū dicit, & florem Fabae Peryclimeni asserit. Sed id euenire, quia variant magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti rotunda. Et frequentissima hodie Fabā nostra maior, rarō vsipiam tamen nisi satā prouenit, ferunt quippe in scrobillas paxillo depressas. Quare vt non est difficile nosse istam vulgarem Fabam, maiorem, longiorem, minūsq; rotundam esse, quā antiquorum Fabā fuerit, sic eandem Phasiolum Dolicumūe asserere, nequiquam licet per eosdem authores,

FABA Minor.

Altera, quæ minor est, Italis & Belgio satū frequentissima ad veterina alenda, sed vsipiam vsus frequentior quā in Anglia, vbi panes Fabaceos veterina potius quā triticeos dant. Hęc non multum videtur abesse à Græcorum, quā superius expendebamus, Fabā: Est enim ea illis adhuc vsitatissima, fresa inibi vocata, ad pulmenta expetita: & Italiae, Venetijs præsertim, vulgo *Faua menada dicta*.

Sed syluestris, qualem sapius in Galloprovincia & in Botoneti Ericetis sterilibusq;, non *Sylvestris* procul Monspellio enatam legimus, tota minor est, sesquicubitalis & cubitalis: & culmi quadrati, minus rigidi surculi, communis Fabae folijs, quasi egens adminiculi, & supernè in cirros, capreolōve Pisi desinentibus, flore Vicie obscurè purpureo, & siliqua dum maturit alioqui non discrepāt: cohibent autem quaternas Fabas aut quinas, gustu Fabaceo, sed non ita grato, odore grauiusculo, magnitudine Orobi, quem Dioscorides Tithymali Paralij semini comparat. Plinius quasi æqualitatem hanc & parilitatem innuens, Fabae parē tradit: quæ nos adducunt, vt non inuiti credamus hanc præ ceteris delineationem Græcæ explere. Quando etiam hęc non secus atq; antiquorum Fabae sponte prodeunt, in locis Galiae paulō antè dictis, quemadmodum illa ē Fabarijs insulis, quibus cognomine fuisse ferunt autores: tametsi malim esse illam Cherronensem in Mari Euxino, quā in Germania siue Arctico Oceano, vbi terra assiosa, & minus olim nota Græcis aut Romanis fuit: nec puto in Dania insulisue finitimis hæc reperiri, eam tamen volunt esse Cymbricam Cheronensem siue peninsulam Plin. autoritate. Itaq; illam vulgatissimā Fabam amissam putare, tam parū verisimile est, quā siligine laudatione tritico carere nos, de quo tamen fuerunt controuersiae multae. Sed nōstrates Fabae cū caulem quadratū, rectū, surrectū, vnicū, vt plurimum solæ leguminum habeant Theoph. & Plin. autoritate, & particulatim florent, ipsiq; flores nigricantibus lituris (quas lituras lugubres rati Flamines Romani, non mandebant, vt tradit Varro) insigniātur, nō esse *κρυμνο* siue fabas nolim assentiri. Et in ipsius fructus latiore quasi basi, qui cernit nigrum vestigium illud, quod hilum antiqui vocarunt, quasi germinis umbilicellū & inuolucrum, nequiquam vulgares respuet fabas, quibus penē id signi peculiare est. Ipsae etiam in duas semisses sponte ferē & natura diuelluntur: & planē tot iisdemq; facultatibus comperiuntur, quas antiqui prodiderunt, tum cibo tum medicamento: nam flatūs & terra insomnia excitare, vulgus etiā queritur, & ad vlcera abstergenda, atq; carnem procurandā quibus chirurgus harum farina vtitur. Quamobrem non aliō dissident à Græca notissima illa nōstrates Fabae Germanorumūe Boone, quā magnitudine & oblongiore teretive figura: quæ cū in plerisque eiusdem speciei & naturae pomis, nucibus, & seminibus, tum in Cicere satiuo & sylvestri, discrepant, Diosc. monente: nam, inquit, à satiuo nihil differre, nisi semine tantum.

PEr pauca extant apud scriptores antiquos de Phaseolo, quem Diosc. ægrè concoqui, in flationes aluum & vomitum ciere tantum dicit: Galenus autem à φασόλω Dolichonem discernit, eundemque Cicerulæ aut eiusdem speciei vult: Quod Plinius videtur innuisse, & Maro vbi canit *Seu pinguem viciam feres, vilémve Faselum*: vilis enim meritò dicitur, vt cuius tantum quasi noxi aut parum vtiles meminerunt antiqui, eoque incognitum penè reliquerunt, nisi quantum ex Cicerulæ collatione percipi potest, deq; Galeni sententia, fortè & Plinij verbis, qui Fabæ folia rotunda, Phasiolo autem Pifo & Erui-liæ longiora & venosa scribit: quæ accipienda esse de Phaseolo, potius quàm de Phasiolo videntur, quia Phasiolo folia sunt rotunda, nec venosa. Et apud Columellam etiam pusillum legumen vileque intelligi videtur: quando Phasioli modi quatuor obruuntur à totidem operis: nec enim Phaseolus nisi rara & peregrina in Italia fuit. Eapropter nobis videtur sui generis legumen ignobile quoddam, Phaselus, simile tamen Erui-liæ aut Ciceri, quale est quod pictum damus, in huius operis extremo, Phaseoli facie, sed siliquis Ciceris aut Viciæ: congruis item Sparto, aut Genistæ, quales Dioscorides annotauit. Sponte hæc in Heluetia exit, folijs ab vno pediculo gracilibus, ordine positis, senis & septenis in caule geniculato, striato, cubitali & sesquicubitali, gracili, lento, flexili. Folia ipsa minimè crassa, aut carnosæ, sed venulis perquam exquisitis secundum longitudinem intexta, magnitudine ferè, sed non positu Phaseoli. Floribus purpureis, Phaseoli minoribus, in prolixioribus clauiculis: è quibus postea siliquæ fuscae visuntur complures, magnitudine & effigie Genistæ aut Cicerulæ: semine intus pullo, Eruium æquante: radice multum fibrosa, nigra, maiore quàm cæteris leguminibus, fortè quia Sylvestris est plânta, nam ruri repertam nobis dedit optime spei doctissimus amicus Penius Medicus.

Cicerula altera, an Phaseolus Diosc?

EST & quædam alia, quam nonnulli Phaseolum suspicati sunt, ea etiam in agris, & syluis occurrit, vnde hortus Morgani habuit. Cicerulæ similiter hæc folia, caulésque emittit, venosa, tenuiæque, auriculis Leporis similia: siliquis Viciæ latioribus & longioribus, flore purpureo, & quàm Pisi minore: harum vtramuis malunt Phaselum antiquorum recentiores doctiores, quàm Fabam nostram, vt quæ sit legumen neutiquam contemnendum, imò tanti faciendum hodie, vt vere & totam ætatem, multis in regionibus magnum sit annonæ supplemētum, & nō parum multæ gentes panes ex Fabis depſant Veterinariæ, etiamque plebeculæ non incommodos: farina autem, aut ipsa tota fresa Faba pul-tes lapidas, & placentas conficiant, efficiantque, vt de hac nostrate Faba dictum putemus quod antiqui scribunt, Fabæ maximum honorem habitum fuisse, vt qua panis attentatus sit.

*PHASIOLVS vulgaris Turcicæve multicolor Fabæ,
est SMILAX hortensis Diosc.*

NVLLIVS verò laboris est istud legumen trifolium, folijs hederaceis, Faba tereti, oblonga, renis effigie, multicolori, esse antiquorū Dolichum Phaseolumve dictum, asseuerare, hanc non perinde triuialem fuisse & longè abesse à Phaselis certum: tametsi nomenclaturam Phaselus, quasi minoris fructus à Phaseolo retinuerit, propter quamdam similitudinem, fortè fructus & foliorum, potius quàm ob magnitudinem: Dolichum autem & Phaseolum effigie siliquarum & fructus, qui Lintrem Lembumve nauculam exprimūt, vocarunt. Nusquam autem nisi sati peregriniquæ hortis nostris, non secus ac Romanis olim, visuntur Phaseoli, cuius enatæ frondes hederaceæ prolixissimis in viticulis deducuntur ad topiariorum ornamenta, qua de causa vocauit Dioscorides hortensem Smilacē, cui perquam similis esset folijs & vultu, tametsi diuersa fructu. Est autem fructus Phaseoli per-

perquam amæno aspectu, plerumque bicolor & tricolor, maculis atris, pullis giluis, rotundis, guttatis, oblongis, obliquis, circularim, tæniatim aspersus, nitens: plerumque ebori concolores fabæ totæ, nonnusquam flauescunt, interdum atræ prorsum, plurimum renuli effigie referunt, vnde notissimæ sunt vbiuis, & apud Italos teneræ integra siliqua in iusculis multum esitantur, multoque magis quam vulgares Fabæ expetuntur: tametsi parū lautus cibus nobis esitantibus fortè non assuetis, videbantur.

Per multas accepimus à naucleris fabas Phasiolôsve ex Americæ nouo orbe, æque Hesperia Aphrica allatas, quæ mixtæ naturæ videntur, sed propinquioris Phasiolo: nam earum quædam exigua, minor multò Phasiolo, ex fusco purpurascit: quædam latissima & candida, compressæ rotunditatis, ambitu fere vnciam æquat, gustu, concretionem & Phascoli similitudine, hanc non demptam ex arbore Phasiolifera, vt quidam putant, norunt amici quidam, qui seuerunt, legumienque non ita dissimile Phasiolo habuerunt: Sed alias perquam raras habemus nos, munere lectissimæ, literata virtute & familia in Anglia illustri, Heroine Catharinæ Killigree, quas ferunt repertas magna copia ad Cornubiæ littoræ, & quod non parum mirum, eo loco nullam meminit vllus nauem illisam, nullumve naufragium factum: & tamen quotannis nouæ inueniuntur, partim fluitantes & partim effodiuntur immerse fabulis littoreis, quasi, vt putant Cornubiensis maris Anglici accola, secundis Austris, aut Zephyris è nouo mundo appulsæ fuerint.

Belgarum. Βουκτωρ, an. E R T S I M V M
Theophrast?

ET S I in segetum censu ponunt Theophrastus Plinius atque Galenus Erysimum quoddam Sesamo simile & cognatum, cibus aptum, tamen delineatio magis folia leguminositate statuit. Nulla autem planta videtur affinior eruditorum sententia, quàm illud frugum genus, quod Belgis Brabantis, Heluetiisque tanta copia seritur, vt isto vniuersa fata, quasi purpura operta eminent rutilent. Vniuersa planta, præcipue quando maturescit, purpurascit Amaranthi colore: caulis bicubitalis, striatus, folia Smilacis minora aut Atriplicis: flore candido: semine glumis contento, triquetris fuscis, quæ molendo exuuntur, ex Farina, lacte & butyro pinsuntur placent, & sartagine friguntur, pueris expetitæ. Belgium, & præsertim Antuerpianus ager, huius est feracissimum. Quod si oculis vidisset sedulus & perpetuus Hermolai, Ruelli, Leoniceri, cæterorumque doctiorum capto Mathioli, veniam potius præcipitis iudicii, & pauca inspectionis, ne dicam lectionis, ab illis doctis exorasset, quàm eorum nomen lacerasset. Vt quorum monumenta multis studiorum anxietatibus comparata, illi quasi offam præmanant in os inferuerint, amplissimæque segetem (sed immeritæ) laudis suggererint. Intuere eius duo argumenta: Triticum Sarracenicum Tridentinis *Formentono*, tantum caule rubet, non foliis: alterum argumentum, ab omnibus audivisimè depascitur. Respondeo, *Formentone* totum rubrum esse demptis floribus albis: rura Belgica & Gallica id affatim edere, & tuam Dialecticæ hinc captionem moliri, quæ dum ab omnibus auide vorari argutatur, viriditatem, vnde tota vis rationis pendebat, reticuit: nõ enim dicit non edi Theoph; sed virentia folia non edi: misera tamen vtræque argutatio. Rubor inest palmitibus, Titymallis, Atriplicibus aliis, & similibus multis in locis, alibi nullus. Et Basileæ agnum habuimus cicuta Helluonem; at alibi passim animantia respuunt: hic in Anglia virentes asparagos veterina non tangunt; post fœnicetium in maritimis, illis aridis vescuntur.

Math. pag. 572

An Officinæ S E S A M I semen sit Dioscoridis?

SEME in istud perpetuo nomine & usu Sesamum fuit, quod satum, vidimus adultum in horto Treuisani Doctoris Patavini, siliquulis cylindraceis, præsepiolis distinctis, semine isto flauescente, oblongo, Sesamino plenis. Caule sesquicubitum crasso, foliis Amygdali, vel Ocymi. Flores, Ruborem, & alia non meminimus, nec putabamus vili fore, qui plantam, hanc Sesamum inficiaretur, si semen semel intueretur istud dictum.

Quare


Quare si ruborem desiderat in Sesamo Senensis, docti in illo pado rem, vt qui vnus plantulæ fortè aride, in solo peregrino adultæ animaduersione, de Sesamo aduersus omniū iudicia statuerit, nec quidquam potioris docuerit. Quantum enim seminis istius Sesami Venetias, Pisas, Genuam, Lucam, Antuerpiam ex Alexandria Candiaque, venum venit, huius plantæ est, quam monitus fortè inuitus depinxit.

SATIVS LUPINVS.

Nec ita procul absunt à Fabaceis & Phaeolis fructus quos *δέραξ* vocarunt Græci, quia calidiores cæteris leguminibus essent, aut potius quod *δέραξ*, id est, calida aqua lauantur & macerarentur quò amarorem exuerent tristem & molestum, à quo etiam *λύρα* & Lupinus dictus, vnde Virgili. *tristisque Lupini sustuleris Calamos*, Quamplurimis in hortis præsertim Pharmacopœorum habetur satius, culmum edens, perinde ac Faba, rectum, & suapte natura stantem, sed rotundum, cauum, nonnihil tomentosum, è radice ferè singulari, nec multum fibrosa, à qua fere per totum caulem & ramos alterno situ exerantur in pediculis folia sena & septena diuisura, digitata Viticis, aut Staphidis agricæ similia, aduersa, virentia, subtus incana, hirsuta: filique Fabaceis minores, latiores quàm Phaeoli: durus fructus, rotundus, compressus, albidus foris, subluteus intus, perquam amarus. Flos ter estate spectandus, nam initio ex imo emicant albi, postea è cauliculis affecta æstate & per Autumnum exeunte. Pedemontani proferunt patentes planities satiuo, quos maceratos esitat plebecula.

Segetum SYLVESTRE flore purpureo.

IN satis & cultis Gramuntio luo circumiectis non procul Monspellio sepe occurrit hic, qui illico intuenti satium superius descriptum refert: nisi quia gracilior multò est, caule, pedalifolio quinque partito, angustiore, & flore purpureo & puniceo, Pisi minore: fructu etiam minore, guttatis, aut fortuitis asperso maculis, pullis, cinereis, & cæsiis. Inibi etiamque in hortis herbariorum visitur hic idem floribus luteis Genista, fructu nihilo secius amaro.



PISVM VVLGATIVS Maius.

Germa. Erweyssen. Ang. Pease.

Belgis. Stock erwitten. Ital. Piso.

Equadam vrbe Pisa inter Ossam & Olympum montes sita Pisum allatum & dictum volunt: de quo nihil extare apud Dioscoridem non tam mirum sit, quàm certos nos facit, multa eius operi intercidiisse, quæ illi notissima fuerunt. Nam nullum legumen notius aut præstantius secundum Fabam Piso est: quod græce etiam *λίωτον* dicitur, quasi dicas oui vitellum, quem colore & similitudine exprimunt, vbi per maturitatē flauent viridescuntve, sunt in siliquis cylindraceis ipsa semina, quæ vnà cum membraneis vaginulis, vere & estate iusculenta commendant: harum feges prolixè admodum luxuriat, humi semper caduca, nisi ridicas, pedamentave sit nacta, prælongis, gracilibus, fistulosis caulibus, per media foliola euntibus Perfoliatæ ritū: supernè lentis in clauiculas exeunt, folia rotunda, oblonga, in duos ferè semicirculos oblongos diuisa: flore effigie papilionis, albicante sui medio purpureo, radice exili, quibusdam Germaniæ locis sponte germinante,

An Pisum angulosum Hortorum quadratum Plinii?

ALIQUA multa in semine varietates visuntur Pisi non secus atque Fabarum: nam prægrande quoddam in Belgiæ & Angliæ hortis colitur, angulosa & quadrata corporatura

STIRP IV M aduersaria noua. 397

tura ciceris maiore, mediocrem Fabam æquante, ferrugineo aut ruffo colore: nec tamen gustu distat: sed multum longius in denos, duodenosve pedes porrigitur: videntur hæc angulosa Plinij Pifa.

PISVM minus ex luteo virescens.

Ital. Piselli.

Propter corticem viridantem interioremq; medullam, oui luteo concolorem, certum est vocatum fuisse *ἄχρεον* id est, luteo pallidum, vt est terra Ochra: vnde etiam *λευκός* nomen superius dictum in maiore Pifo manauit: præterea autem commendatio in iurulentis, quia illico tenerescit, vtpote minores, pinguiore, deliciores, facilius elixantur, facilius concoquantur. Seruntur in agris, vbi minore cultu, nec fulcris agent.

PISVM Sylvestre.

IN Heluetia & superiore Germania, non secus ac Phaseolus sylvestris, obuiam se dant peregrè eunti, etiam sponte Pifa. Figura nõ ab simili, sed radice multò adultiore, fibroso ore, crassiore, & perenni, quales illic collectos, chartis inseruit noster Penius. Quidã in tuo vnus paginulæ rariorum stirpium libello, memorandum mirũq; quiddã affirmat: in faxis littoreis, nulla terra opertis, tantam tamq; portentosam segetem Pisorum sponte nulloq; satum enatam in Angliæ Suffolcia, inter Otfordum & Alburnum, etiã Autumno 1555 quantum satis, vt millibus hominibus suppeteret.

Pisum cordatum, sit ne potius ISOPYRVM, quàm Melanthij quedam species, aut Trifolium palustre?

Quoniam nomenclaturæ Isopyri atq; Phaseoli innuebant hæc plantam esse leguminũ naturæ affiné, aut similem saltem, non abs re solertes vestigatores trifolium Fabaceum, Phaseoli folium aquaticum, nobis commodiore loco memoratum, autumarunt verum Isopyrũ esse. Quod valdè simile vero esset, si vocula Anisi abesset: quæ obstat quò minus hæc aquatica Germanicè faba vocata, verè designationi satisfaciât. Desideratur namq; non tam Phaseoli *πένταλον* (quod nonnulli etiam folium interpretantur) in hac, quàm Anisi foliũ, quod quibusdam repetitum frustra, aut luxatæ lectioni Dioscoridis additum, opinantur. Qui verò vulgarem lectionem tuentur, quandam Melanthij speciem appingunt, nulla prorsum Phaseoli siue ortus, siue lineamenti similitudine: sed muta pictura, qualis Commentatoris est, vno aut altero Anisi ramulo, ad radicem Melanthij expresso. Quare si coniecturæ indulgendum & codici assentiendum, malim cuiusdam amici exercitatissimi amplecti sententiam, quæ Cor Indicum, ortũ, summitatibus & clauiculis Phaseoli, folijs verò Anisi diuisura, Isopyrum statuit. Suffragâte ipso fructu, quem ternum Melanthij colore & sapore Pisi, aut verè antiquæ Fabæ siue Phaseoli Sylvestris similitudine & magnitudine Halicacabi, folliculus claudit. Id Cordis aut Pyramidis effigiem media sui partè conspicuam refert, vnde Cor Indicum vulgo passim vocitatum, & notũ. Officinis propter folliculum haud admodum diuersum, nisi colore, ab Halicacabo, Halicacabũ peregrinum vocatur.

Ochris syl. siue ERVILIA.

Sylvestris indolis velutiq; degeneres à Pisis Ochrisq; Eruiiæ, quasi eruendæ & eijsciendæ dictæ, rarius nisi in hortis Septentrionaliũ herbariorum hodie seritur: iuxta tamen sepes, vias, in Linguagotia sponte reptat imbecillioribus vitiẽulis, membranula triplici aut duplici secundum longitudinem veluti pinnatis, ima folia oblongiora & latiora, in clauiculas desinentia ferentibus: superne vere foliola partim in plura & minora diuiduntur, partim etiam clauiculis donantur cãdidis, & interdũ purpureis, flore & siliqua Cicerculæ cui admodum similis.

Ll. j.

I. A.

LATHYRIS Norbonensis latiore folio.

Valde verisimile est à Lathyridis Cataputiæ granis quæ Orobinis similia seminula Dioscorides dicit, nomen factum Cicerculæ vocatæ, quæ hodie differentias duas habet ex agro Norbonensi allatas, vbi sponte frequentior erumpit ea, cui latiora superne acuta bina, neruosa per intervalla oriuntur folia, citu & imitatione auricularum lepusculi arrectarum, aut Bupleuri herbariorum,

Angustiore gramineo flore Lathyris.

Alteri in nudis ibidem enatæ folia admodum angusta, graminea, Venosa, & mucronata, è pediculo bina in tortiles capillaceasque clauiculas definente, Catanacæ ferè sunt: defluxis albidis & luteolis floribus succedit siliqua compresior, duplò breuior, latior superiore, vbi grana angulosa pusilla, Pisi aut Heruiliæ sapore.

ARACVS aut Cicera.

Quamuis distinxerit Galenus Aracum citra aspirationem scribendum, ab Arachæ aspiratione scribi solito, viciuq; & exitium quoddam istud posterius Lentiū & aliorū leguminū dixerit: tamen vtrumq; videtur ab indole sui cognati leguminis quasi in spiritum abiisse, vt de illis diximus, & in istis obseruamus: Est enim prorsum cognatus & similis, fortassis idem ille Aracus, quem quidam Cicerculam alteram volunt: nec abs re, cum eius grana sordidius nigricantia inter Pisa, Orobos, & Vicia pullulent, à quibus videntur degenerasse. Quod idem Columella affirmare videtur, quando nihil sapore, sed tantum colore à Cicercula dissidere, eoque Cicera vocari asserit. Ramosis è radice fibrosa prouoluitur calamis, flexilibus per longitudinem quasi teniolis membranulisue pinnatim angulosa: folijs Cicerculæ.

Est vbi luteo flore inuenerunt amici quidam, quem nisi Ochra viciu putant esse, vt steriles Auenæ, Lolium, Melampyrum, alijq; segetum morbi.

APHACA.

Mixta videtur hæc è Piso & Lenticula, vt cuius siliquam, semenq; simile est fortita: Pisi autem folia, caules & capreolos, longè exiliores quàm Lentis, cuius semen refert, sed minus, nigrius, durius, esu ingratius, siliqua non dissimili tamen, latiore, longiore: tennella sunt folia, ex aduerso bina, caulis geniculum Pisi modo amplexa, vnde exeruntur capreoli.

Terra GLANDES, sine PSEUDOAPIOS
Germanorum, an ASTRAGA.
LVS Diosc?

Leguminosa huius gentilitatis est bulbosa, quam Germani Swart Kettich, id est, Raphanum nigrum, & Sewbrot, id est, Suillum panem, Aker eychel & grund eychel, id est, Balanum terrestrem vocant, Spargit humi tres quatuorve ramulos in imo rubellos, Cicercis aut Pisi folio & clauiculis donatos, quibus, si adsint, proximas quasque plantas amplectitur: flores item purpurei Pisi sunt: & in siliquis paruis exiguum semen. Radices verò oblongæ oliuarum glandisue instar sunt, foris nigrae aut pullæ, intus albidæ, multis quasi traiectæ vel appensæ fibrosis loris, seu funiculis variè inuicem implexis, & latè fufis. Angliæ, Germaniæ, Galliæque Nortmaniæ Syluosis opacis, iuxta sepes: Norbonæ autem, Italiæ cæterisque æstuosis regionibus, non nisi in arduis & niuosis eruitur: cuiusmodi sunt illic Vegani montes & colles Martij Galloprovinciæ. Sapor illis subdulcis, glandis, aut Castaneæ astringens. Siccata multum durefcunt, vti Pæoniæ radices, nec minus solidæ sunt: nec minus contumaces tundendo (quas seruamus) quàm Thoræ glandule. In hanc veram & meram recensioem videant studiosi an possit quadrare Astragalus, cuius lectionem apud Dioscorid. luxatam esse ex Paulo perspicuum est, qui non Memphiticum sed Pheneum Astragalum legit, & Plinius idem confirmat: Ac tametsi descrip-

descriptionem dat paulum diuersam, nullam tamen facit mentionem; fortè quia iam tum in Dioscoride lectio deprauata erat; vel quia ex alio scriptore verterat. Ad hæc, Galenus & Aegineta, Astragalon paruum fruticem έχοντα τας εἰζας, astringentes, quasi plures, nec tamen Raphanum memorant. Quare, tanquam non in Dioscoridem, sed ab isto codice male acceptam animaduertamus hanc lectionis deprauationem, quipiam erit nobis audendum. Eapropter nos, ubi σεδνγυλη ὡς περ, εἰς φανος ὀνευμεγεθης, habetur, βάλανου: vnus literalè methatesi, & alterius caudicella sursum versus reposta, reponi vellemus: qui lubricus lapsus est amanuensibus: quum enim Glandulam, Ficum terre & talum vocarint Romani, Astragalum, non Raphanum, sed potius veram, nec huius nostri fortè disparem effigiem intellexerunt: nec solum talum, Ofsiculum lusorium Astragalon vocarunt Græci, quale referunt hæ radices, sed etiam flagra, nodulis, aut tuberculis asperata. Sic enim Μάξις ἀσπεργαλωτικής, scutica talosa seu nodosa fontibus cædendis apud Lucianum usurpatur. Hisce tamen ineptiusculis scholiis facilius quis obstrepet, quàm meliora subdet: Caterum candidus arbiter, minima quæque in Priscorum designationibus scit non esse seuerius exigenda: de Apio, quem quidam putarunt cum hac eundem, manifestum sit: Eam siquidem similem dicit Asphodelo, vt idem fecerat Theophrast. cum tamen vnico sit bulbo.

Erium Sylvestre Herbariorum sitne κατὰ νοῦν, siue amatoria, aut necessaria, non Bulbosa unguimilua Dioscoridis?

Q Vasi necessitate inconcussa & fatali adigeret ad amandum, Catanancem vocarunt, quasi amoris illicium necessarium; quia omnia vincit amor improbus. Eam autè neutiquam notam probè nostro æuo, minus mirum est, cum etiam si stirps de facie nota, & apud nos nata foret; tamen incertum adhuc esset, num verà esset censenda; nullis enim viribus, nisi præstigiis & Fascinatricis infantiæ, amatoriis illecebris commendatur, quas Thesalicæ tribades & lenæ prætexebant, fortè suis carminibus, vt hodie faciunt impuræ fordæ Italæ, verbulis abusæ nefariis ad insanum amorem conciliandum, quas vires attribuunt herbulis vulgatis. Idcirco Plinius, cuiusq; coæui cordati viri, consultò figuras harum tacerunt. Nec sanè eas nosse, vilius est operæpretiū: nec Dioscorides vires, sed historiam duntaxat alienam citat. Quodpiam genus leguminis fuisse hanc descriptio ostendit, cui non malè quadrat: ea herbula, quæ in hortis herbariorum Julio & Augusto, post flosculos Pisi delapsos, filiquas longiores, exiles, teretes fert, semine refertas rufascente: foliis angustis, gramineis, binos pollices longis, Lagopi angustifolii, quæ marcida, recuruaq; instar milui conuulsi cruris visuntur: radice exili, simplici. Visitur etiam in agris litorum maris Septentrionalis.

ALTERAM Ciceris semine, oliuam radice æquante, mali parui magnitudine, quæ vel adumbret, nullam nouimus plantā: rara namque admodum effigie oportet sit hæc: si descriptio vera est. Videtur persuasio hæc, deliri amoris conciliandi etiam nolenti volenti. à seminis pertusi mysterio hausta: quam si fas fuisset, nec nos ineptiæ piguisset; in Phyteumate, Leontopodio, & proximo Antyrrhini capite patefecissemus.

CICER satinum, arietinum Dioscoridis.

OFFICINARVM Cicer rubrum vbique in Italia, Germania, & Gallia feritur, & adeò noscitur, vt nullus nesciat iam esse antiquorum verum Arietinum, qui modò videat in filiqua tereti, & instar marsupiioli tumida, hirsuta, vnciā longa semina, Piso maiora; caput Arietinum frontata effigie, & angulo aliquantum mucronem æmulante: color albus quibusdam, quæ minus in medicamēta veniunt: alia obsoletè nigricant, plurima ex fusco purpurascunt, qualia efficaciora ad medica commoda habent officinæ. omnes: sementem & messē faciunt Itali, apud quos esitantur magna copia: folia Læti positu, medio neruulo hærent, tantillum crenata: flores purpurant punicanter.

CICER Orobaum Theoph. ab Orobo nigredine tantum distans.

Ll. ij.

DIE:

DIFICILE tamen sit statuere quodnam sit Dioscori. domesticum primum: nam nouū quod hic damus, tantopere simile est Norbornensium Orobo, siliqua præsertim, vt certos nos reddat esse illud quod dulcissimū & Eruo similitimū à Plinio dicitur: sed ambigimus iā, sit ne idem istud cum Diosc. satiuo: cui eundem fecit Orobū vulgatum & receptū officinis doctus & perbonus scriptor Dodonæus, qui nondum, hanc nouisset. Norbonē & Galloprovinciæ ple-riſque fatis per messes flauet hæc, culmo assurgēs sesquipedali, geniculato lateratim, quasi in obli- quū flexo, leuiter striato, fistuloso: foliolis in imo neruulo prolixo hærentibus, Lentis aut Araci: à medio itē ramulis donatur & foliatis pediculis: & iuxta summos alarū geniculos complures cō- fertæ siliquæ, vno fere exortu nixæ, sese tangūt & stipant, cylindrex, vnciam longæ, rectæ, teretes, inter transuersa pusilla interualla foras protuberantibus singulis quasi to- rulis, ternis & quaternis, articulatim distinctis: ipsa intus semina nulla membranula di- stincta, Pisum Arietinum fermè equant, obtusè triangula; Orobi duplo maiora, colore albida, pallida & subfula, non ingrati saporis, Ciceris aut Pisi.



O R O B V S receptus Herbarior.

RO B V S, color rubeus antiquis fuit, qualis in ruffis bobus, & Orobis cernitur. Ho- die nihil penè ab illo dudum dicto dissidet receptus in Officinis Italicis & Norbo- nēſib. Orobus semine & siliqua præsertim, nisi quia huius altero tātò minor est, cōpres- sior, nec vno loco, sed variis ex alarum geniculis, secundum summū & imum caulis ex- orta, pendula, alioqui terna & quaterna claudit semina Cicere minora multò, tangenti hebetius angulosa, & vno latere aliquantum acutiora, gustu lentis, folio & facie Pisi Lē- tis aut viciæ: ramosis sparsis luxuriantibus, caducis fere ramulis: minus tamen est πλω- νόκυλ. hic quam superiores duo, minúsque ingratus gustanti: nec enim nostro in- genio conuenit, stirpium vel figuras, vel qualitates plumbea Lesbíæve norma ad nostrā sententiam exigere, aut flectere, vt nimis multi faciunt: sanè par est alterutrum horum leguminum, verum esse Orobum, cum è tam multis nihil penitus similius occurrat, ori- tur hic affatim in glareosis.

CICER SYLVESTRE VERIVS.

VIRVIT hac ætate in horto Morgani quoddam Cicero parum adhuc notum è Sabau- dorum & Heluetiorum finibus huc accersitum, facie & siliqua Arietini Ciceris, quod eousque præfert, vt primo intuitu quilibet Cicero dicat: Siliqua quippe brevis, foliosa, compressior paulò: flores item purpurantes, non ab similes, sed semina multò minora, compressa & potius Lathyridis Cicerculæ: habitu tamen latior tota, latiusque plures ramosos alis & firmiores spargit culmos, cubitales & sesquicubitales: folia edentes Loti sylvestris fermè æqualia, Ciceris Arietini maiora, crassiora, rotundiora, & tantillum etiam crenata: Radice quotannis rediuiua. Quare non ab re quis coniectet istud Diosc. Sylue- stre esse.

CICER Sylvestre herbariorum aliud folliculis Coluteæ.

LO N G I V S adhuc videtur recedere à Dioscoridis sylvestri istud, quod caducis ra- mulis serpebat superiore anno in eodē hortulo, flexilibus gracilibus ramulis, propi- us Securidacæ minorem aut Lentem, quàm Cicero designantibus: & quidem floribus luteis pallentibus Lycoſtoni, cui folliculis penè par est, sed Coluteæ figura & Arietini Ci- ceris ritu vnà plures collecti, hirsuti, atri, referti perpusillo semine Sesameo, aut Geni- stellæ, duro, compresso, nitido, gustu Phascoli. Mathioli, huius suam picturam men- tionemque

STIRPVM aduersaria noua. 401

tionemq; ridicule inculcat in Indice, quod tamen non describit, quasi super eò nihil am-
bigendum esse nobis imperasset, vt alibi passim facit.

Φακός LENS.

{ Gall. Lentille.
{ Ger. & Belg. Linzen.

NVL LV M minus ambigua notitia legumen quam Lens, quam quod lenes æquanti-
mesque vespcentes efficeret, Plinio authore, sic dicebatur φακός autem Græcis ab
vtre qui fuit αἰσος metathesi & mutatione vnus elemēti. Facile de siliquula & granulo ro-
tundo, æquabili circinatione compresso, lagenulam effigiant, quilibet eam noscitet. Ca-
lidior solo, & sudo, siccoq; cælo proferi gaudet, vbi lætior, lautiorque quolibet legumine
habetur. Ei Ciceris syluestris siliquula compressior breuior, penè quadrata: vbi duæ vt plu-
rimum lentes insunt, sæpe Fulcæ & interdum albæ nigricantes. Foliola qualia hærent su-
pernè in Pilo: segete humi fusa & reptrice.

Βίκια VICIA.

{ Ger. Wicken.
{ Bel. Witsen.
{ Gall. Vesce.

A Vinciendo ducit Varro: malim tamen Βίκια esse, nempe lagenulæ effigie semē, quod
etiam ἀγκυρόν Attici vocabant. Nulla autem regio algidior calidiorue Vicia satina &
Syluestri vacat. Sentitur enim in subsidii Auenæ ad iumentorum pabulum. Siliquæ sunt
Genistæ: semina compressa Lentis, nigra, quina aut senna, præssè rotunda, ingrata gustu, nõ
dissimili Lentis aspectu, sed habitior tota: folijs maioribus Pisi Minoris aut Ciceris.

ΑΡΑCVS, siue Aracca & Cracca maior. Vicia syl.

{ Ger. Wild Wicken.
{ Belg. Droek.

Aed: quasi pestes perniciosæ; leguminosæ frugis dicunt vnde ἀράχιδι & Craccæ, vecijs in-
satis associantur, & valde assimilantur: siquidem in vna quasi γάρχη siue spinula aut dor-
sulo insit veluti plumatim in alē modum foliola perquam exigua è viticulis, multò quam
Viciæ aut Lentis exilioribus, luxtaq; alas Viciæ ritu & similitudine, flores purpura diluti-
us rubent. Siliquulæ longiusculæ Catanæ propior est, vbi senna aut septena semina rotun-
da nigricant, penè Raphani: non autem compressa vt Viciæ & Aphacæ, qua quilibet eam
discernere valeat.

ΑΡΑΧVΣ siue Cracca minima.

Nimisquam exilis & penè capillacea hæc tum viticulis, tum foliolis iisdem, dispo-
sitis Lētis modo, sed delicatioribus & angustioribus multò: perpusillæ siliquulæ
pediculo, non caule ipso vt superior subnixa & quaternis intus granulis nigricantibus, ro-
tundis Rapi aut Brassicæ inclusis, florum apiculis pallidulis.

ΗΕΔΙΣΑΡVΜ, siue SECVRIDACA maior & minor.

ANcipitis Securiculæ gmulò semini fertur accepta πελεκύσσο siue Securidaca vox quanti-
etiam ἀλυσταγοῦ ob suaueolentiam vocarunt. Ea in aruis & segetibus quas rapidi tor-
rentes ex Alpibus Taurinis præcipiti alluione, plerumque vastant, & ad Cenacium via,
satis multa oritur, leguminisq; modo serpit & fertilitate restibili sese reparat, foliolis Len-
tis vel Astragali maioribus, procurrētibus viticulis & floribus Ciceris purpureis: siliquæ
hærēt, humi item stratæ, compressæ rostellis aduncis, quætæ Fœnugræci seminis & simili-
tudine, sed cōpressiores vtrinq; & angulosā aciem Securis effigiant radice leguminosa
fibrosa, sapor amaricans & Lupini fermè odor fœnugræci vel Meliloti, cuius commenda-
tione Myropolē nomen dedisse Hedisarū videntur. Vtebantur fortè tunc non secus
Ll. iij. atq;

atq; veneti suffitores, quâq; Meliotti ad Chyrotechas aliâq; fragrantia grata imbuêda, multum vtuntur.

Securidaca minor.

*ASTRAGA-
lus Monspel.*

Legumen illud multo minoribus viticulis, folijs & floribus purpureis exiens, è peciolis quina & sena cornicula introuersus falcata habens, mucronibus reflexis infernè cōiuncta, & duplici intus serie digestū semen, subrotundum, subfuluū, est similis Galegæ vel Araci quàm Securidacæ. Idcirco præceptores nostri Mōspellienses huius speciem esse inficiabantur: Inibi quippe & cæteris Norbonæ Frontignanæq; aridis, glareosis, maritimis totū viret annum radicēsq; complures profundè merfas, prolixo implexu spargit. gustu leguminoso, nec perinde vt Securidaca, amaro. Eapropter Astragalo propiorem astruebant, quò nos etiam referendam duxissemus, nisi Raphani bene magni radix illi & astrictoria, cætereq; facultates ad vlcera deessent. Quare vniuersas stirpium gentilitates animo voluenti, nulla quæ explendæ descriptioni satis sit, vsipiam sese dat. Non ea, quam in collibus Lugdunensibus prope Trenon, & in horto Patauino floribus purpureis & folijs similibus ciceri, sed gracilioribus, vidimus. Radix certè dissuadet, nam Senensi herbariorum Dictatori, licuit pictoris opera ad quiduis lubitum fuit, alludere & nobis illudere, ideò nunc illum illius picturæ postremò puduit.

GLAUX vulgaris.

De colore foliorum, quæ aduersa spectarentur glauca siue pallentia, χλωρὰ dicit Diosc. nomen huic ascitum fuit. Fruticat autem ramulis, bicubitalibus vimineis, flexis, sparsis, stratis, rotundis, gracilibus, lignosis, bina crebrâq; foliorū serie, à radice crassioribus & duris, & intortis propaginibus procurren- te, quasi Arthemisiæ: cernuntur folia cæcio virore supernè, auersa verò pallore glauco, Cythisi maiora multò, Fabæ, situ & crassitie propiora: purpurascunt flores extremis ramulis Galegæ. Siliquis tamè multo maioribus, crassioribus, quæ per menses maturæ dehiscunt in binas vaginulas semine plenas, colore, sapore & odore leguminoso, cuiusmodi tota planta: quæ tamen proceritate speciosior multòq; maior est, quàm vt Glaux prodita videatur: multa in Belgio. Ex Angliâ nos litoris, item mediterraneis procul mari, Londini Serendam curauimus.

GLAVCA vel Glaux, quadam leguminosa herbariorum, floribus purpureis.

Vxta agrorum viarūq; margines obuiam sese dat in Francia, Anglia, & Belgio hæc, caule rotundo pedali, radici exili, singulari nitente, à qua statim folia erumpūt Ocyroidis aut halimi, albida, Glauca, oblonga: è medio autem caule aliqua multa exeunt minora & minutim Lentis modo aut Viciæ diuisa. In summo caule pallido, conspicui flauent aut panicant flores, congesti in glomerulū, ex calyculis multis conflatum, obsidentibus squamosis folliculis, acerosiſq; veluti glumis, vbi semen. Tota plāta læto aspectu.

Caput Gallinaceum Belgarum, an Onobrychis Diosc?

Quasi sursum vnâ cum scaturiginibus erumperet ἀνὰ βρύχην ονοβρυχίς dicta, circa nam que fontes oritur. Non labor, non herbæ defuere complures, quæ se nobis obtruderent, quasi legitimæ forent: quas tamen omnes respuimus, propter vnâ aut alteram quæ propius Diosc. descriptionē, tametsi valde ieiunam & parum signatâ, accedere visæ sunt. Harum notior Galega riparum & viginosi foli alumna, nō perperam putaretur, ni folia multo maiora essent, lentis, procerioresq; caules, quæ excessum, (nam tota facies leguminosa, flos & vires perbellè suffragantur) si quis obijciat, similia collata in Cappare cū malo Cytonio, & cætera componat. Et interim, dum ille nosq; melius quid vestigamus, hanc iam describendam habeat, vt rariorē ita minorem & multo figuræ propiorem: quam in hortis Belgicis colunt herbarij, è radice parua fibrosa, cauliculos pedales, exiles habet, & folia lentis angustiora, aliquantò longiora, sine capreolis: in cymis, teneris, Galegæ flosculos, purpureos, dilutos, albedine mixta gestant. Quibus per æstatem marcescentibus, quibus

quibus filiquulam pro semine, casside, cristata insignitam, spinulis muricam, quadantenus Tribuli terrestris, ostentat. Eruditus Coldenbergius nos semine primus docuit, atq; in Hollandiæ & Zelandiæ aggeribus & littoreis aduersum maris alluiones & procursus erectis repagulis, nasci sponte monuit. MonsPELLIJ in hortis enatam habuimus.

ORNITOPODIUM, siue Pes auis.

SCi tam vocem aptarunt isti legumini Docti recentiores, ad huius herbulæ filiquas, pedem auis effigiantes describendum: constant quippe vni pediculo nixæ, quaternæ aut quinæ, expansæ mucronatæ, quasi stillis aduncis, articulatis, curuatis, in pedis auis æmulatione: palmæ & sesquipalmæ sūt viticuli, sparsi humi foliolis Araci minoris: flosculi melini Coronatæ Meliloti.

Varitas.

Quàm elegans hæc varietas quam pictam damus: Oritur in marginosis herbis Grinwicij Regiæ, ad Tamesim flumē, nō procul Lōdino: vix tota binos aut ternos superat pollices: ramulis in terram sparsis, exilioribus & crebrioribus, venustius ordine positis quàm superior: quæ non alijs ab ista natalibus gaudet.

Perpusillam Ornithopodium.



SFERRO Cauallo, Ferrum Equinum.

PLanta etiam leguminosæ familiæ est hæc, cuius filiqua multū mirationis excitauit istis nomenclatoribus, qui Sferro Cauallo, id est soleam equorum refringentem fabulati sūt. Nam nobis experiri nō auidis, magna copia reperta propè Massileam, frustra sæpius factum fuit periculum: etiam via quæ ad prædium Rondelletij mareq; ducit, ad dexteram, propè rusculum in squallidis dumetis & marginibus plurima gliscebant, ætate minus torrida. Siliqua affabrè plantam hanc à tribulo terrestris, Scorpioides leguminosa, & Ornithopodio, quibus alioquin foliolis albidis, & comptis similis est, discernit. Flores item pusilli, lutei: intrò nonnihil compressæ filiquæ, veluti securiculata, vndosa & semicirculis sinuata acie, ternis aut quaternis equinæ soleæ vestigijs continua & distincta spectantur, seminulis soleam, equinam effigiantibus, aut dimidiatam lunam, vnde illi quidam nomen Lunariæ affinxerunt: gustu leguminosa, radice Londini hortis viuaci.

SCORPIOIDES leguminosa.

EST & alia nec minus venusta aut rara, segetū Norbonensium alumna: Radice nittitur fibrillis multis, cauliculos rectos, graciles, binos aut ternos, pedales & sesquipalmæ erigente: quorum in summo, admodū incuruis mucronibus adunca cornicula, Fœnugræci rotundiora, graciliora insunt, introflexas Scorpionum caudicellas, transuersis articulis & argutulis hirs imitata. Flosculi pusilli lutei, alterius Scorpionidis: Foliola Ornithopodij, aut Tribuli exiliora, ab imo statim cespitem, in neruulis vtrinque ordine sita.



TRIBVLVS terrestris.

Ll. iij.

Soliti

Soliti erāt projicere hosti murices infestis aculeis armatos: quos quia protererētur τριβυλλοῦς nominabant: vnde huic filiquæ plantæq; muricatæ Tribuli nomen. Videas præterentes puluerulentas & sabulosas planities maritimas Adriatici, Thyreni & Gallici Mediterranei, isto terrestri & minori Tribulo itineranti, exutis præsertim calceis, infestas & prope modum inperuias. Mōspelij etiam aridis & oliuetis serpit, aspectu liguminofo Ciceris, ramulis compluribus exilibus, gemino foliorum versu refertis, nō Portulacæ, sed Lentis vel Araci: eoque labeculam in Adrachne suspicamur, & legere Arachi δαοῖα aptius rei veritati ducimus, id est Viciæ, vt indicio ipsamet est plāta. Pusillos flosculos luteolos, in pediculis ex alis exeuntibus, vbi emergunt infestis aculeis rigidiusculis, sexanguli, quinquamgulivæ murices, medullam & semen ostēdentes, per maturitatem & ætatem dehiscētes, radice parua, fibrosa nec altē depacta, nullius hodie fermē commodi, nisi Asinis, quibus pabulum illic est. Commentatoris Senensis solitam sedulitatem duo testātur Tribuli: alter qui iam nobis dictus. Hunc Doct. aī Guino Pisano dono acceptū quasi in Italia præsertim Venetijs, rarum foret, dicit: alterum Dioscoridis folijs portulacæ sibi in D. Nicolai ædis Veneto littore visum, quam eius sanē non vulgarem cognitionem & in stirpi inquisitione operam positam, quidam peritus locorum illorum & herbarū Italus facetus sic nobis exponebat: Commentatorem inquires nunquam nisi aridum aut pictum vidisse vulgatissimum Tribulum, eōq; describere nesciuisse: deinde Crithmum seu portulacam marinam illic frequentem, pro Tribulo Portulacæ folijs accepisse: non tamē describere ausum: forsan quia nullus extabat author aquo descriptionem subriperet. Postremū esse in Lio Vēhetæ insula fabuletis, cuius Pharmacopœorum notissimum terrestrem, eōq; minimē Pisis accersendum.

ASTRAGALI per similes palmaris pusilla planta.

QVm peregre essemus in collibus quibusdam Galloprovinciæ, hanc sublegimus elegantia neutiquam spectatu indignam: radicibus namque prorepat lignosis, implexis, corticosis, denso exortu, numerosos cauliculos, fruticantes, duros, sed breues, vix binas aut ternas uncias excedentes, & foliola emittentes pusilla Lentis, Astragali, aut potius Tragacanthæ, quam tota refert rigidiuscula, incana hirsutie: flosculis, luteolis, aut albidis, Ornitopodij: gustu præsicco & æquē duro.



POLYGONIVM Herniariæ folijs & facie, per amplam radicem Astragaliti.

Nec hæc despectui futura erit discendi cupidis: Est enim perquam parum nota, perpusilla quidē herbula, & humi accumbens cespiti semi mersa, ramulis creberrimē geniculatis: foliolis & seminulis albidis, prorsum Herniariæ: tota incana, quā mexiguo, muscoso flore. Radice ampliore quā pro plantæ modo, dura, surculosa, implexa, & in se reticulatim conuoluta, auulsu difficilis: gustu præsicco, callidiuscula. In fusissima Crete salonenfis Galloprovinciæ planitie, media via inter Aralacē, & Solonam ad diuersorium D. Martini.



STIRPIVM aduersaria noua

405

HELIANTHES species rara, figura leguminosa, floribus aureis.

NON perinde formosam iconem hanc, atque natia facie dono misit nobis hanc noster industrius & peritus Pharmacopœus Iacobus Raynaudet, quam è iugis arduis montis D. Bonauenturę, non procul Aquisextiis eruerat: Radice lignosâ fruticulâ, ceruicem paulum inflexam habente, supernè & infernè nodosam, è qua emergunt viticuli palmares iunicei, recti, flexiles albidii, foliolis Lentis aut Coluteę Scorpioidis ex glauco virentibus, ab imo summo tenus stipati: floribus aureis & calyculis Helianthes vulgaris: semine item non dispari, pusillo Cisti Ledi, amaro gustu.




GLYCYRRHIZA Echinata & siliquosa.

SI qua est sterilis Glycyrrhiza, vt Math. sibi re vera certū esse auditione postremis cōmentariis prodit, tres forent Glycyrrhizę species; nobis tamē quot de facie notę, tot frugiferę sunt. Ac primum Dios. dulcis radix notā & culta variis locis, etiā horridioribus, vt Germania & Belgicę, fructū fert vaginulis muricatis Caucalidis emulis, denis aut quindenis, vno imo apice hærentib. & in orbē sese explicatibus, eminus intuēti quadantenus Platani Echinum eminentib. proceritate interdū assequitur, quanta proceri est hominis. Radix, nō vt alterius numerosa passim & fusè humi sparsa, sed recta, altè depacta, aded vt quātum humo mergitur radix, tantum solo extent caules: singlis vaginulis vnū dūtaxat semē rufum lentis effigie inest. Huius vsus officinis rarior hodie; quippe, seu arida seu recens, vt nos periculū sepe fecimus, lōge vulgata dulcedine & gratia vincitur, eōq; tantū voluptatis causa colitur.

Communis verò nulli nō nota, quę ex Hispaniis Londinum; Antuerpiam & Lugdunum defertur, & vili ubiq; locorū distrahitur, non paucis Gallię Norbonensis locis multum sponte oritur, etiā prope Latera oppidū, cuius meminit Plinius, Mōspellio leuca. i. dissitum: radicibus, flexilibus, multis implexis, caule & foliis pinguibus, & dum eam euelleremus manū glutine inficientibus, floribus purpureis albicantibus; mense Iunio & Iulio siliquas fert paruas Cicerulę magnitudine. Cuius radix nuper ex Hispaniis aduecta & hortis Pharmacopœorum depacta, faciliè succrescit & reuinit.

COLUTEÆ Scorpioides

SOLERTIS ingenii præceptor Ron-delletius nō raro ratus fuit Glycyrrhizam minorem nuncupandam esse plantam locis multis nemorosis interbuxos erumpētem, Iunio & Iulio: floribus Coluteę, vel genistę, minoribus: folio itidem Coluteę paulo minore: caulis similis est, gracilior: radix buxæ minus dulcis, aut potius dulci-amara dicenda, & minus grata: siliquę Math. Scorpioidi vsqueaq; similes, vnde vocatur nonnullis Colutea Scorpioides. Norbonę copiosa in valena sylua & prope fluminis crepidines cis Lanum.



VALE.

Glycyrrhiza spiciuosa Anthiashena. VALERANDVS Donrez Pharmacopœus Lugdunensis plantarum rariorum vt quis alius studiosus & peritus, cui certò fidimus, siliquas paruas genistæ, aut acatiæ, sed minores, secundæ nobis dedit, semine exiguo Genistellæ: hanc Antiochenam à loco, Glycyrrhizam à similitudine & spinis, quibus donata erat, faciebat. Sed nihil nisi siliquas vidimus, eoque nihil dum asserimus.

Arabum & Actuarii SEN Asiatica & syluest.

SENO & magno ægotantium incommodo innotuit Græcis Sena, quam vnâ & appellationem Arabibus debemus: Albafemer vocant illi, vnde detortum Sena. Hac autem hodie nullum purgans frequentius, tutius, aut præstantius est. Ea herba, æstiuæ & parua est, vul tu, leguminoso Securidacæ, Glycyrrhizæ, aut Coluteæ: In Liguria, Thuscæ, Romani agri & Appuliæ variis locis, legitur Autumno, nec feritur ante Maiû, quia frigoris impatiens; eoque hortis Septentrionû vix trimestre viuit, nec promit, nec maturat flores vel siliquas. Quare Officinæ potius è fundo vernaculo, nempe Orientis emporiis, petunt, plurisq; faciunt, quam istam aut Italicam: duas enim foliorum differentias, aut varietates habent insitiores è diuersis plantis Senæ: probatius folium & laudatius ad purgationes (finum vocant) est oblongius, acutius, Myrthi maioris effigie: alterum rotundius, breuius, quod vilius habetur: quare non secus atque Myrthus maior & minor, foliis videntur hæc duo inter se distare, vt præstantius folium sit Domestica; alterum syluestris Senæ: duas itidem Mesuæ agnoscit: & ad persuadendum alterutram earum esse syluestrem, multum spirilli pilulæue stercoreis caprini aut ouini faciunt, quæ frequens inter Senæ Orientalis, folia, folliculos & quisquilias passim apud nos allata reperiuntur, vbi empturis prostant; feritur namque & adolescit probator in fineto ouillo inibi: alioquin vtrique siliqua est effigie Coluteæ, compressa, vt Arboris Iudæ, sed falculæ in modum connexa, fusca aliquot serie digesta semina, Gygartis similima, compressiora, claudens. Flores ex pallido lutei sunt, rubellis vestigiis venosi: graciles caules Meliloti, pedem & sesquipedem alti: ingratiuscula tota gustanti, tantillum amara, calida & sicca: tametsi veluti sænugræco affinia, mucaginosum reddunt mandendo sputuma: folia, quibus ad purgandum consultius semper, quæ flatum discutient & nonnihil lubricent, adduntur, quam si per se, puluere infuso aut decocto, dentur: Sic enim turbarum multum cingere, & intestina, stomachumque torquere, vel plebecula conqueritur. Eapropter qui aduersum Mesuem tuetur non esse corrigenda, imò siccitate sua atque quadam alstrictione ventriculum iuuare, nescit quid commentetur: nã sic Brassicæ marinæ, Thymelææ & Chamæleæ siccitas, stomachum iuuaret, quem tamen lædunt illo viroso odore, & purgatriæ qualitate, à qua non longè absunt folia Senæ, vt dum virent adhuc, aut macerantur, odoramur. Proinde ritè Mesuæ folliculos tutius purgare monet: nèpe membranei sunt, minùsq; flatulenta semina, quàm folia: sed hæc plus mouent, præsertim infusa, quàm decocta; quia ebulliendo nonnihil virium absumitur & flatus dissipatur: vt vsus ipse castigare valeat illum Commemoratorem, qui nihil addendum ad eius noxam corrigendam autumat. Sed hæc explicatius in remediis.

COLUTEA Gallis, Baguenaudrier.

PVTATVR Colutea dicta, quod mutilati effractiue eius stipites aut virgultæ (nò præscisa) intereant, vt Theoph. autor. Tanta autè inest foliorum & siliquarum parilitas Coluteæ cum Sena, vt plerique non ineruditi Senam syluestrem hanc esse vulgo persuaferint: at Colutea cum Theophrasto arboreseat, nobis autem frutescat, Rhamno penè par; nec herba vt Sena sit, iam quilibet potest à Sena eam discernere & discere: quippe folia colore, situ, magnitudine, & superficie Senæ, Hedisari, aut superioris Coluteæ Scorpioidis, paulò antè dictæ sunt, floribus item luteis, nec disparibus: Folliculi veluti membranæ vesiculæ, teretes: quæ flatu turgent, & tactæ, strepitum edendo crepant: semine intus hærente Lëtis (nò Gygarti) minore gustu, leguminoso. Augusto siliquam maturat, vbi spontaneus arbutus est, in Linguagotiæ iisdem saxosis sterilibus ad Frontignanam, quibus Chamæiridem oriri monebamus: sed ea etiam vulgatior hortis Galliæ, Germaniæ, Italiæ, & Angliæ: nuspiam tamen arbor magna futura: eapropter apud Theophrastum satius legeretur, ἀένδρον μὲν μέγα, δὲς, non ἐν μέγας, nempe arbor non ita magna, siue arbuscula: quod ex consequutione paulò

paulò pòst inferunt verba Theophrasti: $\sigma\chi\iota\sigma\tau\alpha\iota\ \kappa\alpha\iota\ \alpha\pi\tau\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\sigma\sigma\tau\alpha\iota$ id est, finditur, siue diuaticatur in ramos, et arborefcit: non igitur initio arborem esse, sed arborefcere dicit, qui ortus & adolefcencia planè conuenit nostrati Coluteæ.

Spartium, Genista scoparia vulgi.

Genistella infectoria, an Lutea Pl?

Hippospartium, vulgo Rapum Genista

Spartium Dioscorideum Hispanicum

Spartium minus, vulgo Elpho Hispanica

Genistella Graminea montana.

Spartion fruticosum aphyllon, iuncea aculeis lanatis

Genistella aculeata.

Genista Spartium spinosum maius

Acacia secunda.

Acacia Aegyptia.

Fraxinella siue Dictamnus albus Offici: an Tragium Diosc. facie & foliis Lentisci?

SPARTIVM. Genista scoparia vulgi.

VVLGATISSIMÆ notitiæ & vtilitatis Spartium vbiuis gentium fermè antiquis Gall. Genest. semper fuit, vt etiamnum est. Sic vocatum, quia vinciendo, nectendo, adeoque tendo, fili, lorivæ vices exleret: sonat enim Spartium funiculum vel lorulum: Genistam indidem à genui flexilitate deducunt nonnulli, quæ duntaxat species Sparti dici potest. Est autem hæc omnium notissima tum apud Boreos tum Meridionales, sterilibus præfertim, arenosis, montosis, frigidioribus, Vargis fruticat densè pullulâtibus, hominis proceritate interdù superantibus, rectis, gracilibus, striatis, duris, sed flexilibus: per interualla foliola numerosa promès, Hyperici, nigriora, minora, abundeq; luteorum florum suauè olentium Pisi, post quos falcata effigie, siliquas Iunio & Iulio maturat, seminis atri lucidi plenas, Lenticulæ similes, quo vomitum, non secus ac Spartio Dioscoridis, sapius duarum vnciarum decocto propinato, citra magnam contentionem mouimus. Verum flores recens decerptos sapissimè quàmplurimos, & per se acetariis inditos vorat Plebecula Auerniæ & Aquitaniæ, maxima copia, innocuos non modò, sed etiam admodum gustu suauès: nec quicquam vomitionis nausææ vilius aut comotionis mouere solitos. Quin apud Brabantios gèmanes condiuntur sale & aceto flores, mensisque inferuntur, capparum olearumve pari commendatione: credùtur etenim non modò cordi vires, stomacho appetitum alere, sed etiam obstructions referare, calculum frangere. Id circo falluntur, falluntq; qui hosce flores vomitioni mouendæ officinis siccandos præcipiunt, rati istam genistam, esse Dioscoridis Ellebori subpar deiectionum Spartium. Quantumvis enim feminis incoheris, vix aliusmodi vomitionem moueris, quàm quæ communibus emeticis Raphano, ficu vel oleo cientur: nec enim deiectione insigni, sed tantum leuiore conatu excludant, qui hauserunt.

Vulgi GENISTELLA infectoria, an Lutea Pl?

VEgeto & perquam hilari florum luteo, micantium thyrsulis crebribus editiora præta ornat copiosissima hæc, instar Lini segetis æstiuæ: nec vspiam frequentior quàm Taurinis, Pedemontanis, & Angliæ occiduæ. Virgultis rectis, pedalibus & sesquipedalibus densè fruticat Lynariæ folio, & flore concolori, sed Genistæ similiore, minore siliqua & semine, amaricante gustu tota: Lanarum infectoribus expetita, sed vt proceritate, sic virium efficacia Sparti superatur.

Herbariorum RAPVM Genista, siue Hippospartium, & $\phi\upsilon\lambda\lambda\omicron\upsilon$, floribus galeatis Tragorchidis.

RAdicibus Genistæ & Genistellæ adnascitur quasi soboles spuria, sed specie visenda & raritate, excrementum Rapum Genistæ vocatù, non absimile ortu, concretu, incremento, caule, & effigie Hyppochistidi vel Orobanche. Quod magnis votis & peregrinationibus Chymistæ Maio mense venantur ad vtriusq; Genistæ radices, sublectos teneriores asparagos, cum radicibus siue appendicibus à Genista auellendis alembico indut. Indeque igne oleum eliciunt ad calculosos perquam celebre. Id auulsumus in Flâdriæ, Galliæ, & Angliæ locis maiore Genista scatentibus, alioqui frustra quesitù & diu alibi. At Sabaudia

& Pedemontanis colles, paruæ Genistæ feracissimi, etiam istud copiosum fundunt.

SPARTIVM *Dioscorideum, Hispanicum & Norbonense,*
vimineum manus.

Et iam adductis moxq; adducendis Spartio congeneribus plantis, nulla propius explet Dioscoridei notionem, paucifolio frutice, siliqua & semine, quàm ista. Quæ Hispanijs & Norbonensibus, præsertim maritimis, vel nō procul à litoribus, vt in Grammuntia Sylua MonsPELLIJ, & vicinis collibus, passim obuia fit. Etiam Taurino finitimis, & in Prouincia nobis visam monuimus. Stipite eadem maiore & lignosiore adolefcit in Angliæ, Belgiæ, & Galliæ hortis, ramorum propagine arborefcens, virgas multas fundentes, rectas, glabras, iuceas, nec striatas, vt Genistæ, sed vimineas, flexiles, & sequaces: quibus foliola insunt adeo exilia, vt iam marcida facta in suis natalitijs æstuosis, nulla prorsum extitisse videantur, maxima anni vertentis parte: Quod illic obseruauimus vsu venire *Sferro Cavallo* dictæ folijs, & ei nouæ plantæ, quam Iuncum asperorum cliuorum vocat illic Aphyllon Scola MōPELLIACA. Quò factum, vt Dioscoridi tantilla res aut non fuerit curæ, aut non animaduersa. Siliqua, semē, & flores, prorsum sunt Genistæ, sed maiora, & efficaciora: cuius modi vult Dioscorides & Mesuæ, qui à duabus ad 5. drach. florū, dandas vomituris imperat: seminis verò, à duabus ad quatuor. Quum tamē Genistæ vulgaris flores plenos discos multi in acetarijs ex multo oleo vorent, nec quicquam nause ēt: & seminis tripla aut quadrupla dosi, opus sit vomituro etiam puero. Vnde liquet nō Genistæ, sed huius semina & flores in officinis habenda, vtpote legitimi Sparthi, cuius ne pictam quidem effigiem, nedum viuam stirpem, videtur intuitus Commentator insulsus balbutor, quem miseræ si puduit recantationis, cur non piguit etiam calumniæ Mesuæ inusta, qui Lentis semē dixerit esse Genistæ, sequutus Dioscoridem. Hunc tamen se nunc postremò antequam sua alia agnosceret errata, sibi sedulò perlectum profitetur iste Senensis, qui vitio præ ambitionis caligans, non respexit ad Viciæ, Erui, & Genistæ semina, lippis & tonforibus nota.

SPARTIVM *vulgo Elpho Hispanica Iuncea, nautica, vulgi Funi-*
spartion, an Linospartion Antiquorum?

Litoribus Mediterranei maris vtrisque Africa & Hispaniæ hæc non minus frequens quā nota, ac ingenti copia deuehi solita Antuerpiam, Massileā, Genuamq; ad corbes, stragula, atq; trirremium nauiumq; rudentes peraccomoda. Virgultis iunceis, gracilioribus, durioribus, glabris, ex viridi pullis, multis, rectis, flexilitate Lini duriorē, radice simplici, exili, exit: semen & flores eiusdē Antuerpiæ satæ in viridario optimi Pharmacopœi Gulielmi Driesch non meminimus: certum tamen habemus, nonnulla, sed tantilla habuisse foliola, delicatiora, vt tota planta fuerit iuncea, cubitalis, & fermē textrinæ apta sportularum, quas adhuc vocant *Sportols*, nempe ab Spartio dictas, quò minus dubitamus esse speciem veri Sparti.

GENISTELLA *Graminea Montana.*

Sparteæ & hæc herbula est, & paucis duntaxat montium celsiorum conuallibus aridis obuia, vt Calcari montis Norbonensis, propter Cœnobium: in Germaniæ etiam arduis multo longiore spargens culmos vtplurimum sesquipalmares, graciles, spartos, enodes quibus summis singulis spica mollicella, tométosa, Lagopij quadantenus, sed minor flauet: aliquot fibrillis radicatur: indidem erumpentibus gracilibus foliolis, palmum altis & sesquipalmū articulatim veluti geniculatis, per spat-




STIRPVM aduersaria noua.

409

spatiola & commissuras insecti, ea videre est virentia et iamnum Londini.

SPARTIVM aphyllon fruticosum,
lunceis aculeis, lanatis capitulis.

ET inuentu minus frequēs hic asperioribus præruptisque decliuibus Alpium Magdalene in Galloprovincia fruticellus, latiusculè in latera, aliquot sparteos striatos, ex pullo buxeos è radice Tragacanthæ prolixiore, lignosos, & sesquipediales furculos spargit; nullis foliis, sed multis fenticosis, rigidis stilis pungētibus, iunceis, aduncis in summo tantum: quibus singulis aduoluūt fastigiola, tomentaceæ gemmule Vitis, minores, sed concolores, partim longiusculæ & incuruæ, partim breuiusculæ: nullum folium, florēme vidimus; gustus perparum amaricantis, exsiccantis, astringentis.



GENISTELLA aquileata.

EX VCTI colles, squalidæque Angliæ & Belgiæ ericeta hanc plantam abundè dant: Eradice exigua, virgas graciles, rectas, complures, spinulis infestas submittentem; quibus foliola Thymi vel Ericæ, flores luteo pallentes, Genistæ minores: etiamque breuiore rotundiorēque siliqua, & semine Erui subrufo: Hac penè carere videtur adhuc Italia & Norbonna. Et hortis negligitur.

GENISTA, SPARTIVM spinosum maius.
Belgis. Batpeldoren. Ang. Brike Browme.

PRORSVM cognata Genistæ hæc, sed admodum aspectu horrida, sentibus præduris, innumeris, cancellatim armata, semper virētibus, striatis, lignosis virgultis, sparteis, spinis penè folia occultentibus. Quare Doctiorum nonnullis placuit Nepam esse aut Scorpion: sed penè folia occultentibus. Quare Doctiorum nonnullis placuit Nepam esse aut Scorpion: sed obstant siliquæ genistæ aliquantum breuiiores, & flores non absimiles, concolores, & eiusdē saporis, qui particulatim emicant aurei tota æstate, etiamque hyeme in Angliæ, vbi frequentissima in sterilibus & ericetis, in Prouincia item Norbonensi penè par proceritate. Sed Monspelli ad Lanum, in saxosis collibus triplo minor, rigidior, & squalidior est, adeo vt parum Genistam representet, foliis ternis Rutæ. Illic Spalathum vulgo opinabantur & vocabant plerique omnes, tametsi inodora & funis instar pertinax frangendo sit: floribus quidam lubentes ad isterum viridem vtuntur, & toto cremio calfaciunt furnos.

Monspelliensis.
& Anglic. Aspalathus secunda.

Spina ACATIAE Dioscorid. prima, frutex arborecens, leguminosus Lentisfolius,
Siliqua torulis Lupini effigie distincta, plurimum bigrana, aut trigrana, cuius GYMNI ARABICVM.

FRVTICI huic arborecanti Egyptiæ nomē Græcum additū ab ἀκᾶζα verbo, id est, acuo, vnde Acatia, quasi acuta. Septimus iam agitur annus cum huius Venetos, Patauinos, nosq; certiores fecit Medicus & peritus Pharmacopœus Sequinus Martinellus, missis è Syria siliquarum fassis plenis Alberto Martinello fratri suo, perquam sedulo & erudito Pharmacopœo, ad Angeli symbolum: ex quo semine in horto Patauino aliisque quàm plurimis Venetorum locis sato, orta est ista Acatia, cuius siliqua penes nos est, accepitq; noster Morganus plantam nuper ex maris Occidui Insulis Perunianis, ne quis putet peculiarem Egypto aut Arabiæ. In neruulis prælongis foliola sunt Scorpioidis leguminosæ, aut Sferro Canallo, in toto virgulto gracili, aliquot rigidis spinis in furculis exertis. Seminis tota siliqua non maior vno alterove Lupino simul iunctis, sed suis alueolis distincta. Quare ridiculam nobis

SPINA ARABICA Egineta.

SPINA ARABICA Dioscor. in Carduus.

M m. i.

dedit

dedit Acatiam Senensis, cui si spinas demas, arborem Iudæi iudices, & merito suspicere spinas non naturę, sed pictoris aut Cōmentatoris commentum fuisse: nec huius siliquę, siue Lobi sunt Lupini similes, sed Genistę duplō latiores, vt Senę compressę. Et Plinio cuiuslibet Acatię semen lenticulę est, equidem minore grano & folliculo. Quam orbem nostra hęc propior, illa verō Cerēcis arbor erit, quam ille, nec cogitans relatu Oratoris exquisitijs delineat.

ACATIA ALTERA Diosco. notior Europea, folio Cytisi facie
& siliquis Genistę sparti spinosę.

CONFIRMAT etiam superiorem spinam Acatiam altera hęc quam illi assimilat Dioscori. foliis Rutę aut Cytisi ternis: siliqua Genistellę, aut vulgaris Glycyrrhizę nouaculam effigiat dorso obtusiore, & altero latere, quasi acie acutiore, tria aut quatuor Genistellę etiam semina dura claudit: quę nondum matura flauent, postea nigricant, similiter Spartio effigie & parilitate magnę spinosę Genistę, non arboris, vbi quidā deceperunt Mathiolū, qui æquę incertus vt in superiore, illam quam candidus scriptor Anguillara dat, & tamen fidem illi abnegat, eandem ipse ridiculę asserit. Quippe altera Dioscori. specie, vniuersum Tirrhenum, Ligusticum, atque mediterraneum litus scaturit, vt pleraque Italię loca.

FRAXINELLA, siue Dictamnus Albus Officinarum an sit
τῆς αἰτίας. Diosco. Lentiscis facie.

HIRCINVM odorūmve putorem monet Tragii huius appellatio: Quare docti quidam Barbari, qui huius delineationem, natales, & vires compares Dictamo Cretensi, præsertim ad euellenda spicula capris infixis, legissent, eidemque nostrā fraxinellam contulissent, putarunt eam Dictamnū album esse vocandam: recentiorum autem quidam exercitationes, Tragium istud Lentiscis facie à Dioscoride descriptū, huic planē quadrare assenerunt. Quippe scapos edit plures, sesquicubitales & bicubitales, ramulis & foliis Lentiscis Glycyrrhizę aut Fraxini, vnde Fraxinellā herbarii vocāt: flores Iunio & Iulio admodū speciosos & numerosos promit, Thyrsū sesquipalmi, lōgioremve obsidētes, Asphodeli quadātēnis similitudine, sed ex cādore purpurantes, ē quorū medio staminula quēdā pendula porriguntur: radices albide, multiplices, mutuo amplexu herētes, minimum digitū crassę, quas eruebamus turgidas & foetentes, succo luteo, viscido, digitis pertinacius herēte: quod Gūmi videntur suggere, aut sectari muscę luride, cluniūque & alarum virore conspicue, cuiusmodi ferē cantharides in Fraxino, vt nos studiosē obseruabamus, in quodam pago trans Rhenum, altero à Basilea fere miliari, prope rupes quasdam apricas, vbi maximā copia sponte fruticabat, Semina penē Lentiscinis paria, nigra, lurida, in folliculis Helleborastri aut Napelli. Quamobrem non pessimē videntur arbitrati esse Tragium: Nam quod obiciunt de Crēta Insula, cuius vnius hęc sit alumna, non officit assertioni nostrę: cū multę hodie in nostris tractibus: & plurimę ex insulis, nō alijs admodū, & fortē nūquam prisca gēti notis, afferātur æquę rare, & eadem etiam metipsę, quę solius Crētę putabātur indigenę. Ceterū, μικρότερα πάλιν, id est, minora cuncta, sanē potius intelligendum de vniuersa Fraxinella, quā de eius foliis, quę minora sunt, eoque à Plinio Terebintho scitē collata: ne nunc ad toties iteratam literulę in μέγεθος & μικρότης voce, commutationem prouocemus, vt triviali argumento Senensis, ne sit locus. Huius ad venenata non temerē vsi sunt practici radicibus, quę etiamnum in officinis multi commodi sunt: foris ad motę opis epispastica, intrō verō sumptę, non modō venenatos succos, sed etiam putridos & foetentem illuuiem foras exigunt, decantato Agyrtarū & quotidiano in pueris experimento, lumbricos funditus omnes interimunt.

FRUTL

FRUTICVM, SVBFRUTICVM, CRE- 411 miorum & Arborum aduersaria, concisæque recensiones.



Osteaqua cœpta via prolixissima simul & ope-
rosissima, herbarum necessitudines & gentilitates in suas classes redeimus, ac pen-
iam opinionum salebras emensi, Herbariorum tenebras discussimus: reliquum est, ut
quo ad eius fieri poterit, fruticum, arborum, & utriusq; æncipitis constitutionis plan-
tarum comparationes, ad eandem Philosophia leges exigamus. Orsi quippe sensuum
indagine à simplicioris minusq; operose natura plantis notissimis, decet nos, uti fecimus, per notas simili-
tudinis & cognationis, ad perfectiora, quasi cōpositiora gradum facere: quibus tandem perceptis, eucha-
mur ad ideas principiorum: unde fontes scaturiunt certa & solida cognitionis facultatum & usus. Est
enim hæc particularis plantarum enarratio, quasi quadam aurium pictura: quam nisi accuratè intuitus
fueris, frustra cognitionem earum proferis. Sed cum herbarum, fruticum, suffruticum & arborum na-
tura, non videatur forma genericæ distare à se ipsa, quando easdem plantas videas herbas primulum,
deinde in frutices, demum in arbores abire: & è contrâ, hæc in herbarum modulū penè desicere, nec mu-
tata effigie totius vel partium: huic cognitioni melius consultum putauimus, si interdum nonnullos per-
quam similes frutices aut arbusculas incrementi æncipitis inter herbas adduceremus, & alibi fruticæ-
tes herbas cognatas, arborum explicationi relinqueremus. Iam verò plurima fruticum parti, cui maxi-
ma cū arboribus necessitudo & similitudo est, non erit opus multa designatione, tantò minus arboribus,
ut quas occursum frequens, diuturnitas, magnitudo, & omnium stirpium iam prægressarū comparatio,
cuiuslibet manifestas reddat.

Lentiscus.

Terebinthus { maior Latifolia Norbo.
minor Lentiscifolia.

{ Obsoniorum.
Coriariorum.

Rhus { Plinij.
Plinij alterum, Cotinos Theoph. &
Coccigria.

Pistachia.

Glans vnguentaria.

Lilac.

Staphylodendrum Pl.

Siliquæ, siue Caroba.

Cassia Solutina.

Iasminum { vulgare,
luteum, Caruleum.

Balsamum, Carpobalsamum, Xylobalsamum.

Sorbus { domestica } Alpina.

{ Sylvestris }

Fraxinus.

Nux inglans.

Nux peregrina Indica.

Zizipha candida Monspel. perperam Venetorum

Sycomoros, an A. SARADARACHI Auic?

Vaccinia rubra & nigra, an Idea radix?

Vaccinia palustra.

Osage Germanorum. Gold Engl.

Chistus omnis.

Chistus Ledi species folio Pnnica.

LENTISCVS.

Lentorem foliorum attrectatu quilibet percipit, unde Lentiscum dicunt, partim etiam
è Græcis mutuati, qui σχῖνος quasi σχῖσος, aut fissile vocarunt, quod facile & frequens
funderetur in dentiscalpia, ad nitillam alboremq; dentium, ut etiamnum fit hodie. Fruti-
cat & arborefcit stolonibus & caudice concolor & similis Therebintho minori, sed bo-
tris & vtris initio ex fuluo purpurantibus, maturefcendo nigricantibus acinis, nitidis, Su-
machij Phylææ, & Sambuci: vtriculis folliculis siue oblongis, rotundis, aut incuruis, tereti-
bus, quibus insunt culices & effigies ite Terebinthi, adeoq; flores similes, racemosi, musco-
si, quos primo vere Aprili mēse promit, non particulatim, ut putauit ex Arati & Cicero-
nis versu, Lentiscus triplici solita grandescere fetu, quod Theophra. merito Scille attribuit, hi
autem vocis affinitate decepti, Lentisco. Quare non esse contemptui habendam nomen-
clationum perpensionem, alibi iure asseuerabamus. Semperviretes autem Lentisci feracis-
sima vniuersa Norbonensis ora maritima, quæ ad Taurinorum iuga, quæq; ad montes
Mm. ij. Pyreneos

Pyreneos protēditur. Illic namq; Lentisci, Rosmarini & Lauendulæ virgultis ac cremijs, quā quouis ligno magis ad calfacienda clibana vtuntur. Nec præterquam vnam norūt speciem, quam *Resinle* vocant. Ideoq; fallitur & fallit Senensis, quod pumillas reseces *Lē tiscos*, alias à procerioribus specie facit: fit enim tantum reseces cymis ad vsum, ne in arboris æmulationem assurgant. Et hunc errorem cumulauit inscitia, cum vniuersā plā tam grauer olere ait: at nobis alijsq; studiosis saltus & colles aridos Norbonæ peragran- tibus, inserta inſos folia, non modo suauiter spirabant: sed etiam, quod fortē nescit Cō- mentator, sitim arcebant, & fauces humidas tuebantur. Itaq; nobis silētibus, qui norunt Mastichen, & sciunt Lentisci furculos, vt Xylobalsami succedaneum in Officinis vsurpa- ri Lētiscinisq; dentiffcalpijs post epulas dentes emundari, illius resellent & ridebunt cō- mentatinē. Porro quomodo & quamnam ementiātur Caphuram hodie Veneti mango- nes, in succis Medicatis docent.


TEREBINTHVS *Lentiscifolia minor.* TEREINT.

maior *Pistachia folio.*

*Terebinthi lati-
folia species.*

*Volucella siue
Culices è folli-
culo.*

*Folium Tere-
binthi minoris.*



Coccinæ racemorum bacculæ aut a- cini rubelli similes & concolores quadantenus Ciceri, nomen Terebin- tho potuerunt fecisse: nam *ἐγγεῖνθος* Græce Cicer est. Huius autem semper- virentis & perpetuifoliæ, nullus collis aut deuexus paulò aprior Norbonæ aut Galloprovinciæ non feracissimus: vbi duas folio tenus discernendas me- minimus. Frequentior quippe est angu- stiore Lentisci positu (non Fraxini vt Senensis) colore & habitu, folio duplò maiore.

Alteri autem folia multò latiora, ro- tūdiora, vicina Lauro & Pistachiæ, adeò vt eminens intuentem fallat. Vix vtriq; ædem, acinulis quā Lentisci maiori- bus, coccineis, purpurantibus: demum ex viridi in cæruleum maturescenti- bus, non per initia (vt putauit radiatus Apollo) flore Lētisci aut Sumachi race- mosi: folliculi cartilaginei, teretes, aut co-

nici, angulosi, vel spherici: vnde culices è fuliginoso excremento euolant, succo salinari ad Balsama laudato, effluente. Vbi lætiores, & adultiore sunt arboream proceritatem affe- ctant: & ferro vulnusculis factis in Valena Sylua Monspelliensium, sæpius nobis non pau- cam Terebinthinam extillarunt lucidam.

RHVS *Cbsomorum & Coriariorum quid.*

Color item coccineus flāmeū siue acinulorū in racemulis nomen huic fecerunt: eous au- tem *ῥυθγο* interpretantur vnde Russus vox Latina, & *roux* vulgo Gallorum. Aciduli autem racemi olim, & etiamnum hodie ad condimenta, multus in culinīs vsus: eoq; culi- narius siue obsonarius vocabatur. Cortex autem & folia alutarijs ad pelles dēfandas cō- quisitus, vnde Coriarius dictus. Quare non sunt vt falsò produnt duarum plantarum, sed vnius arbusculæ partes: hanc multò proceriorem quā Dioscoridis sit, penē Sambuci maioris magnitudine, ferunt Monspellio & Castronouo contermina. Oliueta quædam glareosa & macilentiora. Sorbo vulgari adeò similia sunt folio superficie & positu, vt vix sit internoscere, nisi attentius perpendenti. Locis Galloprovinciæ aridioribus & rude- rosis, defitis incultis pumilla, & quanta qualisq; apud Diosc. descripta bicubitalis ar- buscula, visitur.

RHVS

RHUS Plinii Myrtifolia Monspelliensium.

EODEM ex usu ad coria firmanda, nõ de semine, duo frutices apud Plinium Rhus dicuntur: horum notissimus & vñtissimus cunctæ Norbone, præsertim Monspelliensibus, apud quos vberè ad Lani amnis crepidines fruticat, virgultis ramulisque quadratis, frequentibus, viridatibus, folio Rusci, Myrti, aut Iuiubæ. Seminula intra angulosam tuniceam thecâ inclusa sunt cochleata, Calimodo multo minora.

*COCIGRIATheoph. Cotinus Plii
& Theoph. Rhus alterum.*

Κότινοι sunt cirræve flocci, quales in galeis, aut galligallinacei vertice visuntur, qua de similitudine floris, dictus fuit hic frutex, qui è summis virgultis, quinàm cubitorum altis, pulcherrimum lanitiũ tollit, Sericeo vellere & contextu calamistratum. Quod crispatur & explicatur in latam cesariem, crinibus puniceis, fuscis, tortilibus, semine Lætis minore, ex nigro rufescente; caudice & virgultis fuscis, vimineis: foliis circinatis, densis, rigidis, Casparis, Pistachiam aut Terebinthum redolentibus, & concoloribus. Auraico agro quatuor miliaribus Auinione, qua Insulas & Aquas sextias itur, magnus prouentus est: Vidimus etiã in agro Veroënsi, Venetiis, ex locis Histrie alpinis. Quò magis miramur, tantè venustatis stirpem frequèti usu & mercatu ad coria curanda expetitã, indictam fuisse Cõmentatori.

Terebinthus Indica Theop. est Pistachia Dios.



Anuculis Piceæ strobilos imitantibus πικραι δι

στæ, hodie sunt Officinis notissimæ, & edi solitæ: non secus atq; Pineæ vescæ sunt: porraceo colore intus, mēbranula extima & cortice amictæ Auellanæ: Arborem qualē in hortis Italiciis vidimus, etiamtque in horto Graii seduli Pharmacopœi & stirpium percupidi, ad Londini mœnia, prorsum dicas Terebinthum, ramorum & foliorum ortu, habitu, magnitudine: flores item racemosos purpurantes Terebinthi edunt in Italia, & Galloprovincia, vbi seruntur, sed maturitatem non assequuntur.

Mm. iij.

GLANS



GLANS vnguentaria, cathartica, siliquata.

BEN.

LILAC.

EFFIGIES triquetra, sed rotunda & glandis æmula huic nomen generis aptauit: oleum verò quod pressu reanittit Myrepfica, siue vnguentaria, nomenclaturam à cæteris distinxit: iamdiu Dioscoridi non minus nota, quàm nostræ ætati, tametsi non eius siliqua; vt qui palmulas vocatas libro primo, Phenicobalano confert, vnde nomen BEN Arabistæ videntur detorsisse, quod illi nuculam hanc vnguentariam interpretantur. Officinis & suffitoribus, tum ad valetudinem, tum ad voluptatem, oleum dat pressu, vt nullo odore iucundum, sic nullo rancore, aut fœtore veterascens, nullâ labem aut sordem chirothecis aut vestibus illinēs, ac quamlibet odoris fragrantiam illibatam & vegetam tueri, omnium oleorum vnum aptissimum, non secus ac Sesamium, aut Amygdalinum premi solitum: est namque in siliqua, quam nullus veterum aut recentiorum literis mandauit, admodum eleganti, palmum longa, carinula bifori conflata, tereti, rotunda, gracili, binisque loculis ventriosa; nempe ima mediâque sui parte, qua protuberat, glandem singulam singulo claudens; summa verò, acuto stylo, quo, rostri instar, vel Rhododendri vel Periplocæ repentis, acutum mucronem; protendit: Intus subrufo colore, foris pullo cinereove, & secundum longitudinem striis rugisque exarata: coriacea tota, flexilis & corticosa, insipida, subastringēs & sicca. Hæc dono data primum præceptoris Rondelletio fuit, deinde nobis, qualem iconē damus.

LILAC verò nequit esse hæc, si verè pinxit pictor apud Mathiol. qui hîc nescio quid misit: Nam Populnea longiore fronde, fructu non siliquato, sed Pistachii in morem singulatum prodit.

Germanorum *Impernuszle*. an STAPHYLODENDRON THE?

PROPTER periuundos flores albidos Bryonia, aut Labruscæ, odore & similitudine, videtur transalpina quædã arbor, Staphylodendrum apud Plinium (qui tamen Aceris solum dicit) quam volunt esse hîc depictam, & multis locis Heluetiæ non procul Basilea arborecentem, depresso, vdis, aut limosis, iuxta amnes & sepes, velut Sambucus, cui habitu respondet, aut Terebinthi: sed crenulis perpusillis, elegantissimis, & supernè acutis donatur. Semen quadantenus nuclei Cerasi, intus esculentum. Quibusdam in cœnobiis caudice Prunum æquat, & nuculis precularum globulos necant.

Κεράτια SILIQUA, CAROBE.

Carobia Actuarii, & vulgo Prouincialium.

APUD antiquos Κεράτια, quasi cornuta siliqua legitur; est enim digiti indicis longitudine, sed quasi in cornu falcata, quam prædulcem esu vocat Plinius. Multum hæc cognita Niceæ & maris Ligustici accolis, vbi eâ esitant pueri etiamq; porci: Quare, qui sacrâ paginam noui Christi fœderis vertunt, hanc debent intelligere Lucæ 15. de filio profligato. Non parum affinitatis huic cum Cassia fistulari solutiuâ, quam effigie præfert & ortu, vt nuper intuebamur in horto amici Londinensis.

SILIQUA, aut CASSIA PURGATRIX, Arabum Carobis similis.

PRE-

Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 415

PER QVAM vtilem arborem istam Egyptiis Arabibusque debemus, à quibus, aut ab illa odorata, est nomenclatio profecta: nisi sit *κασύς* Græcè, quod coriaceum vocant, quasi sit coriacea ipsa siliqua insignis, quam nullus non nouit, cuiusque si semina lata, quæ intus transuersis membraneis aluiculis dissepuntur, seras, prius macerata in aqua frigida, & terræ infodias, videbis planè ortu totoque ipso habitu Carrobiam imitari. Flores lutei sunt, Chelidonii minoris, odori, plusculi, vno exortu, senis aut septenis foliolis radiati, quales multasque perquam raras vidit & attulit ex Insulis Americis & D. Dominici, exercitatisque cognitionis peritissimus D. Iohnes Brion Hoppeuilleus Northmanus.

GELSEMINVM vulgatius, flore albo.

CONCINNIOREM quam certioremsciuit sibi appellationem de sententia quorundam doctiorum, quibus Iasme dictum putatur, quasi viola odora, quia oleum apud Persas olim solitum esset istius floribus imbui: quod tamen grauius spirat Dioscoridi, eoque arguit non esse nostrum Gelseminum. Et violæ vox, laxior multo est, quam vt certam quampiam plantam designare valeat, nedum hanc quam Mauritani Zambac & Gelseminum dicunt: vbiuis in hortorum angulis apricis, & pro prædiorum cauadiis furculo pangitur, adque ornamenta, pergularum, industria & pedamentis erigitur ad fornices. Folia sunt in imo latoria, lateribus vtrique reducta, acutiora supernè quam Lentisci: flores albi vt plurimum, Polemonii, in flexilibus prolixissimis virgultis octo & decem cubitorum, Clematis altera ritu. Patavina & quædam Gallica vireta luteum habent. Sunt qui cæruleos flores fundere dicant. Luteum semen habet, Polemonii minus, rubrum, aut nigrum, ni labat memoria.

BALSAMVM.

PRO Dioscoridem vires melius quam stirpem notam habuisse: de viribus namque multa, de figura nihil. Hanc sic amici nostri oratione referunt: Humilis est frutex, aspectu deformis, cineracei coloris, flore pusilli Iasmini lutei simili, minore, perpetuis virgis, folia horna, exiit Decembri, quibus nonnisi mense Maio noua sufficiuntur. Cari atque Babilone fata viget. Decembri mense ramuli præsciduntur, quibus cera oblitæ appenduntur amphoræ, excipiendo aureo liquori, qui moschum sapit. Hunc nosse non difficile, sed vbi noveris longè difficilissimum habere. Opera danda accuratissima, quod eius vires quam exploratissimas habeamus, vt quando non licet illo frui, saltem bonitate proximis & simili facultate præditis vtamur. Tribus huius plantæ partibus tria succedanea est meditata posteritas: Liquoris namque loco sua Balsama vnguinæque vulneraria nostri Barbari in Thesauris habuere, quorum mirificas vires literis & experimentis proditæ sunt. Lignum verò, quod Xylobalsamum dicunt officinæ, Lentisci sunt furculi, plerumque carioli, tamen neutiquam contemnendi, modo recentes sint, nec odorem amiserint; gratissimus namque pulvis intus & foris, stomacho, propter naturæ amicam temperamentum: cuius argumentum faciunt dentifscalia, quæ aromatica & moderata astringitione & calefactione dentes, gingivæque perpurgant, roborant, & mulcent. Idcircoque eorum multæ myriades parantur à miseris mancipiis, qui in triremibus Lygum sub neruo vitam degunt. Pseudoxylobalsami huius magna copia paucò ære parari potest ex Italia & Gallia Norbonensi. Sic semen, id est, Carpobalsamum officinarum, cum neutiquam fructus Balsami sit, imò cuiusnam plantæ, incertum sit, rancidum, vietum, exoletum, inodorum, minimè Carpobalsami loco usurpari debet: quin potius huius penuria, semen Terebinthii, vel Lentisci immaturi eximæ vires, omnes Carpobalsami facultates, & dote, vt si quod aliud, explere mihi videtur. Quin Terebinthii è pullulantibus botris atque flagellis tempore verno laticem limpidissimum, odoratissimum, non parum tenacem emunximus, qui digerendo, glutinando, doloremque mulcendo, omnia quæ Opobalsamo insunt, conferre videtur. Quod non modò doctiorum antiquorum, sed etiam Barbarorum Barbitonorum consensus sequutus est. Nullum enim videre est ex illis vnguibus, quod viri præstantia nomen Balsami meruerit, cui non sit admixta Terebinthina vulgata: Quid putas futurum, si genuinum Terebinthii liquorem admiscuissent, qualem descripsimus Capite de Terebinthio? Ea de causa nullum præstantius succedaneum arbitramur, cuius omnes partes omnibus respondent

M m. iij.

partibus

Opobalsami succedaneum.

Pseudoxylobalsamum.

Carpobalsamum

Terebinthii liquor.

partibus, ligno, liquori, semini respondeant, quàm Terebinthum genuinum. Mathiolus & qui suum Garyophyllorum, nucis myristicæ, aut Cinamomi oleum, huic liquori præferunt, suauitati & saporis plus quàm optatis facultatibus deferunt. Hæc namque tametsi eximios fundant liquores: tamen nec Dioscoridi nota, nec venenis aut Theriacis comparata fuere. Et præterquàm quòd plerumque vel foetent vel feruent ignis empyreumate; etiam si sint optimè parata, tamen sæpius acriora sunt quàm par sit, & intemperiem feruidam imprimere nata: Oculorum verò hebeti aciei si quis ad mouere ausit, ne ille hominem ex luscioso cecum faciet: corrugat enim pupillam, nec penetrat: sed viam sibi intercludit, & dolore vexat: Myristicum verò oleum, laxando & inquinando, nec foris vulneribus glutinandis, nec stomachi vires colligendo idoneum est, nec quidquam Balsamo simile habet.

SORBUS domestica & Sylvest. Alpina.

SORBUS hodie notissima in Gallia, Germania, & Italia, arbor magna est, foliis & facie Sfraxini, Sumach, aut Sycomori Venetorum: colore partim ex luteo pallescente, partim punicante, fructu rotundo, aut Pyri parui effigie, perquàm astringente: floribus albidis, racematim coherentibus.

Fraxinus bulbula Dod.

HVIC prorsum simili montibus oriunda frigidioribus, floribus iisdem, sed umbellatim candidis. Fructu multò minore, copioso, maiore Oxyacanthæ vulgaris, concolore, acerbo gustu, quibus potius quàm homini, ubi vidimus, expetito.

FRAXINUS.

EX superioribus Sorbis facilè innotescet Fraxinus; cuius semen Officinis Lingua auis vocatur, quòd auium lingulas imitetur, gustu acre, amarum.

NUX IVGLANS.

NEC infrequens puerisque notissima Iuglans, foliis pregrandis, nervosis, Terebintho, aut Fraxino multò maioribus, Centaureo magno paribus. Cuius nucs condiuntur die vna albæ, hoc modo: Teneræ nucis cortex putaménve antequàm lignescant, deglubuntur illicò cultro, testa albida & teneriuscula tenus, è vestigioque nè nigrescât, in aquam puram proiciuntur, & vsque dum mollescant coquuntur, Cinamomi & Garyophyllis traictæ, saccharo in Syrupum perfectè cocto bulliunt tribus quatuorve ebullitionibus: tumque quò saccharum ebibant, triduo, aut quatriduo inibi sinuntur. Et quia Saccharum recrudescit, propter humorem quem imbiberat, illud idem saccharum per se denuò, coquitur, & sic bis terte repetitur.

NUX peregrina Indica, non biforis.

AD VEHITVR quidam fructus ex occiduis, adeò nuci Iuglandi similis, vt nondum introspectum, sæpius putauerimus nucem Iuglandem esse: sed effractû, caro fuit vesca, intus albida, Castaneæ sapore, nullis distincta nucleis: putamine, & testa vtraque crassiore, quàm nucis Iuglandis. Hunc Rocellæ nobis dono dedit eruditissimus Doct. Launæus Medicus.

ZIZIPHA candida Monspel. quæ perperam Venetorum Sycomorus, an ASARA Darachi Auicenna?

HANC à fructus & totius arboris figura Monspellenses candidam Zizipham dixerunt, quamvis facultatibus sit prorsum absimilis, ytpote gustu admodum ingrata, virofa, amaricante, sed Zizipham satis referente, carne & nucleo; colore tamen buxæo, pallido. Flore stellato, Flammulæ, aut potius Circeæ concolori, folia Fraxini, Staphyllodendri, aut Sorbi, atrovirentia, Venetiis & Norbonæ frequens. Belgis colitur in hortis.

VACCINIA nigra & Rubra, an Idea Fadiæ Myrtillus.

Non

Herbariorū *VACCINIVM* nigrū aut Rubrū, an *Idea* Radix.

NON PERPERAM quadrat huic *Ideæ* plantæ vteruis horum fruticum aspectu Myr-
um aut Ruscum illicò referentium, vnde Pharmacopœi cum plebecula quasi Myr-
tillos vocarunt & vsurparunt, astringunt etenim & exsiccant ambo, nonnihil refrige-
rando, quæ omnia appositè quadrant *Ideæ* radici, cuius fuit potissimum vsus, cuiq;
nomen inditum à monte, quia non nisi montosis locis & accliuibus arduis calidarum re-
gionum, quibus saltus & nemora frigidiorum plagarum respondent vt plurimū. In An-
glia, Belgio Gallia & Germania, Seuenæ inaccessis Tridentiq; alpibus vtrumq; fructum
esitauimus. Sed virent initio, deinde rubent tandem nigræ bacca suauiores maturitatem
assequutæ vineo succo turgent, prædulci gustu. Proxime folia lignosis furculis crebribus
samentosis multi hærent: floribus *Ericæ* aut *Vuedonis* minoribus, pallentibus. Radix
lignosa multa edit virgulta, pede altiora. Folia virent obscure, effigie Myrti aut Ruci,
rotundiora, molliora, sed Hyeme decidua.

VACCINIA rubra.

Idem natalibus Rubræ frutex latiore & habitiore aspectu semper viret: non perindè
vt nigra, frequens, nec tamen nigræ dissimilia folia, sed paulo maiora, & ad Myrtum
albam siue maiorem & Rhus Plinianum accedentia rotundiora. Baccula non minores
nec dissimiles sed rubræ, astringentes magis, nec perindè succulentæ. Radix æque lignosa
fibris serpit *Ericæ* ritu, Flores oblongis caliculis parutulis subpûpureis apiculos è medio
exerunt.

Palæstria VACCINIA.

Sunt etiam parum frequentia alibi quàm in Germania & Batavia paludosis & mariti-
mis hæc *Vaccinia*, quæ Iohannes Cruthmanus Mechliniensis, vocatus de Vroede, il-
linè Antuerpiam nobis primùm adferebat non dissimilia colore, longiore tamen & nõ-
nihil turbinata figura, parua lachrymam Iob effigiente, in viticulis samentosis exilibus
quamplurimis humilibus breuib. foliolis Serpilli minoris, vel *Herniariæ*. Interdū bac-
cæ quæ rubræ sunt maculosæ punctis visuntur, acerbi astringentisq; gustus. Hanc tûr Com-
mentator *Ericam* bacciferam indigitet, neq; causam dicit, neq; ratio subest, neq; quidquã
Ericæ illi inest. Exilitatem quippe foliorum, esse vagam notam quamplurimarum planta-
rum *Ericæ* valdè dissimilium, & hanc refrigerare & humectare qui aiebāt *Senensem* me-
ritò subsanabant: calida enim, valdeq; sicca *Erica* est.

Sagel Germanorum vel Gold e Anglorum Myrtus
Brabantia quibusdam.

IN *Ericetis* vmbrosis, nemorosisq; saltibus fruticat
multis ramulis ab imò, alterno exortu ab radice lig-
nea flexilibus, duris fuscis *Vaccinij* superioris. Folia pu-
nici Chamelez paulò latiora. Seminum crebri racemuli
conferti & conflati quasi spicis post pusillorū, luteorum
florum pallentium Lapsū apparêt: in quibus semen pin-
gue odorū *Stachadis* citrinæ vehementius, & trifolij o-
dorati quadatenus simile. Iunio & Iulio Anglæ mulier-
culæ venū adferunt ramos florentes ad concinnada æ-
diū, conclauia & triclinia suauī odore quem halant flo-
res, imbuenda. Adduntur etiã idē flores potioribus cõ-
suetis Septentrionalium, penuriam Lupulorum interdū
resarcituri. Interdum ad hylaritatē bene potis conci-
liandam: ferit namque caput latiore temulentia *Sagel*



ad enervandam animalcula, quæ eius odore fugantur sufficiuntur quædam loca & suffulciuntur summitatis vestes.

CISTVS mas, Fœmina, & Cistus Ledon.

Ledon.

V Eluti hederaceus folijs circinatis atq; rotundis visos videtur vocatus, & quia non erāt læua, nitida, sed potius squabra & pannosa λυδωγ dicta. Vniuersa plaga quæ ab Eridano amantissimo ad Rauenam, quæq; ab Hetruria ad Massiliam, frequenti ornatur Cisto Mari vocato, Fœmina & Ledo, quæ importuno penè prouentu in collibus macilētioribus, exuctis Norbonæ lasciuit. Vtrisque eadem facies, sed fœminæ rotundius folium & minus nec adeo squabrum aut lanuginosum: flos etiam roseus, sed decolor & obsoletior minore frutice tota, sesquicubitali & cubitali, Mari verò longius, maius, hirsutiq; caua pubens folium, quadantium Saluæ, roseus Cynorhodi flos.


Sedenim Ledon cui frequentior Hippocystis adnascitur, folia admodum angusta, tangenti glutinosa & squabra, nigriora Ronsmari culti, paulò latiora: flores candidi fœminæ Cisti minores omnibus, semen in triquetro & tricocco pericarpio, pusillum Hyocyami.

CHISTVS LEDON latifolium.

Hippocystis.

P Rater hæc tres semper virentes, rarior species, est quædam Ladanifera, virgis furculis, folijs multo crassioribus, latioribus, longioribus: Sumachi Plinij aut Rusci modo fruticās, semineitem tricocco: multa lasciuit quopiam ip mōte celsissimo agri Ite rilis Sauenæ, cui nomen S. Colūbæ. Alioqui gustu Cisti Ledi, & fragrantia grauiuscula. Hanc demum monuit nos se habere florentem Coldenbergius. Semine & flore alterius Cisti.

Caudici ad radicem Ledi adnascitur Hippocystis, frequens Galloprovinciæ & Norbonæ, sobole fungosa, ex luteo in puniceum Granati bicoloris genimante, cetero Hypo sparti & Orobanche æmula.



Myrtus maior baccis nigris, oblongis, teretibus.
Myrtus maior baccis albis.
Myrtus minor.
Buxus.
Lycium siue Pixacantha Norbonensium.
Malum puniceum.
Ligustrum.
Phylerea maior Oleastri facie } Norbonensium.
Phylerea minor angustifolia }
Phylerea arbor an Macaleb Arabum?

Bourgespine Monspellensium.
Olea.
Olea syl.
Olea folia.
Salix { Latifolia.
Amerina.
Salix humilis repens.
Persica malus.
Nux Myristica.
Arbutus.

Laurus

Laurus vulgarior duplex.	Poncire, Adami poma.
Laurus Tinus.	Limes.
Arantia mala.	Canella folium.
Limones.	Cinamomum.
Citream malum.	Macer Gracorum.

MYRTVS minor.

VOLVNT sic vocatam propter Myrrhæ quandam æmulam odore gratiam, qua pollent semperuirentis Myrti bacculæ. Est autem minor, Officinis notior suis baccis, adeoq; tota hortis Septentrionalium delitiæ & ornamentum est. Fruticat virgis tonsilibus, rectis, flexilibus, nigricantibus, effigie Buxi, folio minore, sed Rusci mucronato, baccis nigris Hederæ, vineum succum pressu remittentibus: eis post vindemias saginantur aues, tamque suaves ededo fiunt, ut integras, non exenteratas essent, eoque proverbio feratur, sterco earum prestare carnibus, in Galloprovincia maritima, ubi siccanus collis nullus, cui arideat paulo placidior aura, ubi non multa vernet hæc myrtus. *MYRTVS Maior.*

VERIVS illic etiam fruticat hæc, propter baccas, lagenulas effigiantes, maior dicta: folia item maiora Phylereæ aut granati minora: floribus item albidis & superioris similibus. Alterius modi ex hortis Franciscanorum Venetorum habuimus foliis albidioribus, & fructu albo, pari, & simili, nec alioqui ita diuerso, illic alba Myrtus vocata. *Varietates.*

BYXVS.

PERPETVI folia etiam buxus, siue *πύξος* Græcis vocata, ut ex qua tabulæ ad scribendum fiebant, *πύξυς* dictæ, vnde & pyxides. Nulla autem magis quam hæc gliscunt montes & colles in Delphinatu & Galloprovincia. Quibusuis etiam assiosis ad Septentriones, cliuosis, incultis frutescit & arborefcit, prædens rigidis virgultis & ramis admodum foliosis, graueolentia & ad myrtum similitudine cognitu facilibus; luteus siue buxeus ligni perquam solidi color: bacculæ tripodes, coronula denticulata insigniuntur, Myrto alioqui non absimiles.

LYCIUM, siue PYXACANTHA Norbonensium.

SOLITVM fuerat aduehi Lycium ex Lycia, vnde nomen illi: verum quid sit hodie norunt perpauci; nec tamen pigebit (quod nos vsus docuit & coniecturæ adeo vero similes, ut verisimiles credamus) hic addere. Est in Prouinciæ Norbonæ plerisque locis arbuscula Oleæ syluestri similis, Arbuti magnitudine, foliis Oleæ, sed breuioribus, rigidioribus, rotundioribus, minoribus, caudicis foliorumque viridi, obscuro, saturiore colore, subfuluo, spinis crassis, atque rigidis, præduris. Baccæ sunt ut Phylereæ maioris, sed rotundiores quam Oleæ, succo subrubro, Oleaginoso, uti Phylereæ: qui succus amarus, ingratisimus, accensus, cum strepitu quodam flagrat, extinctus rubet. Hanc tamen præ se vndique ferat Lycium, tamen non auderemus asserere eandem esse: Id tamen audeo dicere, vix maiore posse vsurpari commodo Lycium, quam istud nostrum: & posse longè propius, aptiusque subdi illi quam Amurcæ: habet namque vires digerendi, quadam cum astringentia. Quod si non sit Lycium, fuerit sanè species Oleæ syluestris, cuius Amurca omnium præstantissima, vice Lycii est; nam quò minus pinguis est & oleaginosa, eò melior: Nocet enim oculis, præsertim olei pinguedo, ut docet ratio Physica. Valde putamus Senensem exercitatum apud declamationes, aut latrationes oratorias Quintiliani: nam ut illic Methrodorus utitur imaginibus, pro locis, sic is non modò iconibus abutitur, sed etiam Anguillaræ & aliis doctioribus vera monentibus conuiciatur.

MALVM PVNICVM.

LVBENTER coniectamur *ῥόαν* dictam ab acinorum colore Cytiniq; & Banlausti aspectu roseo: etiamque ad Rhus, de quo superius egimus, quadam similitudine, & vsu, in culinis, ad coria edensanda, non diuerso. Sponte arboream magnitudinem assequitur syluest. in Italia Hispania & præsertim Mauritania, vnde pulcherrimæ feruntur allatæ, Punico item cognomine: Septétrionis celum non fert, nisi ægrè & in hortis: horto Regio *Wastmestri* floret quotannis, Belgio & Francia, gigantis ipsis terræ mandatis, germinare in arbusculam vidimus, Myrti rotundiore fronde. Pomum ubique esitatur, anguloso acinulo, dulcis acidi, mixti vinosi que saporis, deliciis & medicamentis expetenda.

*Ger. Brenæ
ocypfel.
Gal. Pommes
de Grenades
& Mygraines.
Ital. Melagrano
pomo Granato.*

LIGVSTRUM Dioscorid nostras.

DE florum speciosa foetura Cyperus dictus Græcis videtur; $\kappa\upsilon\pi\alpha\gamma\iota\zeta\omega$ enim floreo est, quod alluisse visus est Maro ubi *Alba Ligustra cadunt*, canit. Nulli a utem calidiorum aut frigidiorum regionum hæc hodie deest, semperuirente frõde Oleæ, atriore, latiore, molliore, horum septis & areis accommoda, & tonsilis: flores muscaceos, candidos, odoros, ceu vuz oblonge rudimentum edit Aprili & Maio in letioribus Galloprovinciæ conuallibus, aut collibus Angliæ non perinde strigosis, Septembri: racemulis Lentiscis, aut montanæ Sambuci, quos Auicenna esu sanguineum lotium, aut potius colore crueptum ciere dicit: quod præstitisset quibusdã refractariis experiri, quàm istud Ligustrum verum esse inficiari: gustu autẽ & facultate astringit. Quæ tamẽ nomine Alkanæ afferuntur assulæ, vel bacilli, ex transmarinis Africæ emporiis, luteo sunt intus ligno, eoque si crinem (vt videtur Auicenna ex Dioscoride velle) ruffant, sunt sanè aut melioris notæ Ligustri, aut diuersæ plantæ.

PHYLERÆ duæ Norbonensis Galloprovinciæ.

FRONDOSA millam ramis patulam Theoph. $\Phi\upsilon\lambda\lambda\epsilon\alpha\upsilon$, ex qua Phylluræ, siue assulæ finduntur, Tiliam esse, non hanc, certum est. Sed germanitas vocis imposuit doctissimo interpreti Dioscoridis. malim tamẽ legere $\Phi\upsilon\lambda\epsilon\lambda\alpha\iota\alpha\upsilon$, siue Oleæ amasiam istam, quam Dioscorid. describit, & nos pingendam curauimus, percongruam descriptioni, & Oleæ non modò similem, sed etiam sociam, vt ab oleastris, quibuscũ frequẽs reperitur, nihil ferè discrepet.

PHYLERÆ minor.



Huius autem duo modi arborescunt in Galloprovinciæ viarũ marginibus & oliuetis Masiliæ vicinis: & quæ maior, rarior, persimilis pumillæ oleæ, caudice ramisq; nigrioribus, longioribus quàm oleæ Agrestis, & folio magis Ligustrum accedentibus: bacculæ multæ in ramis, etiam oliuæ agresti minores, non amaræ (vt oliuæ) sed subdulces, nucleo intus Cerasi.

PHYL. MINOR multò frequentior iisdẽ in natalibus & Mospellii collibus glareosis: folio equè longo, sed angustiore duplò: duploque minor tota planta. similes acini Lentiscinis, & similiter racematim proximè herentes admodum curto pediculo, quæ item maturæ subdulces sunt, aliquantũ acres, sed neutiquam ingrati, vt sunt Oliuæ satiuæ & agrestes

Senensis

Senensis infarcti plaustro verborum autoritatum, nec tamen quam dat describit.

PHYLAREA ARBOR Gallo-
provincia, verior *MACALEB*
Serapionis.

Expressam de viua arbore hanc iconem, prorsum refert prior maiorque dicta Philerea: reperitur in Galloprovincia prope Tholonam, æquat scapo & sparsis stellonibus Prunum aut Cerasum, folio planè Phylereæ, aliquantum latiore: flos Ilicis muscosus, albidus & plusculis vnâ aceruatis baccis Terebinthi maioribus, nigricantibus, herbidis, dulciculis nucleoli intus crassi: quales prorsus prostant hodie in Officinis nomine Machaleb. Et certe si Ligustrum Serapionis sit Machaleb, erit hæc illius Ligustrum, non illa quam Matheolus dat nec describit.



*Desiderantur
hic multò plures
congestæ bacculæ,
quas prætor
emisit.*

*Vulgo Mossellensium BOVRGÈS-
PINE* perpetuò virens, an *A-
PHARCA* Theoph?

Frontignanæ Linguagotiæ Iliceta istam arbusculam frequentem pariunt: cui facies & habitus superioris Philereæ, sed Ilicis adolescentis folia: rigida, rotundiora, latiore quàm Olea ambitu, tantillum denticulis aspero: muscosis, numerosis, racemosis, Lentisci flosculis, subter folia aggestis: Bacculæ sunt Lauri Tynni didimæ, bino veluti gigarto vix cõflatæ: furculis ramisq; magnitudo & habitudo etiam Ilicis: gustu amaricat folia, & tantillum astringunt.



Nn.j.

OLEA

OLEA.

Varietates.

Amurca.

Helladi Athenisque Græca accepta ferenda appellatio: Ἐλαιον enim, primum vocavit Minerva, quæ arbore Oleæ præstantissimo quam potuit munere Atticâ ditavit. Huius lucos perennes densissimos & amœnissimos alunt apricæ tepidiores conualles Hispaniæ, Galloprovinciæ, & Norbonæ, ubi in MonsPELLIJ vinetis duplicem perquam nobilem fundunt laticem: nimirum oleum, bacca callo: & mel, siue Elaomeli, quod mirum dictum, sed verissimum, caudice vulnerato: de quibus cum lachryma oleæ Ethiopica, in succis dicendum. Eleonidi iam memorauimus in Manna. Bacca caro callusue immaturæ virescit: nigricat autem nitidior cuticula maturæ: elegatior ad Frontignanæ via, ex purpureo punice, rariore hæc alibi: Fronde exit flaccidiore, latiore, & ferè Saligna, in solo & cælo Septentrionali, ubi nihil osecius perennis viroris est, Londini in viroto operis & stirpium nouitate visendo, Cæcilij regni florentissimi Angliæ incomparabilis tum sapientiæ, tum eruditionis Nestoris. Amurcæ siue facis, quæ oliuæ effractæ atq; expressæ fraces sūt, efficaciam eodem relegamus: hac autem non lubenter carerent Medici, si quot & quanta ad morbos quàm difficillimos curandos præstet remedia, scirent: nec enim vel Lycio vel Acciæ cedit, quin potius quibusdam viribus excellit.

OLEA Sylvestris siue Oleaster.

Q Vos vnquam meminimus spontè arborecentes olearū frutices, dumtaxat magnitudine & habitiorē corporatura videtur distare à fatiua, quā hæc prorsū ostendit, nō secus atq; Prunella Prunum fatiua, altera quippe in alteram, trāsmotione aut inoculatione, aut neglectu abit, rigidiuscula enim fit Oliua, impexo atq; horridiore aspectu: interdum feticosa, quando in saxosis desitis, eius radix pastinatione non diffatur, aut nocitura pululatio, & feticosa ad caudicem soboles, non interlucatur. Quare huius non effigiem, quæ alioquin eadem superiori est, sed vires, vtpotè in sicciore adultæ loco, vt magis astringētes, terrestres, vegetiores dicit Diosc: folia duplò minora, Phylereæ, sed subtus glauca: fructus numerosior, similis & par Myrto maiori: flosculi racemosi, candidi, odor, Lambruscæ foliati.



SALIX.

GLISCIT OMNIBVS VDIS AQVAVM POTRIX ET AMATRIX
salix, à saliendo Latinis, veluti Græcis παρὰ το ιεναι τεα, quia ocysime quasi saliendo in incrementum eat: Oleæ fronde latiore, glauca, auersa, amara, supernè virente, floris

floris vice lanitium amenti sesquiunciam oblongum & teres propendet, nec seminiperda semper est, vt Homerus vult, quia alicubi semen excipitur & satum oritur.

Platiphyllus.

Plerisque non adeò depresso lubentius oritur quæ vocatur *Platiphyllus*, ea cinerea est magis, folio latiore, iulo siue catulo hirsutior, breuiore, Salicis amerinæ vimeneis virgis, cereæ flexilitatis & coloris, aptissimis ad quas fillos texendos; fronde longiore *Lysimachia* purpureæ.

SALIX humilis, repens.

PRÆTER vulgatas Salices est quædam humilis, serpens humi, pedem & sesquipalmum alta: foliis paruis, Myrti minoribus; flores amento Muscolo in pubem auolante, cani. Montibus Sabaudia, Lugdunensibus & Veganiis multa, aspectu decora.



ἐλαίωγον *THEOPHRAS. siue*
Agnus Castus.

VEL VTI Salicem frugiperdam, sic ἔχρησαν, siue castum hanc vocant: quod vtraque, frigiditate quapiam Venereos prolificosque seminis spiritus videtur enecare, aut enervare. Hortensis est Europæis, Italis, Gallis, & Anglis; tametsi amantior sit agri calidioris: Expandit in pediculis frondes digitatas, plurimum foliis septem, Salignas, Lupini, aut Ricini positu: in ramulis summis Lauendulæ concolores flores, & alicubi albicantes, vt in Coenobiis Italorum funecinctorum, qui virgarum cinctu ad Venereos frenandos insultus, quasi Amuleto, hac freti erant: tametsi semen Coriandro par, nonnullis esitatum libidinis inciet impetum, non secus atque Ruthæ semen, nonnullis adimit.

ONAGRA,
siue Mulcibruca

BELVARVM, cum fera rabie corda tument, domitricem hanc & demultricem in Apenninis iugis & plerisque; Alpinis, ac in ipso Veronensi Bado sciscitati sumus, num inibi vsquam comperissent: sed id responsi tulimus, nullam repertam plantam, quæ quadret Onagræ, præterquam Rhododendrum, Sambucum montanum & Laurum hynumon. Se facile deprehensuros si ea occurrisset, ex radicis odore, foliorum florum luculenta magnitudine. Et certè non ea fuit negligentia Guinus eruditissimus & strenuissimus herbarum venator, vt si veram inuenisset, tam raram, tamque expetendam, non & cultu in hortis, & literis posteritati propagasset. Aiunt amici eruditiores, hanc esse *Lysimachia* speciem quandam circa Lugdunum oriundam: at ea herba, non arbor est.

PERSICA
Males.

VLGARIS Persica solo mutato & venenata vi, patrio nomine notissima hodie est arbuscula, qua consita sunt pleraque omnia Europæ vineta: fronde Salicis est, aut Persicaria, Amygdali item flore. Poma succos oblita priores venenatos, iucundi odoris & saporis, nec insalubria sunt. Carne foris succulenta, pube albida obducta, sublutea quædã, albam pulpam habent. Lutea tota alia præstantissima: non pauca sanguineo cruore madent: omnibus Labyrinteis alueolis sculptis; amaro intus nucleo.

Germ. Pfersich
Bel. perseboon.
Ang. Percheira

AMYGDALVS.
Germ. Almandel
baum

VOCANT Amychas Græcè putaminis Amygdali maturæ rimulas, hiulcasque fissuras, quales autumnò ubique; cernere est in Galloprovincia, Delphinatu, ubi consistunt planities

Gal. Amâdier.
Belg. Aman-
delboom,

parentissimæ Amygdalo arbore, cui facie, fronde similis, & par Persico, procerior tamen & frondosior. Ægrè floret Aquilonio cœlo; tametsi in Angliâ maturat interdum nuces. Hæ interdum peramaræ natura, cultu dulcescunt, esculentæq; Theop. & nostro tempore.

Moscata NVX, siue Myristica Macis Arabum & Officin.

AFFINEM fronde & fructu Persico esse arborem nucis Myristicæ, quam frequentem habent insulæ Orientis & Moluscis, vnâ referebant, qui attulerunt easdem nuces decerptas suis manibus amici, & triplici cortice protectas, quales conditæ prostant in Officinis, & posse nostro cœlo assuescere negabant. Tota vescendo est condita: nam callosum extimum putamen est, cui proximè subest Macis Officinis notissimus; Cutaceus deinceps liber interiacet Macerem ipsum & nucem, quæ est lignosa, odora & perpinguis, dum recens est, & matura.

De Macere in Cinnamomo.

ARBVTVS, siue VNEDO d'Arboux.

Galeno perperâ Epimelis.

FRONDES Citri & Lauri, nō tenues, vt perperam legitur apud Dioscoridē huic sunt Arbuto, quæ secus montosas & Maritimas vias Galloprovinciæ Norbonæ, æstate numerosa Fraga edit, Coccineo hiliaris purpuræ aspectu micantia, & quasi superbiētia, acerolis compactis partibus, comosis intus, edendoque guttur asperantibus conflata; vnde fortè νόμαχος dicta. Berberidi concolor flos calyculis luteolis.


Vulgatior LAVRVS baccifera Laurier.

Laurus humilis Virgultacea, non Baccata.

FATIDICÆ Lauro flauescit flos, nigrescunt bacca matura: frondes autem sempiterno nitent virore; iniectæ igni fragorē edūt salis strepitu, vnde Daphne quasi Duophne dicta. Sponte multa calido solo, non nisi satū in Angliâ & Belgio. Alia Gigartifera surculo, non semine oritur, hyeme in Belgio emoritur, & arbusculam tantum æquat.

Laurus regia Latiorum.

Laurus TYNNUS carula bacca.



VTRANQVE earū prorsum vultu emulatur Laurus Tynnus, valdequàm elegās & noua, assurgitque in arboris æmulationem. Fert Corymbaceam vmbellam multis conflata Terebinthi seminibus, aut Gigartis vuarū similibus, sed ex argenteo in cœruleum luridis. Flore ex albo purpurascente. In Valenæ nemore Norbonæ plurima, & plerisque locis Ceti montis, inter Cocciferas Ilices, frequens. Premitur oleum ex bacculis, quibus valdequàm lubenter vescuntur sturiones, turmatimque ad illas conuolant.

Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 425

*CEDRVS Theoph. cuius Diosc. MEDICA MALVS, sine
Cidromela. ARANTIA, LIMONIA, CITRIA, LI-
MÆ, & Pomum ASYRIUM.*

Hanc antiqui à solo Medo Medicum, ab odoris diuina fragrantia Cedrum & Citriū dixerūt quasi Cithyō odoramentū Diuis libandū: tametsi hæc in Africa sit syluestris, & Olbiæ Galloprovinciæ adeo familiaris in afflatu oræ maritimæ, vt sempervirentium Lucorum amœnitate & Pomorum fœtura perenni, neutiquam inquilina videatur. Si quis horum Pomorum duo summa statuatur quasi fastigia Arancij & Citrij, vno intuitu cunctas varietates discernet: Nam Arantio folium non planè Lauri, sed veluti geminum, nempe vnum in petiolo quasi pinnatim inest, maioriq; subest, quod nonnihil angustius supernè videtur quàm Laurinum. Ipsa autem mala Arantia etiam cortice sunt reliquis flauiore: nā ex aureo vel herbaceo Charatiæ sunt concoloria, minus medicati saporis, succo gratiore & magis culinis familiaria, interdū dulcia, interdum acida. Cætero Citrij generi frondes sunt Arbuti aut Lauri, sed latiores, nec pinnatæ, multis itē intercurfantibus secundū ramos sentibus: flores niuei Ornithogali aut Styracis, qui condiūtur & miscētur cardiacis: aut stillatitiam dant multo suauissimæ fragrantia.

Hac autem Citri tribu poma *Limonia* vocata frequentiora sunt, eoq; minoris sūt: ob-
lōga, succo acidior, acerbior, frigidior. Cortice & carne magis esculentis, nec perinde
vt Aranciorum amaris, maioris ad incidendum efficacitatis.

Deinde *Medicum* Diosc. malum, tres amplexum est varietates. Vulgatius est similis
Limonio, oblonga oui effigie: Sed maiore, cute rugosior, magisq; caperata, odoratius est
medicatus, antidotis commendatius: Pulpa & succo in acetarijs multo gratius.

Lima autem quæ dicuntur, illis duplō ferè maiores sūt, calloso carnosio corio, pollicem
interdum crasso, oblonga Cucumeris aut Melonis effigie, superficie concolore Limonio
aut Citri o-puluillis & torulis rugosis papillatim extuberante, vt Citri sapore condito, &
crudo grato.

Pomum *Asyrium* Adami vocatum, è latiore basi in obtusiorē conum rotundius tur-
binatur, vertice circulatim obtuso & quasi vmbone depresso.

*CINAMOMVM & CASSIA Græcorum
XYLOCASSIA Offic.*

Dicta sit fortè Græcis *νάσυ*, quod corticem coriaceūve operimentum designat, cuiusmodi Cassiæ tubuli erant: istius autem Cinamomi, puta folia, corticem, & furculos, quæ vidimus, quæ partim audiuius à peregrinatoribus, partim & legimus, testantur esse arborem affimilem Oleæ magnitudine: adeo similitudine Lauri & Arbuti, vt quidā recentiores minus consideratè hanc fecerint cum nostra Lauro eadem, sed duntaxat solo diuersā. Iam non ambigitur, an vera extet Cassia, sed disceptatur, quid ab hac Cinamomum distet. Istud autem hodiernum Cinamomum, neq; idem Cassiæ, neq; tamen multo diuersū esse, certū est. Nam si vtriusq; ex Dioscoride notas perpendas, videbis ferè easdem esse vires, non item disparem vsum. Si recentioribus assentiaris, & exploratioribus, eiusdem arboris non ita diuersas partes esse discēs. Quod etiam percipitur de Galeno & Plinio. Nam quod vterque suspicatus est, adeo verisimile est, vt verissimum videatur: nempe, esse variz arboris, aut eiusdē diuersas partes. Descriptioni Diosc. nō magnoperè attendendum: nam cum dicit varias species esse, intelligit gradus potius & varietates, etiam vnius speciei. Locus est Arabia, nempe Emporium, quemadmodum hodie Veneta vocatur Terebintha iris & alia multa. Planta ipsa stolones *ραββί*, id est, rami, *παχύφλις*, id est, Crassi corticis: igitur non arborem, nec quidem ramum, sed potius eius corticem describit, colorisq; notam apponit *κοράλινον*, id est, Coralli æmulam, nempe nondum perpoliti aut nitentis *σευπ*, id est, angustam valde: Nam si crasso sunt cortice, tubum non valde latum relinquunt. Ideoque crassam & latam addit. Quibus è coniecturis
Nn. iij. quid

quid inter Cinamomum & Cassiam sit differentia percipi potest. Nos verò meminimus duodecim annis ferme elapsis, Cassiam ad Cinamomum verum in proximè accedentē nos vidisse in officina Gulielmi Dries Pharmacopœi Antuerpiensis, in hac parte valde exercitati. Erat verò multorum iudicio furculus ille Cinamomi, baccillo solido, fractu facili, Cinamomæ cortice obfecto, cui etiamdum cuticella pullo colore obducta fuit. Folium verò seu pictum, seu sicum multis in locis videre est.

XYLOCASSIA

Dum hæc meditaremur, quidā Veneti institores, qui Londini negotiantur Morgano nostro, corticem, fermè pollicem crassū, scabrum, calosum, & foris lili aut Oleæ concolorem, interius verò connexum mollius superficie: odore, sapore & colore quadantenus Canellæ vulgaris, quam prorsum gustando præfert nostra: idcirco & quorundam consultiorum medicorum sententia fert esse Cassiæ arboris extimum & crassissimum corticē, ut iam vnius arboris duos cortices habuerimus, quorum hic sit crassior, alter delicatior, odoratior, multoq; ad vtendum commodior. Est hic gustu astringenti, sicco, adq; sistendū fluorem, ut putarim non parū oportuno. Eius interior superficies videtur à caudice arboris Canellæ auulsa, odoris præsentia nares feriens, & os mansu, complens gustu Cinamo meo. Quare non modò non deest nobis Cinamomum verum, quod conqueruntur ex Galeni descriptione, sed etiam adsunt plura quàm ille memorat: nempe illud graciliore fistula, colore fusco, sapore & odore vegetissimis, quod plurimi, hodie sit Venetis, & Theriacis ut verum additur Cinamomū: deinde nostra Canella vulgarior: postremo iste cortex iam dictus, qui nequiquam est contemnendus, oleæ caudici concolor extima superficies, quod magis fulcit coniecturam.

Cortex XYLOCASSIÆ facie, an sit Diosc.
& Pl. MACER.

Inter superioris corticis magna fragmēta, etiam repertus est alius qui ex cuiusdam arbusculæ stipitis imo exēptus: interiori sui parte valde, similis & concolor superiori est, sed minus crassus, ferè inodorus, aut quiddam iuglandis & Lauri redolens, gustu: perparū caloris glutinisve mixti astrictioui habens, cum autem Diosc. & Galeni astringens sit & calfaciat, arboris cortex hic videtur.

Piper { album,
 nigrum,
 longum.
Cubebæ Offici.
Caryophylli.
Asphaltus { Rhodius.
 Rosens.
Agalochus.
Lacca.
Myrrha.
Bdellium.
Thus.
Thus Lympidum.
Styrax.

Cotonea malus.
Flex humilis coccifera.
Aquifolia.
Ilex arbor.
Suber Olbia Galloprovincia folio rotundiore.
Suber angustiore folio.
Phellodris.
Quercus.
Cerris Plinij echynata.
Glandes Guinea.
Galla.
Fagus.
Castanea.
Castanea equina.

PIPERIS ROTVNDI duplicis frutex, longè diuersus à Pipere longo.

Minus veram antiquis Piperis plantā, minusq; notā fuisse putamus, aut cōfusus proditā notis, quando etiamnum hodie ab istis naucleris qui magnā Piperis nigri vim ad Septentriones asportarunt, rite referatur effigies: Eam dicebat quidam eorum non imperitus esse arborem, plurimi iam fruticem aduolui solitam Periclymeni modo, ramis crebris

bus

Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 427

bus, tripedalibus. Citrij folio, magis exucto, minus nitido, ima parte perquam venoso. In prælongis racemosisq; gracilibus pediculis gemina serie racematimq; acini conditur, vocatur hi nigrij: Rugosi sunt lauiore & sæpissime vieti.

ALBI verò rotundi, tametsi scanilis planta sit, similima nigræ: tamen calidioris esse naturæ indicio est feruor, qui maior multò in albo Pipere percipitur, & carius habetur, pauciorq; copia mittitur ex Orientis, sub Equatore, Insulis Molucis.

Piper autem Longum, longe alia planta, alia loco dicenda.

CVBEE Offic. non est Carpesum.

Stius Bacculæ, quæ Officinis notissima est Cubeæ nomenclatura planta, iisdem pene in locis oritur, & pariter Hederaceus frutex describitur, folijs Myrto latioribus, angustioribus Mali Granati: acinuli in singulis pediculis singuli propendunt: fieri potest vt sit Nigro Piperi congener quando rugosum & enanidum videmus.

CARIOPHYLLI.

Non nisi recenti oribus Græcis innotuere Cariophylli, vtpote ex maximè diffitis oris Indiæ meridionalis Orientis adferri soliti. Eius folia quæ habuimus, fuerunt Arantij magnitudine minus virentia: alia latiora & rotundiora ostendebant Doctissimi Comasus & Anguillara, hic Ferrarig, ille Venetijs: spirabat istud Cariophyllum. Flores conditi cum petiolis & ramulis teneris, nonnullis Emporij celebrioribus, vt Antuerpiæ, Venetijs, & Genæ sæpe visitur. Alioquin floridi ipsi clauis denticellis stellatim decussatis cristati, noti sunt omnibus, notamq; arboream facile redderent: Eius Gummi quod eximij odoris est, glæ Ammoniaci cōcretionem & colore, seruamus hic musarum thesauris.

ASPALATHVS.

Haud dispar Aspalathi difficultas, sed non perinde magna necessitas fuit hæcenus. Verum, recentiorum sedula vestigatione factum est, vt tres lignorum differentia nobis innotuerint, quarum quælibet Aspalathi nomine digna est. Prima nobis visa Veronæ & muneris data ab eximij Pharmacopœis Francisco Cocleario & Andrea Bellicoco, qui suis Theriacis mysticis, de Doctorum Veronensium consilio, miscuerunt. Frustrum quod habemus densum solidum & compactum fuit, quasi cuiusdam fruticis imæ parti resectum, radiatis fibris, ponderosum, colore buxæ sed saturiore, suauissimo odore & pertinaci. Eum esse verum Aspalathum tum persuasi fuimus. Sapor non ita amarus nec gustu insuauis.

Altera species Venetijs aduecta Rhodo missa fuit: Nicolao Comasco Medico imprimis erudito, apud quem tum maximum truncum vidimus, cortice exutum, rubentem, taxo concolorem, odore adeo fragrantem, vt quam latè patebat cænaculum eximio imbueret odore. Eiusdem nos adhuc frustulum seruamus dono missum à peritissimo Pharmacopœo Valerando Donrez, qui ab eodem accepit.

Aspalathus.

Superest tertia, albida foris, intus torulo subflauo aut citreo, sandali albi & Citrini simillima albam Rosam sapit, nullam gustanti manifestam exhibet qualitatem, nisi tantillum calidi, quod vix gustu discerni potest. Hanc primum nobis dono dedit optimus vir Pharmacopœus Londinensis Morganus & nomē id indicauit. Alioqui Oliuastri Rhodiensis aut Sandali speciem arbitrantibus



*Aspalathus
Rosens.*

Quot sunt paulò instructiores Officinæ, tot sunt fermè Agallochi species. Quædam enim Ebenum, Aspalathum. Aliæ nonnullæ Sandalum, Citrinum aliæ autumant. Sed charissimum & vfu probatissimum hodie magna copia Venetijs habet institores, gustu astringenti, præsicco, non multum amaro, suffitu suauissimum reddit odorem, & succu aut liquorem pinguem, odorem, qualem in Ebena vel Guaiaco videas, cui concolor, & fortè congener.

Arabū Lacca & offi. an sit Diosc. **CANCAMON.**

Laccam arborem & nomenclaturam Arabicam esse quadantenus arbutu & pruno similem multi referunt, cuius sint frustula & furculi, quos vulgari Lacca obductos in officinis habent: quam nullis rationibus seueriores veri exactores, Laccam Arabum Dioscoridis Cancamū esse inficiantur: hinc perspicuum, quòd alius alio vergit, omnes diuersi abeunt. Censet Anguillara à docto Montano persuasus, Benzoin potius esse Cancamon. Quia, inquit Montanus, Cancamum odoratissimum est: Lacca non odorata: sed neutrum verum. Quia nec Dioscorides odoratissimam dixit, sed tantum odoratam: & sanè eius odor suavis & gratus suffitu, quomodo Dioscorides vsus fuit. Addit vir doctus: Itaq; Benzoin putari, cui congruunt ea quæ de Cancamō antiqui dixerunt. Neq; istud quidem compertum, nam adeò non magni fuit apud antiquos Cancamū, vt Theoph. Galeno atq; Etio, magno medicaminum censori, silentio præteritum sit, qui tamè toties Balsamū, Laserpitium succum, Cyrenaicū, Myrrham, Aspalathum, cæteraq; id genus, inculcāt. Deinde aliunde deuehitur Benzoin quàm Cancamū, siquidè hoc Arabicæ plantæ Lachryma est, illud nō Arboris lōgè alius solo, effigie, & viribus. Iam si propterea quia odore fragrat vegetissimo, & adeò myrrhā emulatur, vt nō rarò imponat (sic inquit Mōtanus) nō idcirco illicò probatum est, nam non similitum, sed quadantenus simile Myrrhæ dixit Dioscorides. Et etiā si dixisset, parū Montano id argumentū fauisset. Quippe Styra, Bdellium, Thus Limpidū, Album animæ, multeq; aliæ Lachrymæ, Myrrhæ similes sunt, & proinde huic Laccæ: non tamen sunt idem, non est igitur Benzoin, Cancamum Diosc.

An verò sit Chermes, cuiusvis est sciscitari, at non nisi eruditi statuere. Excrementum namq; Illicis illud insectoriū quæadmodū cætera querna, quæ in vermiū excrementū etiā fatiscunt, vnde vermillō, crassarū est partiū, astringit nō inciditq; odore nullo, & incerto ex ratione euentus est. Nā quòd sua experimēta quasi argumēta certa venditāt recentiores, facta tua meraq; est incitia: nō enim per se dant neq; certi sunt, illiusue, an aliorū sudorificorū viribus & merito proliciāt sudores. Hic tamè cum anxij animi quid tanta de re statuendū foret alternaremur, Oraculū, id est, Appolinis speciosū illud delubrū, quod illi glorioso Vercelleni hiatori in honoris æde erectū sperabamus, consultū rogatūq; sententiā ire

visum fuit. At ille illudit nobis, nec dubiū exemit, sed turbellæ Pharmacariorū risum iocōsq; mouit.

Ceterū, si cui minus placeat ista valde bona, & iā inde ab vsq; Arabū primis tēporibus vsurpari ccepta ad omnes illas affectiones, quas Dioscorides cōmendat, potius, quàm illa incerta & inerti vtatur, Myrrham vel Bdellium optimum per nos vsurpare liceat. Quid verò cui magis quadret, in antiballogenis latius.

Myrrha.

Myrrha, quasi suauiter & odore fluentis vnguentariaq; distat, nomen indicat Lachrymæ, sed cum tam multa sit affinitas huic cū Bdellio, Styra, Cācamo Benzoino, Albo animæ, facit illa arcta similitudo, vt neq; penitus nullā, neq; planè optatā nanciscamur. Myrrha tamè nō carere nos certū, vt neq; Bdellio, sed quia vtriq; tanta necessitudo, vt nō tam specie quā accidētib' distare videatur. Vtrū Bdelliū præferēdū sit, meritò ambigimus. Etenim quòd Bdelliū putatur, quia certò scimus &

*Myrrha aut
Bdellium suo trū
co & furculo spi-
noso hærens.*



Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 429

& à Rondelletio experimentis persuasi sumus optimè viribus Myrrhæ respondere, putamus illud Myrrhæ speciem esse, nec vulgare rationis momentum istud. Londinum superiore anno allatæ multæ peregrinæ merces fuere, inter quas quàmplurimos huiusce ligni furculos expiscati sumus, solida substantia, cortice duro, nigricante, spinis multis & rigidis, crassiusculis, horrentes, quibus multa copia Bdellii erat aggesta, intus forisque valde quàm amari; Cætera descriptioni Discoridis perquam similia. Cæterum frustra vellitant scriptores isti, & de colore refragantur herbariorum Senensi: nam vidimus nos in Officina Guillelmi Driesch periti Pharmacopœi Antuerpiensis, fuluam, albescentem, adeoque viridem Myrrham. Itaque illud $\chi\lambda\omega\rho\upsilon$, vt est vagum significatione, ita congruit rei faciliè varianti colore. Siquis namque expiscetur sedulò, videbit interdum frustula viridantia, cuiusmodi nos vnum habuimus, quod multis ostendimus.

BDELLIUM.

BDELLIUM quasi olidum putridumve dictum. Quia autem à nemine proditum est, qua planta Myrrha manaret, eaque adeò similis proditur Bdellio, vt ferè indiscrètæ similitudinis sint, valde verisimile est eiusdem esse similitudinis spinosas arbores. Nam & nobis compertum est crebro vsu, vtrâvis ciere menses, mollire admotu, illitu, suffitu, ac quouis alio modo, tametsi maioris, minoris virium momento quadantenus, vt cætera omnia, differant, colores, varietates, sapores, fermè easdem. Nam si qui de odore vellitèr, sciant suauitatem in odore, non semper ab specie, sed gradu mixtionis manare. Etenim eiusdem generis plantæ scetent quædam, aliæ iuuuiter olent. Itaque sic accipiendum, Bdellium suffitu $\epsilon\omega\delta\epsilon\mu$ siue odoratum dici à Dioscorid. quemadmodum Vnguis odoratus, Castoreum, Muscus, Styra liquidæ, Caphura, aliæque multa, quæ præ vehementia scetent, aut ingrata sunt. Quare cum vtraque proximè alterâ spinosa arbor describatur, & Gummi adeò simile effigie fundat, voluerunt quidam, non nisi tanquam syluestrem à satiuâ Myrrha distare Bdellium. Porro Myrrhæ descriptio, quam dant, non est ita diuersa ab ea quam Plinius Bdellii scripto reliquit, Bdellium nominatissimam arborem, nigram, magnitudine Oleæ, folio Roboris, fructu Caprifici, naturæque. Quem Caprifici quadantenus effigie fructum industria peritissimi exoticarum plantarum Caroli Clusii in versione bus è Garcia habemus.

STYRAX.

QUOD ex hac emanaret liquor, ac veluti stiriatiui extillaret, Styra dicta videtur. Eius feracissimus ille tractus Galloprovinciæ, qui à trium Mariæ Sororum fano antiquissimo, ad forum Iulium vsque porrigitur: est namque prope oppidum Solarium collis lætissimus & opertus frequenti, Styrace, nullidū illic cognita, quam primi nos iuuenique multum Pharmacopœis & studiosis, tum Monspeßuli Professoribus ostendimus: nam iamdiu videramus Venetiis in Franciscanorum horto: truncus ipse similis betule ligno, aut mali cotoneæ: folia vtrâvis minora, & quàm Cotoneæ minus rigida, minúsque auersa parte cana: flos albidus, Arantiæ magnitudine, nò odore. Baccæ aliquàm multæ Staphylodendri magnitudine, rotundiores tamen, quas excipiunt vngulæ ternæ atque amplectuntur, quæ pediculo longo hærent. Inibi tametsi tanta copia est, nihil tamen liquoris effluit, sed Lacrima Styraçis Venetias defertur purissima perquam odora, inque grana & glebas hammoniæ modò coactas, quibus inest quidam melligeni similis liquor, qualis è facis defluit.



CYDONIA MALA.

DE **P**OMI orbiculata circinnatione turbinati Cytonium vocarunt ipsam arborem, quæ vbiuis valde ferax est, sed præcipuè in apricis & viretis calidiorum regionum, vbi malo speciosiore, aureo, melino, foeta visitur, lanugine tomentacea obducto, ipsa sit odore grato, perutili stomacho carne.

THVS.

THVS *ῥόδεν* dictum, quod Diuis faciebant & adolebant thuris glebam, vti etiamnum vulgò fit. Est itidem & Thus Lacryma Arabicæ arboris, quæ multis iamdiu sæculis cognita & vsu recepta, vera genuinaque est: Verùm ipsa planta vixdum cognita planè est, nisi de paucis notis, quia pusilla est arbor, foliis Lentiscinis, Arabiæ indigena. Eius sunt vires mirificæ, intus & foris aduersus morbos perquam graues magnæ & conspicuæ vtilitatis, quas recensere longum foret.

THVRIS *Limpidi folium aiunt.*

THVRIS Limpidi, pellucidi & resinæ Cedriæ emulsi nitorem puritatèque Succini assequuti, nobis & visendi & habendi fuit copia multis in locis, quod non perperam Dioscorid. notis quadrat, si notas, vsumque perpendas: nam & dum adoletur suauissimum halat odorem, & vulneribus, tumoribus, discutiendi vi, nonnulla relicta astrictione, ad robur partis opem certam fert. Rupellæ occidui maris quadriennii fermè est cum doctus medicus Launatus nos gummi istius glebis, arboris fructu & folio, donauit. Asserebat nihil tamen, sed sibi relatum à nautis vtrūque, trunci Pino similis sobolè esse. At folium, quia valdequàm rarum, nequedum ab vlllo depictum, hic dedimus, magis sciscitaturi, sitne Resiniferæ plantæ, quàm asserturi. Est namque, quod rarò coarctat aliis, ab imo pediculo ad summum vsque cuculæ verticem, duplicatum, quasi ex geminis conflatum tenuibus tunicis, vagina, sesquipalmum longa, instar infundibuli, hiantis histrionis speciem præ se ferentis; supernè Galeata videtur, quod de floribus Nappelli & Lonchitide, non de foliis vllis, memorant autores.



COCCVS *infectoria, seu Ilex Coccifera, an Aquifolia Pl.*

INFECTORIVM granum cruore miniato & muricato pannos imbuens, nomen Arbusculæ fuit. Si, quam sæpè meritò & profusè laudat, suam Italiam Senensis Commentator tam diligenter lustrasset, neutiquam dubirasset, an huius arbuscula, vt vocat, repeririatur in Italia, ac multò minus Bizantio Cocciferam Ilicem hanc accersiuisset. Siquidem frequentissima hæc humillima Ilex, cum plerisque Italiæ locis, tum præsertim in Hetrusco, Romano & Senensi finitimo agro, locis montosis, glareosis, sterilibus, inter varias Ilices, Smilaces asperas, Terebinthos, Lentiscos vbi etiam, tametsi pauca & parum, nec quotannis, tamen nonnulla Coccum ferunt. Sed quia minus Coccinum & paucum, citoque euanescent, partim ignoratur, partim negligitur. At in Galloprovinciæ Aralatenfi planitie patètissima, solibus æstiuis retorrída, squalida, glareosa, lapillis silicibusque constricta, & Frontignanæ Norbonæque maritimis hanc legunt mense Maio, annis adeò æstuosis, vt totum semestre nihil penitus pluât. Plebecula tunc turmatim & vicatim confluit illuc Coccum lectum, quem Vermilionem voce vernacula vocitat, atque venundat in mercatu singulam libram 12. & interdum vicenis assibus Gallicis. Perelegans naturæ opus & visendum, non tamen fructus aut semen, sed excrementum nobile tantillæ Ilicis, quæ à cæteris Ilicibus exilitate tantùm differt, horridiore aspectu, & rigidis spinulis, densis, crispisque foliis ac sinuosis, angulosis, minoribus, semper virentibus, sed Agrifolium præ se fert. Coccum autem ferunt copiosum, & amplexantur folia imi introflexæ spinæ, atq; surculi

culi præduri copiosiores, nitidum, Agrifolij aut Asparagi hortensis planè similem, concolorem. Fusciore tamen & obscuriore foris, intus verò sanguineo cruore lucido gliscit, què pressu excipiunt recetem ad medicatas cordiq; amicas. Alkermes præsertim confectiones, Pharmacopœi Mōspellienses, Aquisextienses, Massilienses, & Arelatenses, crudo, candido, vel fuluo serico, illic etiam à Scriticis vermibus neto & glomerato. Verum infectores, qui magnam vim cocci emunt, non premunt: sed aceto aut albo vino irrorant, ne in vermiculos, aut vinifugas exiles muscas abeat cruor, penè vacuis relictis tunicis. Sicq; in puluerem rubellū miniatum redactū seruāt; vnde Scoletium antiquis dictum, seu vermiculosū istud, esse, satis liquet: & cōpertissimum non esse fructum, sed excrementū Illicis: cui in surculis sunt glandes longiores, nitidiores, nigriores Quernis, sed Echinato acetabulo, non bullato ima parte, inclusæ. Flores verò Martio illic promit muscosos, subluteos aut herbaceos Oleæ Illicis, aut Querqus. Cuius etiam medijs folijs & trūco non rarò animaduertimus excrementa rotunda, rubella, & interdum flaua, maioraq; istis, in varijs locis Galliz, Italiae, Germaniz, quercetis prope Basileam in Heluetia plurima. Quæ non alia videtur ab ea, quam mulierculæ, Dioscoride dicente, legebant ore, & vocabant Coccum, fortassis quadam, vt verisimilius sit, similitudine. Sed cum nostrati Nōrbonensi & Hispano nullus hodie notior aut potior habeatur, virēsq; eidem omnes congruāt, quas meminerint scriptores, frustra istum improbat, & alium expetit, qui neutrum probè nouit Senensis Commētator.

Septentrionis *AGRIFO LIVM*, siue *AGRIFO LIVM*, non est

flex, neque *Cratægon*, neque *Aphricana Palyurus*.

LVbens hæc & perquam frequens arbor crescit in frigidis regionibus, vt Anglia, Germania, & Francia: calidiorum autem duntaxat montosis aliosis rarò & agrè frutescit: quare nequit esse Palyurus Aphricana, cum sit etiā eius inuicendi saporis bacca. Neq; esse Illicis speciem certum: non enim glandifera est, & natales Illicum feraces, adeoque astuosos odit. Quare indicta fuit Diosc. nec fortè valdè nota Græcis. Est tamè persimilis Cocco, infectoria folio, quod perpetuò viret, sed latius hyeme, spinis horrido, in margine multilatero, leniter sinuato: bacca Oxyacanthæ, Kermes, aut Asparago cōcolor, sed ingrati saporis: cortice ad gluten aucupatorium consiciendum apto.

VTrauis superiorum adeò huic similis est, vt non sit discernere illicò facilè, à Cocco præsertim: huius tamen glandosus Echinatus fructus oblongior est, dactylum aquas, nupiam coccum ferēs, etiam vbi inter Cocciferas Illices frutescit, proceriore maioreque trūco, ramis & frondibus perennibus.

Dicta *ægræ*, quia ferra propter duritiem fuit secanda: syluæ quadam in Galloprovincia & Nōrbona, quantæ quantæ sunt, Illicita sūt, cuiusmodi est Garantius lucus ad Mōspellum, vbi proceras & querna elegantia quàm plurimas videas, sed oblongo Arbuti folio, tantillū denticulis per ambitū asperato, perpetuò atrovirente, oblongiore, graciliore superne: Querqus glande propendēte, nucamento muscoso, luteolo, non diuerso.

Eadem illic variat stipite humiliore, albidior foris, & Oleæ similiore: itemq; glande, altero tanto minore.

ESt *ægræ*, erumpo, pullulo, vnde vox *ægræ*, qua designarūt potissimum glādiferū genus, & præsertim Quercū, quam tum dictæ iam arbores, tum frequentissimus occurrit, ipsaq; celsior & ramosior arboris species, frondis grandioribus anfractibus sinuata, quauis notatione notiozem faciūt, tum frigidis, tum calidis plagis. De cuius adnata, excrementitiāque multiplici sobole, plantis, fungis, fructuum rudimentis, musco & vellere nouitate spectando, iam quædam diximus, & multò plura in Agaricis dicemus. De Quercu marina inter Algas, de esu & vsu Medico omniū partium & fructuum, deq; Querno sale consiciendo ad corporis humani & metallorum medicamenta, inter remedia.

Querqus ægræ, siue *præcella dicta CERRIS* Pl. tristi prægrandi Echinato glandes.

QVa itur Pefaro Romam publica via, visuntur celsissimæ, alibi minus peruiz, nec valdè notæ hodie: cuius glandes prægrandes capulum habent Echinatum, ambitu squamis præduris sibi mutuò incumbentibus, horridum, magnitudinem fere Echini marini aut semiconi laticis æquans, cuius nonnullam similitudinem retinet: valde crassus est, interiori sui parte lenis: glans, quam claudit, nonnisi magnitudine differt, folia maiora multo: eadem alioquin Quercui.

Ex

Suberifer latifolia Ilex glande echinato.

Suberifera angustifolia Ilex.

Phellodris.

EX vnaqualibet superius narratarum primo quoq; intuitu quivis suberiferā noscitet Ilicē, *Ἰλῆξ* à cortice dictā quia semper altipetus & inimmerfabilis vndis manet quē si excris, omnino eandem cum arborea Ilice dixeris. Ei tamē folia & glandes rotundiora, breuiora, item dētata: cortex geminus stipitem amicit, alter interior qui perpetuō hāret: alter crassior duos pollices, rimofus rugofus, perquā levis, qui deglubitur, & quolibet gētium deferitur ad crepidarum soleas suffulciēdas, aliāq; multa necessaria. Multa Galloprovinciē maritimis Tholonē, Olbiē & alijs adiectis, & in Tuscaniē Lucē prētura.

SE n ad Apēnini radices & Anconēsis agri nemorosis collib' multō frequentissima, quā angustiore, lōgiore, minusq; crenato folio est, ad arboream Ilicem accedēte: glādofo semine, cupulo foris pungenti, asperedine squabro.

QVasi ē cōfusus Ilicis & Querquus in hāc principijs, nomenclaturam Theophr. φελόδρις, siue Suberiquerquum cōflavit. Etenim de facie & folijs Ilicem quampiam dicas: ipsū autem lignum mollius & laxius Ilice, sed folij incisura serrata Castaneā, non Querquus: reliqua effigies Ilicis,

minor tamen Quernis: maior Ilignis, non glandes, sed ἀκὺλα exiliora & oblongiora.

EX hac tribu eam meritō quis putet apud Theophrastum dictam Salsicorticem & Ἰπύλοισιν, quam hodie robur vel *Roure* vulgus nostrās vocitat, vt quā sit perquā solido cōpacto trunco, multū cineris vrendo relinquente, qualem etiam ē vulgari Querno trunco nos parandum curauimus.

QVa autem Gallas dat Quercus, duplex videtur: Earū vulgatissima nemorum & saltuū Pedemontium Delphinatus aliarumq; regionum temperatiorum est alumna, minore stipite, brachijs & fronde. Huius quādam varietas aut differentiā videtur Fagus Theophr. dicta vocis argumēto Latinis Esculus, cuius esculenta glans & post Quernā dulcissima celebratur, famemq; explebat primis mortalibus: hodie *Fargni* & *Farguo* Italice: *Hargni* Gallicē: lignum istius firmitus proditur, quam vrbane Quercus.

At



Citimus hic ramulus Phellodris Ar cadum est apud Theophr. & Ilex famina lib. 3. cap. 16

AT Fagus vulgaris, glande diuersa à Querna est, triquetra, pusilla, vtrinque acumi- FAGUS;
nata, unde *ὄξυς* Theophr. videtur vocata. Ligno etiam est minus compacto & ro-
busto, fronde Populnea, aut Alni: longiusculæque videtur abesse à Quercu; tametsi &
hæc potuit Fagus ab edendo dici: cuius glandis nucleus esca pauperulæ plebi & vris
quæsitæ, regionibus frigidis & calidis.

CASTANEA syluæ sunt Allobrogum & in Aluernis, quamplurimisque nemorosis, al- CASTANEA,
siosis, regionum tamen non frigidiorum; nam cælum Aquilonium non ferunt: præ-
grâdes, stilis muricatas, echinofas glandes edunt: medulla omnium glandiferarum sua-
uissima, & ad panificium aptissima: frondibus longioribus Canabinis, aut Ilcis grandio-
ribus, similiter Fago aut Ilci, sed angulosius plicis.

MIXTÆ quasi naturæ ex Fago & Castanea est ea quam naucleri vocant Equinā: fron- CASTANEA
dibus digitatis Hellebori aut Ricini, Castanæ alioquin fimbriis donata: in qua Echi- equina.
nus octennium aut decennium Castancæ, eiusque nucleum claudit & tuetur saporis perbo-
ni; vt nonnullas incorruptas prædulces gustabamus in Musæolo Preceptoris Rôdelletii; &
etiamnum habemus dono cuiusdam Pictaui, qui multa rara ex Barutho & Aegypto no-
bis comunicauit. Affabrè visitur expressa, vt quàmplurima, in Commentariis Mathioli.

Sambucus vulgaris corymbacea.

Ebulus, siue pusilla Sambucus.

Malus.

Pyrus, Pyraſter.

Mespilus.

Aria Theoph.

*Alpina arbuscula, bacca Oxyacantha, recen-
tiorum Chamameſpilum.*

Euonymos Theoph.

Cornus arbor & frutex.

Cornus fœmina, siue virga sanguinea.

Cerasa & varietates.

Cerasa racemosa.

Chamacerasus.

Prunus syl { *Vtraque.*
Domestica.
Varietates.

Prunopersicum.

Armeniaca malus { *Maſor.*
Minor

Sebesten.

Iuiube vtraque

Paliurus

Paliurus altera Theophr.

Paliurus altera peregrina.

Pyracantha.

Berberis.

Myrobalani Arabum.

Thamarindi.

Lotus arbor Dioſco.

Lotus arbor Theoph.

Guaiacum Patanum.

Guaiacum Officinarum.

Palma sancta, siue Palum sanctum.

Ebenum.

Tilia { *Fœmina*
Mas } *Theoph.*

Ulmus.

Carpinus.

Betula.

Aldus.

Alnus nigra, siue Frangula herbariorum.

Nuces auellana.

Populus { *Alba*
Nigra
Lybica

Arbor Iude.

Populus Noui Orbis arboris Iude folia.

Morus omnis.

Sycomor.

Ficus omnis.

Platanus.

Acer.

Sorbus torminalis.

Oxyacantha.

Mespilus Aronia.

Sambucus { *Aquatica.*
Varietas.
Montana.

Piper longum.

Ribes vulgaris & nigra.

Vua crispa, siue Vitis precia.

Amomi & Cardami differentie.

*Rosa satina, syluestris, cerulea, lutea, & vari-
tates.*

Eſglentine.

Rubus omnis.

Cynobatos.

SAMBUCUS VULGARIS corymbacea.

QUA EST LITTORVM CREPIDINVM QVE opacarū amans, Actæa, siue ακτή, quasi littoralis dicta videtur: Sambucus etiam Latinis vocata, aut potius Sabucus, Sereno monente, à Sabucæ instrumenti similitudine, quæ illi cum cauis virgis tubisve medulla exenteratis, quibus nulli non è plebe notissima Sambucus est: fraxinea facie, & fronde, sed latiore, nonnihil ambitu crenato: umbellis candidis, Drabæ, latioribus, circumnatis, magisque speciosis, & corymbacea fœtura acinulorum sanguineorum, nigricantium per maturitatem, luxuriante, ad Vuæ æmulationem, Augusto, quando decerpuntur transmittunturque cribris ad pulres, & condimenta, præsertim apud Germanos & Heluetios, ubi pueruli cruorem esculentum farina densatum auidè sorbent. Acetum Gallia è floribus & racemorum succo admodum laudatum & rubrum parat.

Aldermooft Heluetiorum.

ANNOSÆ arboris, apud Boreales præsertim, ramis accrescit excrementum corticosum coriaceumve multis dotibus cognitu dignissimum, plebique Anglæ & Germanæ, Iudæ aures vocatum, proptereffigiem auris, quam cartilagineo concretu rugosoque complexu multis plicis & mandris æmulatur: sed colore pullo, prædurum, aquis merum mollescens, spongiæque ritu tumens: anginis certissimo experimento vtilissimum, & tumoribus intus forisque nunquam satis laudatum: gustu penè insipido, cutis elixæ, aut corii,

Auricula Iudæ.

EBVLVS, siue pumilla Sambucus.

SCITE admodum hanc pumillam humilèmv Sambucum Dioscorides dixit, quippe tanta vtriusque inter se cognatio, ut primo ineunte Vere, nisi quis radicem & furculos huius minores tenerioresque perpendat, non sit cuiuslibet discernere: verum hæc annua herba est: Sambucus autem annosa fit arbor: & Ebulo fronde, facièque minor sit; scapudum cubitorum, odor tetrior, & purgandi vis vegetior. Umbellæ corymbaceæ perquam similes, sed vescendo vix ferendæ. Radix flexuosa, tenerior, humilè sparsa, Vrticæ modo: purgando serum efficax; primo Vere colligi solita.

MALI.

MALI, MALA.

MALVM arborem, eiusque tum diuersitates, tum fructuum varietates, accuratius explicare, ut prolixioris esset instituti, ita nullius ferè operæ precij, quando Malus urbana est arbor prædiis & paradisis perquam familiaris & nota, cuiuslibet cœli admodum patiens: Sed amantior tamen humidioris, sapidior fructus siccioribus, primè hodie commendationis *Curtipendula* ad nobilem Alkermes confectionem.

PYRA.

Alia quàm plurima Mala, cultu mangonio, transplantatione diuersa, in Anglia, Belgio, & Northmania, quæ foris intusque coccinio succo & aspectu micant.


ETIAM Pyra, à turbinata effigie pyramidis in modum dicta, frustrà quis vel discernat à superiore, vel literis mandet: cum perpetua consuetudine videndi in viretis, & esitandi in mensis, nihil frequentius Galliæ, Germaniæ, & præsertim Septentrionis plagis, Belgio, Northmanniæ, Angliæ: ubi *Cidre*, & *Pere* admodum suaues potiones vini vicarias facitiant. Lubens quàm plurimas differentias & nomenclaturas satiuæ & syluestris, tum fructus, tum arboris tacemus, rariora simplicia hinc tantum exequi polliciti.

MESPILVS.

EST MESPILVS sarbuscula congener & similis Syluestri Pyro, non solum folio, quod tamen longius & angustius est, sed etiam pomo, quod item pusillum fert, Sorbo domestico aut Pyro syluestri par magnitudine, gustu, & effigie; umbilicello tamen supernè extatè, aliquot diuisuris & vnguiculis foliosis redimito. De isto politissimus Politianus cecinit: *Regum imitata Coronas Mespila*: nam de prima MESPILVS, in Oxyacantha.

MARIA

ARIA Theoph. effigie Alni.



Nec ita dispari aut effigie aut facultate, sed longe rarior, amā-
tiorque Alpini cœli, Aria vocata Theo-
phra, quam in Angliæ frigidioribus
fyluosis frequentem videas: rarius ca-
lidioribus, nec nisi Alpium iugis Nor-
bonensis Saucenæ & Sabaudia. Folio
Pyri, Fagi, aut Alni, auerso, glaucò, fu-
perne atrovirente: floribus plusculis, in
ymbella candidis Pyracanthæ, aut O-
xyacanthæ: exiguo pomo, rotundo &
gustu Aroniæ Mespili, aut Cynorhodi
alabastriculum æquante: sapore nō in-
grato, nec perinde astringente, auicu-
lis expetito.

Chamæmespilium.



Arbuscula frutæve Alpinus folio Mali, Bacca
Oxyacanthæ aut Pyracanthæ.

ET hæc Alpini soli indigena in asperis Minde-
nis Norbonæ, & saxosis ad Baldum Veronen-
sem: Flagellis exit vimineis nigricantibus duos
tresve cubitos surrectis: folia item subtus glauca,
supernè virentia, propiora nano Pomo, cui nō ab-
similis tota plâta præterquàm fructu, qui bacca A-
riæ similis, æqualis Pyracanthæ aut Oxyacanthæ. Qui-
dam apprimè docti Chamæmespilium nobis sua-
debant: alij Euonymum Alpinam faciebant. Præ-
sicco gustu nonnihil tamen calido, acri & astringe-
nte.

SEd vt verior, ita & frequētiore infœlix Euonymos: nulli enim regioni calidæ aut frigidæ E V O N Y M O S
iuxta sæpes & margines deest, aut ignota est de siliquula quadrangula, quadricoccoûe Theoph.
folliculo, quaternis loculis carinato, quæ totidè claudūt semina: extimus colos ex puni-
ceo flauet: folia, rami, reliquaq; facies illi Mali Punica, sed pallidè ex luteo virgæ, qua nul-
la materia commodior vernunculis culinarijs aptandis, ad carnes laridis ligulis transfigen-
das, ideo Lardariam vocant: tota quiddam spirat ingrati: flores luteoli.

Qo. ij.

Sed

VIVRNA vul
gi Gallorum &
Ruelly, an Vi-
burnū Virgilij?

Ride Sen. Cereas latrationes in Guillād. epist. pag. 385.

CORNVS ar-
bor.

FOEMINA
Cornus.

Pseudocrania
Cordi.

Virga sanguinea
CERASA.

RACEMOSA.

CHAMÆCERA-
SYS.

BRUNVS 64.

Varietates.

ПРЫНЕС.

Gal. Apricos.
Præcotia.

¶ N Italia, Angliæ, & Galliæ Burgūdæ senticetis & syluosis passim fruticat hæc, cuius Ruellius nomē, qui accepisset *Vurnam* dici à suis popularibus & colonis, Viburnū esse Virgilianum coniecit, è quo prædatus Senensis, & vt forex suo iudicio captus, Fluidā prodidit. Sedenim neq; Viburnum potest hæc asseri: non enim lenta est, neq; vllum indicium nisi nomen vagum, ex antiquis monumentis supereft. Fluida autem Rhus, quasi fluentis, Gazæ interpretatio est, vt prius monuerat Ruellius. Alioquin cognatior est folio & flore Arię & Mespili, pariter acino in vmbella condito, sed compresso, oblongo, nondum maturo rubro, maturo autē nigro, non (vt doctus Ruel. scripsit) rubro: folia Alni pubent canitie, & totus frutex albicat, ternū & quinū cubitorum.

Flli consimilis aspectu ligni & foliorum Cornus, sed plusquam cornea stipitis duritie, interdum iusti modi arboris, interdum tantum fruticis. Floribus luteolis, muscosis, ipsum ver ortu antevertentibus: fructu Cerasi oblongi, cœcoloris, oliuę effigie, Gallis & Germanis nota & frequens inter dumeta minus arida, aut iuxta fluentia: gustu perquam aultero, acore non ingrato.

Altera, autē quæ vocatur fœmina. foliorum & ramulorum effigiatura adeò appropinquat huic Eonymo, vt Cornū dixerint. Licet ea nō sit soliditate ligni aut bacca venustate; fert enim pusillas baccas nigricantes Hederæ aut Polemonij, & edendo ingratas, non acidas: flores albos Ligustri, in virgis cortice amictis, ex viridi in fuscum purpurantibus, vnde Virgæ sanguineæ dictæ.

Triualis etiam cognitionis Cerasus, & multiplicis est differētiæ, quæ magnitudine arboris, fructus sapore discernenda est, aut ex vulgatis libris holitorijs percipienda. Flos Persici candidior: & rotundiori folio fatus, quàm syl. quæ passim arborefcit fructu acido mixto, aut dulci. Suauissima omnium Cerasa acidula, quæ & *Aigrettes* vocantur, veniuntq; in culinas & Officinas.

HÆC non differt nisi quia minor tota est, congestimque in racemulis Cerasa fert, flores
pariter albos, quales nobis ostendebat ex Sabaudis Alpibus delatos Valerānus noster

Perquam rara & *Alpigena* humilis *Cerasus*, cubitum pedēne equans, folijs, ramis & stipite *Cornus*, albidis, squallidis nodosis. Floribus albidis, pallētibus, aut luteolis. Fructus binos maturat in pediculis longioribus, pendulis. Cerasi ritu, sed in imo duo foramina albidia, quoddam rudimentum pupillarum aut oculorum adumbrantia : *Gigarta* quina, aut fena, albidia, lucida, *Oxyacantha* paria.

V Bique viarum agros sepit, aut sepes fulcit inter arbuscula vitæ contumacis Sylvestris Prunus: iam latiora edens, iamq; & vt plurimum, pusilla pruna: quarum frutices gemina in differentia sūt, altera horridior, minor, spinis rigidior, fructu minore, acerbior, ex quo fit Prunellorum Acacia. Latior autem sylvestris transplātatione, insertione, & cultu, in grandē, proceram, & domesticam abit: mitiore pomo, succulentiore, suauiore. Cūctas differentias nec otii, nec animus est persequi, cūn liceat bene longas paginas multorum scriptorum de istis consulere: Damasceus omnium olim præfātissimis, Brignoliensis hodie in Galloprovincia palmam præripuerunt bonitate, salubritate, & sapiditate.

Pomaria quædam cultiora Gallica quandam Prunoperficum colût, cuius fructus caro, Pruni est: cute subviridi Pruni, sed nucleo Persici.

ARMENIACA malus $\left\{ \begin{array}{l} \text{maior} \\ \text{minor} \end{array} \right.$

Ed innumeram ferè turbā Prunorū, Malorum, Ceraforum, & eiusmodi fructuū, paradisi nimisquàm notorum, nec lubet, nec licet per angustia temporis & paginæ profectui, quando ea possunt ex varijs & prolixis Rei Rusticæ, scriptoribus peti, vti & arborum quàmplurimarum, quæ communione principiorum, cultu mangonio, & insertione quâpiam diuersam vel figuram, vel speciem obtinuerunt: vt sunt Prunoperfica fortè, & Malæ Armeniaca, Præcocia dicta, quæ figura & foliis referunt Pyrum, pomo autem ipso Malum Persicum.

PER:

PER ^{EA} M aliam esse à Persica & temperamento vario, vel de Dioscoride discas, ne- ^{PERSEA.}
dum ex Galeno: Id alioqui folia astringentia produnt, & is nullas tota ditione Ro- ^{DE PERSI-}
mana, sed duntaxat Alexandria fuisse dicit Perseas ex Perside allatas, quum indidem ^{ca malo superius}
allatis Persicis vniuersa Italia abundaret, non relinquit id controuersum. Eapropter ea ^{& de Persica}
non nisi paucis nota hodie, quia, uti tunc, rara est. Facie est apud Theophrastum præcoci ^{nuce.}
Mali, aut Pyri, cuius magnitudinem æmulatur: astrictione & magnitudine Pyro simi-
lior, fructu autem Persico.

IS T A Pruna quæ voce Maura ex Serapione notissima sunt Officinis. Nec nisi Græco- ^{Æginete M Y-}
rum recentioribus memorata, propterque mucosum succum Mixaria vocata, sunt ar- ^{XA & Officina.}
boris Pruno congeneris & consimilis facultate, quæ agrè solo Italico, vel Norbonico as- ^{Sebesten.}
fuescit: tamen Plinii memoria in Italia creuerit, & nostra ætate in Monspelliensis agrum
urbecula vernaculè *Masillarges* nominata, quidam amicus aluerit: sed neglecta, non diu
illuc superfuit, & tantum arbuscula fuit, facie Pruni & folio, sed latiore: fructu Iuiubæ
cognato, atro & magis viscido.

H A c vix vllam reperias quæ ramis foliis totoque senticoso occurfu magis emuletur *Iuube*.
Paliurum (quem Rhamnum tertium faciunt) in aridis & glareosis strigosis Norbo-
næ arboris alicubi, alibi duntaxat fruticis magnitudinem, ut Monspellii & Anconensi
agro in Italia, assequitur: furculis præduris, foliosis Lentisci, aut Rhamni, multis adun-
cis spinis, intercalantibus, præacutis: flos muscosus Oleæ aut Rhus Pliniane, luteolus
fructus, dulcis, Pruni cute Phœnicea, vel Rubella.

C V M sint tam laxæ descriptiones vtriusvis, & ex facultatibus valdè imbecilles conie- ^{Paliurus &}
cturæ, nullum puto posse statuere quænam cui sit præferenda. Quæ huic Dioscori- ^{Rhamnus.}
dis descriptioni valdequàm accedit, est Rhamnus tertius, nam frutex quantus est, præ-
durus est stipes, aculeatus, semine pingui, linoquenon fuliginoso, sed satis duro, ut lini:
vires huic congruunt: nam lapillos exurit potentissimè: diureticus est: ac proinde haud
abs re doctus Anguillara ambigebat esse Rhamnus Paliurus alio nomine (ut sæpè fit)
nota Africanis transmarinisque regionibus, vel Dioscoridis fuerit vitiatu codex. Quod
ad semen attinet, huic sunt ternæ osicula, uti Theophrastus vult, semine Lini æmulo, non
fuliginoso, uti corruptè legitur, læue, non lentum tangenti, & in siliqua lata folliculari.
specie, ternæ, quaternæ habet, ut sanè hæc ipsissima videatur.

Q V A M verò lib. 4. & capite Theoph. meminit Paliurum, si quis expendat, comperiet ^{P ALIVRS}
alterum esse Iuiubam Sylvestrem: nam fructus rotundus est, ruber, quantus Cedro, ^{altera Theophr.}
cui nucleus inest esui non ineptus: vino immersus fractus, an concilies suauitatem, non ^{an sit Iuuba Syl-}
tam scio, quàm facilè credo, ^{vest.}

P ALIVRS alter peregrinus.

S V N T & alia nonnulla, quas si ausi esse-
mus hic addere, potuissimus pro *P*a-
liuro subdere: nam satis congruunt, præ-
sertim quædam quæ Mospelliensi agro
oritur, spinis horrida, foliis Oleæ, mino-
ribus, baccis nigris, tricoccis, Smilacis,
grauidis, succo fuluo, tincturæ apto, præ-
grandibus, Berberidis modo, granis ter-
nis, sed minoribus, oblongis, gustu sub-
acri, cuius hanc picturam damus, non
procul Monspellio, qua itur ad scaturi-
ginem Lani amnis, secus ripam & pro-
pe viam multa.



RHAMNVS
primus Diosco.

PRIMVS Rhamnus Italiæ, Galliæ, & Hollandiæ maritimis pluribus in locis, ramosus ab imo summo tenuis frutex, aculeatus, furculis albidis, foliis angustioribus, multis, herentibus, Chamæleæ longioribus: iuxta alas fructu denso, racematim aggregato, Asparagi, aut Agrifolii, minore, succo flavo, turgido.

RHAMNVS Secundus
Monspellensium.

SECUNDA species Cōmentatoris minus exquisitè respondere Dioscoridi notis videbitur, illis qui secundam speciem Rhamni MonsPELLII sepibus muniendis aptissimā viderunt: nam tota planta alba & minoribus floribus, foliis Oleæ, sed candidioribus Iesamini pubet, at herbacei coloris: cortice ex viridi pallescente: vtriusque rarus vus: MonsPELLIENSES hunc Rhamnum secundum vocant.



SPINA INFECTORIA,

Rhamnus Catharticus, Recentiorum
folio & flore Mali sylue. Bacca
Alni nigra sive Frægula.

SPINÆ infectoriæ plus est similitudinis facie cum Pruno syluestri, quàm cum Rhamno, cui spinistenus tantum nonnihil assimilat; & vis est purgatoria illi, vnde Syrupus paratur, quo nostri præceptores iam multis ab hinc annis Lutetiæ vsi sunt; certiores viri quàm Senensis: vt qui non ad pituitam crassam & viscidam, sed potius tenuem educendam, & impetum eius in articulos citatum auertendum & cohibendum prudētius vtuntur. Nam sine calfactione purgat, & nonnulla astrictiuncula partibus robur conciliat: neque liquefacit humores, vnde maior fluxus subsequatur.

PYRACANTHA.

EST & in Galloprovincia & Italia arbuscula sepibus non ita frequens, cui facies & folium Pyrastri; aspectu squalida: eius bacca rubræ esitantur pueris. Semina oblonga habent, quasi Pyri aut Berberidis. In umbella flores racematim candidos & fructus Oxycanthæ pares edit, quem, propter foliorum similitudinem, nonnulli Pyracantham vocant: valde est spinosis ramis, non foliis: vsus hodie nullus aut neglectus.



ALgidioris foli aut Montani Berberis est indigena: fruticat & arborefcit senti- BERBERIS
Acola tota, rectis, præduris virgis quinum aut fenum cubitorum; folia numerosa, rigida,
crassiuscula, Pyracanthæ aut Myrti, crenata, gustu acidula edentibus: floribus muscosis,
emicantibus, Ribes, aut Cornus: perpusillis acinis, racematim in pediculis conditis, ob-
longis, Cori item effigie, colore & penè sapore: cortice cinereo, libro subtus luteo, quem
Officinæ *Bugiam* vocant.

HI Syriaci fructus vulgatiùs quàm verius Myrobalani vocantur: neque enim glan- MYROBALA-
des sunt, neque odori, vnguentisve apti, potius Persicis aut Prunis accensendi: Quo- ne Arabum,
rum etfi complures oriantur differentia in Syriacis, Arabicis, & Calecutiis regionibus, de Græco Myro
quibus debentur à Græcis & à nobis: tamè quatuor quinquè duntaxat hodie prostant balano superius.
in Officinis differentie è totidem arboribus. Nam Cepuliferæ & Citriniferæ eadem vi-
detur arbor, proditurque à nuperis nauigatoribus, Persici aut Amygdali folio. Bellerici-
feræ autem latiores Laureæ sunt frondes; sed Indiciferæ Salicis, cuiusmodi etiam Em- Kebuli.
blici videntur: alioquin inter se congeneres arbores promunt ipsi fructus; me- Bellerici.
diam quandam naturam inter Oleam & Prunum sortitæ. Horum plurimùm duo gene- Citrini.
ra condiuntur, aut huc condita adferuntur: plurius institores faciunt alterum horum, qui Nigri.
Kebulus, aut Cebulus vocatur, omnium maximus: is oblonga pusilli Limoni, aut Persici Emblici.
effigie, compacta callosa nigraque carne, sapore iuglandis edite. Alter minor est, rotun-
dior, tenerior edendo, Bellericus vocatur. Kebulo sunt Citrini similiores: facie, cute, nu-
cleo oblongo, & pulpa, sed fulua, vnde nomen. Indi nigri dicti & notissimi de colore:
nuclei expertes, callo penè lapideo, quos concolorem melancholicum humorè, vt cæ-
teros, quemlibet suum aptius educere putant. Vltimò Emblici potius fragmenta, quàm
integra Pruna, quadantenus triangula, Bellericis minora.

NEc magis Græcis olim, nec minus nobis noti hodie fructus quos Thamarindos, THAMARINDI
quasi Palmulas, aut Dactylos minus aptè vocarunt. Non enim Indi Orientales, vnde
aduehuntur, Palmæ similis arboris tradunt esse, sed Prunis, folio Saligno, vt Fraxini, mi-
nutum inciso, magnitudine Querci, tametsi effigies fructus Dactylon, siue digitum in-
flexum præferat, cute, pulpa, fibris neruosis, fuscis, & atris intertextum, qui cohibet femina
terna aut quaterna, Casisq, compressa, & angulosa: gustu quouis Pruno acidiorè.

LOTI multæ arbores in Gallia Norbonensi miræ & spectandæ proceritatis occurrunt: LOTUS ARBOR
superant namque magnitudinè quamlibet maximam, vel quercum, vel iuglandem,
præsertim loco non procul Mònspeilio, cui *Boutonniet* nomè: foliis est Populi nigra, vel
Betulæ, sed aliquantò angustioribus: baccis nigris, Piperis maioribus, aut Myrthi, rotun-
dis, prius Æstate virentibus, Autumno nigris, maturis, nusquam rubris, vt meminit qui-
dam: intus Inbebarum nucleolo, fructus suavis esui: vulgò pueris expetitus, dulcis nam-
que, neque astringens est, & tamen dysenterie prodest, hæc Dioscorideæ vulgatissima.

QUÆ verò in horto Patauino elegantissima visitur, & digentissimè colitur, iamdiu à GVATACVM
Docto, Fallopio sata, & Guaiacum credita, videtur esse vera Theophrasti: nam ma- Fallopii Pata-
gnitudo & folium Pyri, Lauri, aut Ilicis maioris, niger fructus, magnitudine Cerasi, qui uinum
per initia viret, sine pediculo: vel admodum exiguo, deinde fuscescit maturus, dulcis
valde siccatus, id testantur: & hæc Theophrasti Plinisque Lotus. Quam cum turbulen-
tus Commentator nescit distinguere, nihil aliud quàm ineptè congesta verborum mole
onerat lectorem discendi audum. Namque quàm sibi Constantinopoli missam iactat,
non alia est certò, tametsi ille non depinxerit, quàm Patauina. Sed quia illa sicca missa
fuit, paulò arctior strigosiorve erat, alioqui foliorum & vniuersæ stirpis idem modus: quod
nobis certò licet aspectu ipso & doctissimorum fide asserere, nempe Bauhini nostri Me-
dici Lugdunensis, omnium stirpium consultissimi, atque Valerandi *Donnez*, peritissimi
inibi Pharmacopœi, qui eandem in Syluis Lugdunensibus copiosam colligit. Itaque duæ
sunt omnino cognitæ species: altera Dioscoridis, altera Plinii & Theop. nam istius cor-
ticè scarificabamus adacto scalpello nos, intus libro luteo, foris fusco colore tum fructu.

STVD lignum ex Orientis Calecutii Indiis, eque Occiduis insulis & continenti noui
orbis maxima copia minimo pretio còparatum, vel Barbitonfores & Mulomedici non
norunt, nedum eruditi artifices, qui lubente Deo, huius ligni & artis ope, diram Indicam
luem, quæ longè lateque per vniversam Europam sæuiter serpsisset, eodem vnde irrepse-
rat;

India Occidua
Palma sancta
PALMÆ SAN-
CTÆ similis ar-
bor.

Palum Sanctum
India Occidua.

Hebenum, siue
Xylelos Officin.

TILIA femi-
na Theophr.

TILIA MAS.

VLMVS.

CARPINVS.

BETULA.

Alnus nigra.
Germano. Faul-
boman Colycea
Theo. Frangula.

Nux Auellana

rat, penè iam repulerunt, tamen nondum plenè innotuit arboris ipsius figura natua, quam exactè delineatam dabimus nos breui, modò amicos nostros frustrata non fuerit naus & spes: aiunt hi proceram speciosam arborem esse: folia quidam Maligranati, alii ilicis, aut Arbuti modo, firma, minora, nitida, frondes dicunt: caudici corticem albidum, quadam nigritie viridante, maculosum: flores luteos plerique omnes faciunt: fructum nacleri nesciunt delineare, sed rotundum, nec ita magnum dicunt. Hispalenses scriptores luteum itè cùm maturuerit dicunt, geminis quasi Lupinis conflatum: Lignum præstantissimum quod nigerrimum & pinguisimum: de cuius immensa vtilitate & oleo, quod sine Alembico elicitur, dicendum postea.

EX eiusdem classis Nacleris, qui indidem superiore ætate in Angliam remearunt, habuit Morganus & nos ab illo furculos, quos per sculptorum paucitatem non licuit hic appingere; ita nec alia quàm plurima, quæ in operis calce cernentur. Rami sunt arboris grandioris, recti, cortice arboris Indæ, folio Citrii, carnosio, nudo, Lauri latiore, breuiore, nervoso, horum in summis hærent folliculi pallidi, coriacei, circinata rotunditate, admodum compressi, numo coronæ Gallicæ ferè pares, quorum medio insunt semina Lentis effigie & colore, compressiora, gustu amaricante.

HANC quidem arbitrabantur Palmam, aut Palum Sanctum, quæ species diuersa à Guaiaco est, quamvis similis designetur, nempe nō vasta, vt Fraxinus, sed minor, & ei cōcolor cortice: folia cuiusmodi Plantago, sed crassiora, minora, pinguiora, breuiora: fructus Iuglandis magnitudine, aluo subducendæ idonei.

OFFICINARVM Hebenū quin sit species Guaiaci nihil obstat: nā præduræ assulæ, grauissimæ, quæ in officinis visuntur, & aquæ merse fidunt, tum pinguedo, quæ exudat igni, perinde atque è Guaiaco, tum aspectus ipse, & vires, ac sapor, videntur testari: nam odor etiam ei inest Guaiaci, vires ad eadem quæ Guaiacum cōmendantur. Ne porro quis obiiciat, solam Indiam nigrum ferre Hebenum ex Poëta; dicimus, Hebeno idem euenire posse vt Guaiaco, quod non modò in Trapobaniæ finitimis ad Orientem Austrum, sed etiam in India occidua longissimè disita, syluestris frondet.

ALIA est hæc à Dioscoridis Phylerea, & per y scribenda, quod in tenues assulas & phyluras discerpatur. Frequentior multò Septentrionis frigidioribus Germaniæ, Belgicæ, & Galliæ, quàm Italiæ, vel Norbonæ: pulcherrima Basileæ Helueticorū in Diui Petri area, patulis ramis, sparsis, inque vastæ magnitudinis ambitum fornicatum propagata, folio latiore, Populneo aut Betulæ, ferrato ambitu Loti: ramis item frondosis, & Amentis per initia Coryli aut Iuglandis.

MAS autem non perinde effigie tota atque folio differt, tametsi exiguum sit discrimen: folia Vlmi scabra rugosave sunt: flosculos, non baccas, vt fœmina, fert, sed semen & flores in folliculis Carpinum modo.

VLMVS. **VLMVS** multò vulgatissima notatuque facillima est: folio non adeò illi dissimili, aut Alni. Folliculis vermium volucellorum & fuliginis refertis, saluaris limo aut liquori manantibus, Buxi color ligno.

VOLVNT recentiores hanc esse Carpinum Theophræ. tametsi Vlmo congener sit: foliis quippe iisdem, sed follicosa sobole feminis, cuiusmodi fauagines in caudatis foliis Lupuli.

ET Betula perinde pueris nota, vt de virgis infesta, folio Alni aut Fagi: virgis flexilibus, rectis, gracilibus, ad scopas necendas idoneis: nucamento Coryli.

VDOS salicum natales crepidinæque riuiolorum sequitur hæc, ad insectoriam quæstia, & valde nota de Coryli figura consimili: cuius corticis potissimus vsus: ruffescit is ex fusco.

OBVIA paucioribus locis hæc, nisi ad Septentriones, vt Angliæ, Germaniæ, & Northmanniæ syluosis vdis, folio Alni aut Cerasi, aut Cornus, fusco: flores albi, nec dissimiles. Baccæ exiguæ, quantæ Piperis grana, quæ primùm virent, deinde rubent, demùm maturæ atræ fiunt, insuauis gustu: virgultis frangendo teneris, ideo Frangula nonnullis dicta: cortice nigro, sed glaucis maculis asperso, libro subtus flauo, vomitum ciente, & aquas secessu deturbantur.

Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 441


Vix vllus locus paulò asperior montanæ Galloprovinciæ est cui desit huius fruticis pro-
uetus. Surregit autem quâplurima virgulta recta, læuia, polita; prædura; cortice obdu-
cta nigro, & folijs oblongis, Berberidis, maioribus, firmis, inter quæ crebra fœtura bacca-
rotundæ admodum nigrae & plenæ erumpit, magnitudine Myrti, sapore planè melleo,
& pergrato plebeculæ, quas ideo vocat Amelâchos, quasi mellea. Virgis surrigitur virenti-
bus & ramolis, omnium rigidissimis & durissimis, quaternos aut quinos cubitos longis:
quibus in scopas vincitis, vtuntur ad areas verrêdas. Scatent hac loca aspera prope Diui-
am Moisterias & Sisteronem illic vrbeculas.

RAmis & fronde Columnus superiori Alno similis admodum sed catulis pendulis hyeme,
Vitimoris betulæ quàm Alni: nuces ipsæ pistachijs pares, tû satiuæ, tum syluestres: vel
pueris esu notissimæ.

EST fluentorû riguorumuë vtraq; populus asclela, sed nigra frequentior, folio rotundo, oblongo, supernè acuto, initio atrovirente, hederaceo, in cuius pediculis oblongis race-
matim hærent acinuli, Piperis rotundi ritu. Quæ verò alba vocatur, frôdibus est perpetuò
tremulis, supernè virentibus, subtus incanis, Tusilaginis, interdum in angulos exeuntibus:
catulos ante foliorum exortum, latifolio Salici modo edit.

Lybica ex vtrius earû facilè noscitur, sed magis nigre assimilatur, rotundiore, minore, &
breuiore folio, duriore, albiore, obtusiore, sed crebro cristato, aut sinuato, adhuc magis tre-
mulo: vnde Gallis *Treblis* dicta.

Cercis Theoph. ob siliquam
semenq; lentis effigie indi-
catur peruenusta arbor hæc:
quæ itidem propter riuos aut
latiores margines interdum &
in collibus Veronæ amœnis &
Norbone, hetruriæ etiâ nô pro-
cul Sienæ, quò min⁹ decuit hæc
ignotam fuisse Senensi, nam si
nouisset, qui alioqui solitus est
vel triuiales quasdam Constati-
nopolî accersere, & occasione
dicendi parû tempestiuam de-
plantis arripere, exq; alijs Côm-
mētarijs in suos rapere, istâ suâ
popularem tacuisse. Venustas
hanc ilicò oculis commēdat &
notam facit. Flos copiosus cō-
fertim pullulātibus aut nondū
exortis folijs, purpureus puni-
cās, hilaris, Cicerculæ aut Pisi.
Siliquæ per Augustū maturāt,
semē Lentis effigie, cōpressum,
Genistæuë: ipsæ foris Xirāpeli
no siliquæ aut spadiceo fulgo-
re micāt cōpressæ, digito latio-
res & longiores, quadantenus
Senz sed rectæ: folio exactè ro-
tundo, Afari, neruoso & veno-
so, Cyclaminis, crasso nitido.



Arbor IVDÆ
Mousseliensis
sive CERCIS
Theoph.

ENono orbe nô ita dudum nec min⁹ elegâtes nec parum similis arboris ramos prægrâdes
Angli mercatores illinc reuerſi attulerūt, quorû Morgani dono iconè exhibem⁹ inferi
us: virgulta sūt aliquatū flexuosa, & per semipalmū palmūq; crebra, geniculata, veluti
insertione cōmissurâq; partiū nodosa vnde exeūt ē singulo pediculo singula folia, ora ex-
quisitè rotūda, nec vspiciā nisi quæ pediculis hæret, intercisâ crassa, rigida, latiora Arboris Iu-
dæ: cui Populi alternatim exeūt prælōgi loruli, stipati acinulis multis exiguis, planè populi

Prægrandi folio
rotundo noni or-
bis populus.

ritu, quare & hanc Populum Perunianam vocare visum fuit: gustu perquam astringente, aliquatū calfaciente, subaslo.

MORVS omnis

IVVAT morum temperies cœli moderatior, cuiusmodi est agri Veronensis, Auinionensis in Galloprovincia, & plerisq; locis, vbi ex viui radice panguntur ad solertis vermiserici passionem: vulgatiormorus serotinos flores edit, catulos hirsutos & folia Alni oblongiora, maiora, rotundiora, nigriora, squabra, læuiter crenata mora, maturescētia cocci nis conflata primū acinulis: matura cruentatis, & suauissima in delicijs. **ALBA.**

Humilla quam vocant Chame-morum non nisi modo magnitudine pro totius rara parte distat. Nec videm Chamæfycus, siue humilis Ficus.

SED enim albæ minora imbecilliora sunt folia, tenuiora, sinuata ambitu, albæ populi, aut Sambuci montanæ albida flacida gratiora, sed mora multò insipidiora, candida nitent, ad nauseam potius quàm alendum nata, caduca fatuē dulcia, tota arbore minore: quam tamen pluri faciunt coloni ad velleris opus. **SYCOMORVS.**


EX Syria & Ægypto Sycomorum aut potius Morosicum (vt Celsus diceret) quidam frusta sunt cōati Italiæ Hispaniæq; tum Europæ, tum Indiæ inquilinam facere: nam ne germinauit quidem: tametsi in syluis Syriacis per familiarem esse, vel Propheta testatur Amos, qui se Opilionē dicebat & legere solitū Sycomora illic aut locis vicinis: nec pauci sunt hodie qui eadem inibi illuc peregrinati viderunt, Amicisq; nostris & nobis quidā studiosiores ambulones Monachi, Veronæ & Bononiæ ita oratione rapresentabāt, similiorem multò moro quàm Ficui: fronde Apoci aut Mori, & cognitu facillimā de fructu, qui caudici, aut imis ramis propè alas hæret, media inter Ficū & morum constitutione & figura, pusillam Ficum æquante, granulorum tamen intus experte.

FICVS.

Est magno subsidio fructus ficus Hispaniæ, Italiæ, & Galloprovinciæ, vbi syluulas verna & Autumnali fœtura biferæ Ficus, perelegantes videas: fronde prægrandi, lacinijs an fractuosis quinquepartitò sinuata, asperâ, glauca Mori albi & spondyli: fructu suauiore pleniore, recenti, sicco solito, cuiusmodi vbiq; esitantur.

PLATANVS

PER quā familiāris Macedonio & Peloponneso Platanus, quæ alibi rarò oritur, & vastam magnitudinem ad vmbracula comparatam adipiscitur: Italiæ multis in locis colitur, & speciosa visitur, nec minus annosa Florētia prope pomeria, & in suburbio quodā, nō procul mœnijs vrbis, vbi hosce ramos & surculos defregimus at gustu, cum penè echini maturuissent: penduli hærent hi pediculis singulis longioribus & breuioribus, non æqualibus, aut vno exortu iunctis (vt pingunt qui non viderant) parillitate vuedonis ferè, Bardanæ concolores, apiculis acerosi asperati, Sphærophali in modum, quæ sunt semina ipsa



Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 443

ipsa scabiosæ montanæ non dissimilia, tomento leni subrufo intexta: fronde perquam lata (vnde Platanus dicta) Vitis aut Aceris, sed altioribus sinu diuisuris, & laciniis portetioribus, dentatis: ligno non valde compacto.

ACVTIE foliorum cognitu facilis Aceris species illa, quam antiqui vocarunt κληότροχον, tãta quippe folia similitudine sunt cum Platano, vt Panepistemos Cardanus ille sibi visas Platanos frequentes in Scotia literis mädarit, & nõ nulli prope Oxoniã easdẽ oriri sponte nobis asseruerint, etiamq; ostẽderint hanc rati esse Platanũ: est quippe ambitu & diuisura Platani aut Sorbi Tormalis vocatę, nõ tamẽ adeo profundẽ aëta; angustius folium est, nec ita cõpleta circinatione, vt ex ramuli huius cum cõmuni Aceris intuitu pictura hĩc monet. Folliacea filiqua cõpressa, bipennem expãsam, & inuersam, aut Papillionis alas imitata, vno vtrinque semine donata: muscosi flores, luteoli, Corni, aut Afaræ Darac.

HVIUS congeneres duæ sunt: vnius folia

(quæ Theophr. Sphendamnos est) angulis Hederaceis, ternis & quinis, superiorem æmulantur, sunt minora tamen, & minore folliculo. Hæc vbiuis præruptis & syluosis frequentior. Infrequentior altera Septentrioni, quæ fortẽ apud Theophr. Zygia sit: tametsi & frigidis proficiat, folio & fuctu minus lacinioso, minore: flauente intus ligno,

SORBUS TORMALIS.

CALIDARVM & frigidarum, Angliæ, & Norbonæ Valena sylua familiaris hæc Sorbus, flore, fructu, & nucleis Ariæ vel Mespili Aroniæ. Folio Aceris, Vitis, aut Populi albæ.

RECEPTA iã vsu & nomine Oxyacantha vera est illa, quam Galli *Aubespın*, Angli *May* OXYACANTHA dicunt: folio est Mespili Aroniæ, Apii incisura: ramis duris & mucronibus septis: floribus cãdidis vel rubentibus, odoratis, fructibus baccisve rubris, gustu subausteris.

HVIUS est perquam similis arbuscula in sylua Valena, tribus à Monspellio leucis sponte orta, folia edens similima, sed latiora, fructum rubrũ, quadruplò, triplòve maiore, Auellanæ parẽm, suauem gustanti: nucleis ternis, duriusculis, Septembris initio maturis: *Uulgò Monspe. Pometz. Ita. Asaides.*

ACER.

Galli. Erable.



Varietates.

Mex-

MONTANA
Sambucus racemosa.

MONTIVM & Nemorum amasia Sambucus, superioribus perquam similis, facie, cortice & ligno concolor est, sed fronde minore: flore autem non in umbella, sed racematim Ligustri in morem ex luteo albicante, racemósque multis acinis congestos, odoratis, Coccineis & puniceis, vuâ integrâ exprimentibus relinquente, nō insuaues per Augustum esui, uti ceruis, frondes, quas depasci dicuntur avidissimè, præsertim dum prægnantes sunt fœminæ. Frigidi est temperamenti somnūque conciliare potis, adeoque veterum, præsertim baccarum esu: qui si nimius, admodum noxius proditur.

SAMBVCVS Montanaracemosa.

AQUATICA.

ROSEA.



AQUATICA NHILO secius & hæc sibi nomē Aquæ vindicat, utpote umbrosarum amcenarūmq; riparum, quas rblandè igan aquæ, alumna, in Germaniæ, Galliæ, Angliæ, Italiæ, Pedemontiumque pratenfibz, vdis, conualliumq; marginibus: verum fronde potius propiusque Aceri, quàm Ribes nigra, vel quàm Sâbuco accedit: virgis gracilioribus, geniculatis, politis, fractu facilibus, Sanguineæ, frutici siue cornu fœminæ concoloribus, nec medulla pluri: florum foliolis Thlaspi Candia, latioribus quàm Sambuci, sed effigie & odore similibus, uti & semine ruberrimo, compresso, Viburri, dictæ fluidæ Theoph. gustu nauseam faciente: Gallinis & anibus in cibum cedit.

ROSEA.

ELEGANTIOR, hilarior aspectu, & rarior Rosea SAMBVCVS hæc, herbarum studiosis in hortis alicur: Folio, stipite, toto habitu aquaticâ Sambucum præfert, flore tantum visu iucundo, multiplo, glomeratim cōgesto, Rosam candidam equante & effigiantē, discernitur.

Bryonia folio
Amomū Græcorum & Plinij.
Alterū apud Plinij
Punica folio.

NON parum affinitatis Amomo esse cum Cardamomo, præter ipsam nomenclaturā & vires aromaticas, in antidota addi solitas, itemque somnificas, tum Theophrasti & Plinii autoritas nos certiores reddunt: ut enim Diosco. posterior vixit Plinius: ita certiore collationem reliquit; ubi inquit; Simile est Amomum Cardamomo nomine, frutice, semine oblongo; metitur eodē modo & in Arabia. Dixerat idem paulo superius: Amomi vna in vñe est, Indica vite Labrusca, quare quam Labruscā Indicā vocat hīc, videtur cum Amomo Dioscor. folio vitis albæ, eadem: quæ cum doctos diu exercuisset, & eos peregrina planta defecif-

defecisset, nostram Ribes nigram opinati sunt: quæ ut vera non sit, saltem non monumento esse poterit ad veram vestigandam. Et alioqui non indigna cognitu, folio viticeo, aut Bryonia, virgultis odoris, interfindendum virentibus, nigræ vix modo racemosa, flosculis herbidis, luteolis: locis syluosis Alpinis frequens, & in hortis culta, ut Hypris, & alibi, in Occidua Flandria.

Est alia Ribes longe similima folio, facie & furculis, baccis non nigris, sed rubris, pellucidis, suauioribus multò, & notioribus, tum officinis ad Rob. de Ribes, tum hortis.

Primum, & alterum describit Amomum Plinius, quasi exscribens aliorum sententia, qui existimauerunt esse fruticem Myrtae, Palmi altitudine: laudabatur quàmmaximè Punicæ mali folijs simile, nec rugosis, colore ruffo. Preciū vix in libras x. & xl. Adulterabatur autem folijs Punicis. Hinc item factum, ut accuratiores expensores arbitrati fuerint, illum fruticem acini Alkekengi, & folio Punicæ aut Persicæ, qualem in Solonis descripsimus. Et quàmuis autores consulturo, in promptu erit nosse nos hodie utroq; verò Amomo carere: tamen hæc plantas huc adductas esse par fuit, ad veras, quando sese offerent, certius dignoscendas.

Quæ vero ignauiores huius vnam ducerent, aliam peregrinam plantam, ut multò Amomum aptiorem, adducunt: quæ quidem ipsis acinis, aut granulis Piperis minoribus, Cubebæ rotundioribus, pedicellis extantibus ipsòq; demum gustu, illam Amomi vnam adumbrat. Sunt tamen ea quolibet Pipere feruidiora, acriora, nec aromatica. Eòq; *Pimento del rabo* vocat Lusitani, quorà cōmercio ex Indijs habemus: sed iam desitū adferri in Septentrionem, ne vulgatum Piper vilesceret. *Peper met stercken* vocabant Belgæ, id est, caudatum Piper: folia produntur vitis Anguillaræ.

Eadem delineatione persuasi, non paucis placuit Rosa Hiericōtea vocata pro Amomo: quod tamen minimè decuit eos asserere, incertos foliorum, quæ meminimus vidisse, & creuisse Doct. Treuisano Patanij. Crescit enim haud ita difficile ex semine recenti: hærent autem seminula complura, racematim vnà stipata, glumosa, Sorgi minora; & intra fruticis, cancellatim, reticulatimque implexi glomum contenta. Folia verò non succurrunt.

Am autem qui nouit Amomum Dioscoridis & Plinij, illicò noscet eorundem Cardamomum, utpote Amomo simile nomine, frutice, semine oblongo: & idem discet nostrum siliquosum, Cardamomum Officinarū, aut Græcorum non esse, aut descriptiones prorsus deprauatas esse: nam Galeni locus adductus de exenterato fructu Cardamomi, potest intelligi de glumis mundato: nec vllus locus aduersatur ex Dioscoride, Neutiquā tamen contemnendi vsus hæc siliquas putamus: tum quia tacito consensu, & prerogatiua vsus receptæ sunt: & fortè Arabum sunt. Earum quæ maxima, Melegetta, aut Millegetta dicta à semine crebro, sacro, ocluso in folliculo membraneo, Ficū foris effigians nomine *Grani Paradisi* notissima est, & ex Occidua Aphrica frequens allata. E quatuor alijs siliquis, quæ inter se perquam similes sunt: ea quæ Officinis, maius Cardamomum vocatur, oblonga triquetra, lapidi dactyli concolor & par, semen condit angulosū, Millegetta minus. Triquetra item siliqua, sed breuior est media vocata, nec dispari semine, quā verius putant Cardamomum, propter amarorem & acrimoniam non exiguam. Minima pariter triquetra, sed vix nucleum Pruni æquat. Perelegantem aliam habemus à Morgano quandam, recens allatam ex Indijs Occiduis, pusillæ Melegettæ penè parem: sed triplici carina triquetra graciliorem, & admodum Xyridis siliquæ accedentem: sed corticoso capillitio obductam, albidam, intus oppletam semine pari, albido, lucido Melegettæ sed albo, mansu facili, & gustu multò gratiore, Gingiber prorsum testante: subtus etiam, quā siliqua hæsit scapo, arguit Gingiberis stipitem: quare istas omnes siliquas Cardamomi, esse plantarum consimilium, nec Gingiberi absimilium, non abs re quidam peregrinator narrabat.

Cum è superius dicto Pipere nigro, tum è fructus nucamento Officinis notissimo, satis constat diuersam hanc esse plantam, quam recentiores folio Mori delineant.

Borealium hortis, ut Angliæ & Belgij, loco Vitis viniferæ est hæc: eoq; vix crispam vocant hebarij, viticea item fronde, aut Ribes, sed incana totis virgis, & spinis horridis, Pp. ij. acinuli

Ribes nigra & Rubra.

Amomum apud Pli. Punicæ folio

Piper caudatū.

Rosa Hiericōtea

Cardamomum

Millegetta

Piper Longum.

Vna crispa sine Vitis precia.

acinuli crebri, singuli, in virgis tamē sunt pellucidi, pallidiores, intrò maturi, subfului, cultu multò suauiores & maiores.

Satina ROSÆ
Rubra Prouins.
Candida.
Pallida.

ORbis deliciz, florum princeps & honos Rosa, Angliæ florētissimi Sceptri, perinde auspiciatissima, ac meritissima tessera, vt in quo regnò hunc fruticem, non modò ipsa bruma virentē, & interdum penè perpetui folium, sed etiam mirè feracem, biferum sæpe, quādoq; triflorum videas, Triplex est vulgariore colore differentia: nam aut purpura sanguinea, saturè puniceant: vel aspectu niueo micant: aut candore & rubore confusis, flammeo rutilant, virgineis genis, & malis concolores, quas plebecula pallidas vocat. Tres hæ insigniores satiaz differentia sunt, quæ, quòd sexcentis ferè lenocinijs, colores, odores, saporē, magnitudinem, numerumq; foliorum, & vires demutare queant: & soleant fieri præpropere, serotinè, brumales, non sunt huius instituti.

Cinamomea.

Sylvestris tamen natiua sunt varietates, & notatu perquam dignæ: eius præsertim quæ boreales *Canel rose*, siue Cinamomeam appellant: hæ foliolis, sunt omnium florum minimæ: Franciæ, Belgio, Angliæ, ruri sponte crebræ, ipso odore notissimæ.

Moschata.

Moschata videntur sylvestrem exuisse animum, mangonio, & hortensiles duplè factæ: vbi fragrantia comendatione coluntur, condiunturq; & esitantur passim in Italia, Venetijs præsertim: aluū iucundius, sed vehementius cient: & animi deliquia, stomachi, cordisq; lancinationes accersunt.

Lutea.
Carulea.

Pares & cognatiores illis Luteas, cum alijs sæpe vidimus Argiera Affricæ ex Numidia, Galliæ inquilinas factas: tum in Anglia consimiles, solerti manu in Genista scapū infitas, vnde colorem, odorem, viresq; mutantur nouas. Est & iamdiu videre Caruleas in hortis Italicis.

Esglentine ou
Esglentie.

Species est altera folijs minoribus Myrtinis, sed latioribus, flore & elegātia Rosæ Moschata: fructum similem cæteris fert, & æqualem: tota planta multò odoratior, vulgò *Esglentine*, Angliæ & Flandriæ hortis, ad odoris gratiam colitur.

Spongia Bedeguaris.

Ramis omnium, sed præcipuè huius villosum, colorumq; muscidum excrementū hærrere solitum floccis, velleris Sericei, instar, Bedeguard vocatur.

Dunen Rosem.
Pomifera.
Morifera.
Baccifera.
Batis Rubus
moraq; Bati-
na.

Inter Sylvestres non postremæ venustatis alia Angliæ perquam familiaris, & Esglantina cognatio: fruticat pumilla, bicubito non altior, sed inodora: folio minore, & pereleganti: Mespilo Aronia non dispari: pomo donata minore multò, colore viuidiore, rubello subpuniceo, per Augustum maturo: flos Rosæ sylvestris est.

Sunt Rosis perinde facie, vt viribus & nomine affines Rubi Batis, vt sint vbiuis perinde noti & inuisi, importuna, nocuaq; feracitate: duplicè in eis differentia facile percipias: vnus namq; vulgatissimus, quo intextæ vinciuntur sæpes: inter dumeta & lumeta nihil isto frequētius: virgulta crassa, quadrangula, sentibus infesta promit: folia spinosa, serrata, terrena, & mora edit planè Fragræ similitudine: ad Diamorum confectioem Officinis vtitissimæ, floris Esglantina.

Reptans.

Alter Rubus nullum latere quit, in aruis passim restibili, seque progignente rediuiua sobole gramineis seminibus sparsim pulullate, in satis plurimum triticeis: prorsum similis, sed tantum minor reptansq; est: minorem minusq; succulentum maturat fructum.

Rubus IDEA.

Hic item spectat *Framboysier*, quasi Fragra lignea aut syluosa Gallis dicta, & admodum nota Septentrioni: vbi nullus saltus vmbrosioris syluæ, isto Moro caret, duplò maioribus acinulis conflato, carula purpura nitentibus: condiuntur mora & esitantur, ad voluptatem & sitim quæsitæ, aspectu amœniore. Minus horridus spinis frutex, folio terno, non dispari Fragræ, crenato.

Cynosbaton.

Nescio qua sui fiducia nos inuitos nihil scire docere vult doctif. Math. qui iādiu nō no-uit, nequidē postremò monitus agnouit Cynosbaton. Cuius duo frutices, vt nomenclaturæ, sic effigiaturæ ex antiqua descriptione persimiles, certos nos faciūt, aut saltem ea nō carere nos hodie. Est aut frequētissim⁹ Cynosbatos Rubi persimilis valde quā spinosus sæpe arborefcit, & amplexu arborū accrescit, florē & fruticē Rosæ sylvestris promēs: eius baccas cornui aut cerafo pares & cōcolores, intus lanugine fæctas, pueri esitabamus.

Cupressus prox-
ime Sabinæ red-
dens.

Vgiter virētis Cupressi lucus est perquā amœnus & venustus propè Burdegalam, alibi-que hortis ad Septentrionē pulchre adolescit, vt in Anglia, Rami & folijs Sabinæ bacciferæ, sed nucula oblonga, pusilla, sculpta aut rimosa, ouo columbino pari, intus semine compresso, perpusillo, Quod.

Arborum aduersaria, concisaque recensiones. 447


QUODLIBET solum æstuosum, & alsiosum modo macilentius sit & sterilius, tam abundè Ericā fundit, vt ea neminè latere queat: vulgatiore biflora purpureis floccellis Thamarisci Norbonensis, cui vsquaq; similis est & cognata facultatibus, ad splenem atque calculi affectus. Saxosis tamen montibus Angliæ occidua ad Bristoiā exilior, tota sesquipalmaris, sed densior fruticat: flore calyculato, longiore & Vnedonis ferè, hilarius purpurante, nec caterò diuersa.

Sed quasi gaudeat aridis & squalidis, speciosior fruticosiorq; euadit in Romano, Thusco, & Norbonensi agro: ramis folijsq; prolixioribus, caudatis, comosis, Chamæpitis effigie, flores edentibus calyculatos, veniunt purpurantes, similitudine Vnedonis, apiculis fibrarū. Et hanc, si, vt nos floridam pedibus triuisset in Italia Mathiolus, neutiquam Fallopio, seu plantam peregrinam acceptam tulisset.

Non eosdè hæc nacta natales, sed fabuleta maritima Venetæ: eandè studio flores videbāt Mospellij secus patibulū Castrī noui: humilis reptat humi, sesquipalmaris, folijs pusilli Germanici Thamarisci, Lini pericarpis aut Cythi: semine, floccellis luteolis, item Cythi aut Helianthes: quare Cystum quintum opinatus fuit Doctor & Præceptor Assatius.

Vulgatiorem prorsum, facièque Ericæ prioris videas, præcipuè in riguis & maritimis Galloprouinciæ & Lio Venetorum, in Cotonæi magnitudinem caudicemq; abire, è quo ad splenes detornantur pocula. At quam hic Meditæneæ proximam appinxiimus, ad Rheni ripas in Germania sponte frutescit: sed exilior humiliorq; multò, nec arbor fit. imò plerumq; in hortis Angliæ Brumâ interit. Et flores huic tomentosi, papposiq; diffuunt vnâ cum semine, maioresq; sunt ferè pares & similes vulgaris Lampang, sed purpurei. Norbonensi autem ramosi exigui flocculi, nec papposi, sed rotundi Oleæ, ex albo puniçantes sunt, & acinulis, quos interdum totum triduum soli obiectos obseruamus subsilientes & tripudiantes, vermicello intus orto agitante, & tripudij autore, qui pertusis aut desilientibus tandè granis, foras prodibat.

Sabina baccifera.



BOreales Meridianiq; horti, præsertim in claustris Vestalium, Sabinam vulgatiorem alunt longè notissimā de Thamarisci folijs, sed rigidioribus, pungentibus, tetrūque odorem halantibus, perpetuò virentibus, baccarum expertibus.

Calidioribus autem Lyguriæ gaudet, mōtosisq; vt Norbonæ Ceto monte, hæc, baccas oxycedri maturās subpuniceas, refinosas, minus foetente tota planta, quā superior: odore tamen non absimili, folijs vt plurimum Cupressi: sed interdū in Galloprouincia folia ima sunt Iuniperi, superi

Pp. ij ora

Sabina Ag-
pria,

IUNIPERUS
vulgatior,

OXYARCEV-
ris, siue acuta
Iuniperus

CEDRVS
Thœnicea

Cedrus Lycia

ora Cupressi minus aspera aut pungentia.

Quandā ægyptiam Sabinam Bononienses professores faciebant, quæ à nobis inter A-
brotanum relata est, caule pedali et sesquipedali, in summitates caudatas, comosas
exeunte, pullo pallentēve colore.

Glareosis tum Meridiani, tum Borealis soli sterilis, inter Ericeta, fruticosa sobole sem-
pervirente, fruticat minor: folio & facie Ericæ aut Sabinæ, fructu Piperis, grano sub-
dulci, odoro, vti lignum totum.

Vlgatissima est etiā in Galloprovincia Iuniperus maior hæc, inibi CADE vocata: folio
Iuniperino maiore, acuto, mordaci, pungente bacca triplò maiore, Sabinæ persimili,
& concolori, resinosa tota: spirat suaueolentiam lignum, funditq; liquorem, quem illic O-
leum de Cadde vocant.

EX Istria quasdam habuimus plantas, non dispares fronde & figura, sed fructus erat
teres, oblongior, mediocris Oliuæ par.

Eadem Norbouensi agro visitur bacca, buxæ, tripode, quæ quidem non pessimè qua-
drat Cedro Phœnicæ.

Lyciam Cedrum iamdiu vidimus Lutetiæ in quibusdam hortis, folio Iuniperi multò
minore, ad Sabinam accedente: bacca Phœnicæ minor est.

CEDRVS Libania & Palestina præcelsa,

Aliæ sūt Cedri Græ-
corum, quarum
nonnullæ in Citrijs di-
ctæ: hæc autem illis
indicta, Palestinorum
in Libano Alpigena,
ex sacra pagina admo-
dum celebris & nota
fuit: Eius autem pu-
silla cupressi semina,
sed cōpressiora, in Fi-
gulinis fata, nobis ar-
busculas tres aut qua-
tuor pepererunt: quæ
perquàm venustum
arboris cōmensum, &
indolem, iam tum per
initia præferebant.
Patauij semen habui-
mus, vbi industrius &
generosus vir Cortu-
sius etiam seuerat, &
colebat: vt mirum sit
tantillum semen alio
celo & solo, tam ce-
leriter & eleganter in
arbusculam sesquipal-
marem aut cubitalem
erumpere: hîc pictas
ex conis & icone has
plâtas exhibemus: &
facile deprehendere sit,
min⁹ verè in Mathiol.

delineatas. Sempervirent folia Abietina: aut Pino breuiora: Ligni autem materies & as-
pectus, hilari sunt & nitido aspectu, ex Phœniceo purpurâtes, non valde duræ, odorem ro-
seum, quàm Sandali suaviorem aut Cupressi habentes, præsertim dum pruni adolentur:
Galliæ Northmanæ, Iodini, & Belgio, iam valde nota materies: hæc fortè innuit Poeta,
cum de Circæ canit, Vrit odoratam nocturna in lumina Cedrum.

E. duabus



EDVABVS quas veluti summas coniferarum differentias statuit Dioscorides, vulgatif-
simam Pinum multis hortis cultam in Belgio & Anglia, Italia & Norbonæ ad aquas
Marianas spontè natam in promptu nosse est: quippe arbor enadit celsa, prægrandis, fo-
liorum proluxioribus longioribusque, quasi comosa, pilis & cono ampliore, crassiore, bre-
uiore, pressius Cedrinum conum exprimente: nucleis compactis, esculentis, item habi-
tioribus, quos officinæ vocant Pineas.

HVIVS autem sylvestris videntur esse plures varietates è conis, foliis, totiùsque magni-
tudine ductis: duæ namque in Lyguria, Galloprovincia, & Norbonensis, ora maritima
passim syluescunt: foliorum prælongo rectoq; capillitio illi persimiles, sed vna brachiata
est, cui folia manipulatim erumpunt è mediis glabris ramis, æquabili plurimum exortu, ce-
parum instar.


ALTERA persimilis vndeque stipite ramorum, foliorum, & capitata facie, vtriuf-
que earum conus oblongior, minor & angustior supernè, quàm Pineæ.

EA autem, quam vocant quidam Cembronem, vndique item foliorum comosa den-
saq; sobole stipatur, conis obtusioribus, breuioribus donata, per maturitatè facilè hiulcis.

SUNT adhuc syuestres duæ, quæ breuiore foliorum scetura, magis circa ramos reducta, MUGO:
pressius Piceam præferunt, aut Abietem. Quarum quæ ampliore cono & longiore folio
donatur, Mugo vocatur.

ALTERA exilius viliusque comatur, donaturque nuce multò minore, & ferè Larigna. LARIX.

LARICIS ne no-
men quidem Gre-
cia olim innotuisse
certū est: quippe quæ
oblectetur frigidiorè
& Boreali celo. Acta
meriti Diosco, alicubi
huius resinæ meminit
quasi pergrinæ & ex
subalpinis Gallia &
Germania in Græciā
aduehi solita: tamen
arborè minus nouisse
indicio est Agaricū:
quod ille radicem esse
dicit, & ex Armenia
peti. Iam verò per-
quàm nota, & nobili-
tata triplici excremē-
to & præsidio Larix,
Manna nempe, Aga-
rico, & resina La-
rigna, quæ Lagrima
hodie Venetis dicitur
& falso Septentrion.
& Trāsalpinis indica-
tura Terebintinæ venū
mittitur: folia pluri-
ma, sed delatiorè pu-
be frondet, nobis e-
tiam Bruma sæuiente
& niuib. Alpes in-
sternente. In Germa-
niæ Alpinis Montes Nicolai & Allobrogum Sabaudis, per exortus quosdam eadem foli-
manipulatim & penicilli in morem premit.



Agaricum La-
rignum.

PICEA, &
Abies.

Sapin Gall. est
Phoropios

Theo. hac mul-
tum theda dat.

σμίλαξ *TAXUS*
ΜΙΛΑ *Theop.*

PICEA autem & *Abietis* vastissima nemora transmittunt, qui ex Germania, Triden-
tū, Veronā, Venetiāve petūt: cognata vtriq; facies est, & plumatim ramos pinnatim-
que folia vestiunt breuiora ferē *Taxi*, pungentia, rigidiora; sed *PICEA*, in extremis, rectis
flexilibus ramis Coni grandiores, ventrosioresque, & aspectu iucundior: *Abieti* au-
tem præcelsa proceritas, erecti, crassique caudices, adque nauium malos succindi soliti, nō
modò antiquitus, vt in Nemore *Pelio*, cuius execratur abiegnas trabes, Poëta sed ho-
die ad Aquilonem in Noruegia & Russia. Et huic vni summis in ramis, & in cœlum ob-
uerfi mucronibus sunt coni.

QVAMVIS prorsum feralis & pernecabilis credita *Taxus*, & sic vocata sit apud Pau-
lum origine Græca, à sagittis inficiendis, venenōque armandis (cuius etiam stolones
curuantur in arcus, vt canit Virgilius) eius tamen baccas rubentes, Coccinas, teretes, per-
similes & subpares *Smilacis asperæ*, vel *Asparagi granis*, innoxie pueruli esitant in An-
glia, nosque gustauimus sub hyemem, non ingrato sapore, sed fatuo, vel amaticante, vbi
porci passim eas, quasi glandes pascuntur. Nulli sanè Angliæ angulo deest hæc, vbi sem-
peruirente vmbrosa, densaque ramorum iuba latissima, similiter *Abieti*, plumatim lon-
gis quasi pectinum radiis atrovirentibus comatur, inq; sepulcretis & arëis pro templo-
rum foribus pangitur, ad arcendos Solis æstus à concione, plebq; sub tegmine *Taxi* vmb-
rosa & annosæ conuentus religiosos agere sæpius solita, nullo percepto inde vel tan-
tillo incommodo.

PALMAPIVS, siue Conifera.



VIGARIS palmæ congene-
res esse multas sylvestres in Si-
nu Guineæ Oceani occidui, quæ
steriles sunt, nec nisi exilitate à
fatiis absunt, narrabant nobis
mercatores industrii Gallobrito-
nes, qui illuc quotannis fermè cō-
merciū causa adeunt. Inter quas &
alii Angli institores non parū ve-
nustam & miram hanc, icone hīc
expressam, inibi oriri affirmant;
cuius ramos luculenta conorum
fœtura onustos dono iidem attu-
lerunt stirpiū cultiorisq; artis pe-
ritissimo Pharmacopœo & Ciui
Londinensi Iohan. Riccio, qui
nos donauit isto palmite, aut
potius Pinopalmæ termite: cuius
arborem, quasi quandam ex
Palma & *Pino* hybridam natura ludibunda videtur conflasse: est quippe lignum ipsum fun-
gosa Palmæ prorsum textura, in villos tota dehiscens, & squamosa cute lorica-
tum, fastigiato ter-
mitis



Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 451

mitis numerosis, & in orbem exortis furculosis ligulis quadraginta, aut quinquaginta compactili vertibulorum & squamarum serie pyxidatini articulatis, pedem longis, rotundis, parum compressis. Quorum singulis commissuris, singuli, numerosi coni altius inferuntur triceni, aut quadrageni, qui mediocrem conum Cedri ementiuntur, puluillis in quinquicem digestis, reticulatq; & imbricatim extuberante vetricoso nucis cortice, fusco, nitido, polito, crassitie & concretionem nucis Indice: intus nucleum glandemve oblongam, sesquiunciam aut duas uncias longam, præduro, inque farinam ægrè friatili, gustu glandis & castaneæ: quæ sunt ei genti panis supplementum.

PERMULTÆ sunt Palmæ species, non parum inter se fructu, præsertim & fronde di- PALMA
uersæ, & omnes orbi nostro peregrinæ, ægrèque assuefactæ. Nam nostras quæ Norbonæ & Lyguriæ maritimis, & præsertim ad Olbiam Galloprovinciæ frequenter & felicitè enata visitur, fructum non maturat; eoque potius voluptatis, quàm utilitatis causa alitur. Seruntur autè non in iucundo spectaculo & Naturæ ostento Dactylorû tria oscicula, vnâque iuncta panguntur: tres inde oriuntur exiles stipites, sed in vnum conflati: foliorum tamen pusillorum & harundinaceorum trina pullulatione distincti, cuiusmodi in Francia, etiâque in Anglia facile proueniunt: adultæ, sunt squamatim imbricatimve tecto caudice, crasso, harundinacea cultrata fronde Xyphii, ynde Spathæ vocantur, quas, vt & flores, & fructus & ramos è cacumine ferè promunt.

CHAMERIPHES, siue reptatrices & humiles apud Theophrastum palmulæ, notissimæ sunt Hispaniæ, Galloprovinciæ, & Italiæ maritimis, tum ad scoparum vsum quæsita, tum ob encephalum illud, siue cerebellum gula blandimentum, antiquis in primis Chameriphes.
Encephalus
Theo. Cephaglio-
ni Italicè.
commendatum: scapus enim propè radicem ventriosior protuberat, crûsq; humanum æquat, fistulosus claudit hanc medullam, qualem æstimamus suauis Carduorum gustu: tota minor est, foliis angustioribus, baccis alterius Palmæ crebrioribus, minoribus.

HVC etiam Musa reddenda est, quæ ex Orientali in Occiduas Indicas insulas, adeoque Cunophoron,
an nux Indica;
in Portugalliam trãslata iamdiu multis innotuit: & indidem folia portentosa magnitudinis nos habuimus: eius effigies, fructus, floræque affabre delineata extant in ditissimis Commentariis famigeratissimi Mathioli.

INTER Palmas præstantia obtinet palmã & famam Nucis Indice arbor, Calecutiis In- Nux Indica;
dæ fabuletis maritimis vastissima & utilissima: foliis vulgaris Palmæ maioribus: flore Glandis aut Illicis fructu, quem nucem vocat & Auicenna, qualem passim pro foribus Officinarum videmus luculentæ Melonis magnitudinis. Serunt hunc & transmouent indigenæ, quò lætiores exant arbores: sunt hæ laxiore mollioreque ligno.

HANC admodum fructu varian, fortèque syluestrem esse suadet nucula, quas ex finibus Trogloditicæ Guineæ habemus: hæ vix magnam æquant Oliuam: Corticoso illi nucleo, oleaginoso, sapido, prorsus Smilis, sed huic testa ossea, duriore, nigra.

NOVITATE & vilitate visenda altera ex rei argumento Palmalimum à nobis vocata & ex Percinjanis Insulis cum multis rarissimis allata: hastè fermè procentatè recta edit virgulta, digitum & pollicem crassa, altera sui parte semitotunda, polita, costæ prælongæ effigie: antè gemino sulco profundo quàm longa est veluti carinata, in quas cauas strias sese induunt & stipant multa densa folia, quadantenus Palmea, aut arundinacea, sed angustiora, & in villos canabini corticis planè similes, perquàm tenaces & Nucula Indica;
Acatia co-
gnata planta.
fribus torquendis aptissimos diuulsa, ea per exortus summotenus in sinu striarum velant & oculut penitus iuncellos complures Sparteos, Elphæ pares: præterquàm in summo, vbi comatur scapus, sparsa sobole in thyrsi elegantis effigiem.

LVBIT etiam permultarum arborum & fruticum peregrinarum aliquot descriptio- Hæc sub finem
operis pietas hanc
bes.
nes & Icones addere, quarum inspectione Philosophiæ verè candidati oblectentur, & quasi specimine vel verbis, vel literis indicare plâtas naucleris & mercatoribus queant certius consequi. Quædã earum Acatia congener est foliis & spinis: furculi tortiles, Iuibæ còcoloribus item per crebra internalla geminis aculeis donatur, cornua Limacis exerta referentibus, interque cirri exiles foliola Acatia primæ positu & similitudine gerunt.

EST & alia, quæ non foliolis dissimilis, in viminibus sesquipedalibus, spinulis aduncis donatur concoloribus vix crispæ, sed exilioribus.

Cysti folio arbor **H**uius arboris extrema virgulta lignosa sunt, Cysto cōcoloria & similia; folia itē rugosa, oblōga, Saluē aut Mēthē: sed in sūmis ramulis, villosos, exactē sphaericos floccos dēstant, siue lanosa capitula Platani.

PALMACEA, aut Arundinacea pinnata spinosa.



Rubi facie senticosa planta.

NERII FACIE
Arbor

VISCUM IN-
dicum

SVNT huius plantæ indidem aduecti rami foliosi, illis affines, nec min⁹ intuenti effigie peregrina: quippe Sábucini, aut ferulacei sunt, fistulosi, & medullæ pleni, recti, rotundi, octonū aut denū cubitorum: sed per longitudinem triplici cartilagine, digitū lata, pinnati, aut alati, instar teli: & oris extremis modicē fibris sinuatē sunt cartilagine, stellulīq; spinosis ornate, solertis opificis sapiētia arguētes.

ALTERIVS illic natæ arboris truncum aut bacillū hīc proximē exprimendum, curauimus, quāle vnā accepimus. Quod carpi crassitie est, longam hāstā æquās, & cortice nigro, dēso vestitur: tuberculis crassis, senticosis, creberrimis, in clauē modum muricato, solidō, & graui, prædure ligno.

ET huius plantæ operæ precium est intueri paucis hæcenus notas siliquas, perquā pulcras. Propēdent hæc de ramis & surculis Sábuci palustris, medullosis, pallidis, pullis, nodosis, sesquipalmum & pedem longis vaginīs, cutaceis, vno cohesu septenis aut nouenis, singulis gracilem Lampetrā effigiantibus: intus farciūtur pelliculis cepaceis & tomētosis, aded exuuium serpentis eminentibus, & quiddam cadaueruli anguini simile involuentibus, vt pueris horrore sit & illudat: cōsimili florū exortu oblōgi exeunt calliculi, herbæ sanctæ, aut Strammoniz, quales quā potuimus scitē delineatos ad calcē operis videtam, ritu Visci, quod, quia multū adūbrat, Indicū Viscū vocauimus: sessili, sed transuerisim excurrēte est radice cespitē; gramineis geniculis & Polypodii quadārenis; sed albicantibus: culmis itē ex pallido virentibus, a medio summotenus crassioribus, fungosis, striatis, sesquipedem longis: in quibus folia semper virentia Visci effigie, sed duplō maiora, crassiora, fungosiora, & secundum neruum, medium folium intercurrentem, circulis vtrinque senis, non parum admirationis mouentibus, veluti scalpro impressa. Eadem cœlo & natalibus ramorum arborum, Indicarum debemus hanc, vnde auulserunt, qui Morgano miserunt, cespitē latiore, sessilis caudicibus incumbit, fibrillis cepaceis radicata: vnde proximē surgunt folia inuicem conuoluta, tunicea, inferius fermē palmum lata

lata, numerosa, quadatenus Aloes aut Scyllæ: & supernè in ligulas prætenues, micronatas desinentia: purpureum, striatum, concavum, alis donatum Scapum Hastulæ Regiæ, aut Aloes duorum & trium cubitorum ambientia, quæ multis glumosis siliquulis spicatur, Auenæ situ: magnitudine verò, & sericeo tomento candido, Apocinum vel Asclepiadem representant, & semine, sed Conisæ exili, gustu salso, ingrato, nitroso: fortè, quia in aura maritima adoleuit, vt Aloes illic in Sabuletis.

Coniecerunt iidem Naucleri in easdem sportulas, surculos effractos arboris, Alno quidem similis, fronde & ligno: sed tamè diuersos, racemoso, muscoso flore, glomerulos comflante: fortè duntaxat cælo & agro variat.

Sed hæc, tametsi Petasitidem adumbret, ortu & ambitu exactè circinato, vegetadis folij galerum fere æquatis: est nihilominus cespitè radicis implecto, multa sobole lateratim repullulâte, & caules fundente aut potius foliorum pediculos bicubitales, culmosos, medullosos, singulis singulo folio hærente: nec anfractuofum, lunatum sinum, pediculus fulcit, vti in Bardana. Fungoso, strumoso cespitè, carioso: & supernè densè, circum caules vti Meum, comante, maximam Osmundam æquante, lorulis vimineis, subtus late fufis, gustu sicco altringente, auulsam hanc ex annosa arbore, ni fallat memoria, dicebant.

CEREXVS.

HIVS penè portentosa elegantia, Naturæ Genius

omnem prouocauit in nostratibus plâtis admiratione: nam mirabilitatis opplet spectantis animum & oculos, huius rarissimæ venustatis plantæ spectaculum. Eam plebecula effigiei argumento, Cereum vernaculè vocauit: hastas enim surrigit quaternas & quinas, nouemdecim & vicentum cubitorum, virgatis & ad normam directis strijs, canulatas: in externis extantibus striarum angulis obtusis exeruntur stellulæ, corneis stilis radiatim è suo centro quoquo uersum


minacibus, vno duntaxat prominulo horsum, eque directo longius: tota quandam effigiaturam, & concolorem superficiem Echinomelocacti præfert, sed brachium æquabili ductu æquâte: Columellæ, aut Cerei Funalis prælongi instar. Eius è medio & striarum dorsis, anastini, angustiore ceruice, cucumeris ventre, surriguntur brachia terna, quasi folia tertia crassa, eundè comensum proportionis & figuram sortita. Intus torulus ligneus, prædurus, carpi crassitie, obductus est, callosa carne, & succo Aloes: gummeo enim turget, perquam amaro lentore: flores in fastigio summo promit, referente qui attulit, Digitalis purpureæ: fructus hilari purpura miniata rubet, ficus ferè effigie, gustu non insipido.

Idem maris Peruniani insulis, Hispaniola, & alijs, mirificè & cognatæ faciei istud spinosum foliū, ruri, ac sponte, abundè arborescit perbella foliorum annuorum succretione, NE Ficifera: & connexus: sed inde permultis in locis Hispaniæ Galliæ & Italiæ fatum, flores nec fructus pro-



Indorum TV-
NE Ficifera:
pro-

promit, quos ideo hic appinximus, quales Massileæ, in amœnissimo ad portus litora vireto strenui ducis maritimæ militiæ Petri Boni decerpimus, & permaturas esitauimus. In monachorum etiâ Paradis multis & suburbanis ad MonsPELLIUM, non modò elegantes cultæ, sed etiâ neglectæ plantæ multos annos viruerunt: adeo namq; sūt viuaces, vt tū folio semideffosso humi, tum vel seminulo sato proueniat illic: etiâq; in Belgio quibusdam Pharmacopœis foliū peperit. Vnâ mox cum ficuum rudimentis supernè in umbilicello emicāt flores calathi Balauftij quadātenus effigie, luculentiore magnitudine & luteo colore: fructus maturi ficum magnam equāt



*Indorum ferru-
minatrix.*

*Rorida siue solis
ros & Aegætiou
recentiorum, a-
lia Alchimilla
ab Droso.
Post capillares
omissa fuit.*

spinulis ambitu horrido, cute miniata purpurascēte: intus succo cruento, granis, & pulpa ficulneis, sed gustu insuauiore. Esu multo, lotium cruentum cieri pleriq; asserunt. Proximè hanc appingendum curauimus arbusculam, inibi etiâ sponte enatam & huic admodum cognatam, vocant Indi ferruminatricem, artuum fracturis & luxationibus peramicam: perpetuò viret etiâ hæc, & foliorum sobole successiua arboreâ magnitudinem adipiscitur: iisdem planè folijs sed fructu minore & spinosiore, purpureum viscidum succum remittente, adq; imbuendos pannos infecturæ tenacissimæ.

Mirifica hæc herbula & efficacitate nequiquam post habenda, plerisq; plantis apud antiquos decantatissimis, quibus fortè non nota fuit: ac ne quidem hodie admodum Italiæ, Norbonæ, Austrinæque plagæ herbarijs. Est quippe vernacula Borealiū, qui Rorè solis vocant siue *Son dau* vt cuius folia aspergine limpida & rorulenta æstate madeant, quam non modo solis feruor non exhaurit, sed etiâ augere & porro fouere videtur. In Franciæ & Brabantiæ sabulosis ac udis scrobibus interdum obuia fit: Angliæ Cantia & Somerseti præfecturæ hac adeo scatent, vt non procul illustri Cœ nobio & môte Glassemberio vocatis, quantū sat sit Equo onerâdo suppetat, fibrosa radice, senis octonisue in caudicellis flexilibus, rubellis, sesquiunciâ lōgis foli-



Arborum aduersaria, concisæque recensiones. 455.


ola oblonga, coarctata, pusillum cochlear, vel auriscalpium imitata, hirsutie purpurea puberula: ambitu crenata, subter verò glabra & polita, rotundis guttulis aspersa, viticosis cauliculis ternos quatuorue digitos longis, rubellis & inflexis, albidos flosculos gerentibus: & rotunda seia in glutinis pericarpio Anagallidis quadatenus similia claudunt: totius acris gustus, tubastringens, non nihil acidus & acerbus, admodum exsiccans. Ad falsa pituita decubitus in pulmones (quorum vlcera & tabem sanat) nulli secunda: tusa vna cum salis nigri graminis cutem rumpit admota. Fuluus aureusq; limpidus ros, qui destillatur ex folijs & flosculis, bibitur ad eadem.

Viscum Indicum superius pag. 452.



POPVLVS noni orbis.

441.




Peruniana alia Aloes facie arboribus item innaescens pag. eadem.



NVCVLA Indica. Pag. 451.





NERII facie arbor.

452.


Pragrande folium, Palmae filamentis & textura.



DEbemus etiam Occiduis Indijs istud coriaceum foliū, cui simile aut par latitudine aut crassitie nullum nouimus. E Palmae congeneri arbore euulsum videtur, quin ipsa tota textura asserem bicubitum latum, aut potius tegetem, quaternos aut quinos cubitos longum refert, tegulae modo fornicatum, & media secundum longitudinem costa semidigitum crassa carinatum, superna ora quasi praefectum esset, margine digitali tenuiore duriore, clauditur. Vniuersum folium à summo ad imum in villos, ijs quadantenus similes qui obducunt Nucem Indicam aut capillitiū texendis funibus aptum discerpitur, quemadmodum totū est tectorijs adiū & stercis accommodum.


Peruniana MECHOACÆ prouincia planta Bryonia similis.

PERINDE falluntur qui putant Bryoniam esse hanc atq; illi qui Laurum Cinamomum, & Smilacem Asperam Salsam parillam, aliâsq; complures exoticas easdem specie cum nostratibus faciunt. Hanc mittit Insula omnium quæ nostræ ætati in Occiduis Indijs innotuerunt, auro, pecore, stirpibus ditissima, *Mechoacum* vocata, cui radicem cognominem fecerunt Indi, vsuq; docuerunt Hispanos primum, ferè 20. ab hinc annis, à quibus has acceptas pingendas curauimus & quarum drachmæ puluisculo solo, sed ex vino albo aut iusculo propinato, commodissimè quolibet die, hora, & ætate, nulla molestia aut incommodo quinquies, sexties, aut septies flauas Hydricorum aquas eductas, pituitasque quasuis comperimus. Reliquæ plantæ descriptionem & historiam debemus libro Hispanicè scripto, cuius copiam nobis fecit D. Hector Nonius magni nominis & peritiæ In Angliâ Medicus Lusitanus, qui etiam huius radicis multam copiam habuit. Hanc nõ visam qui cupit nosse, intuatur Bryoniæ radicem: sunt enim concolores cortice, rugis, & ferè magnitudine: sed huius taleolæ, frustave rotunda transuersim secta, siccandi causa, intus multis circulis à centro ad ambitum parallelis, distinguuntur mandendo sapore farinaceo, nec acii. odoreq; neutiquam ingrati est: ceterò albida & friabilis, vt Bryonia, cui similem faciunt sarmentis pedamenta scandentibus, & racemis. Folia atro virentia, rotunda, perennia, Nymphææ ferè, & pariter supernè parum acuta.



SESQUIPAGINÆ alioqui vacaturæ spatium visum est explere aliquot rarissimis iconibus ex nostris rerum Britannicarum ancipitis naturæ observationibus: quas multò plures in Musarum thesauris habemus, daturi simul atq; exsculptæ erunt.

IN Angliæ littore meridiano, Insulæ Portlandiæ vocata ex aduerso Nortmanix inter fluitantes Algas reperimus plantæ quoddam rudimentum, cuius si species & attrèctes surculos palmares & sesquipalmares, pustulosos, molles, flexiles, Spongiâ prorsus dicas, cui etiam concolor est, & vixisse putes: sin habitum & ortum ramis brachiatum. Corallinis affiniore dicas, unde qui dâ apud Plinium Plocamon Isidos Coralio similem, sine folijs, præcisum mutato colore in nigrum durefcere, cum cadat frangi solitum: coniectarunt. Ea tamen videtur Antipathes Dioscoridis, cuius etiamnum ramulum habemus è Massiliensium piscationibus.



BRITANNICÆ conchæ Anatifera.

FACIT specimen istud Naturæ quippiam boni vel è sordibus meditantis, vt iam multa lubeat credere, quæ alioquin iussimus si legissemus apud rerum Septentrionalium Historicos. Quamquam paulò secus hi narrant, duntaxat in Scotia aut Orcadibus maris Deu Caledoniæ Arctici, olim à Romana classe deuictis, compertum. Nos verò non solum ex Scotia, sed etiam hic ad Tamesim annem, quâ Londinum præterfluit, conchas pediculi rugoso crassiore è naui annosæ carina auulsas habemus. Sunt eæ admodum pusille circinata ferè rotunditatis conchæ, foris albidæ, lucidæ, læues, tenuitatemque telluris quacunque


fra-

fragilem, biforem, Mitulimodò præferentes nuci Amigdalę compressę pares : pendule autem erant hæc foris ad imum ventriosę nauium carinę , cui musco & limo semiputrida innati erant quasi fungi pedicelli, quos ferè Ouracum umbilicelli dixisses , cuius chę basi, quasi vitam alimoniamq; inde sugerent auiculę, quarum rudimenta è summa parte conchę hiulcę, conspiciuntur. Pediculos istos ferunt Historici primùm è vermicellis concreari quod non potuimus scire, neq; dum credere: tametsi scimus has easdem conchulas elegantissimè efformatas in furculis arborum quā maris æstus alluit temerè proiectorum, aut depactorum sobolem esse. Earum autę quę humi, in siccio labuntur emori : quę verò alluuiionibus maris rapiuntur concha excludi, & in Anatem, aut ei congenerem auem adulescere. Has volunt esse *Barnacles*, Angli & Britanni Galli: *Clakis* vocat Scotia: vbi abundant & capiuntur dum per brumam concreuerunt gelu paludes . Sapit nobis esitantibus anatem aut Anserem syluestrem.



LITOTYL A, lignaue lapidea Anglica.

Compertum nobis est esse amnes & Riuiulos, vbi mer si pali lignei, ridicę, aut conti, aliquot mensibus lapidescunt: imò ferè, vt sic dicam, ferrescunt, eadē perstante superficie, situ striarum & fibrarū ductu pristino: vt eminus, quas assulas ligni diceret, attrectando & lapidi illidendo dicas esse lapidem ferri minerę immixtū, soliditate, grauitate, duritie & duratione lapidea nec flammis obnoxia: cuiusmodi magna frustra videre est in illo monticello affabre multiplici lapidum mineralium structura planè visenda, conflato, ad tubulos & elices transmittendos fõtis peramœni, qui scaturit in horto eximie literaturę & prudentię incomparabilis Cæcilij Anglię meritissimi Secretarij. Mirificas hasce aquas è montibus præfecturę Bedfordię & in Cambria siue Angliæ Occidua, quam Walliam vocant, emanare multi asserunt.



FINIS.

LONDINI. 1571.

Calendis Ianuarijs, excudebat prelum Thomę Purfectij, ad Lucretię symbolum.

Cum gratia Priuilegij.

-30926-

Oct. 1951

- Staack -

F 540.
-L 7975

ES71
P3975
1-SIZE

